

PAVLI AEGINETAE TOTIVS REI MEDICAE LIBRI VII. AD PROFECTIONEM

PARATI, ET BREVI SVMMA OMNIVS

medicinarum artem complectentes. Per IANVM CORNARIUM medicum Physicum Latina lingua cōscripti.

IANI CORNARII MEDICI PHYSICI, DOCTORIS  
labellarum, in Paulum Aeginetam medicum, libri VII.

Cum Indice rerum & verborum locupletissimo.



Cum Caesareae Maiest. Gratia & Privilegio ad decennium.

BASELAE PER IOANNES HER-  
VAGIOS ANNO D. M. LVI.

THE NATIONAL ANTHROPOLOGICAL ARCHIVES  
OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION  
WASHINGTON, D. C. 20560  
1900-1909

THE NATIONAL ANTHROPOLOGICAL ARCHIVES  
OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION  
WASHINGTON, D. C. 20560  
1900-1909

THE NATIONAL ANTHROPOLOGICAL ARCHIVES  
OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION  
WASHINGTON, D. C. 20560  
1900-1909



THE NATIONAL ANTHROPOLOGICAL ARCHIVES  
OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION  
WASHINGTON, D. C. 20560  
1900-1909

THE NATIONAL ANTHROPOLOGICAL ARCHIVES  
OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION  
WASHINGTON, D. C. 20560  
1900-1909

ORNATISS<sup>VS</sup> VIRO D<sup>NO</sup> MICHAELI  
MEIENBURGO NORTHVSIIEN. COS. ET  
*compatri suo Chariss. Ianus Cornarius*  
*Medicus physicus.*

S. D.



Nullum aliquod studiorum genus est Cos. grauissi-  
me, quod aequè omni utriusq; sexus aetati, summis &  
infirmis, diuitibusq; pariter ac pauperibus, & utilita-  
tem de se exhibet, & necessariò ab omnibus expeti-  
tur, id esse studium conseruandae sanitatis, neminem  
negare audere arbitror, quum hoc supra communem  
experientiam, tot in uita uulgata dicta confirment: inter quae etiam illa  
circumferuntur, ut sanitate uita nil melius habet: & Non est uiuere, sed  
ualere uita. Atq; ego admodum adolescens in eam sententiam deueni.  
Nam quum puer domi satis negligentem, quod ad uictum attinet, edu-  
càret, & puer adhuc à patre ad externas scholas emittere, usq; ad adole-  
scentiae ferè finem, corpore non adeò firmo fui, sed quod ex facili afficerer-  
tur, ob uictus iusti negligentiam, Imò ut rectius dicam partim ignoran-  
tiam, partim inopiam. Quod ipsum quum non ita tardè intelligere in-  
ciperem, circa annum aetatis decimum octauum, animum ad medici-  
nae (quam & conseruandae sanitatis & amissae recuperandae siue curan-  
dorum morborum artem esse audieram) studia adieci, nò admodum pro-  
bantibus id parentibus ac amicis, qui sacris literis & pietatis religioni  
me addicere conabàtur. His itaq; etiamsi obsecundandum ducerem, ta-  
men magis literarum ac linguarum studio inhærens, per aliquot annos  
ita progressum faciebam, ut si omnino factis iniiciendus essem, non ita in-  
depetus ad hoc uiderer: & medicinam tamen neutiquàm negligebam, sed  
professores publicos audiebam, non uelut artis assecla, sed ut uerum fa-  
ciar, uelut explorator, & prout aetas ferebat, uelut arbiter aliquoties his  
aures prebens. Et quanquam iudicio meo non ita confiderem, ut quid-  
de eius seculi medicina sentirem publicè proferrem, & esset quaedam quo  
que reuerètia publicè docentium, qualiacumq; uidelicet didicissent: ta-  
men nò obscurè intelligebant illi quibus me associabam, non uideri mi-  
hi satis sanum esse hoc, tum autorum, tum professorum genus, quod tunc  
scholas medicas occuparet. Praelegebatur autem Auicenna, qui princeps  
totius artis habebatur ac appellabatur. Praelegebatur Rasis, & praeser-  
tim bonus ipsius ad Almansorem liber: in quo absoluta curandorum  
omnium morborum ratio proponi ferebatur. Allegabatur interim alijs  
ab alijs faciendae medicinae, siue ut uocabant practicae scriptores recentio-  
res, Bertratius, Gatinaeus, Guainerius, Valescus, & aliorum innumerabi-  
lis turba. Sed inter praecipuos prodecebat Arculanus què alijs Hercu-  
laeum uocant. At Graecorum medicorum, uelut Megaresium, nulla  
ratio habebatur, nisi obiter mentio incidisset Hippocratis, ac Galeni &  
Dioscoridis: Nam reliqui penitus ignorabantur, & nec nati sciebantur.

Et illorum scripta nec Græca, nec Latina extabant, nisi quòd translationes quædam corruptissimæ pariter ac barbarissimæ ex Galeno, à paucis magni thesauri loco possiderentur & æquè uitiatæ, ac non satis latini, Hippocratis exigui mole libelli haberentur, alter Aphorismorum, alter prognosticon, qui aliquando itidem in scholis prælegebantur, ubi magni illi principes ultro his locum cesserant. Quòd itaq; hoc autorum ac professorum medicorum genus, nec sanum nec rectum esse iudicant ex linguarum studio, quod tum in Germania florere incipiebat, assequi mihi uidebar. Quum enim omnes relatos autores barbarissimos esse uiderem, ut nunquam quòd dicere, aut docere uellent, satis intelligendū exhiberēt: & publici professores adhuc illis longè inferiores per omnia audirentur, nō dubitabam Græcos medicos optima scripta prodidisse, & maximè dolendum esse iudicabam, eorum nihil ad nos extare, aut haberi, quod sciri posset. Itaq; etiam si toto pectore à scholarum doctoribus abhorrerem, & barbaros illos autores auersarer: tamen nomine atque dato eo progressus sum, ut medicinam aliquot annis exercuerim ultra citroq; Oceanum magnū apud Liouones, Rutenos, & in illustrium principum Megalopyrgeum ducatu ac aula, utēs quidem barbaris illis magistris præuijs: quid enim aliud facerem in meliorum egestate? sed sperans quotidie fore, ut aliquādo inciderem in optimos artis autores, græcos sua lingua loquentes. Et hac de causa quum per Belgas ad Anglos, & rursus ab his per Gallias peregrinatus, Italiam petere constituissem, ubi Basileam perueni, cōmodum reperi illos penitus interis̃se creditos medicos græcos, Hippocratem, Galenum, Paulum Aeginetam, Dioscoridem, ex Aldina Venetis̃ officina excusos, & ad Ioannē Frobenium, qui paulò antea è uiuis excesserat, perlaros, ita ut hi in officina Frobeniana, Cuius tum Hieronymus Frobenius successor & hæres erat, eomodo essent, ut doctis ac studiosis non solum legendi illos, sed etiam utendi larga facultas exhiberetur. Atq; ego quidē si mox Basileę reperissem qui lōga peregrinatione exhaustos loculos mihi largo auro repleuisset, & uestitum aliamq; suppellectilem partim detritam, partim diuenditā, ac uelut uia onus relictū, luculenter suppeditasset (sicut sanē reperi paulò post illic qui ob medicinam utrunq; offerrent ac exhiberent) tamen tam magnō gaudio neutrum admisissem, quāto me affecit optimus uir Hieronymus Frobenius, qui ubi me ignorum sibi penitus, familiariter excepisset, & in amicitia recepisset, de græcis illis autoribus apud se extantibus edocuit, & ipsos paulò post utendos dedit. Horum itaq; usus Italiae uisendæ desiderium plurimum mihi mitigauit, & me per integrū annum Basileę retinuit, qui erat à septembri anni uicesimi octauī, usq; ad septembrem anni uicesimi noni, supra Christi nati maioris numeri annos, mille, quingentos. Quo tempore quum Erasmus Roterodamus in eā urbe uiueret: etiam si ob tumultuantem rem publicā postea inde Friburgū Brisgoę se cōferret: multi quotidie docti homines ac studiosi adolescentes, ex Italia & Gallia, alijsq; regionibus ad illū & uidendū, & salutandum affluebant: Quos etiam ut mihi familiares facerem, ex



illius & aliorum doctorum hominum, Basilienſium diuini familiaritate contingebat. Intet hos autē non poſtemus I. Heruagius fuit, qui defuncto Frobenio, & in thoto matrimoniali, & in officina ſucceſſit, & poſtea multos bonos autores, & nunc Paulum hūc typis excudit. Ex illo potro tempore reprobatis ac reiectis medicis illis barbatis, quos per totos nouem annos ſequutus eram, totum me ad græcam medicinam cōtuli, græciſq; medicis me totum addixi, quos & ſequor & ad quorum imitationem medicinā exerceo, & iam per uiginti ſex annos Germaniæ noſtræ perſuadere perſeuero, hos eſſe ueros medicos, & rectos artis medicę autores, ipſorū maxime lingua legendos ac ſequēdos. Et ut nō eſſet quōd quererentur aliqui, uel de græcę linguę ignorantia, aut horum autorum difficultate, conatus ſum græcos illos medicos facere latinos, non obſcura & perplexa ſed lucida & explicata uſus illorum in latinā linguā translatione. Extat itaq; Hippocrates noſter latinus, magnę doctrinæ, ingentis utilitatis, immēſæ difficultatis opus, ſupta duo milia annorum ab omnibus in latina lingua deſideratum, & à uullo unquāmfelicitē ante nos tentatum. Extat Galenus totus, magna ex parte per nos latine loquēs, & reliquis aliorum translationibus noſtra opera caſtigatis. Extat Aetius, qui totam medicinam ſedecim libris includere conatus eſt. Prodidit breui noua noſtra Dioſco. translatio, noſtris itidem emblematis illuſtrata. Nunc uero damus Paulum Aeginetam, qui idē quod Actius ſeptem libris efficere ſtudio habuit. Et ad hunc acceſſerunt noſtri doctellatū libri ſeptem, quibus difficilēs & obſcuros ac aſperos eorum librorum locos explicamus, illuſtramus ac dedolamus: non ad hunc alioqui autotem ſolum intelligendum conferentes, ſed etiam ad multos alios græcorum medicorum locos: quemadmodum etiam antea cōmentarios medicos in Galeni quidē libros. κατὰ τὸν τῶν τῶν conſcripſimus, ſed quos ad omnem ueterem græcam & latinam medicinam rectius intelligendam utiliſſimos eſſe iudicamus. Hæc ad te Michael Meienburge publica hac præfatione recenſete uifum fuit, non in aliquam gloriatio/nis, ſpeciem, ſed ut ſtudiorum meorum ratio omnibuſcōſtaret, & quōd nihil opis aut operæ omiſerim, ut recti ac ueri ueteres medici in lucem reuocarentur, barbara ac corrupta medicina exularet, & in ſumma, ut quantum in me eſſet, rebus mortalium iuuandis, ſanitati conſeruandæ, morbis depellendis, amplius ac ſpacioſus campus aperiretur: qui ſanē in reſatis autoribus uerſari uolentibus, undiquaque amœniſſimus competitur. At uero quid his præſtandis effecerimus, nulli iactamus. Per omnē ferē Europam diſperſis his autoribus, nuſquā deſunt qui optimā ueterem medicinā expaſſis ulnis excipiant, & omni ſtudio proſequant. Sed obſurduerunt tamē magna ex parte publicę ſcholę, nec ſana cōſilia admittunt, ſed antiquam ſuā cantilenam canunt, & cum Gryllo grunnt, & in luſo ſe uolutare malunt, q̃ priſtina forma exuta, homines puritatis ac recti amantes conſpici. Sunt rurfus alij, qui græcos medicinæ autores & ipſi recipiunt, & recipiendos cenſent, & ut recipiantur etiam ſuam operam ſtenuē nauant, ſed Arabum medicorum iugum, uelut

ad quod adfueverunt, ut ego quidē arbitror, excutere non audent. Quibus sanē precor, ut inæquali illo partim græco, partim Arabico iugo, se minus grauari sentiant. Verum his qui nos sequi uolent, satis erit græci iugi onere premi, aut potius suauitatem eius experiri, & sub optimis artis magistris eō eniti, ut exhausti laboris iucundissimi fructus ipsis contingant: qui sunt sanitatis tutela, & morborum medela. Hos enim fructus longē iucundissimos proferūt nobis græci illi medici scriptores, ut apud nullos alios querere, nec aliunde deliderare sit opus. Et alioqui præstabilius est de fontibus haurire, quàm de riuīs, etiamsi inde detiuentur. Ad horum medicorum præscriptum reformata uelim Pharmacopolia Europea, & quoquo uersum se latissime Romanum Impetium extendit. Nam quod de bello dicitur, multa sunt in bello inania, id molto uerius de nostri seculi officinis medicamentarijs dici metetur, multa sunt in Pharmacopolijs inania. Et ut nihil dicam de his siue simplicib, siue compositis medicamētis, quæ tempore exoleuerunt, & præ ætate uires suas amiserunt: neq; de his quæ falsa pro ueris agnita usurpantur: neq; de his quæ quum uera sint, & recte se habeant, aut non rite parantur aut non prout debent in usum ueniunt: tot syruporum ac Iuleporū batis nominib, appellatorū, inutilis onerosaq; turba: tot aquarum per fornacis uim, de simplicibus medicamētis extortarū, rudis indigestaq; moles, Pharmacopolia tenet, quæ non alio q̃ calorum ac lixarum impedimentorumq; bellicorum loco haberi meretur: quum Hippocrati ptisana, cum familiaribus naturæ humanæ potionibus, uino, aqua, aqua mulsa, aceto mulso suffecerit, uelut iustus exercitus, ad omnes morbos acutos expugnandos. Ad Hippocraticum itaq; præscriptum, uelut ad Polycleti regulam, reformanda omnia illa ac usurpanda essent, neq; ulterius progrediendum, quàm in quantum Galenus & reliqui, quos dixi, græci medici nobis præuios se exhibuissent. Neq; enim dubium alii cui esse debet, græcos medicos Hippocratis uerbis persuasos, ut modū non ita nimium excederent, se continuisse: & contra arabas ac Mauros ijsdem uerbis inductos, latius euagatos esse, & tot uariarum potionum, & aquarum destillatarum formas excogitasse ac inuexisse. Verba Hippocratis ex lib. de rati. uict. in morb. acutis, postquàm de supra relatis docuit, hæc sunt. Cæterū de reliquis potibus, qualis est ordeacea, aqua & qui ex herbis fiunt, & qui ex una passa, & uuarum expressarum terti mentis, & ex tritico, & cnico, & myrti baccis, & malo punico, & de alijs, ubi alicuius ipsorum usus contigerit, scribetur circa ipsum morbum quemadmodum etiam de alijs compositis medicamentis. Atq; hæc nō sub præcipientis, (neq; enim tantū mihi sumo) sed sub monentis persona, à me dicta accipi uolo, ut hi qui memoratis pharmacis uti uolent diligenter expendant quos sequantur, & quibus in morbis, & in quibus corporibus ac temporibus ea propinent, & cautissime circa multiplicē eorum usum se gerant. At uero sicut in Pharmacopolijs multa sunt inania, ita magna fiducia quidam nostra ætate per annos iam plus minus quinquaginta, ad unius medicamenti usum se contulerunt & primum quidem

quidem aduersus unum quendam, uariarum tamen specierum, morbum  
 nouum creditum, & Gallicum appellatum: quem ego ueterem esse, &  
 λειχῶν nomine Græcis uenire, & apud Plinium, & apud Galenum,  
 Mentagram appellari non dubito: postea uero in communi aduersus  
 omnes, ita tamen ut alij aliorum purgantium, et digerentiū, ac uires cor  
 roboratiū medicamentorum usum, ad unius illius primum per se u/  
 surpati, ligni Guaiaci appellati, et hebeni generis nō male iudicati, usur/  
 pationem adiungerent. Atq; ego sanē omnes qui hoc medicationis du/  
 ctu uisunt medicos noui plures ex ægrotis ἀνδρῶν ποσὶ ἀλάσαι, quā cura/  
 se ad integram sanitatem restitutos, siue hoc morbi malignitati, siue æ/  
 grotorum fato, siue medicorum imprudētiæ adscribi debet: nihil enim  
 definitio: sed ut hinc nouorum & incognitorum medicamentorum: nisi  
 quatenus felix iterum atq; iterum facta experientia docuit: usus pericu/  
 lum cognoscatur, in medium adduco. Idem profecto nouitatis studium  
 nuper adeo etiam radicis Chinæ usum inuexit, radicis quidem nec ad/  
 modum nobilis, nec satis cognita, sed cui tamen aliqui nō parum quid  
 amplius tribuunt, in omnibus morbis curandis, quā ipsi ligno Gua/  
 iaco. Sed quem in talibus exoticis inuehendis sperabimus finem, si ita  
 procedet nouarum rerum experiendarum libido, quæ recens etiā Spar/  
 tam parillam ex India apportauit, cuius stirpis item et superiorum de/  
 coctum, omnia morborum genera, & imprimis gallicū sanare creditur.  
 Ego certē ut nihil temere affirmandum, neq; quicquā leuiter contem/  
 nendū puto iuxta id quod Hippocrates dixit, μηδὲν ἐνὶ, μηδὲν ὑπερπο/  
 ρῶν: ita illud quod idem circa morbos exercere iubet, cautissime obser/  
 uandū duco, ἀσκήσειν inquit, ποτὶ τὰ νοσήματα δινοῖ, ἀφιλεσει. ἢ μὴ βλά/  
 ψει: maxime quum compertum sit, quædam etiam præsentī sua com/  
 moditate, longum in posterū ac grauius malum inducere. Proinde græ/  
 cos medicos, uelut optimos ac cautissimos magistros, & maxime admi/  
 ror, & libentissime, dicam etiam felicissime, sequor, & alijs sequendos  
 esse iudico. Et hac de causa post illos supra relatos, etiam Pau'um Aegi/  
 nctam ad latinos transcribendum ac publicandum duxi, uelut uetæ ac  
 sanæ medicinæ certissimum exemplum. Hunc autem autorem peculi/  
 riter tibi compater charissime dicare uolui, tum ob præceptionum in ip/  
 so breuitatem, tum ob totius operis non onerosam ad eō molem, ut tibi  
 familiaris, & in multo usu esse possit, id quod neuitquam in istis maxi/  
 mē occupationibus tibi negligēdum esse nosti, ex Hippocrate edoctus  
 qui dicit, Virum prudentem ratione apud se inita, quod maximi pretij  
 res est hominibus sanitas, nosse conuenit quomodo ex sua ipsius intel/  
 ligentia, in morbis utilitatem capiat. Nosse autē conuenit ea quæ à medi/  
 cis & dicuntur, et adhibentur corpori suo, eaq; cōiudicare posse. Et quā/  
 quā mox in eodem loco, libri ποτὶ παθῶν principio subiiciat: At  
 quæ hæc singula hæcenus nosse satis est, quatenus idiotæ cōtingere po/  
 test: tamen tibi in literis, sapientiæ ac eloquentiæ studio tantam clari u/  
 dinem adepto, nō hæcenus nosse, satis esse debet, aut potest, sed præco/  
 amore quo recta, & hæc nostra studia colis, longe altius ad sanitatis træ

curam te immittes. Sed stultum sit me præscribere modum ei qui iam multis annis, à prima adolescentia, in maximis rebus ad consilium adhibitus sit: ut in te ac prudentia tua plurimum situm esse, omnibus constet, quo patrijs regionibus pax, religioni cōcordia, & Germaniæ tranquillitas contingat. Hoc itaq; ut felicem successum deo opt. Max. largiente efficias, uel ego maxime omnibus uotis expecto. Nihil enim libetius in hac in grauescente ætate uideā, quàm ut uirtuti, & rectis studijs suus honor, pietati ac religioni suus cultus restitatur: bonis recte factorum præmia, improbis cōtraria contingant: ad quas res omnes his turbulentissimis temporibus miserrimè afflictas ac intercisas, aliquādo & ut speramus breui reparandas, tu plurimum conferre posse, & collaturus esse crederis. Neq; enim sine his duabus rebus, premio uidelicet & pœna, respub. in integro statu contineri potest. Er sicut Plato dixit extremum iniustitiæ terminum esse, si qui iustus non sit, pro iusto habeatur: Ita extremus impietatis & maliciæ terminus est, haberi aliquem piū & bonum, qui talis non sit. Quod uero ad me attinet, ut non dubito quin hoc meum officium, tibi hunc meum laborem inscribendi ac dicandi, gratum tibi sit futurum, ita mihi satis est, si uicissim intellexero, memoriam nominis nostri esse apud te integrā, cui à prima nostra tua cognitione semper, sic nunc ita turbatis rebus uel maximè, recte probari cupio. Vale Zuicauj. Calend.

April. M. D. LV.

Paulus Aegi.

# PAVLVS AEGINETA DE SEIP<sup>a</sup>

SO, AC OPERE SVO.

Pauli laborem me uides, qui plurimum  
Eminus orbis, ortus est ex Aegina.

## PRAEFATIO TOTIVS OPERIS.



**N**ON sanè quod à ueteribus quid circa artis tractationem  
pratermissum sit, ad huius operis compositionem perue-  
ni, sed compendiarie doctrinae gratia. Vice uersa enim  
ab illis quidem recte accitro defectum omnia elaborata  
sunt. Recentiores uero supra hoc quod neq; omnino ip-  
sos attingere student, etiam garrulitatem ipsorum damnant. Qua de cau-  
sa ad hoc opus adornandum progressus sum, quod his qui ipsum, uelut par-  
est, habere uolent, commentarij ac monumenti usum exhibebit, mihi uero e-  
xercitationis loco fuerit. Absurdum enim est, rhetoras compendarijs in-  
dicialibus libellis ad profectiorem paratis uti, in quibus uniuersarum legu-  
summa continentur ad usum expositae: nos uero tales negligere, & quidẽ  
quam illi non ad modicum solum, sed longum etiam tempus, considerationẽ  
differre possint, nos autem nunquam, aut ualde raro, eiusmodi facultatem  
habeamus. Nam necessitas in quibusdam morbis saepe numero sollicitudinẽ  
requirit neuiquam differendam. Quapropter recte Hippocrates tempo-  
ris occasionem praecipitem pronunciauit. Illos equidem in solis feri urbi-  
bus negotiorum usus urget, in quibus etiam librorum luculenta adest co-  
pia. At Medicis non solum in urbibus, aut agris, aut desertis quibusdam  
regionibus, sed etiam in mari saepe, in ipsis nauibus, repentina morborum  
necessitas ingruit, in quibus dilatio mortem, aut omnino periculum extre-  
mum inducit. Caterum omnem medendi methodum, aut omnem particula-  
rem materiam, memoria tenere difficilimum est, aut etiam omnino impos-  
sibile: quare hoc compendium ex ueteribus collectum confeci. Neque enim  
neas fortunas in ipso proposui, paucis quibusdam exceptis, quae inter artis  
opera, & uidi, & experientia cognoui. Verum in pluribus praclaris uer-  
satus, & maxime in Oribasio, (qui & ipse totu librum, in quo omnẽ tuen-  
de sanitatis rationem tradidit, instar florum aliunde decerpfit. Nam post  
Galenum & adhuc iuniores fuit) optima ex his delegi, nullo quantum ei-  
us fieri potuit morbo praetermissa. Etenim Oribasij opus illud in septua-  
ginta libros distinctum, omnem artis doctrinam in se continet. At non fa-  
cile parabilis est tantae molis opus, ad multos adeo uersus extentum. Epi-  
tome uero compendio omnia huius tractans, ad filium Eustathium scrip-  
ta, multos morbos penitus non habet, & reliquorum tractationem imper-  
fectam continet, ita ut iam causae iam cognitionis signa, quandoq; etiã sus-  
ficiens curatio desit, itemq; alia quae mentionem sui fieri postulant. At ue-  
ro praesens nostrum scriptum, & signa, & causas, & curationes omnium  
morborum, similarium, instrumentalium, & eorum qui in unionis solutio-  
ne considerantur, comprehendit, nõ modo summatim, sed etiam diffuse, pro-

Recentiores  
damnant uete-  
res

Dilationis pe-  
riculum

Oribasium

ut res ipsa exigit. Et ante horum aggressionem, totam tuenda sanitatis ex  
uictu rationem exposuimus. Postremum uero librum, de medicamentis tum  
simplicibus, tum compositis conscripsimus.

QVAE IN VII. TOTIVS OPERIS.  
libris contineantur.

**I**N primo omnem tuenda sanitatis comperies doctrinam: & affectio-  
num etatibus, temporibus, temperamentis, & quibusdam alijs peculia-  
rium praeservationem ac correctionem: & alimentorum omnium vires ac  
usus per capita expositos.

In Secundo februm omnium doctrina habetur, praemissis his quae ad ip-  
sam conferunt, nempe ex recrementis, & diebus iudicatorijs, & alijs si-  
gnis, subiectis item symptomatis ad febres consequentibus.

In Tertio de affectionibus in locis consistētibus tractatur, initio à sum-  
mo capite facto, ita ut ad summos pedes, usque ad ipsos ungues deueniamus.

In Quarto de affectibus extrinsecus corpus impetentibus, & uelut  
in propatulo consistentibus agitur, non quidem in certis, sed in plurib. par-  
tibus. In quo etiam de lumbricis, & dracunculis dicitur.

In Quinto de uenenum iaculantium plagis ac morsibus tractatur. In  
quo etiam de morsis à cane rabido, & aquae formidinis affectu agitur. Itē  
de morsis à cane non rabiente, & de morsis ab homine. Ibidem quoque de ve-  
nenis, & auxiliariis aduersus ea medicamentis habetur.

In Sexto omnia ad chirurgiam pertinentia recensentur, tum circa car-  
nem, ubi & de telorum extractione agitur, tum circa ossa, In quibus etiam  
de fracturis, & luxatis sermo habetur.

In Septimo omnium medicamentorum vires continentur, primum qui-  
dem simplicium, deinde uero compositorum, & praesertim eorum quorum  
in aliorum sex librorum decursu mentionem fecimus, maxime maiorum &  
compositionis appellationem adeptorum. Neque enim placuit nobis in di-  
lis sparsim omnes compositiones collocare, quo & doctrina minus perur-  
bata esset, & ut quis unam aliquā quaerens, aut etiam plures ex nobilibus  
compositionibus, facile reperiat. Ad finem uero quaedam ad componenda  
medicamenta conducentia, & succedanea inter se species referuntur. Ita ut

totus liber in doctrinam de ponderibus ac mensuris absolua-

tur. Primum igitur librum iam exor-

diemur.

Liber pri-

LIBER I.

Primus totius operis præfatus liber existit, in quo omnem tuenda sanitatis rationem percurramus, uelut & iam in præfatione dictum est, & rursus per capita referetur, ubi hoc tantum antea protulerimus, quod in primo & secundo libro plurima ex Oribasio transcripsimus. Non enim nostram sententiam producere uolumus, sed ex omnibus utilitatem colligere. At in reliquis quinque libris paucissima ex illius scriptis relata sunt.

CAPITA PRIMI LIBRI.

De his quæ accidunt prægnantibus, & quomodo uiti debeant	Cap. I	De repletione	Cap. XXXII
De nutrice	Cap. II	De ebrietate	Cap. XXXIII
De lacte nutricis	Cap. III	De his quibus corrumpuntur	Cap. XXXIII
Quomodo uiciosum lac corrigatur	Cap. IIII	De uenere	Cap. XXXV
Educatio pueri	Cap. V	Ad impotentes ad coitum	Caput XXXVI
De pustulis puerorum	Cap. VI	De immodico coitu	Cap. XXXVII
De Tussi & grauedine pueri	Cap. VII	De seminis redundantia	Caput XXXVIII
De peruritu	Cap. VIII	De perfrigeratis	Cap. XXXIX
De dentitione	Cap. IX	De adultis à sole	Cap. XL
De Aphtha ulcere	Cap. X	De pituita in superiore uentre redundantem	Cap. XLI
Ad femorum intertrigines	Cap. XI	Quomodo qs facile uomat	Cap. XLII
Ad anrium humiditates	Cap. XII	De subducentibus aluum & urinam moventibus in sanis	Cap. XLIII
De Striâ	Cap. XIII	De infusis per clysterem	Cap. XLIII
Vicius infantium, & reliquarum ætatum usque ad inclinatam	Cap. XIII	De glandibus	Cap. XLV
De frictione præparatoria	Caput XV	Quæ commansa, aut naribus indurata ac illita, pituitam à capite ducant	Cap. XLVI
De exercitijs	Cap. XVI	Quæ menses ducant	Cap. XLVII
De exercitiorum speciebus	Caput XVII	Sudorifica	Cap. XLVIII
De frictionum speciebus	Caput XVIII	De aere	Cap. XLIX
De uocis exercitio	Cap. XIX	De aquis	Cap. L
De lassitudinibus ex exercitijs	Cap. XX	De balneis	Cap. LI
De cutis adstrictione	Cap. XXI	De balneis naturalibus	Caput LI
De lassitudinibus spontaneis	Cap. XXII	De uicij temporibus anni singulis conueniente	Cap. LIII
Vicius senum	Cap. XXIII	Vicius negocialiam uitam degentium	Caput LIII
Ad rugosum corpus	Cap. XXIII	Vicius iter facientium	Caput LV
Vitacandum odorem spiret corpus	Caput XXV	Vicius nauigantium	Cap. LVI
Vit recalescat habitus	Cap. XXVI	De carniū imminutione	Caput LVII
Ad colorem uitiatum	Cap. XXVII	Quomodo attenuatos renutrire oporteat	Cap. LVIII
Ad liqores	Cap. XXVIII	Quomodo quis partes corporis attenuatas curare possit	Cap. LIX
Dentibus præseruandis	Caput XXIX	Dignotio optimi temperamenti	Caput LX
Vt ne gravis sit auditus	Cap. XXX	Dignotio corporum distemperatorum	Caput LX
Ad caliginem oculorum	Caput XXXI		

PAULI AEGINETAE.

rum	Cap. LXI	De leguminibus	Cap. LXXIX
De capitis formatione	Cap. LXII	De fructibus fugacibus	Cap. LXXX
Cerebri temperamentinota	Cap. LXIII	De fructibus arborum	Cap. LXXXI
Ventriculi temperamentinota	Cap. LXIII	De animalibus, & primum de volu-	Cap. LXXXII
put	LXIII	tibus	Cap. LXXXIII
Pulmonis dignotio	Cap. LXV	De ouis	Cap. LXXXIV
Cordis nota	Cap. LXVI	De pedestribus animalibus	Cap. LXXXV
Hepatis temperamentinota	Cap. LXVII	De partibus animalium	Cap. LXXXVI
put	LXVII	De lacte	Cap. LXXXVII
Tertium temperamēti dignotio	Cap. LXVIII	De lactis potu	Cap. LXXXVIII
put	LXVIII	De lactis casso	Cap. LXXXIX
De omittis	Cap. LXIX	De caseo	Cap. LXXXX
Calidae corporis intemperiei corre-	Cap. LXX	De piscibus	Cap. XC
ctio	Cap. LXX	De testaceis	Cap. XCI
Frigidae intemperiei correctio	Cap. LXXI	De mollibus	Cap. XCII
put	LXXI	De cartilagineis	Cap. XCIII
Sicca intemperiei correctio in uen-	Cap. LXXII	De ceraceis	Cap. XCIV
triculo, uelut exempli causa. De	Cap. LXXII	De uini facultate	Cap. XCV
inde etiam reliquarum intemper-	Cap. LXXII	De melle & aqua multa	Cap. XCVI
rierum	Cap. LXXII	De somno	Cap. XCVII
De alimentorum facultatibus	Cap. LXXIII	De uigilia	Cap. XCVIII
put	LXXIII	De sopore graui	Cap. XCIX
De oleribus	Cap. LXXIV	Dioclis epistola praeseruatua	Cap. C
De Asparagis	Cap. LXXV		
De radicibus esui aptis	Cap. LXXVI		
De Tuberibus & fungis	Cap. LXXVII		
LXXVII			
De frumentaceis	Cap. LXXVIII		

PAULI



IN PAVLV M  
EGINETAM  
INDEX.

## A



Bis arbor	277.4	Aerugo in unguentis	349.4	Amygdala	25.6
Abortientes imman-		Aesculapius pulvis	324.6	Anacardis	317.6
tia	13.6	Aeris frigidi & calidi excessus no-		Anatis ceno	26.4
Abfcessum chierur-		cium	303.6	Anarrhinon	271.4
gia	218.6	Aes usum	302.4	Ancl	260.6
Abfcessus rampentis	121.6	Aestatis uictus	14.4	Anchilops	84.6
Abfcessus quid continet	162.6	Aetatum uictus	3.6.4.4	Anchusa ingetum porcinum di-	
quid sit	163.4	Aetonochois herba	288.4	cta	113.4
Abfcessus nervorum & abfcs pro-		Alerum factor	106.6	Ancylofes	132.4
gressu inflammatione	162.6	Alaris	221.6	Anchusa Chaeos pelettrum	312.4
Abfcessus in tunica, sine tunica.		Alauda	185.4	Ancyle	182.4
pag.	163.4	Albuginis	86.6	Andronius pestilus	321.6
Abfcessus corporis externi	161.6	Alcibiadium herba	278.4	Androsomon	301.6
eos rampentia	162.6	Alcibiadus eiusq. uires	268.4	Angine & huic affinia	97.4.6
rudentia	165.4.6	Alica	24.4	Anhelosi	100.4.6
Abfctibz poris	45.6.75.4	Alcutia quid	28.6	Animaliam partes quae, quibus	
Achoris curatio	159.6	Alimi uis	23.2	praesent in cibum	26.6.27.4
Achor	64.6	Alexander medicus	146.6.314.6	Anime uicia quibus Venus mede-	
Acmofirmis tunicae affectiones.		Alexander	98.4	tur	9.4
pag.	86.4	Alexandria operatio	275.6	Ani inflammatio	130.6
Acetum	310.6	Ale usio	223.6	Animalia pedestria	26.6
Acetum mullum Iuliani	307.4	Allium	24.4.298.4	Animalia	26.6.6. & deinceps.
Acetum	292.6	Aloes usum mirandus	185.4	Animalium syluestrium in esum	
Acetum scilliticum	314.4	Aloes usum quotidiani	75.4	uis	27.4
Acetum mullum scilliticum.	314.6	Aloe mane danda	304.6	Anicetum	357.4
Acetum Aegyptium	154.4	Aloe quibus danda	305.4	Animi remissi commoda	3.6
Acetum mullum Iulianum	74.4	Aloes usum quando periculofissi-		Ani fistula	240.6
Acetum mullum simplex	314.4	mus	57.6	& hemorrhoides	241.6
Aeris solum melli cupientes sana-		Alopecia barbarum	85.4	Aneurysma	180.4.230.4
re	10.6	Alopecia	62.6	Anni tempora quomodo humores	
Aerium esur	74.4	eius curatio	62.4	in homine uarie afficiant	31.6
Acopa unde dicta	344.4	Alui excrementorum ratio	42.4	Anni temporum ratio	319.6
Acoporum usus	183.6	Alui profluvium	110.4	Anni usum medicamenta quibus sa-	
Aescens in uentriculo cibis	107.6	Alum subducens	11.4.6.29.4	luti, quibus morti fuerint	142.6
Aconitum haustum	201.4	Alum molliens per os accepta.		&	143.4
Acrochordon	180.6	pag.	111.4	Anterus pulvis	136.6
Acron Agrigentum	50.6	Alum humilem ac fluidum fiste-		Antemis	302.4
Aculos extrahemus	179.6	re	58.4.6	Anferes	26.4
Ad eboreas	167.6	Alus puero quomodo soluenda.		Antigoni regis praesentia	30.4
Adipem uis & delectus	170.6	pag.	2.6	Antidotum mensura ratio	198.4
Adipes animalium	298.6	Alum resiccata mouentia	58.4	Antidoti annui usus	148.6
Adipem cibum	17.4	Alui profluvij in pueris curatio.		Antides unde dicta	216.6
Ad dentes attritos	95.6	pag.	3.4	Antidotum uaria ex papeuerum et	
Adstringens	186.6	Alui subductio omnium humorum		pitibus	315.4
Ailures	231.6	commune auxilium	14.6	Antidoti uarie	312.4
Agroci usus	305.6	Alum subducens	78.4	Antides	96.6
Agrileum nigrum haustum	104.4	Alysson	190.6	Antillium malagma	342.6
Aeris optimi nota, & pro corpo-		Alysson purgens	306.4	Antylus	218.4
raui temperie accommodatio	12.6	Alypon quae Alypiat	306.4	Anus procidens	132.6
Aeris ambigui nos necessitat	50.4	Amazonum pastillus	321.4	Anus non perforatus	242.4
Aegilops	114.4.6	Amarantum	277.4	Apium montanum	292.6
Aegilops	84	Ammanite	24.4	Apium	23.4.196.6
Aeris flos	303	Ambustis pilos producere	160.4	Apium sylvestre	277.4.298.4
		Ambustis uideri	159.6.165.4.6	Apios	306.6.310.6
		Ambrosia uis	272.6	Apiastrum	189.6
		Agnoris affectio	76.6	Apes ne fruant	182.6
		Amphibena morsus	194.4	Aperientia	190.4
		Ampeloprefon	24.4	Aphrodisiasticon clidion	310.6
		Amylum	24.6	Aphroditarium pastillum	324.4
				&	Apibis

Aphebe ulcери in pueris uidentia.	169. b	Articuli contusi & luxati	169. b	lidiatem	114. b
pag.	1.4	Articularis morbus	142. b	Attenuantia crassos humores, pe-	108. b
Apomeli	127.4	Articulorum inflammatio ignem fa-	145.4	gina	108. b
Apomelitis autilitas	126. b	crum referent	179. b	Attenuantia partes carere	16.4
Apomeli	126. b	Articulorum ulcera	179. b	Auditus grauitas	90. b. 91. b
Apoplexia est syderatio	76. b	Articuli osium ad manum fractu-	155.4	Auditus grauitatem corrigere	8.4
Apochima	118. b	ra	161. b	Auditorij meatus non perforari	pag.
Appetentia canina	179. b	luxatio	161. b	Auditorio meatui illapsa	114. b
Apteris natura	191.4	Arteria dilatatio	130.4	Auris contusa	150. b
Apum idus cura	191.4	Arteriarum dissectio	107. b	Aures cruentae	91.4
Apryani radix	131. b	Arteriarum scissio	98.4. 99.4	Auribus excrescens caro, & efflu-	91.4
Aqua frigida acervatum pota, pa-	104. b	Arteriaca afflicto	72. b	illapsa	91.4
gina	104. b	Arteriam fecere	99. b	Aurium ulcera	91.4
Aqua frigida lacrum quibus con-	11. b	Arteriaca hypoglossis	273. b	item pus & sordes eorum	90. b
uenit	139. b	Artensia	204.4	nerinulatio, sonitus, con-	90.4. b
Aqua formido	139. b	Artis resoluti	114.4	sio	90.4. b
Aqua ad potum malas corrige-	11.4	Ascitis peruncilio	301. b	Autum carnes, & inter se compe-	104.4
re	11.4	Afcyrrhon	270. b	ratio	104.4
Aquale palpebre	181. b	Afcyrrhi uis	186.4	Auribus qualitas esse debent, ut ubi	90. b
Aqua calida hernalis faucibus inji-	106. b	Afcari ter, lubricorū species.	112. b. 114.4	beantur omnia	90. b
ca	106. b	& suffus	192.4	Aurium affliciones	89. b
Aquam euacuanda	15. b	Afelli sub aquarijs uasis	162. b	& deinceps.	91.4
Aqua malsa amplius cocta	179.4	Afelli axes uocantur	13. b	Aurium humiditates siccantia	104.4
Aqua Myrsenes	179.4	Aphragus omnis generis	195.4	Auricula muris	104.4
Aqua marina	179.4	Apidis tres species, earumq; mor-	275.4	&	104.4
Aqua presens facile probatur.	301. b	sus	297. b	Aurium dolor	89. b. 90. b
pag.	12.4	Apidis exuuium	94. b	Auripigmentum sumptum	104.4
Aquam ducentia	12.4	Aphalax Madeniadan	6.4	Aurea fila	104.4
Aqua pileatoris	122.4. b	Aplendon	107.4	Autumni uicinus	14.4
Aqua inter cunctas	301. b	Aprectudines faciei	310. b	Auellane	15. b
Aqua omnis	312.4	Astrictio cutis	166.4	Auca erratica	104.4
Aqua pluuia	12.4	Astringentia	319. b	Auca	104.4
Aque pluuialis qualitates ac gra-	12.4	Aster pastillus	315.4	Auca	104.4
da	12.4	Aster Atticus	171. b	Auca	104.4
Aqua malsa quibus commoda, &	29.4	Atadlos antidotus	219. b	Auca	104.4
eius preparatio	90. b	Athanasia	335. b	Auca	104.4
Aqua medicata	90.4	Atheromata	23.4	Auca	104.4
Aque inductiones	90.4	&	34.6.4	Auca	104.4
Araue morfus	191. b	Athene emplastrum	319. b	Auca	104.4
Arbutus arbor.	134.4	Atrachyllis	315.4	Auca	104.4
Arbutus	134.4	Atramentum sutorium	171. b	Auca	104.4
Archigenis narium obturatio	12.4	Atramenti scriptorij medicamen-	219. b	Auca	104.4
Artion	273. b	tum	335. b	Auca	104.4
Artens Cappadox	152. b	Atramentum Indicum, scriptorij,	23.4	Auca	104.4
Arene proprietates	170.4	metalicum	302. b	Auca	104.4
Arene ingessio	123. b	Atramenti scriptorij illitio	67. b	Auca	104.4
Argentum niuum	301.4. 204.4	Atrae bilis euacuationes	34.6.4	Auca	104.4
Argenti spuma	204.4. 187. b	Atrae bilis generantia	61. b	Auca	104.4
Argenti efficacia	192.4	Atrae bilis hominis	75. b	Auca	104.4
Argenti recrementum	277.4	Atriplex	57. b	Auca	104.4
Argemum	85. b	Attage	31.4. b	Auca	104.4
Aristolochie exhibitio	306.4	Attuagene	16.4	Auca	104.4
Artoborzanum	314. b	Attenuantia	100.4. b	Auca	104.4
Aristolophanium	355.4	&	74.4	Auca	104.4
Armala	291.4	Attenuatos renutrire	15. b. 16.4	Auca	104.4
Arucnia	15. b	&	22. b	Auca	104.4
Arthritis	14.4. & deinceps.	Attenuantia alimenta	12. b. 15. b	Auca	104.4
Articuli distorti & laxati	181.4	Attenuantia citre manifestam ca-	12. b. 15. b	Auca	104.4
Articulorum ulcera	179. b			Auca	104.4

Befafa	291.4	Calidā natura, uel consuetudine no	re	159.6
Beta	300.4	te, item simplicis et composi-	Capitis affectionum praesagia, et	
Bete uis	23.4.6	ti	purgatio	30.6
Betonica Romana	273.6	Caligo uisus propulsatur	Capitis cutis affectiones	64.4.6
Bilis vomitus, uel atra bilis	57.6	Calidolephare	Capitis forma	17.4
Bilem atram generantia	75.6	Callus in distortionē	Capitis dolorem in febribus curan-	
Bilem atram euacuanda	306.4	Callus quid sit	tia	53.6
Bilium	23.4.6	Callos excidentia et consumen-	Capitis dolor et curatio ex varijs	
Bibere liberaliter, et ad libere		tia	causibus	65.4.6, 67.4.6
paratio, ne coelatur uento	29.4	Callus fracturis non obstitit, et	Capitis ulcera sanantia	173.4
Burmen	272.6	obducti signum	Capitis pustulas et ulcera sanan-	
Butyrius pastillas	322.4	Callus in fracturis excresecens, pe-	re	64.4.6
Blatte	297.6	gina	Capitis affectiones quae methodo	
Blepharoxyston	84.6	Callus	curande	61.6
Bolani	24.4	Calculus renam	Capite uariorū animalium	282.6
Bolas armeniacas	51.4	Calculus uesicae	Capito piscis	28.4
Bolas alata	275.4	Calculorum generatio et exse-	Caprarum sanguinem edi Home-	
Bolas armeniacas	274.6	ctio	rus nouit	27.4
Boehria	85.6	Caluities	Caprificus	299.4
Bonina caro	26.6	Canina conuulsio	Caprina caro	26.6
Brachij fractura	253.6	Canina appetentia	Capparis	23.6
Brachij appensio	252.4	Cenadium usus	Ceput acuminatum	17.4
Brachiale	255.6	Cancer quid	Caput humoribus uarijs euacua-	
Brasica uis	23.4.6, 185.4	et uide dictus	re	11.6, 12.4
Brasica conisa	271.4	Canceri	Cnicus syluestris	272.6
Brasica a diarrhoea nino	66.6	Cancer est elephas unius partis.	Carbones in esum unde appetun-	
Brachiocele	210.6	pag.	tur	1.6
Bubones in peste	165.6	Canceri angesciente luna, ante solis	Carcinoma	87.6
Bubo	165.6	ortum capiti, morsus à cane ra-	Carbunculus	162.4
Bubonum unde distans	166.4	bido conseruus	Carbunculus et in palpebris, pe-	
Bubonis operatio	271.4	Cancer exulceratus	gina	166.6, 167.4
Buborecele	127.4	Canceri occulti incurabiles	Carbunculorum cause populares,	
Bucina	28.4, 182.6	Cancrorum medicamentum	et ignis sacri naturam refren-	
Bucellatus purgatorius	307.6	Cancer uteri	tes	167.4
Bucinum naturale auxilium.		Canceri chirourgia	Carbonisatio	87.6
pag.	90.4	Caninum stercus	Cardamine	297.6
Bulbus sylvestris uenenum	201.6	Canis non rabiosi morsus	Carduus	23.4
Bulbus oculi	222.6	Canis rabidi uleus à cicatrice pro-	Caries lignorum	29.6.6
Bulbi	21.6	hibens	Caries	163.6
Bulbi carbonisationem curare.		Canis rabidi morsus cura	Carice	23.4
pag.	87.6	et	Carniū genera et praesentia	26.6
Bulle, et ea ipse no. l'arne	159.4.6	Canis rabidi morsus exploratio.	Carnem imminuentia	15.6
Bulbos	56.6	pag.	Carnem excresecentem crustis ob-	
Bulbus radix	23.6	Canis pars penis	ducenda	174.6
Buprestis, qui hauserint, cura, pa-		Canitum prohibentia	Carnositas in neribus	91.6
gina	193.6	Canopum	Carnis inducenda ductus	209.4
Bryonia, musci genus	274.4	Cauterium qui sumpsere, cu-	Caro comusa	169.6
C		ra	Caro excresecens in ulceribus	174.4
Accoce	210.4	Capillos crispas et teneros facere	Caro in magno oculi angulo excre-	
Accans condans medicamen-		re	scens	221.6
tem	121.4	Capillis defuils conducent	Caro in auribus excresecens	91.4
Acetos spina	204.6	Capillos albos reddere	Ceros saporis species	70.4, 72.4
Calcanei ossis luxatio	265.4	Capillos uarijs coloribus inficien-	Carotides arteriae	219.6
Calci natura	300.6	tia	Carpeia	116.4
Calcificationis secantia	107.6	Capisiri deligatura	Carpasi succus	200.6
Calcificationum uis dela	10.6	Capistrum, deligatio	Cartilaginei pisces	28.6
Calcificationis morsum	189.4	Capitis fracti differentia	Casem uetusissimus	148.6
Calidū correctio	20.6, 11.6	Capiti conuenientia, et contra	Casus	301.6
Calide affusionis modus	16.4	Capitis manantia uleuscula cura-	Casui uires	23.4

# INDEX IN

<i>Castratio</i>	236.4	<i>re, cura</i>	199.6	<i>Clauus</i>	86.4.190.6.144.4
<i>Castrata animalia ad esum</i>	26.6	<i>Charta ustra</i>	192.6	<i>Clavicula fracta</i>	232.6
<i>Castanea</i>	26.4	<i>Cheramanica</i>	310.4	<i>Clavicula luxatio</i>	239.4
<i>Cataplectia uaria</i>	146.4	<i>Chelidoniae morsus</i>	195.4	<i>Claudiacum collyrium</i>	232.4
<i>Carum radix</i>	23.6	<i>Chemosis</i>	81.6	<i>Clematitis</i>	171.6
<i>Carbeter instrumentum</i>	79.4	<i>Cheras unde</i>	219.4	<i>Cleopatra quo uenens interijt</i>	191.4
<i>Carbeter fistula</i>	230.4	<i>Chenichides</i>	249.4	<i>Clidion Oribasij</i>	310.6
<i>Catorbe</i>	68.6.71.4	<i>Chiasmi ratio</i>	257.6.160.6	<i>Chyliferum infusa acris</i>	28.6
<i>Catocbarum pulsus</i>	42.4	<i>Chiasmus</i>	216.6.235.4.149.4	<i>Chyliferibus quando utendum</i>	11.6
<i>Catochi differentia ab uteri strati- gulatione</i>	71.4	<i>Chironia</i>	167.6	<i>Chylifere in uiscera infundere</i>	112.4
<i>Catochos</i>	68.6.70.6.71.4.6	<i>Chironia uiscera</i>	176.6	<i>Chyliferum infusa</i>	116
<i>Cauda in foemina praefectio</i>	236.6	<i>Chirurgia Heliodori</i>	178.6	<i>Chyliferum ad intuentiam sitae sup- pus</i>	120.6
<i>Calx pota</i>	204.4	<i>Chirurgie obiectum bisaridum se- ctum</i>	206.6	<i>Coagulum</i>	195.6
<i>Causa obscura in articulis affectis, quid sciendum</i>	146.6	<i>Cholera quid sit, &amp; cause, eiusq; cura</i>	109.4.110.4	<i>Cochlea marina et terrestres</i>	18.4
<i>Cauteriorum uariae figurae</i>	235.6	<i>Chondrus</i>	24.4	<i>Coeliaci</i>	82.6
<i>Cauter frigidus</i>	244.4	<i>Chrysanthemon</i>	277.4	<i>Coeloma</i>	82.6
<i>Cauter</i>	158.6	<i>Chrysis</i>	305.6	<i>Colica affectio</i>	114.4.6.114.4.6
<i>Cauterium frigidum</i>	230.4	<i>Chrysoceila</i>	293.4	<i>Colicicum qui hauserit, cura</i>	101.6
<i>Cebryaticum hydromelum</i>	69.4	<i>Cibus in uentriculo accescens</i>	104.6	<i>Coitus tempus ad coeptionem</i>	141.4
<i>Cedra</i>	103.4.110.4	<i>Cibi corruptio in acorem, quomo- do curetur</i>	9.4.10.6	<i>Coitus impotentia mederi</i>	9.6
<i>Cedrea</i>	282.4	<i>Cibum auersantes curandi ratio</i>	1.4.6	<i>Coitus immodico mederi</i>	10.4
<i>Centaurij purgatio</i>	305.6	<i>Cibi qui facile concoquantur &amp; di- stribuantur</i>	132.6	<i>Coitus cum auersa</i>	141.4
<i>Centaurina morsus</i>	195.4	<i>Cibi medij</i>	21.6	<i>Coles resolutus</i>	79.4
<i>Cepa</i>	24.4.285.6	<i>Ciborum inappetentia</i>	108.4.6	<i>Coli situs</i>	103.4
<i>Cephalaea</i>	67.4.6	<i>Ciborum uarietas noxia</i>	23.4	<i>Colica tempore Pauli</i>	97.4.112.6
<i>Cerastris morsus</i>	195.4	<i>Ciborum inappetentia</i>	55.6.16.4	<i>Coliformes meatus &amp; ossa</i>	215.6
<i>Cerastris</i>	25.6	<i>Cicer</i>	24.6.277.6	<i>Collisio</i>	32.6
<i>Cera angustaria</i>	181.4	<i>Cicuta hausta</i>	200.4	<i>Collyria subdititia</i>	111.6
<i>Cera usus</i>	54.6	<i>Cicuta</i>	286.4	<i>Collyrium stratioticum</i>	84.4
<i>Ceratitis</i>	290.4	<i>Cinera</i>	23.4	<i>Collyria tenera</i>	87.6
<i>Cera olei in compositionibus mo- dus</i>	340.4	<i>Cinis omnis</i>	300.4	<i>Collyrium eroceron expositum</i>	110.4
<i>Cerebrum a mucro purgare</i>	11.4	<i>Cinices</i>	284.6	<i>Collyrium liquidum dolorem eni- munt</i>	81.6
<i>Cerebri inflammatio</i>	69.6	<i>Cinnabaris miras, et raritas</i>	149.4	<i>Collyria extensoria</i>	16.6
<i>Cerebrum purgatio per neres</i>	12.4	<i>Cinnabari</i>	286.4	<i>Collyrij chelaei uires</i>	81.6
<i>Cerebri membrana inflammata &amp; denigrata</i>	249.6	<i>Cinnabarinum emplastrum, Pam- phates</i>	338.6	<i>Collyria subdititia</i>	139.4
<i>Cerebri temperies simplex et compo- sita, quo discernatur</i>	17.6.13.4	<i>Circularis deligatio</i>	51.6	<i>Collyrium diacenteton</i>	84.4
<i>Cerebrum in cibum</i>	27.4	<i>Circularis figura inepta cicatri- ci</i>	218.6	<i>Collyria arida</i>	117.6
<i>Cerebra uarioru animaliu</i>	276.6	<i>Circuaidendorum tractatio</i>	229.6	<i>Collyria liquida</i>	317.4
<i>Cerion</i>	64.6	<i>Cisampelus</i>	277.6	<i>Collyrium ex lapide Phrygii Ge- leni</i>	314.4
<i>Ceruinia caro</i>	26.6	<i>Cissampelii uis</i>	86.4	<i>Collyria uaria oculorum</i>	107.6
<i>Ceruisus</i>	178.6	<i>Ciria</i>	1.6	<i>Colorem auratam corporis emen- dere</i>	7.6
<i>Cerussa</i>	304.4	<i>Ciria mala</i>	26.4	<i>Colorum ratio</i>	266.6
<i>Cerussa sumpta</i>	203.6	<i>Clavicula solus homo habet</i>	259.6	<i>Colocynthis preparatio</i>	71.6
<i>Cernuus resida spiratio</i>	100.4			<i>Colocynthis usus</i>	305.6
<i>Casos flagris curare</i>	160.4.6			<i>Colomella inflammata</i>	96.6
<i>Cestri uis</i>	273.6			<i>Columella quae dicatur</i>	207.4
<i>Cetacei pisces</i>	28.6			<i>Columbinus pulvis</i>	16.4
<i>Chalastrei uirtus</i>	288.6			<i>Comitiales acuti etiam multo calli di exstiteres, mortui sunt</i>	41.6
<i>Chameraphanus</i>	310.6.105.6			<i>Comitialis morbus, &amp; quid cum precedat</i>	72.6. & 112.6
<i>Chamelea purgatio</i>	306.4			<i>Comitialis morbi affectio</i>	42.6
<i>Chamae</i>	28.4			<i>Comarus</i>	189.6
<i>Chamapityos species quae dicitur</i>	201.4			<i>Concrepere facientia</i>	140.6
<i>Chamedaphne</i>	275.6			<i>Conchyliis</i>	
<i>Chameleconem nigrum qui sumptis</i>					

Combylia Indica	292.b
Concoquuntia	92.4
Concoctio egræ	28.b
Conditum	108.4.114.b
Conditum calculos atterens	318.b
Condyonata in locis muliebris	237.4
Condyonata uteri	14.1.b
Condyonata ani	242.4
Constarbor	286.b
Contractiones convulsorie	110.4
Continua febris quæ est	47.b
Continues febres	48.4
Cōstati morbi nō trāsmutādi	14.b
Costussonis due differentie	247.b
Costus conductencia	269.b
Cousilio mortifera ex lambricis.	pag. 184.b
Cousilio morborū mederi	3.4
Cousilio canina	78.b
Cousilio	79.b.80.4
Copton medicamentum	121.b
Copton malagma	242.b
Corin cibum	27.4
Cordis affectiones	105.4.b
Cordis temperamenti nota	19.4
Corallium anagallis	319.4
Corina uariorū animalium	282.4
Corne et eius natura	285.4
Corporis humani 4. partes	30.b
Corpus tenue fuscum	15.b.22.b
Coriandrum sumptum	200.4
Coriandrum	234.b
Coracum emplastrum	335.b
Coterea	288.4
Cotnaxia	287.b
Costas dietarii spūbas	252.b
Costarum fractura	252.b
Coxæ luxatio	263.4
Coxarum osium fractura	251.4
Coxendicum usū	239.b
Coxendicum morbus	242.b
Coxendicum morbis cōmodo	100.b
Crampen in ingurgitauibus ar-	centia 29.4
Cressificientia alimenta	22.b
Cremasteres	231.b
Crepidinis usū in repositione, Pa-	gina 260.b
Crisonis ad nares medicamentū in	morbo regio 12.4
Criogenes passillus	322.b
Crocetum ex rosīs	210.4
Croton, recti semen	242.4
Crocilli morsus	296.4
Croconagmatis preparatio	321.b
Croconagma vireudiflora	249.b
Croton	306.b
Crotonum humorum redundan-	

tiuum remedia	7.4
Cruentoris emplestrorū usū	332.4
Cruvis deponendi modus	256.b
Crura scia	232.4
Cruſtas inducentia	180.b
Cruſtas eijciencia	174.4
Cruſtam remouencia	163.b
Cruſticum ſiccum ad morſum ra-	bioſi canis 190.4
Cubiti fractura	255.4
Cubiti gibbi luxatio	255.4
Cucurbita	25.4.284.4
Cucurbitularū usū et genera	232.4
Calices fugencia	128.b
Calices oculis obuerſantes	88.b
Cultata uſoria ſeramenta	232.4
Cucumis	25.4.297.4
Cupreſſus	286.4
Cura quid ſit	76.b
Cutis capitis affectio	64.4.b
Cutis ſenilis et tenera	160.4
Cutis aſtrictioni mederi	6.4
Cydonatum	316.b
Cynocrambe	271.4
Cynamaron	271.4
Cynorchis	292.b
Cynanche	97.4
Cytini	296.4
Cypbi lunare	351.b
Cypboides	317.b
Cypbi ſolare	351.b
Cyprium uſus	290.b
Cyrenaicus ſuccus	292.b

## D

Almate et Data telis medicis	145.b
Antis utuntur	145.b
Damaſcena	26.4
Daphnoides	282.b
Darti pelliculi	232.4
Daucus ſylueſtris	282.4
Daucus	23.b
Deſcſatio	247.4
Decamylon	350.b
Decuſſata deligatio inguinis	236.4
Decuſſationis ratio	257.b.260.b
Deſluxus	98.4.99.4
Deligatio grima	254.4
Deſolutio reſoluta	78.b
Deligations ſeu crura habentes.	pag. 231.4
Deligatio capſtrum	251.4
Deligatio circularis	252.b
Delphines	28.b
Delirium quid	68.b
Deliquium animi ex uarijs cauſis	uare curare 59.4.b
Deliqui animi in uene ſeſſione,	cauſe 212.4
De medicamentis inter ſe uiciſim	

ſuccedentis, ex Galeno	352.4
De ponderibus ac menſuris	356
De menſuris liquidorum	357
De menſuris aridorum	358
De notis ponderū ac menſurarum,	pag. 356.b
Dentium emergentiū moleſtijs me-	deri 3.4
Dentium ſuporem lenientia	95.b
Dentibus candorem et gratū odo-	rem conciliantia 95.b
Dentitionis tempus, et una con-	tingentia, curaq; 3.4
Dentem ſine dolore tollere	95.4
Dentificium ad parulidās	95.4.b
Dens corroſus, ſuens, uel commo-	tus 95.4
Dentium ſtridores inter dormien-	dum 77.4
Dentes conſeruentia	8.4
Dentes ſupernacui, gradēsq; 216.4	
Dentium dolores et inflammatio-	nes curare 94.b
Dentib; proſpicere in uocitu	11.4
Dentium extractio	216.4
Depreſſio	247.4
cameratio	247.4
Deſquamata	260.4
Detergentia	154.4
Detergentia ſine maniſeſta calſi-	ſione aut frigeſactione 159.b
Diaphenes	298.b
Diabetes	43.b
Diabete	118.b
Diacroce collyria	82.b
Dies iudicatorij	344.b
Digitorum pedum emotio	265.4
Digitorum rime	149.b
Digitis agnaſcentes	224.4
Digitorum oſium fractura	255.b
luxatio	261.b
Dioclis epiſtola præſeruatua	410.b
Dionyſie proprietates	270.b
Dionyſia emplaſtrum	261.b
Dioptra perna	241.b
Dioptra	235.b.237.b
Dioſcorides Alexandrinus	166.b
Dioſpoliticum	46.b
Dioſpolites	317.4
Dipſacos	118.b
Dipſadis morſus	294.b
Diſcus plumbens	261.4
Diſcuſſoria molliſſima abſq; uehe-	menti caleſactione ac reſicca-
tionē	170.4
Diſcuiſſoria moderatē	167.4
Diſcuſſoria molliſſima	107.4
Diſtichia	210.b
Diſtichiaſis	209.4

Dénitū ratio habēda medico	131.4	Epicauia	81.6	Febris hepicalos	47.6
Dodecatheon eclogia	315.6	Epithema	341.6	Febris ex erysipelatis affectio	43.6
Dolorum species & cura	312.4	Epithema spongiosa	113.4	Febris hectica	49.6
Dolichi	35.4	Epithymi usus	100.4	Febris semitertiana	49.6
Dolorem sedantis	36.4	Epithymi dosis	103.4	Febris mixta, mixta curatio	49.6
Doridis herbae vis	278.4	Epithymi purgatio	106.4	Febris comoda	50.6
Dorycnium venenatum	202.4	Epulis	95.6, 215.6	Februm diariam ex aeris causis cognitio, & curatio	41.6
Dothiene emplastrum	333.4	Equus fluviatilis	280.4	Febris putride cognitio	41.6
Draco marinus	195.6	Erosionum non mordax	171.4	eius curatio	43.4
Dracomis vis	271.6	Erosiones mammarum	106.6	Fecula	312.6
Dracunculi	136.6, 241.4	Esdra angilotus	310.4	Fel animalium	309.6
Dropacis preparatio & usus, pagina	144.4	Ermacei	23.6	Fermentum	273.6
Dropax Gallus	145.6	Ermaceus terrestris & marinus, pagina	273.4	Ferromi vis	271.4
Dryoni miri & uariē ledens venenum	194.6	Errhina natibus indita, medicamenta	67.4	Ferramenta uistoria gammata & culta	211.4
Duritia mammarum	106.6	Erucæ pini haussē, cura	199.4	Ferrum	297.4
Dysenteria	111.6, 112.4, 6	Eruca	23.6, 173.4	Ferula	231.6
Dysenterij conducent	28.4	Erucæ olerum	280.6	Ferularum usus	254.4, 257.6
E		Eruum	291.6	Fex uini	300.4
Eadem medicamenta in eodem in uarijs hominibus uariam sortita effectum	147.4	Eruo	280.4	Fibula fractura	256.4
Ebrietatis mala, curatio, & elucis eam armatura	29.4	Erysipelas in cerebro	69.6	Ficus	254.6, 299.4, 6
Ebrietatis medela	3.6	Erysipelas hepatis	110.4	Ficose pustule	290.6
Ebrietas ex uino ueteri	57.4	Erysipelas	161.4, 164.6, 165.4, 6	Ficum natura	24.4
Ebrietas causa eatochi	71.6	Excilio	247.4	Figura sursum uergens	59.4, 101.6
Ebrietatem comitantia mala mitigare	66.6	Ex Canano medicamentum	277.6	Fila aurea	290.6
Ebiscus	269.6	Excrementorum alui ratio	43.4	Filex	191.6
Ebuli vis	269.4	Exercitia pueris quando suscipienda	3.6	Filicis vis	279.6
Echinuli	28.6	Exercitium quid, quantum, quorsum, quando, & cum uariis speciebus	4.4, 6	Filū quod uiperā stragulant	97.4
Eclogmata uaria	313.6	Ex malis eotonels medicamentum uaria	116.6	Fistula permarū ac plantarū	192.4
Eclogma ex pupaveris capitib.	53.6	Exturgentia	99.4, 100.4, 6	Fistula	247.4
Educatio infantis	2.6	Exuberantia	191.4	Fistulae ueteri	241.6
Edulia media	21.6	Exussio mammarum reprobata, pagina	106.4	Fistulae ani	240.6
Eduliorum uarietas noxia	23.4	Exussum aspidis	273.4	Fistula	173.6
Elaterij exhibitio	305.6	Exulcerantiū uim retinere	197.6	Fistulisme dementia et egilopis	149.4
Elaterium	297.4	F		Fistulae occulte	241.6
Elaterium sumptum	204.4	Fabe	24.6	Fistula quid	239.6
Elephantiasis obnoxios capitis uisione curare	206.6	Fabe proprietates	285.6	Flagris casos curantia	160.4, 6
Elephantiasis contagiosa ut pestis	154.6	Faba Aegyptia	24.6	Flatum generatio	109.6
Elephas est cancer totius corporis, pagina	131.4	Faciei affectiones	93.6, 94.4, 6	Flatum ducenia	199.4
eiusque natura & cura	153.4, 6	Fanus magna	56.6	Floridus puluillus	304.4
Elleborine	277.6	Farina crassa uis	285.6	Fluxus muliebris	193.6, 194.4
Elychnium	168.6	Fatuitas	71.6	Fluxiones in oculos impetuosae	81.4
Emplastrum uaria	312.4	Fauis quid, & cum cura	171.4	Fluxum ueneris sistens	28.4
Emplastrum Dionysia	162.6	Fauorum cremoris potus	6.6	Foliatum	350.6
Empyosthotonos	80.4, 6	Faucibus infixae spine	217.6	Folia malabathri pilule	112.6
Eucanthis	85.4, 111.6	Fauli	240.6	Formicarum uerruce	244.4, 160.6
Eunepharmacus	381.6	Febris irruens principium morbi, pagina	33.4	Formicarum discurrentium sensus, pagina	203.6
Enterocete	127.4	Febris quae inquirēda prebet	31.4	Formicina instrumenta	241.4
Ephemorum qui accipere, cura, pagina	201.6	Febris lipyria & fumose	47.6	Formorū intertrigines curatio	3.6
Ephialtes	75.6	Febris continue	47.6	Formoris fractura	235.6
		Febres comitantes	48.4	Formiculi cremor quomodo fit	8.6
		Febris ardens	48.4	Formiculum	289.4
				Formam graecam	25.6, 100.6
				Fortidum malagma	241.6
				Fortidum acopon	245.4
				Fortor alarū & exudationū	106.6
				Fortus immortini extractio & exsecutio	

festio	133. a. b.	Gangrene initio	257. a.	Haliterum exercitium	153. b.
Fetus effluens	113. a.	Gangrene chirurgica	215. a.	Halitacabum	299. a.
Fetus quatuor simul in utero	141. a.	Ganglium	160. a. 110. b.	Harmation	311. a.
Fistula cum luxatione	266. a.	Gangrena	163. b. 164. a.	Hebetudo oculorum	89. a.
Fistula cum molare	257. a.	huic medentia	167. b.	Hedecarum febrium cognitio, ge-	
Fistulae, & earum differentie		Gargis primarium	131. b.	nera, curatio	48. 49. d.
pag.		Genitales partes non perforate	137.	Hedice fibræ marcor	49. a.
Fistula sine callo permanens	158. b.	Genitalia membrorum impoten-		Hecatombe	219. a.
Fistula	289. b.	tia	119. b.	Hedera	283. a.
Fistula genere et modus	4. b. 3. a.	Genia luxatio	264. b.	Hedera terrestris	101. b.
Fistula ante exercitum modus	4. a.	Genista	298. b.	Hederoi præparatio	311. a.
Frigiditas apta	100. a.	Geometrica quando phero disce-		Heliocæes	314. a.
Frigiditatem curatio	10. a.	da	3. b.	Helenium Ninum appellatum	145. b.
Præparationibus diuturnis conue-		Gibbositas	261. b.	Hellus	287. a.
nientis	62. b.	Gingidium	23. b.	Heliostori ebrietas	178. b.
Frigida quando danda	45. a. 48. a.	Gingivæ eructe et corrosæ	95. a. b.	Hemitritæ	49. b.
& acuatim	50. b.	Gingivarum pruritum sedare	3. a.	Hemiscranii	67. a. b.
Frigida & sicca	164. a.	Gingivæ astringentia	95. b.	Hemorrhoides ani	241. b.
Frigida affusio Hippocratis	31. a.	& eas tumidas	96. a.	Hemorrhoides	131. a. 237. a.
Frigida lenechrum	13. b.	Glandæ	26. a.	Hemorrhoides uteri	141. b.
Frigida potus acuatim	50. b.	Glandule in esum	26. b.	Hemorrhoi morbus	194. a.
Frigida correctio	20. b.	Glandium subditivum usus, for-		Hepar induratum	121. b.
Frigidi note simplicis & compo-		matioque	11. b.	Hepar hircinum	88. a.
siti	16. b. 17. a.	Glandule variæ subditile	113. b.	Hepar navorum animalium	279. a.
Frigida & humectantia sine asiri-		Glandule sursum purgantes	310. b.	Hepatis inflammationis	121. a.
gione	165. a.	Gladiolus	291. b.	Hepar lupi	111. a.
Frigida convenientia	13. b.	Glans anguinearia	271. b.	Hepatis temperamenti nota	19. b.
Fructus quosdam edendi tempus	14. a.	Glans non perforata	228. b.	Hepatis variæ affectiones	119. b.
Fructus fugaces	25. a.	Glaucome	83. b.	Hepatis erysipelas	120. a.
Fructus arborum	35. a.	Gleucinum	50. a.	Hepar obturamentum	21. b.
Facus	302. b.	Glomeris ex staminibus usus	53. b.	Hepatos febris	47. a. b.
Frumentacea	24. a. b.	&	111. b.	Hepar canis rabiosi	190. b.
Faligo	187. b.	Gluten	234. a. 300. a.	Hepatis visio	215. a.
Faligo pistorum	271. a.	Gluten piscium	280. b.	Hepatis à corde emendati nota	19. b.
Falguis not	163. b.	Glatimula ulcus	172. b.	Hepar in cibum	27. a.
Fumaria, vel fumus terre	231. a.	Gobii salsamentum	174. b.	Hepatis inflammatio quid differt	
Fumosa febres	47. b.	Gracilitate corpori conciliare	15. b.	& pleuritide	104. b.
Fumebuli	4. b.	&	21. b.	Hepatis inflammationibus necessa-	
Fungi	202. b. 290. b.	Grammaticæ aspicandi tempus	3. b.	ria sunt astringentia	107. a.
Fungis similis in ulcere excrecen-		Gramine in oculis	68. b.	Hepatica dysenteria	112. a.
tia	174. b.	Gramen, & eius facultas	267. b.	Heraclæ	277. a.
Fungorum vires	24. a.	Graminum enidium	279. b. 183. b.	Herba sabina	271. b.
Furunculus medentia	159. b. 166. b.	Graminum timoriam	283. b.	Hermaphroditi	236. b.
Furunculus discutientia	171. b.	Grando oculi	84. b.	Hernia geminata	232. a.
Furfures	64. a. b.	Graudo	98. a. b. 99. b.	Hernia carnosæ & tofuceæ	233. b.
G		Gravina deligatio	254. a.	Hernia varicosa	233. b.
Gallina	26. a.	Grauedinem in puero curare	1. b.	Hernie species	126. b.
Gallinarum uenericulus sic ut.		Grapeolentia narium	91. a.	Hernia inguinis	235. b.
pag.	110. b.	Grossi	292. a. 199. a.	Hernia aquosæ hydrocele	232. a.
Galli & gallinæ iusculum	178. b.	Grues	26. a.	Hernia stercorosa, omenti, intestini,	
Gibbanum	101. b.	Gula inherens extremitate	217. b.	& aque	234. a. b.
Gila omphacina	106. b.	Gurgulionis affectiones	217. a.	Herpes miliaris	164. a.
Gila	281. b.	Gutturis ramex	120. b.	Herpes adedens	164. a.
Gila omphax	96. b.	Gutturis asperitas	99. b.	Hermodyctylus stomacho incom-	
Galaucitones	160. b.	Gutturis summi sectio	218. a.	modus	146. a. b.
Galeria	185. a.	H		Hexapharmatum	149. b.
Gammari	28. a.	Habitus quomodo recalescat	7. b.	Hibiscus	296. b.
Gemmae & cultivata historia fer-		Habitat malus	121. a.	Hibiscus	260. b.
racentia	233. a.	Harmonia emplastrum	277. a.		

Hiera picre ex aloë usus	139.4	Hypocyanus comestus	100.4	Inferia curatur uenere	94
Hiera quos humores euacuat	61.6	Hypopia	169.6	Infania	75.4.6
Hiera uarie	309.6	Hypochondriaca melancholia	74.6	Intestinum rectū resolutum	79.4
Hiera Rufi	76.4	Hypoglossia	55.4	Intestinum icterici vulneratum	10
Hierarum dosis	310.4	I		curatur	112.4
Hilaritas commode	3.6	Aspidis usus	107.4	Intestina terre	273.4
Hippopotami pellis	275.6	Iatralaptes	212.4	Intestinarum leuitas	100.6
Hippocelinum	23.4.198.4	Iberidis herbe usus	143.6	Intestini prolapsus	127.6
Hippophaes	302.4	Iberis	237.4	Intestina in esum	17.4
Hircinus caro	126.6	Icestim emplastrum	336.6	Intertrigines	160.4
Hircion sanguinis medicamentum	318.6	Icterus niger	124.4.115.6	Intubus	23.4
pag.	318.6	Ichnuemonis pilli	186.6	Intybam troxinam	110.6
Hirundines	303.6	Ictinum intestinum vulneratum,		Ionis	101.4
Hirudinum usus	34.4	quomodo curatur	118.4	Iris que, & corona	211.6
Hirudinibus deglutitis cura	199.6	Ictinus exhibenda purgatoria	308.6	Iris sylvæstris	178.4
Holocleron	101.4	Ignis sacer	69.6.164.6.165.4	Irritationem mitigantia	32.4
Hominis morsus	196.4	Ignis sacer circa sedem	130.6	Ire impotentis remedium acutis	9.4
Hordeum	24.6	Ilaqueatio	211.6	Iris, etiamq; uis	178.4
Hordei uis	185.6	Ilex	295.4	Iridis Illyricæ usus	305.6
Hore equinoctiales	21.4	Illusionum ratio	344.4	Iscæ quid sint	125.6
Humidi correctio	10.6.12.4	Illusiones sedis	310.4	Iscbias	187.4
Humidi simplicis & compositi no		Ilum osium fractura	252.4	Isti emplastrum	385.6
te	16.6	Imberbis ut quis maneant	116.6	Isotheon collyrium	312.4
Humiditas doloris exors	65.6	Impetigines 155.6 & ce fere	156.4	Italicum emplastrum	319.6
Humidis que conueniant	13.6	Inappetentia cibi	55.6.16.4	Iter facientium uisus	14.6.15.4
Humeri summi luxatio	259.6	Incaruans	179.4.130.4	Iusculum galli & galine	178.6
Humeralis uena	221.6	Incaruans	83.6.36.6	Iuscula piscium	178.6
Humectantia	30.4	Incidentia	74.4	Iuncus quadratus	186.4
Humorum in hominibus pro anni		Incubus	75.6	Iuncus leuis & acutus	199.6
tempore, uariatio	31.6	Incubus nocturnus comitialis mor		Iunci rotundi	199.6
Humorum crudorum redundan-		bis	76.4	Iuncus totus	100.4
tium remedia	1.4	Infans que peti solet, curatur, pa-		Inuiperus	170.6
Humorum aliationes prohibentia,		gina	2. & 3.4.6.11.6	Iustus medicus oculus	103.4
pag.	82.4	Infantis nati educatio ac cibus	2.4	Indicatoris signa quando bene se	
Humores attenuantia	25.6	Infantis repleti signa, & lac sub-		citue	31.4.36.4
Humorum in morbo articulari no		ducendi tempus	2.6	Indicationes morborum quando	
te	144.6	Infantum & à lacte amotorum ui-		fient	34.4
Hydatis	211.6	cus	3.6	& quales	15.4
Hydrargyrum	204.4	Infantum affectiones lenius curan-		Indicatorij dies	14.4.6
Hydrogerum	208.4	de	31.6	Indicationis bene, note	36.4
Hydromelum cebyraticum	103.4	Infantes ex nativitate strabones		Indicandi morbi aut solutendi, no-	
&	110.4	curare	89.4	tio	33.4
Hydromelum ex cebyra	316.6	Inflationem ex frigido medela	11.6	Ixiis uenenum	101.4
Hydromelon	317.4	Inflationem mittantia	86.4	L	
Hydrocephalus affectus	107.4	Inflammatio ignis sacri natura ha-		Laborariorum uisus	14.4.6
Hydrocephalus factus	218.6	bens	134.6	Labie rupta	96.4
Hydrosotum	220.6	Inflatio	169.4	Lac bibens ad purgationem, quo-	
&	217.4.127.4	Inflammatio in communi, & pro-		modo se gerat	17.6
Hydri morsus	194.6	prie	161.4.6	Lactis uires, & boni note	17.4
Hydropicorum sectio	235.6	Infusorum per clysterem ratio	11.6	Lactis omnis airtus	174.4
Hydrops	112.4.124.4	Infusi in uesciam amissio	230.4	Lac roquendi modus	17.6
Hydropicis conuenientia	13.6	Infusa per sedem, rursus purgatio,		Lac infusi subducendi tempus	12.6
Hyemis uisus	14.4	pag.	310.6	Lac scissum	17.6
Hygidium	315.6	Inguanaria uis	172.4	Lac nutritis optimum discernendi	
Hypericum	284.6	Inguinis decussata ligatio	216.4	ula, nitrosumq; corrigendi	1.4
Hypochondriaster	208.6	Instrumentum forme literæ H, pa-		Lac generantia nocua	1.4
Hypochondriaci usus	108.6	gina	264.4	Lac coagulatum	103.4
Hypophaei	228.6	Instrumenta masculina & femi-		Lactuca	175.6
Hypophagmata	169.6	nina	245.4	Lactria	296.6



Lactuca aïres	23. a. b	Lippitudinis degenerantia	84. a	Mal' panica, foliastris flos	272. a
Lactaria chalcidica	297. a	Lippientes capitis uisione sanati.		Mal' ouonia	290. a
Lacapthion quid sit	231. b	pag.	206. b	Malua	22. b. 289. a
Ladofa etalis	21. b	Lipyræ fibres	47. b	Malua operatio	23. a. b
Lagopoballica afflicto	21. a	Liuidines inueteratas abstergeñda.		Mallooli luxatio	265. a
Lagopobalmi	210. b	pag.	94. a	Mammaram inflamationes	168. b
Lana subpurata	55. b. 104. b	Liurores autare, uel arcere obor-		Mammae uicorum turgide	215. a
Lane natara	277. b	tos	7. b	Mammaram affectiones	106. a. b
Lap' excretis in tenebro	111. a	Lixiuum	284. a	Mānarū duritia emollienda	171. a
Lapidum præfignia	160. a	Lixiuum pileatorum	63. b	Mānarū	87. a
Lapides cusi & sanguinis reiectio		Lixiuum pileatorum	202. b	Mandragora	200. b
ue excreti	93. a. 101. b	Lixiuum saponaricam	210. b	Mara	24. b
Lapidum omnium als	287. b	Lixiuum protoflactam	84. b	Marcellus medicus	159. b
Lapis specularis	9. b	Locusta	23. a. 269. a	Marina aqua potata occidit	27. a
Lapathi als	273. b	Loli' facultas	263. b	Marine natationes	78. b
Lappa	291. b	Loligenes	23. b	Maritima loca syderatis apta	77. b
Lerix	296. a	Lotio in frigida quibus cōfert	12. b	Marrabium	295. a
Lepidines ulcerosas curare	6. a	Lubricis conuulsi quidam perie-		Marrabium nigrum	272. a
Lepidines ab exercitijs quatnor,		re	184. b	Marciaon	249. b
& curatio	5. b	Lumbricorum species tres	183. b	Masculina instrumenta	245. a
Lepidines spomaneas curare	6. a	Lumbrici rotundi signa quedam,		Maxilla inferna fracta	290. b
Lepipitum	297. b	curaq;	184. a. b	luxata	253. b
Lentum dolores siue fibre	105. a	Lumbrici leti	185. b	Mesocha mesuaphium	242. b. 352. a
Lentus arbor	275. b	Lumbos frigefacienda	128. a	Mesocha	109. a
Legumina	24. b. 25. a	Lunaris scitio	209. b	Matula quod inberet	158. a
Lentiscus	219. a	Lupini	24. b	Meatus obducenda	99. a
Lentiscus linamentum	232. b	Lupini hepaticis medicamentum.		Meatus coliformes	215. b
Leona emplastrum	337. b	pag.	317. a	Medicamentum ponderis suspe-	
Leonides	217. b	Lupinus	279. a	ctum	173. b
Lent palustris	302. a	Lupus piscis	28. a	Medicamentum ex alto emocis	157. b
Lentis	302. a	Lupi hepar	221. a	Medicamentum ex succo Cyrenai-	
Lentiscus	299. b	Luxatis conducenda	169. b	co	46. b
Lentula	24. b. & 22. b	Luxatio cum fractura	266. a	Medicus temerarius filix	115. a
Leptignes	94. a	Luxatio cum exulceratione	265. b	Medica mala	1. b
Lepus marinus	199. a	Luxatio qui est	258. b	Medicamentum ustorij præstantia.	
Leporius sanguis inmundissimus.		Lycocōtose als	269. a	pag.	217. a
pag.	27. a	Lyncus	330. b	Medicus imperitus, qui diuiti non	
Lepus	155. a. b	Lyci libri	193. b	habet rationem	183. a
Leporina cero	26. b	Lycus medicus	189. b	Medicamentum ex cacano	122. a
Leiburgus	69. b. 70. a. b			Medici laus	244. a
Leidria	28. b	M		Medicamentorum simplicium fa-	
Leuce quando curabilis	157. a	Macule solares	94. a	eultates	267. b
Leucoplegmatis	121. b	Macilemos increffare	15. b.	Medicamenta annui usus, item que	
Lubenes	155. b	&	16. a. 22. b	tuor rebus constanua	143. b
Liberos gignendi commodum tem		Maceris catapota	111. a	quibus saluti, quibus morti fue-	
por	9. b	Macor ex fibre bectica	49. a	runt	143. a
Libella	28. b	Macies oculi	88. a	Medicina scopus	236. a
Ligatio ex duobus inijs	172. b	Macberionis emplastrum	338. a	Medicamentum tribus pipertis ge-	
Ligustrum	286. a	Madorionis	85. a	neribus	46. b
Lingua resoluta	78. b	Magnes spirans	127. a	Medicamentum copton	121. b
Lingua incarnatio	216. a	Malaguala	241. b	Medicamenta suppuratoria	91. a
Lingua asperitas	57. a	Malum medicum	283. a	Medici feiitros inducentes	170. a
Liguronum potro do	173. b	Mala medica	1. b	Medic. nimium usus nocuus	12. b
Lingua in esum	26. b	Malum	86. a	Medic	221. b
Liliam	285. b	Malorum genera aïresq;	25. b	Medulle als	290. b
Libyanus	319. a	Malicortum	296. a	Medulla in esum	27. a
Limaris est adorce	345. a	Mala panica	25. b	Medullarum temperaturæ	170. b
Linsens	283. a	Mala citrea	26. a	Melampycon	290. b
Lippitudo	82. a. 83. b	Mala mandragora	289. a	Melancholia, eiusq; species	74. b
		Mala panica	296. a	Melancholus	

# INDEX IN

Melanchlorus	322.b	Morbipopulares	30.4	Nervi concretione effe dracu-	
Melancholia commo diffusi mede		Morbi acuti & diuturni notio-		culam	182.b
aut coitus	9.4	nes	32.b.14.4	Nervus confusus, vel totus	182.b
Melanchlorum	33.4	Morbi principium quid	33.4	aut	182.b
Melampyrum uictus	269.4	Morbi similitudinem partium simpli-		Nervi motus uoluntarij	24.4
Melancholiam sumptum	104.b	ciores fibriles	33.4	Nervi colligantes	24.4
Melica quid	103.4	Morbi consueti non transmutantur		Nervus nudus	182.b
Mel primus infantis cibum	2.b	di	14. b	Nervorum generi conduens	51.4
Mellis uires	29.4	Mordicansium nim molire	197. b	Nervi dissilio incurabilis	78. b
Mel	139. b	Mordentia	79.4	Niccolai palmule	331.b.441.b
Melin beractes	103.b	Modioli	249.4	Nicander porta	193.b
Melme	277. b	Morsus hominis	196.4	Nigredines faciei	194.4
Mellis asus	325. b	Morsum calefacientia et lancinan-		Nimum purgati	30.4
Melicoides	171.b	tia	189.4	Nitrum	182.b
&	219. b	Moschus	308.4	Nitri spuma	275. b
Meliteria Oribasij	314.4	Moscheola	147.4	Non purgatorum afflictiones, po-	
Meloplacuncion	103. b	Morum iunantia	79.4	gina	303.b
&	316. b	Maius provocat fluxiones	133.4	Nodus anatus	116. b
Melopepon	25.4	Mulier inordinatè purgatis	13. b	Nome	246. b
Membrorum genitalium impoten-		Mulier medica	67. b	Nome ulcerum depascens, pu-	
tia	119. b	Mulicribi locorum affectus	136. b	gina	174. b
Memecylon	284.4	Murana	195. b	Nome in ore	175.4
Memoria amissio	71. b	Muria	24.4	Nabecula	86. b
Menses mouentia	132. b. 133.4	Muris aranei morsus	192. b	Naces ruscide & pomice	181. b
Mensium purgatio, & eius tempo-		Muris	269. b	Nax pinea	186. b
ra	131. b	Muris parande modus	111. b	Nacum e cerebro educens	11.4
Menses ducentia	11.4	Murices	181. b	Naces siccat uiridibus similis tel-	
Mentificosas pustulas sanantia abs-		Mullus piscis	23.4.301.4	dere	11. b
que cicatrice	65.4	Myrrhobalani	248. b	Nux arbor	181. b
Merule	26.4	Myrrha minora	131. b	Naces regie	11. b
Menta	278. b	Myrsinoides	283. b	Natrix emplastrum	11. b
Mercenialis	288.4	Myrtis & myrtis	291.4	Nutrientia multam, que citra pe-	
Messila	25. b	Myxaria	184. b	riculum accipiantur	12. b
Menses suppressi	132.4. b	N		Nutricis optime notiones, alius,	
Metallum extinguita	201.4	Nardium Cixicenum	350. b	uitaq;	1. b
Metallorum recrementa	293.4	Nardus Celtica uel Gallica, pa-		Nutricis Lactis nota & corre-	
Metopium	248.4	gina	291. b	ctio	6.4
Micca tela	244. b	Narui granulenta et ulcera	93.4	Numine affliti	74. b
Mellefolium	269. b. 291.4	Nariam afflictiones	91. b. 93.4. b	Nymphæ uis	279. b
Mellefolium quid	269. b	Narui obturatio Archigenis	11.4	Nymphæ preestitio	296. b
Mellefia herba	154.4	Narpsia	288. b	Nyctalopes	83.4
Milium	24. b. 182.4	Nasus fractus uel confusus	350.4	Nymphodon passillus	321.4
Miliaris morsus	195.4	Nasturtium	32. b. 181.4	O	
Milphosia	83.4	Natrics morsus	194. b	Obturationibus liberantia	30.4
Mingens in lecto	119.4	Natationes marinae	78. b	Obturbata hepæ et splenē	21. b
lectam permingentes	119. b	Nauigantium uelut uomitus,		Obstruendi uel pre dita	179. b
Minium symplicum	274. b	gina	15.4	Obstipitas	261. b
Mirgania	109.4. 91.4	Naufragi	98.4	Ochri	25.4
Mituli	290. b	Nausea curatio	57. b	Ocymum	27. b
Mixridatica ex Sciucio	313.4	Nauseam ab acceptis cibis cura-		Ocinastri proprietates	109.4
Mitridatis quo contra uenena mou-		re	10. b	Oculi æres uisu	17.4
nitur	197.4	Nephritici	115. b	Oculis multum conferentia	13. b
Molliscentia	147. b. 148. b	Nere passillus	321. b	Oculi quibus conferendi	1.4
Molles pisces	23. b	Nerium herba	61.4	Oculorum inflammationes curati-	
Mola	117. b	Nere passillus	150. b	tia	173.4
Mollitoria discussoria	107.4	Neronis emplastrum	336. b	Oculorum chirurgia	108.4. b
Mora	25.4. 390. b	Nervos uarie lunantia	13. b	Oculi suppurati & suffusi	13.4. b
Morbus articularis & coxendi-		Nervorum abcessus	162. b	Oculi pterygia & bulbos	201. b
cum	141. b	Nervi sancti aut puncti	181.4. b	Oculorum afflictiones uarie	81. b
				Oculi	

Oculi prolapſus	86.4	Oſſa coliformia	211.6	Papaver	289.6
Oculi ſupparatiōis, anguiſis eum.	87.4	Oſſes piſces teſtacea in eſum qua- lia	28.4	Papaver cornutam hauſtam	302.4
Oculi ſeu quidā morbus	89.6	Oſſis quid ſit	321.6	Partiam animalium ad eſum pre- ſtantia	20.4
Oculi ſubſe & macies	88.4	Oſſium perpetuum nocium	22.6	Partiū extremarū preſectio	243.4
Oculorum expreſſio, & promi- nentia ac conſuſio	89.4.6	Ouilla pellis	275.6	Partium corporis ſingularum tem- peramenta diſpoſcere	20.4
Oculorum ratio	266.6	Oui crudi uſus	339.6	Partium principalium ſanctiſa- tis cognitio	246.4
Oculorum uſus ad corpus conſi- deratio	7.6	Ouorum facultas	266.4	Partes internæ ablata citra uitæ periculum	245.6
Oculi	268.6	Oui aceto macerata	255.6	Partes attenuatas curare	26.4
Oculi ſubſe an de appellata	390.6	Oui ſuffocata	266.6	Parthenium	277.4
Oculi ſanarum uſus	277.6	Oxylapathum	286.6	Parthenij purgatio	306.4
Oculi ſiquid preparatio	240.4	Oxypora	70.6	Parhygron	314.6
Oculi moderari humectantia & perfrigerantia	140.6	Oxyſchænos	299.6	Parulis	95.6.215.6
Oculi generis & uires	21.4.24.4	P		Pastillorum ſpecies	320.4
Oculi ſuſceptum	77.4	Paguri	23.4	Pastillorum theriacorum prepa- ratio	312.4
Oculi primarij	349.4	Panicum	24.6.277.6	Pastillus peponatus	94.4
Oculi & anguina uaria	246.4	Paniscuitus	272.4	Pastillorum ſcilliticorum prepa- ratio	312.4
Oculi diſcuſſoria calida	281.6	Panchreſtum ſiccum	275.4	Pastinaca	23.6
Oculi & olii uſus ac generis	276.6	Palma arbor	302.6	&	298.6
Oculi picum	294.4	Palmaria	35.6	Pastinaca	28.6
Oculi aſenſus aduerſus	197.6	Palpebre infernæ ſutura, & per medicamentum uſus	210.6	Pastinaca marina	295.6.301.4
Oculi affectiones	92.6.93.4	Palpebrarum pili pauciores	85.6	Paſſer troglodytes	216.4
Oculi ſanatio oculorum	33.6	Palpebre grando, merruca, & ea ro excreſcens	211.6	Paſſer troglodites	301.4
Oculi purgatorie	307.6	Palpebra ſuperna ſutura	209.4	Paſſum ebrjaticum	226.4
Oculum pro uaria preparatio- ne uires	35.6	Palpebrarū uſus per medicamen- ta	220.4	Patos	226.4
Olympus, collyrium excellens ad oculi ſclera lēdem	86.6	Palpebra infernæ euerſio	211.4	&	279.6
Olympicum collyrium	328.6	Palpebre coherentes	212.4	Patella genu fractura	236.4
Omenti prolapſus	227.6	Palpebre uelice & aquale	211.6	Paula emplaiſtrum	328.4
Omphacomele	317.4	Palpebrarum carbunculos cura- re	87.6	Peauonis caro	26.4
Omphacomele proprietates	272.4	Palpebra euerſio	82.6	Pedinis uſus	61.4
Omphacitis quid ſit	212.6	& eadem ſcabies	84.4.6	Pedioris oſis fractura	252.4
Oncobolus, eluſio uirtus	268.4	Palpitationes cordis, & de eis hi ſtorie	201.6	Pedore ſupparatorum uſus	224.4
Oncole uires	267.6	Palumbi	26.4	Pederetis uires	269.4
Oncosis uires	271.4	Pachreſtus Eraſiſtrati	84.4.331.6	Pedeſtria animalia	26.6
Ophiochelis	81.4	Panniculus lanens & lineus	295.6	Pediculos in capite necare	65.4
Opium	200.4	Panis generis	24.4	Pediculi palpebrarum	85.4
Opopanax	293.6	Panus	165.6	Pediculos generantia	25.4
Opime aque uſus, & cōtra	22.6	Pantolimus paſtilus	312.6	Pedis ſummi oſium fractura	256.6
&	13.4	Pappi quid	204.6	Pedum rima	249.6
Opiſtoſtonos	80.4.6	Papule	139.4.6	Pedum tumores curandi ratio	1.6
Opiſcoſordo	298.4	Parafynanche	97.4	Pelarium	333.6
Ophias	61.6	Paraphimosis	239.4	Pelariion	318.4
Ordeſium	84.6.85.4	Pardalianches uis	269.4	Pellis ouilla et hippopotami	275.6
Oſis ſeruida ſclera	95.4	Parſicias	89.6	Pellis uiperæ	276.4
Oſis affectiones	94.6. et deinceps.	Paritendi difficultas	141.6.242.4.6	Pelecinus	278.6
Oſis granulenta exſplene	22.4	Parietidis ſeruida balnearum	214.4	Peplij exhibitio	305.6
Oſis albe commoda	22.6	Parotidas diſcutientia	271.6	Pennarum uſus	244.4.250.4
Oſis uicariare uel cubiforme	226.6	Parotidas ſanantia	265.4.6	Pentamiron	350.6
Oſis	167.6	Paronychia	150.6	Pentorobon	275.4
Oſis quid ſit	92.6.93.4	Parotides	92.4	Peonia	275.4
Oſis	24.6	Papaveris ſuccum hauſtum	200.6	Peonia radix de collo ſuſſeſa	24.4
Oſis ſanatio	100.4	Papaver ſpamoſum	293.4	Peonia antidotum	318.4
Oſis ſanatio	60.4			Pepon	25.4
Oſis ſanatio	235.6			Peponaton ſingula	25.6.314.6

Pepo natus passillus	94.4	Picea	149.4	Plumbitis	193.4
Perdix	26.4	Picetorum pharmacum	11.6	Plumalis aque natura, grates	193.4
Perdiciat	84.6	Picris	283.6	pag.	194
Perdiciat herba	64.6	Picra ex alo	31.4	Plumali remedia nel lotare	194.4
Perdicion	177.4	Picra Galeni	317.4	sta	194.4
Perforationis usus	248.4	Pile utriusq; exercitium	4.6	Podagrae praeservatio	143.19.6
Per alium subducens	39.6	Pilatio	147.6	Podagra	144.2.4. & dicitur
Perinet membrana vulnus	127.4	simile	147.6	item	167.6
Peripneumonia	100.6.101.4	Pilius	301.4	Podagrice antidoti	193.4
Periscyphismus	208.6	Pilos argens aqua & attenuans	61.6	Podagricus palus depulseris	193.4
Pernarium fissura & attritus ex		pag.	61.6	pag.	193.4
decubitu	150.4	Pilos nigros faciens	61.6.61.4	Pollen medicus	103.6
Perniones	149.6	Pilos agglutinantis	85.6	Pollen	173.6
Perniciosa signa	31.6	Pilos ambustis producere	160.4	Potentia vis	103.6
Persica	25.6	Pili in palpebris succrescentes, pa	109.4	Potentia	14.6
Persicorum ossa	103.6	gina	94.6	Polypus narium	104.4
Personate natura	171.6	Pili faciei	75.6	Polypus	18.6
Pessus mollitorius	137.6	Pingalio	75.6	Polygonoides	181.6
Pessus vulvae substitutus	113.6	Pinguis natura & consuetudine no	16.6	Polypus quid sit	30.6
Pessus quid sit	113.6	de	16.6	Polypus diffus	106.4
Pessi forma	351.4	Pinguetudo in cibum	174.6	Polyerchiam	142.4
Pessi sine tali tres	351.4	Pinos	149.4	Poesceos lascina lectis unum cum	5.6
Pestem prohibens potio	51.4	Pinorum fructus	194.4	de apta	5.6
Pestis horrendissima	30.6	Pinorum cruce	194.4	Pomorum fructuum usus	16.4
& eius cura	51.4	Pinus	194.4	Pomorum usus, ratio, & edulcora	14.4
Petrofi pisces	18.4	Pini fructus	15.6	pus	14.4
Phagedena chirurgica	135.4	Pirum	171.4	Pompholygorum	104.4
Phagedena	174.6.175.6	Pirum sylvestre	171.6	Populi nigrae lachryma	173.6
Phalangositis	109.6.110.6	Pisces boni reservatu	18.6	Populi nigrae vires	168.4
Phalangiorum morsus	191.4.6	Piscium in esum vires	18.4.6	Populus alba	187.4
Pharicum haustum	101.6	Piscium in scula	27.6	Populares morbi	10.4
Phasganium	291.6	Pisum	24.6	Polygonatum	187.4
Phaseli	15.4	Pistacia	16.4	Plumbago & plumbum	190.4
Phasianus	16.4	Pistilli usus in repositione	16.4	Porrum	144.19.4
Phasioli	15.4	Pituitam euacuans	306.6	Porrigo	64.4.6
Phasiolon	186.6	Pituitam purgens	61.6	Portulaca	170.6
Philetation	194.6	Pituita vitrea	47.4	Potatori ad strenui bibendi, &	
Philippi passillus	321.6	Pituitosis conuenientia	11.6	ne uincat uinum, consilium opo	194
Philosophica quando puero auspi		Pituita in superno uentre redun	10.6	mam	194
canda	3.6	pituita emacuatio	10.6	Potus frigida acernatum	10.6
Phenosis	119.4	Pituita uomitur a radicalis	10.6	Potiones utiles & incunde	106.6
Phlomititis	192.4	Pituitam per os educens	77.6	Poterium	191.6
Philetation	104.4	Pituitam acidam detergentia	16.6	Potica calculos atterens	112.4
Philonis antidotus	114.6	Pituitam e capite educens	11.6	Potica purgatoria	107.6
Phimos	117.4	&	11.4	Posidonius	171.6
Phonaci	100.4	Pix naualis	171.4	Prasoides	177.6
Phrenitis	68.4.6.69.4.6	Pix acopon	145.6	Pracocia mala	190.4
Phryniou	195.4	Pix Aphricana	136.4	Pracocia	15.6
Phycotycbe	115.4	Placitis	199.4	Pracociorum affectiones	107.4.6
Phygethlon	165.6	Plantarum fissura & attritus ex		Praceptores lenes & humani pas	
Phylegrianum	143.6	decubitu, vel calceamentis, al		ris parandi	1.6
Physalides	111.4	cera	150.4	Pregnantium passiones, prentia	1.6
Pica animal pice affectioni obno		Plasta oclaria	111.6	tionis, & nictus	1.6
xiam	1.6	Plentago	171.6	Preparatio per nitrum	16.6
Pice affectio unde dista, & eius		Pleiadum occasus	31.6	Preparationes	16.6
dem curatio	1.6	Pleuritidis periculum quale immi		Preputium curatum	112.6
Picetionis autilitas	16.4	net	103.6	Preputium circa glandem contri	
Picetam, emplastrum Hippocreti		Pleuritis, & eadem uera	104.4.6	ctum, & cum glande coherens	112.6
quid	157.6	&	105.4	pag.	112.6

Preferantia à veneno	297.4	Pulsus quid, eimq; asus ac genera.	Rasura ossis	207.b
Priapismus	229.b	pag. 36.b.37.a.b.ac deincept.	Rasura ossis asus	249.b
Principium morbi quid	33.4	Pulsus non penitus interceptur ho-	Rationis lesio	71.b
Proci antidotus	219.b	mine alio	Rationis impedita Venut medela.	
Profectionem molienti que facien-		Pulsus compressio	pag.	9.4
da	14.b.15.4	Pulsus explorandi commodus lo-	Rauco ex aqua potu	13.4
Propinata	326.b	cui	Rauco	98.4.99.4
Propinatis potus	7.b	Puls ex colocynthide	Refrigeratorii corroo r atorium	
Protrus	330.4	et	stomachi	107.b.108.b
Protopum vinum	217.b	Pulticula purgatoria	Regius morbus	125.4.b
Prostactio	234.4	Pulsuili antherus	Repandatio	261.b
Prospitit uis	271.b	Pulsuili insperfiles	Replemencia moderate	167.4
Pruritus in puero curare	2.b	Punica mala	Repletionis in infante signa	2.b
Pruritus	256.4.b	Punicum acidodulce	Repletionis mala, et curatio	8.b
Pruritus scroti	113.4	Pupille dilatio	Resina lignosa Italica	345.b
Prura	283.b	Purgantia medicamenta non qua-	Resina aceris	157.4
Prurus pulsillat	324.4	litate	Resolutio ex uarijs causis, uarie	
Prusodicticium	276.4	Purgantia composita	curanda	76.b. et deincept.
Prusibron pilos disperdens	126.b	Purgatoria varia	Resoluit ex frigido sanare	11.b
Prutarium emplastrum	334.b	Purgantium scopus	Resonans	247.b
Prutacta	64.4	Purgationum tempus	disimile	247.b
Prutium sumptum	200.4.173.4	Purpure	Restrinctia moderate sicca	173.b
Prutia circa ungues	243.4	Pustula oculi	uermes curantia	174.4
Prutium	15.4	Pustule	Restrinctia	85.4
et	87.4	uossarne	Rha	295.b
Prutia oculi	212.b	Pustula in puero curare	Rhepomicaradix	1.4
Pustine coctura	24.4	Pus disentiemia, uel rampentia.	Rhacosis	296.4
Pustine uis	285.b	pag.	Rhenibus sanguis erumpens, et co	
Pustosis	85.4	Putredo ulcerum	ram duricia	218.4.b
Pute morsus	195.4	et in omni loco	Rhenam inflammatio	216.b
Putis osium fractura	252.4	Pyritia candescit asus	Rhenes in cibum	26.b
Putendori ulcera sanantia	173.4	Pyritis	Rheon barbaricam	219.b
Putendis resolutis uideri	11.b	Pyrgite	Rheon albam subducit	11.4
Putendorum nome	175.b	Pyrethrum	Rheos	85.b
Putendorum ulcera	151.4		et	212.b
Putendorum affectiones	129.b		item	289.b
et	130.4.b	Qualitates actiue et passiue, pa-	Rhodactena	25.4.62.4
Putendi aleratio	117.b	gina	Rhoidarium	314.4
Putendi uirilis deligatio sanguinis		Quartanarum note et cura	Rhus Alexandrinus	62.b
per nates eruptiones cobens.		Quercui	Rhus	303.b
pag.	59.4	Quinquosilium	Ricinus	283.4
Putendorum thymi	230.4	Quotidiana cognitio et cura, pa-	Ricinus à cane	85.b
Putendam cerui et eius uis	268.b	gina	Rigor non calefscens	47.b
Putendori inflammationes	268.b		Rigores indicatorij quomodo cu-	
Puri educatio	2.b	R	randi	34.4.35.4
Puros scholis mandandi tempus,		Radix fractura	Rime sedis	242.4
et que quando discenda	3.b	Radicala	Rime in putendis ac sede	129.b
Putigium	275.4	pag.	Rime pedum	249.b
et	306.4	Radicala	Rimarion	328.b
Pulmo animalium	294.4	Radices esui apte	Risus Sardenius	201.4
Pulmo in cibum	27.4	Rais	et	80.b
Pulmonis temperiei dignotio	18.b	Ramex gutturi	Robur inuatur Venere	9.b
Pulicis natura	183.4	Ramex aquosus	Rodia siflent sanguinem	324.4
Pulsus falso naturalis creditus, pa-		Renunculi operatio	Rodogastio	327.b
gina	17.4	Ranunculus	Rodomeli	317.4
Pulsus catochorum	42.4	Ranarum uis	Rododaphne	291.b
Pulsus mutandi cause	42.4.b	Rane rubete et puluistris accepta	Rosatam	218.b
Pulsus uedij quorum sunt, et quo		cara	Rubia auric colorem refrens	61.b
ram non	40.4	Rapum	Rubra tinctorum radix	277.b
		et		
		Rarefacientia corpus		

# INDEX IN

Rubrica synopica	274. b	Sanguinis uariorum uis	268. b	effusio	118. b
Rubus	273. a	Sanguinem per urinam purgan-	114	Semini profusione prohibere	104
Rubus caninus	286. a	tia	11. a	Semini redudantis mala, & mu-	104
Ruellibus foliis ab acceptis cibis al-		Sanguis in esum	27. a	natio	104
lenatos curare	10. b	Sanguinis stasatio	58. b	Semisyderatio	76. b
Rufus medicus	189. b	Sanguinis e naribus spontanea eru-	59. a	Seminaris uasa	211. b
Rugos tollens	7. a. b	ptionem in febre curare	141. a	Semper uis uirtus	208. a
Rugos arcendis fucus	93. b	Sanguinem euacuare	203. a	Semibus ter in die edendam	7. a
Rumex	286. b	Sanguis taurinus	175. a	Senum mictus	4. a. 7. a
Ruptio	169. b	Sanguinis eruptio	175. a	Senum peculiaris quidam morbus	89. b
& ei commoda	170. a	Sanguinis refectionibus conducen-	114	Seuicio	279. a
Ruta	394. a	tia	11. b	Senectus serpentis	275. a
Ruta syluestris sumpta	204. b	Sapa	278. a	Sensuum organo nocua	11. b
Ruta coctum herbetis	9. b	Saporum ratio	266. b	Sepia	28. b
Ruta syluestris	291. a	Sapa ex carieis	315. a	Seris	281. b
Rythmus quid	37. b	Sapo Constantini	201. b	Seri natura	274. a
		Sardianae glandes	201. a	Serica	164. a
S		Sardonis herba	128. b	Serapis	167. b
Abina herba	273. b	Satyrifasis	319. a	&	291. b
Saccharum	289. b	Satyrifaga	296. b	Serpentis uis cinis	171. a
Saginata animalia a defom	26. b	Saxifraga	155. a. b	Serpillum	277. b
Salamantra accepta cura	198. b	Scabies	156. b	Seseli	275. b
Sal purgatorius	308. a	Scabiosis mendentia	148. b	Siccantia	212. a
Salis flos & spuma	269. b	Scalprum lenticulatum	108. b	Siccantia sine astrictione & sicce-	175. b
Sal indicus	57. b	Scatmonia noxia	146. a	tione	174. a
Salis conis operatio	269. a	Scatmonie fuga	301. a	Siccantia ualde	211. a
Salsamenta	300. a	Scatmonie usus	23. b	Succi correctio	16. b
Salsamentorum uires	28. b	Scandix	151. a	Sicci nota simplicit & compesi-	16. b
Sales theriaci	313. a	Scapula fractura & spina	187. b	ti	72. b
Salix	280. b	Scleroma uteri	193. a	Siccyonium uarie paratum	141. a
Salvia	277. a	Scolopendra utriusq; morsus	278. b	Siccyonium oleum	170. a. b
Salinica	201. b	&	159. a	Sideribus	277. a
Salina humana	297. a	Scorpio marinus	191. b, 191. a	&	201. a
Salutaria figna	33. b	Scorpiouron	216. a	Sideritis heraclea	290. b
Sambucus	269. a	Scorpionis icui medens theriaca.	231. a	Signa ad salutem	31. b
Sandix	64. b	pag.	117. b	Signa indicatorij quando bona, se-	35. b, 36. a
Sandaracha pota	204. a	Scorpij plaga	112. a	cluse	31. b
Sanguinis spatium	101. b	Serotini lexatio	194. a	Signa ad mortem	31. b
Sanguinis refectione lapides excre-	98. a, 101. b	Scrotum	211. a	Singultus cause	51. a
Sanguinem sistens	111. b	Scroti inflammatio	218. a	Silices igniti	17. b
&	180. a. b, 231. a	& ex sudore ulcera	207. b	Siligua	26. a
Sanguinis ex naribus eruptio	93. b	Secantia calefacientia	208. a	&	21. b
Sanguis ex uena an arteria pro-	180. a	Secantia crassos humores	107. b	Simile	30. b, 31. a
rumpat	180. a	Secunda reuera et putrefacta	212. a	Simapi	21. b, 31. a
Sanguinis e naribus eruptionem si-	181. a	Sedigit	218. a	Simapius materia	144. a
stema	181. a	Sedis rime	218. a	Simapius preparatio	146. a
Sanguinis redundantis duplex, pa-	211. a	Sedis rugosa alcera curare	219. a	Sinus	219. b
gina	211. a	Sedis affectiones	224. a	Sinus attriti	178. a
Sanguinis uacuandi indicationes.	221. b	&	242. a	Sinum modi caracj	177. b
Sanguinem turbantia	131. b	Sedis abscessus	163. b	Siphonum similitudo	179. b
Sanguinaria	294. b	Semis profusio uenus curatio	119. b	Siracon	278. a
Sanguinis eruptio ex uena uel ar-	179. b	Semis profusum, & in somnis	130. a. b, 131. a. b	Siracon, sapa duplex	290. a
teria	179. b		218. b	Siricium	296. b
Sanguis ex utero eruptio	133. b			Siriasis signa & curatio	7. b
Sanguis e renibus erumpens	118. a			Sitit cause & curatio	56. b
Sanguis grumosus in uentre	103. a				58. b
Sanguis ex ore eruptio	97. a				
Sanguinem antidotus	314. a				

Sili ex asceribus	18. b	Spongiola epiboma	113. 4	Strabones ex nativitate	89. 4
Sili mortui	57. 4	Sponyli	18. 4	Strangulati	97. b
Singulata	311. b	Spongiola	141. 4	Strangulatio uteri	138. 1
Siniflex basilla	101. b	Spuma argenti	107. b	Strobilas	186. b
Smyrnium	11. b	☞	104. 4	Stramarum varia genera, ☞ cu-	
Suillum emplastrum	331. 4	Sputa cruenta	99. b, 101. b	ra	174. 4. b
Sulatum furiosum	101. 4	☞	101. 4. b	Stramarum cura	170. b
Solanum	199. 4	Spatiorum ratio ac nota	43. b	Strame	116. b
Solares maculas	94. 4	Squamæ omnis vis	137. 4	Struma quid, ☞ eius cura	119. 4
Sole ablutio meri	10. b	Squamiformia agglutinamenta pa-		Strumis medicatio	167. b
Soles ueteres	176. 4	gina	107. 4	Strutorum camelii	16. 4
Solium olei calidi	54. b	Squilla piscis	181. b	Stupeficientium usus noxius	145. b
Solium olei	81. 4	gluten	130. b	Stupeficienti scilicet habentia	86. 4
Sonsum inducens	11. b	Squille	128. 4	Stupefactoria uehementia	114. 4
☞	53. 4. b	Squatine	13. b	Styracis purgatio	106. b
Sonni graioris cura	51. b	Stallicon collyrium	118. b	Suber	101. 4
Sonsum quid est, uel facit, eiusq.		Stagnum piscis	13. 4	Suberis ex Italico uase cinis	111. 4
radix	19. b	Staphyloma	36. 4	Subluxatio quid	153. b
Sonno exurgunt quidam cum cla-		☞	113. 4	Sudorifica	11. 4. b
more ob lambicos	184. 4	Staphylini proprietates	175. b	Sudor	179. b
Sonnum inducens	30. 4	Statuarum sordes	196. 4	Sudorum fetor	106. b
Sorbe	15. b	Steatomata	171. b	Sudorem reprimens	54. b
☞	191. b	☞	119. b	Sudores per expressionem	55. 4
Soramus	151. b	Stellio	171. 4	Sudor indicatorius	54. b
Sopor vigilans	63. b	Stellionum medicamentum	119. b	Suffimenta varia	351. 4
☞	70. b, 71. 4. b	Stellionis morsus	191. b	Suffita explorandis comitialibus.	
Soporis profundi curatio	30. 4	Stercoris caprini malagma	141. 4	pag.	73. 4
Solita antidotes	315. b	Stercus per os redditum	115. 4	Suffocati	97. b, 100. b
Sphacelus	163. b	Stercus caninum	97. b	Suffumigium somniferum Zarnæ-	
Sphacelus	301. b	Stercus ueriorum animalium	134. 4	bo	53. b
Sphæron emplastrum	317. b	Sterilitatem curare	140. 4. b	Suffusio	88. b
Sphinter masculus	141. 4	Sternutationem mouens	11. 4	Sugillata	94. 4
Sphragis polyide	311. b	Sternutatio quando nocua	11. 4	☞	169. b
Spicanardi	191. 4	Sternutationem cohibens	55. b	Sugillatio oculorum	83. b
Spicalæ extrahens	179. b	Sternutatio linguam humectat, pa-		Suendi uentrem modus	117. b
Spina alba	169. 4	gina	57. b	Sulphur	179. 4
Spine fructibus infixæ	117. b	Sternutatoria	93. 4, 119. 4	Supparatoria medicamenta	91. 4
Spine resolutio	79. 4	Stibium	170. b	Supparatio thoracis, ipsarumq.	
Spina extrahens	179. b	Stigmata	153. 4. b	rumpens	101. b, 104. 4
Spine dorsi fractura	153. 4	Stillicidium urine	119. 4	Supparatorum usus	114. 4. b
luxatio	161. 4	Stomatice quæ sint	115. 4	Supercilia resoluta	79. 4
Spiritus animalis generatio	16. b	Stomatice uisiones varie	115. b	Superciliorum pilorum deflue-	
Spiratio recte ceruicis	100. 4	Stomachi uarie affectiones	54. 4	tia	85. 4
Spirandi difficultas	100. 4. b	Stomachum ciens	56. 4	Surditas	91. b
Spirantium agri, per capitis usio		Stomachi inflati	107. b	Susinum, a susis	147. b
nem sanatio	106. b	Stomachi subuersio ☞ salinatio.		Suum carnes	16. b
Spirandi difficultatem in elephan-		pag.	107. b	Sycionia eadem quæ colocynthidis.	
tias tollens	154. b	Stomachi uitiorum causas discer-		pag.	109. b
Spissamentorum decoctum	151. 4	nere	103. 4. b	Sycomoræ fructus Sycanini	157. 4
Splanchnon musci genus quale, pa-		Stomachici qui sint	101. 4	Sycosis	34. b
gina	174. 4	Stomacho humido et uoment con-		Sycomoræ	16. 4
Splenem obstruens	11. b	uenientia, ☞ contra	13. b	Syderatio	76. b, 77. 4. b
Splenis usus	115. b	Stomoma ferrum	157. 4	Syluestria animalia sicciora dome-	
Splen induratus	114. b, 115. 4	Stomachi usus	115. b	sticis	17. 4
Splen morbi, ☞ eorum indicia.		Stomachi ulcus, aut debilitas co-		Synauche	97. 4
pag.	114. 4. b	quendi, uomitusq.	109. 4	Syncope ex tenuibus humoribus.	
Splen in cibum	17. 4	Stomachicorum compositorum ma-		pag.	51. b, 52. 4
Spleni confrenia	13. b	teria	109. 4	Syncope ex crudis humoribus	51. 4
Splen inflammatus	114. 4. b	Stomachi affectiones	107. 4. b		

Syncope quid sit	105.b
Syncope affectu, etiā dum multum frigidū sunt, nūant	42.b
Synopes affectio	42.b
Synopæ ex varijs occasiōibus. pag.	52.a
Synochos	48.a
Symasimus	51.a
Syntaxis	52.a

T

Tabes oculi	83.a
Tabes	102.b
Tadi uariorum animalium	293.a
Taurinus sanguis	202.a
Taxus venenata	202.b
Teda, & eorum uis	275.b
Telepsia ulcera	176.b
Telorum extractio, & ea ex car- ne duplex	244.4.b
Telorum ex osse extractio	245.a
Telorum uarie differentie	244.b
Temperamentorum quatuor ordines, & moderati	267.a
Temperamentorum corporis cor- rectiones	20.b.21.a.b
Temperamenta singularum corpo- ris partium discernere	20.a
Temporum mutationibus corpo- ra affici	31.b
Temperaturæ naturales similia, morbose contraria appetunt. pag.	18.b
Temperamentorum corporis simp- plicium & compositorum, nat- uralium, & contrā, notæ	16.b
& 17.a.b.12.a.b.19.a.b.20.a	
Temperatiōis hominis notæ	16.a
Tenesmus	112.a.b.112.b
Tentigmen ciencia	129.b
Terebinthus	300.a
&	166.b
Terebræ usus	214.b
Terebinthina ad aluum suppres- sam	11.a
&	7.a
Terebella se nō demergens	248.b
Terrā sarda	177.a
Terre intestina	275.a
Terre omnis proprietates	274.a
Terrā edere cupientes curare	1.b
Tertianarum veterū curatio non seruiet nobis	46.a
Tertianarū cognitio & cura	45.b
Tertiana exquisita & extēta	45.b
Tertianarum spurgarū cura	46.a
Testacea	22.b
Testacei pisces	23.a
Testæ uariarum animalium	293.b
Testes in cibum	26.b

Testium temperamenti dignotio.	27.a
pag.	20.a
Testium inflammationes	163.b
&	127.b.128.a
Testis definitio, et circa ipsum cor- pora	231.b
Testudinis marinis sanguinis pre- paratio	196.a
Tetanus, eiusq; genera	80.a.b
Tetrastharmacum	332.a
Teucrion	303.a
Thaidis ceratum	94.b
Thalasserus	331.a
Thapsia baula	204.4
Thapsus, quæ rubia	61.b
Thiacta ad uenenam elacuan- tia	189.a
Thiacta preparatio	312.b
Theodotion	318.b
Theodoretus	317.b
Thoracis morborum presagia, pa- gina	30.b
Thoracis suppuratio, eemq; rum- penia	202.b
&	104.4
Thoraci fluxione infestato condu- centia	13.b
Thronus marcellinus	321.b
Thūni magni	28.b
Thut	287.a
Thyie lignum	267.b
Thylax in rosis	328.a
Thylacitis	291.b
&	289.b
Thymi in locis muliebris	236.b
Thymi pudendorum	230.a
Thymi in pudendis	130.a
Thymion baustum	202.b
Tibiae fractura	256.a
Tithymali septem species	300.b
Tithymalli usus	305.b
Tofsi in articulis	144.b
Tofsi cōcrescere prohibendi, pa- gina	147.a
Tofsi in articulis	148.b
Tofsi circa testem	232.b
Tonsillæ	216.b
Tonsillæ inflammate	96.a.b
Tonsillis insigniter aptæ	13.b
Tonsoris malagma	342.a
Tormina	109.b
Torpedines	23.b
Torpedo marinis	291.b
Torpedinis ceratum	145.b
&	338.a
Toxicon sumptum	202.b
Trachoma	84.b
Tragorigani usus	306.a

Tragoriganus	306.b
Tremoris cause	81.a.4
Thrysalis	302.a
Trichostis	81.b
Trifolium	302.a
&	282.b
item	306.b
Trigonus pessillius	310.b
Triorchis	292.b
&	167.b
Triphyllon	212.b
&	296.b
Triticum	24.b
item	291.b
Tuber terre	302.b
Tuberculum	165.b
Tuberum uires	24.a
Tuber culis medentia	170.b
&	171.b
Tunica supergenita affectio	321.a
Tunica rubicunda	241.b
Tumores ex morbis leuatis	13.b
Tumor latus	168.b
Tumores laxi	147.b
Turtur	26.a
Turdorum caro	26.a
Tusum in puero curare	2.b
Tusis lapides excreti	98.a
&	101.b
Tusis gravis	104.a
Tusis sicca quid test	24.b
Tusis sicca	98.299.a.b
Tusis ex qualis æque potest	11.a
Tusis diuturnæ conuocatorium, pa- gina	100.a
Tusis assidue suffumigatis pa- stillus	100.a
Tusis in febre	55.a.b
Tusilego	273.b
Tylosis	84.b
Tympanites	122.b.124.a
&	169.a
Typhe usus	58.b

V

Varices circa testem	231.b
Vari	94.b
Varicum sectio	242.a.b
Vasorum sectio & astio	208.a
Vasa seminaria	231.b
Vasorum astio	209.a
Vbera in cibum	26.b
Vellus descriptio	257.a
Vehementia stupeficatoria	214.a
Vellitania corpus	70.a
Venarum astio	208.a
Venarum repletarum mala, & si- gna	101.b
Venarum frigidam ruptorium, pa- gina	101.b
Vete	




Vene sectio unde deliquimus anoni adfert 211.4	Veratri sumendi modi 210.4	Vini coctoria nis 6.6
Venerum diffectio 180.4	Veratri exhibitio 203.4	Vina ex melle preparata 7.4
Vene in oppositis, aut vicinis par tibus, quanto secunda 211.6	Veratrum album sumptum 204.4	Vina ad vomitum 9.4
Vene tres in cubiti flexura 211.6	Veratrum anticyricum 207.4	Vina dulciora ad vomitum apta. pag. 11.4
Vene frontis, sub lingua, & retro aures, sectio 211.6	Veratrum 277.4	Vina salua contra vomitum 1.4
Vene sectio, cuiusq. modi 211.4	Veratri nigri preparatio 71.6	Vino veteri inebriati mortui 57.4
Vene sectio aue purgationem, p. gina 51.6	Verbenacee 203.6	Vino morsum induratum lenientia. pag. 29.4
Vene frontis sectio 63.6	Veris nictus 14.4	Vinum Asealonites 318.6
Venerorum simplicium numerus. pag. 198.4	Vermes terreni 275.4	Vini abstinentie utilitas 173.4
Venera ex rebus nobis familiarissi mis 204.6	Vermes ulcerum curantia 174.4	Vinum album attenuet, crassum contra 15.6
Venero occlusio corpus prohiben tia 138.4	Verruce palpebre 211.6	Vinum 292.4
Venero illi communis curatio, p. gina 188.6	Verrucarum genera 160.6	Vinacea 273.4
Venero sumpto curatio 197.6	Verruca acrochordon 244.4	Viola triplix 347.6
Venera simplicia & composita. pag. 196.6	Verruce 244.4	Viola alba 287.4
Venera cauere, & que ab eo pre seruare 197.4	Verrucae omnis generis curantia. pag. 190.4	Viola 280.4
Venerum stimulantia 9.4.6	Vertigo & vertiginosi 72.4.6	Viperæ pellis 276.4
Veneri in hoc sic succurrere 10.4	Verticillorum fractura luxatio 261.6	Viperæ carnes 273.4
Veneri nature, etates, nictus, & tempus apte, ac modus, cau tioq. 9.4.6	Veruta sectio 209.6	Viperæ dispartes 57.4
Veneri in iuuenibus quibus retin datur 3.6	Vesicæ palpebre 211.6	Viperæ maris ac femine morsus. pag. 192.4.6
Veneri utilitas 9.4	Vesicæ resoluta & 119.6	Viperæ morsum senans, theria ca 189.4
Veneri quos læsit 19.6	Vesicæ inflammatio 116.6	Viperarum carnis esus 153.6
& quibus semper innoxia 21.4	Vesicæ insusum mittere 210.4	Virida unguenta 246.6
Veneri non appetunt perfrige rata 140.6	Vesicæ morborum prænotiones et curatio 31.4.6	Vitis sylvestris & alba, ac nigra. pag. 270.6
Venerem ad lædenti 21.6	Vesicæ per clysterem infundenda. pag. 118.4	Vitis facultates 267.6
Veneris alius 109.4	Vespe ne feriant 183.6	Vitilign alba & nigra & 153.4
Ventriculi, id est ventris tempera ture, nota 18.4.6	Vesparum istum cura 191.4	Vitrom 301.6
Ventriculi oris morsus quomodo alluendi 1.4	Vitius atatum 3.6.4.4	Viscum 279.6
Ventris affectionum prænotiones, et curatio 31.4	Vitius perfrigeras & humectans. pag. 145.6	Vitius hebeti conducencia 87.4
Venter in esum 27.4	Vitius febrilis 249.4	Vitius tuendi cura 8.4
Venter humorum animalium, pa gina 233.6	Vitius iter facientium 14.6	Vitalis marinus 18.6
Venterum clementia 121.6	& 15.4	Vlcera humecta & grauo lenia. pag. 175.6
& 121.6	Vitius attenuans 15.6	Vlcera nervi curantia 174.4
Ventriculi inflammationibus astrin gentis necessaria sunt 107.4	Vitius nasugamiam uomitusq. pa gina 15.4	Vlcera narium 93.4
Venterum euacuatio 11.4	Vitius pro anni temporib. & ven tis 14.4.11.6	Vlcera oculorum 83.6
Venter fluxiones sistens 28.4	Vitius negotiosam vitam degen tium 14.4.6	Vlcera é rabido cane morsi eica tricem contrahere prohibens. pag. 181.6
Venter suendi modus 217.6	Vitius humectans 30.4	Vlcerebus fortibus commoda, acribus vel non acribus, pagi na 86.4
Venter mollius manentia 41.6	Vigilie cause, incommodaq. miti gari 29.6	Vlcera que refringuntur 179.4
Venter inflatio 109.4	Vigilans sopor 68.6	Vini liquor 203.6
Venter affectiones 107.4.6	& 70.6.71.4.6	Vlcera cum luxatione 263.6
Venter conueniens nictus 14.4	Vigiliarum cura 51.4	Vlcus simplex 172.6
	Vinum palustianum 110.4	Vlcera cicatrice indigentia, pagi na 175.6
	Vinum purgatorium 308.4	Vlcerebus inflammatis & doloro sis consuetudo 172.6
	Vinum asealonites 113.4	Vlcetum malignorum & putredi nosorum chirurgia 225.4
	Vinum adrianum 106.6	Vlcera diuturna 160.4.177.6
	Vinum meracum multum, vel dul ce, quando venenum est 204.6	
	Vini genera, & facultates, & mo dus 29.4	

# INDEX IN AEGINETAM.

Vlcera eris feruida	96.4	pag.	10.5	Vltorum à sole curatio	10.5
Vlteri apthae in pueris mederi.	3.4	et	8.5	Vfus theriacis	31.5
pag.	3.4	Vomitum tempus, & prouocantia	10.5	Vteri declinationes	135.4
Vlcera fordida purgantia	173.5	Vomitum utilitas	10.5	Vteri inflammatio	135.5
Vlcus cui ignis facer, uel simile ac-	173.4	Vomitum facilem uino indulgenti	195.4	Vterum non perforatum	137.4
cessit	173.4	præstantia	57.5	Vteri abfcessus	135.5, 137.5
Vlcera cruda, & non fupparantia	173.4	Vomitum bilis, uel atræ bilis	196.4	Vteri cancer	136.5, 137.4
uel callofa, curare	173.4	Vomenti in navigatione quid agen-	15.4	Vterus in efum	17.4
Vlcera cana	173.4.5	dum	59.5	Vteri affectiones	131.5
Vlcera quibus glutinentur	173.5	Vomitum irritantia	108.5	Vteri prolapsus	139.5
Vlcera maligna	175.5	Vomitum ciencia	153.4	obturamentum	140.4
Vltus	295.4	Vomitum ab acrimonia efu	10.5	Vteri fiffura, condylomata, & he-	141.5
Vlophon	201.4	Vomitum pituitæ à radicalis	1.4	morrhoides	136.5
Vmbilicus prolapsus	225.5	Vomitum remedia	319.4	Vteri exulceratio	140.4
Vmbilici prolapsus	126.4.5	Vrinarum uitia	117.5	Vterus totus ablatum	140.4
Vmbilicæ iluſiones	310.4	Vrina ſcilicidium, & eius reddendæ	119.4	Vteri inflatio et ſtrangulatio	137.5
Vnguis	87.4	difficultas	119.4	Vteri ſcirrhus	137.5
Vnguis contufus	245.5	Vrinariarum partium apoſtema-	117.5	Vteri nimia purgatio	131.4
Vnguium affectiones	150.5	ta & dolores	230.4	Vna quid, & eius cura	137.4
&	151.4.5	Vrinam ſuppreſſam e ducere	11.4, 45.5	Vna ualde conducentia	13.5
Vnguis oculi	86.5	Vrinam mouentia	43.4.5	Vna paſſe nis	171.4
Vnguentariae glandes	348.5	Vrina quæ optima, & eius gene-	123.4	Vna paſſe	171.4
Vngule	13.4	ra	123.4	Vulnus quarum partium ſit cognoscere	146.4
Vnedo	277.5	Vrinam citra grauitatem ciencia.	123.4	Vulnere in neruis	151.4
Vocis exercitiū ſanitati quòdum	5.4	pag.	123.4	Vulnus cum fractura	157.4
utile	5.4	Vrinæ uerie	123.4	Vulpecula uina in oleo coſta, & gins	145.5
Voces non priuationem, ſed depre-	17.5	Vrinæ difficultas	123.5	Vulpis in medicina nis	170.4
nationem ſignificantes	77.5	Vrtica	225.4.5	Vulſio	170.4
Vocis priuatio	77.5	Vrticæ proprietates	225.4.5	& ei comoda	170.4
Vocem exercendi tempus	5.5	Vſtei ſuppuratorij, pectore & he-	224.5	X	
Vocis ſonus fractus	99.5	patis, ſplenis, ſtomachi	224.5	Xilocolla	100.4
Vocis inſtrumenta reſolute	79.4	&	225.4.5	Xxyſter collyrium	115.5
Volatilia	26.4	Vſtio per medicamentum	210.4.5	Xylomaceris catapotia	119.4
Volatilium partes extremæ	26.5	Vſtio circa medium capitis	211.5	Z	
Voluulus	115.4	Vſtio per ferrum	210.4	Zoſimi iſtitio	145.5
Vomitoriorum medicamentorum	310.5	Vſtio naſorum & menarum	171.5	Zopyrus	147.5
uſus	310.5	Vſtoria medicamenta	233.4		
Vomitum uſus	9.4	Vſtoria ſeramenta gammata & cultrata			
Vomitum ex uino factus	9.4				
Vomitum facilitatem conciliantia.					

F I N I S.







# PAULI AEGINETAE REI MEDICI

LIBER I. IANO CORNARIO

Medico Phsyico interprete.

De his que accidunt pregnantibus, ex quo uisui uti debeant.

## CAPVT PRIMVM



VANDO QVIDEM ex his que pregnantibus accidunt, hæc maximè ipsas diuexant, humorū crudorū redundantia, assiduus uomitus, sputatio, oris uentriculi morsus, & ciborū fastidium, commodum sanè fuerit ipsis consilia præscribere. Conueniunt itaq; deambulationes, cibi non ualde dulces, & uina fulua, odorata, quinquènia, & potus moderatus. Hæc enim omnia, humorū crudorū redundantia, & uomitus, remedia sunt. At medicamēti loco, polygonum herbam aqua

coctam bibant, & Anethum similiter, & ponticam radicem, quæ uernacula lingua Rha uocatur. Hæc & post & ante cibum sumant. Foris autem Oenanthen, & balaustium, & mali punici florem, & smyrni coinam, & feniculi semen, aut omnia hæc simul, aut prout miscere uolueris, cum palmulis & uino ueteri, præcordio cataplasmatibus uice impones. Caterum oris uentriculi morsus alleuandi sunt, aquæ calidæ potu, & placida deambulatione, & præcordio molli lana infecto. Cibus uerò auerſantes, ad uariorum eduliorum & ad uoluptatem paratorum, itemq; amyli sicci esum, inhortari oportet. Hoc autem potius his obtuleris quæ terram edere cupiunt, uelut in pica appellata affectione contingere solet, quæ circa tertium maximè sit impregnationis mensem: eo quod foetus tum non possit totum id quod pro alimentum ratione ad uterum affertur consumere, nimirum imbecillior, ita ut ex hoc ipso uariæ in stomacho superfluitates redundant. Vnde etiam uaria & absurda appetunt, uelut carbones extinctos, & cimoliam terram, & alia multa. Hæc enim de causa, etiam appellationē hanc affectio ipsa adepta est, ob picæ animalis uarietatem, aut quod etiam illa sæpe hac affectione corripitur. Commodat autem & labores, & longiores peregrinationes. Verum quæ delicate uitam degere consuevit, ea ubi prægnans est, repentinas motiones non bene tolerat. Quin & acria aliquando gustare, & maximè sinapi, commodum est cibum auerſanti. Ar uero ad pedum tumores præcipuum est, Anthyllidem ac eto maceratam alligare, & brassicæ folia in latum superponere: & terram cimoliam cum aceto illinere: & alumen similiter cum aceto. Bonum est etiam malorum Medicorum, quæ & citria appellantur, decocto ex aqua pedes lauare.

Rha pontica  
radix

Pica affectio

Pedum tumor

Mala medica,  
citria

## De Nutrice. CAPVT II

Deligenda est nutrix nullum morbum habens, neq; anicula ualde, neque iuencula. Sit autem natu minima annorum uiginti quinque: natu maxima triginta quinque. Et habeat pectus magnum, & mammas magnas, & papillas neq; coniuuantes, neq; auersas. Reliquum autem corpus neq; pingue sit ualde, neq; nimis tenue. Magnum uerò commodum fuerit infanti, si nutrix non ita multo ante pepererit, & præsertim masculum. Vitare porro debet nutrix ualde siccantia, & salsa, & acria, & acerba, & acida, & amara, & uehementer calefacientia, & ualde graueolentia. Itemq; insigniter iucundus odores, & condimenta, & alia acria. Abstineat etiam nutrix à Venere. Et labores per manus & humeros, & molam uerset & texat. Et puerum uulnis gestans circumferat, qui tamen iam sit trimestris aut quadrimestris.

Lactis boni  
note

**L**Ac optimum est, quod moderatum est crassitudine, copia, colore, odore, sapore. Commodum est etiam id quod pollicis unguis instillatus, dum ad lucem consideratur, in flectendo unguem, neque cito, neque tarde defluit. Præstat etiam sic lac probare. Infundatur lac in uas uitreum, & coaguli moderata copia immittatur, ac digitis conteratur, atque ita donec coaguletur dimittatur, ac deinde consideretur, an casei minus in ipso sit quam feri. Tale enim lac inutile est. Contrarium uero coctio difficile. Optimum uero est id quod utraq; habet moderata.

Quomodo uitiosum lac corrigatur. CAP. IIII.

Lac generans  
tubercula

**L**actis uitia hoc modo corrigere oportet. Si quidem crassius fuerit, tunc pituita extrahenda est, optimus autem est ab aceto mulso. Sed & laboribus ante cibos attenuare oportet. Commoda sane hic sunt, & origanum, & hyssopum, & satureia, & scandix, & thymus, & raphani modici, & falsamentum uetus, cum aceto mulso. Si uero acrius fuerit ac tenuius lac, a multis laboribus nutriticem leuare oportet, & sorbitionibus ac carnibus potius nutrire. Et sapam bibendam dare, ac uinum dulce. At si lac immixtus, sorbitiones exhibendæ sunt ac largior uictus, & uinum dulce dandum, & pectus ac mammae confricandæ. His uero etiam cucurbita medicinales affusa commoda existit. Cæterum quod medicamenta a lactis generatione efficaia sint noui, non tamen assiduum ipsorum usum probo. Violentius enim colliquant. Sunt autem feniculi radix & semen, in ptisana cocta: & cytisi folia in uino nigro, aut ptisana: & melanthium in passo, & anethum, & pastinaca radix ac semen. Oportet autem calida aqua prius rigata, ita exhibere. Omne uero uitiosum lac, siue crassum fuerit, siue acre, & graueolens, ubi nutritrix prius id emulxerit, ita puerum admoueat neque unquam acre ieiuno exhibeat. Verum graueolentias & uinum odoratum, & cibus incandus corrigere poterit. De lacte uero in caseum coagulato, in tractatione de mammis libro tertio dicitur.

Educatio pueri. CAP. V.

Mel primum  
infantis cibum

**P**rimum alimentum recens nato infanti mel exhibere oportet. Postea uero lac præbere bis in die, aut ad summum ter. Quum autem & ipse promptus fuerit ad accipiendum, & spem exhibuerit concoctionis, tunc iam etiam cibus dandus est, qui non repleat. Si uero nobis non animaduertentibus repleti fuerint, somnolentiores statim & segniores fiunt, & tumor in uentre adest, & flatus, & urine sunt aquosiores. Ex quibus signis repletione deprehensa, nutritrix nihil exhibere debet, donec fuerit consumpta. Sufficit autem biennium lacte nutrire. Deinde ad cibos transgredi.

De pustulis puero erumpentibus. CAP. VI.

Aluus pueri  
soluende

**Q**uæ circa cutem puero erumpunt, primum quidem patienter ferre oportet. Vbi uero probe omnino eruperint, tunc iam curare, ita ut ad laucra nutritrix immittat myrtum, aut lentiscum, aut rosas. Deinde rosaceo aut lentiscino utatur, & cerato cum cerusa. Sed & nitro mollius extergat. Nam fortiora non feret. Optimum est etiam nutritricem dulciore uictus modo uti. Optimum item est & puerum ita nutrire, ut neque ipsum nimis impleat, neque rursus ualde famem ferre sinat. Quod si aluus puero supprimatur, mel ad cibum affusum simul coquito. Si uero neque sic obediat, terebinthinæ ciceris magnitudine adijcito. At si liquidior fuerit aluus, milium maxime offerendum est.

De tussi &amp; grauedine pueri. CAP. VII.

**S**i quando tussis aut grauedo puerum uexet, mellis illitiones adhibeantur. Oportet itaque ipsam ubi multa calida aqua lauit, caput quoque multo melle illinere. Deinde linguam leniter digito comprimere. Multa enim pituita uocatur.

De pruritu. CAP. VIII.

**S**i quis pruritus puerum infestaret, fomento utendum est, & unctione lariga ex oleo cocto, modica cera in ipso cliquata.

**D**Entiunt quidem pueri circa septimum mensem. Contingunt autē tunc inflammationes gingivarum, maxillarum, & tendinum: & aliquando cōuulsiones. Tunc igitur nihil puero exhibendum est, quod manu opus habeat. Digito uero gingiue assidue in lauacro contrescentur, ac molliantur adipe gallinaceo, aut cerebro leporino. Prominentibus autem iam dentibus, delicatarum mollium lanarum circumiectu utendum est, ad collum, caput, & maxillas, ita ut eadem ex oleo dulci calido irrigentur, & oleum quoque auditorijs meatibus instilletur. Tunc uero etiam uisus luculentior puero dandus est, idemque calida lauandus. Et si quidem alui profluvium habuerit, conandum est ut uenter epithematis impositis adstringatur, quę maxime sistant, cumino lanę insperso, aut aniso, aut apio. Bonum est & rosarum semen ammiscere: & in summa, calidē resiccare. Si uero nihil deorsum subeat, melle in glandulam efformato, alui leniter irriteretur: aut calamintha trita cum melle illinatur. At uero cōuulsionibus puerorū maxime auxiliari uidetur heliotropiū, si in aqua coquatur, & puer in hac laetetur. Prodest etiam irino, aut cyprino, aut sicyonio oleo uti, & in summa, calefacere. Quando uero emergentibus dentibus, & digitos mordet, & uulnerat, bonum fuerit iridis radicem rasam, & non ualde siccam, ore continere. Hoc etiam ulceribus auxiliatur. Prodest & butyrum cum melle illitum. Gingiuarum autem pruritus salsamenti ueteris caro sedat.

Alui profluvij  
in pueris cau-  
ratio

Cōuulsiones  
puerorum

Gingivarum  
pruritus  
Aphthę pue-  
rorum

**E**st & ulcus puero, quod aphthæ appellatur, modo subalbidum, modo subrubrum, quandoque nigrum, ueluti crusta, quod pessimum est, & maxime letale. Auxiliatur autem iris cum melle: & si siccam inflare uelis. Item rosarum folia rasa, & flos rosarum, & crocus, & myrrhæ parū, & galla, & thus, & thuris cortex, & simul singulatiq; melle excepta. Post hæc, aqua mulsa, & malipunici dulcis succus.

**F**œmorum intertrigines myrto arida, & rosis, & cypero inspergito.

**A**urium humiditates siccat lana alumine imbuta indita: aut uinum mustum aut uinum uetus instillatum: aut crocus cum uino tritus.

**S**triasis est inflammatio partium circa cerebrū & membranas ipsius. Consequitur ad hanc scincipitijs cavitates, itemque oculorum, cum pallore ac sicciatate corporis. Auxiliatur autem ipsis luteum oui cum rosaceo impositum scincipiti admodum lanę conuolutæ, ita ut frequenter alteretur. Aliud ad Striasas. Folia heliotropij scorpiuri appellati, scincipiti imponito. Item cucurbitæ ramentis, & cucumeris pëponis pelliculam, quę eius carnem amittit. Aut solani hortensis succum cum rosaceo.

Striasis

**I**nfantēs & à lacte amotos, in remissione ac hilaritate sinere oportet. Exercitia uero & alimenta leuiter exhibere. A sexto autem & septimo anno, & pueros, & puellas, literatoribus lenibus ac humanis tradere oportet. Hi enim cum remissione ac gaudio docent. At animi remissio ad bonam corporis nutritionem multum confert. Duodecimum annum egessos pueros, ad grammaticos iam ire ac geometras, & corpus exercere necesse est. Verum à decimo quarto usque ad tres annorum septenarios, conuenit exercitijs in disciplinis, & in philosophicis doctrinis instructiōi. Sed & exercitationes plures assumere conuenit, propter corporis robur: quo & anima & corpore laborantes, ab impetu in Venerem impediuntur. In his etiam uinū contrahendum est. Ceterum in uigore ætatis, uisus perfectus & animæ, & corporis conuenit. Quapropter exercitijs omnibus utendum est, maxime his quibus

Animi remissio  
stans utilitas

Ætatis  
necesse

quibus quisque adfectus est, & alimentis sufficientibus ac probe alentibus. At in declinante aetate, uictus & animae, & corporis remissus congruit. Nam & exercitia qualiacunque fuerint, pro horum ratione subtrahenda sunt, & alimenta sensim contrahenda, quum habitus ipsorum frigiditatis principium accipiat.

*De frictione preparatoria.* CAP. XV.

**A**Nte exercitia corpus moderatè calefacere oportet, frictione perlintata. Deinde per oleum fricandum est nudis manibus, donec probe caluerit, & mollium fuerit corpus, & florido rubore rubuerit, & ad tumorem perductum fuerit.

*De exercitijs.* CAP. XVI.

**E**Xercitium est motus uehemens. Vehementiae terminus est, respiratio, nis mutatio ad densitudinē. Exercitia uero preparant partes instrumentales, ut ne facile offendi possint, & robustas ad actiones efficiunt. Faciunt etiam alimenti attractionem fortiolem, & alterationem promptiorem, & nutritionem meliorem, propter exorientem caliditatem. Expurgant quoque meatus, & superfluitates euacuant, propter fortem spiritus motum. Quandoquidem igitur distributioni alimenti opitulantur, non oportet crudorem ac incoctorum neque ciborum, neque humorum copiam, aut in uentre, aut in uenis contineri. Periculum enim est ne ad omnes corporis partes attrahantur, prius quum concocti commodi fiant. Clarum itaque est etiam ante cibos exercitia assumi debere. Verum notè oportuni exercitijs temporis, ex uirinarum colore colliguntur. Nam quae aquosa est, in concoctum adhuc significat distributum ex uentre humorem. Fulua uero & biliosa, iam diu concoctum esse. Moderatè autem pallida, recens factae concoctionis signum est. Tunc igitur ad exercitia ducere oportet, & uescicae & uentris recrementis prius deiectis.

*De exercitiorum speciebus.* CAP. XVII.

**O**Mnibus exercitijs commune hoc est, quod caliditatis augmentum ex seipsis animantibus efficiunt. Proprium uero in singulis speciebus inest. Etenim ualidum exercitium, hoc est uiolentum, musculos ac nervos ad robur preparat. Talia autem sunt, fodere, & maximo onere sublato, aut in eodem loco manere, aut paululum progredi, ac uelut deambulare. Huius generis sunt, & per funem manibus ac pedibus nitendo ascendere, & plura alia huiusmodi. At uero uelocia, sine robore ac uiolentia sunt. Talia sunt cursus, & umbratilis pugna, & summis manibus decertatio, & perfollem, & per magnam ac paruam pilam exercitium. Compositum autem sit ex ualido ac ueloci. Nam quae exercitia ualida sunt, his uelut uehementibus uti quis poterit, si ueloces motus addat. Praeterea exercitia alia lumbos magis quam manus aut crura exercent: alia spinam, aut thoracē solum, aut pulmonem. Exercenti autem oportet quam diu ad tumorem corpus attolitur, & floridum existit: & quam diu motus prompti, & aequales ac concinni sunt. In hoc autem & sudorem calidum uidebis uapore ammixto. Tunc uero primum desinere oportet, ubi unum ex relatis fuerit alteratum, ueluti ubi causa, si corporis tumor contrahi uideatur, statim quiescendum est. Similiter si coloris floriditas marcescat, cessandum est. Quin & si motus omnis non remittere uideantur, statim cessandum est: & si circa sudorē mutatio aliqua fiat, aut in copia, aut in qualitate. Si enim minor, aut frigidior fiat, cessare oportet, oleoque circumfuso de caetero recurrere. deinde recuratoria si ueluti actione uti, uelut praedictis facere solent.

*De frictionum speciebus.* CAP. XVIII.

**F**Rictio dura densare, mollis soluere potest. Quare corpora ultra modum exoluta, duriter fricanda sunt. adstricta uero, molliter. Si uero moderato corpore quis praeditus sit, clarum est quod neque molliter, neque dure fricandus sit, sed quantum eius fieri potest, excessibus utrisque uitatis. Etenim

Exercitia etiam  
ante cibos  
sumi.

Exercitia  
maria

Frictiones  
maria



**A** multa & dura frictio, corporis tumorem deprimit. Modica autē & mollis, ut cuncta in tumorem eleuat. At uero tres differentiæ frictionū secundum quantitatem, tribus differentijs secundum qualitatem complicatæ, coniugationes nouem efficiunt, uelut subiectum est. Nam una secundum quantitatem, multa uidelicet, tribus secundum qualitatem complicata, duræ dico, & mollis, & moderatæ in duricia, tres differentiās facit. Et rursus modica, iisdem tribus complicata, alias tres. Moderata uero in quantitate, iisdem tribus complicata, alias tres, uelut subiecta tabula ostendit.

Quantitas.		Qualitas
Multa	}	Dura
Multa		Mollis
Multa		Moderata
Modica		Dura
Modica		Mollis
Modica		Moderata
Moderata		Dura
Moderata		Mollis
Moderata		Moderata

De uocis exercitio.

CAP. XIX.

**I**nter uocis exercitia iucunda ac concinna modulatio nihil ad sanitatem conducit. Verum grauiorum uocū sonus utilis est. Quare in hoc se exercere oportet. Sic enim plurimus aer in respiratione in corpus trahitur, & thoracem & uentrē diducit, & meatus totius corporis dilatat ac dispartat. Quapropter in ipsis lectionibus redundantium humorum excretiones facit, his quidem qui maiore contentione legunt, magis, & per sudores; his uero qui lenius cōtendunt, per occultam de tota corporis mole contingentē transpirationem. Contingit enim ut propter attenuationem, multarum superfluitatum quæ creatu reijciuntur, & sputorum, & muci, & pituitæ excretio ac consumptio fiat. Proinde his qui caliditate opus habent, propter frigiditatem, quod nam aliud commodius auxilium contingere posset, quàm actio illa in transpiratione. Quare sæpe legere oportet, toto corpore remisso, & carne diffusa, ita ut de industria arteriam ac reliquos spiritus transiens, ad raritatem dispargamus, & grauiores uoces sonemus. Vtendum est autem uocis exercitijs & actionibus, neque temere, neque inconsiderate. Imò neque quum prauis ac corruptis pleni sumus humoribus, neque in magnis & manifestis stomachi cruditatibus, ad uocis exercitium deueniendum est, ut ne maior distributio corruptorum humorum ac uaporum in corpus fiat.

Vocis graue  
sonus utilis

De lassitudinibus exercitijs. CAP. XX.

**L**assitudo ulcerosa ex recrementorum tenuium simulq; acrum copia fit. Tensiva uero, nullum quidem memorabile recrementū corporibus incumbere indicat. Verum circa musculos & neruos affectio quædam contingit, in qua tendi sibi uidentur. Inflammatoria uero lassitudo, in qua uelut contusas aut inflammatas sentimus partes, tunc accidere solet, quum exalcati musculi aliquid de circumfusis sibi superfluis recrementis attraxerint. Est & alia affectio quarta, cuius generatio ex eo est, quod musculi ultra quæ conuenit siccantur, adeo ut denudatū corpus, appareat squallidum ac contractum, & ad motus pigrum. Curationem porrò ulcerosa lassitudo habet, recrementorum discussionem, per multam ac mollem frictionem cum oleo multo, quod nullam adstrictionē habet. Altera lassitudo tensiva scopum curationis habet laxationem. Laxatur autem id quod dissentum est, frictione modica simulq; molli, cum oleo uelut ex sole calenti, requies itē ac omni quiete, & balneis temperatis, & diutius in aqua calida mora. Quare si etiam bis aut ter ipsum laueris, plus profeceris. Tertia lassitudo inflammatoria tres curationis scopos habet, superflui euacuationem, dissentum laxationem, & inflammationis refrigerationem. Oleum itaq; multū tepidum,

Lassitudinis  
species quatuor

& molliſſimæ frictiones, & in temperatis aquis longiſſima mora, tales laſſitudines ſanant. Sic autem & quies multa, & unctiões aſſiduæ. Quarta aſſectio in prima quidem die niſil diuerſum à prioribus poſtulat, præterquàm calidiorem aquam, ut leniter cutem conſtringat. In ſecunda uero die exercitio recuratorio opus habet. Exiliant autem itatim in balneis, in frigida, quæ ſolâ. Omnes porro laſſati boni ſucci cibo opus habent.

De cutis aſſtractione. CAP. XXI.

Aſſtractionis ſit aut ex obturatione, aut ex denſatione meatuum. Et obturatio quidem ſit ob copiâ aut craſſitu dinè, crudorum & inconcocti huius morum. denſatio uero, aut per frigefacientia, aut aſtringentia, aut ſiccantia. Statim autem cognoscitur ubi ſe exuerint, ex decoloratione alba, unicum duricia ac denſitate corporis. In ipſa uero exercitatione, ex eo quòd difficulter caleſcunt. Curatio huius aſſectionis eſt calefactio. Itaq; aſſiduis exercitijs utendum eſt, & balneis calidiſſimis. Mora uero in frigido ſolio non ſit diuturna, neq; ipſa aqua ualde frigida ſit. Vbi autem ſe induere uolent, ex aliquo moderate caſſificante ungantur, ueluti oleo dulci ac tenui partium. At uero denſitates cutis ſatis ſanat oleum anethinum, præſertim ſi uiride fuerit anethum, itemq; oleum ex populo nigra.

De laſſitudinibus ſpontaneis. CAP. XXII.

Quandoquidem ob acrium recrementorum uitium ulcerofa ſit laſſitudo, ſi quidem omnino modicus fuerit uitiatuſ humor, exercitium ſufficiet recuratorium. Si uero maior & per profundum, talem nō amplius ad exercitium ducemus, neq; omnino ad ullum motum. Verum quieſcere ac dormire iuſſum, per totam diem in abſtinentia cibi conſeruabimus. Deinde ad ueſperam pinguiter uncto, & temperata calida loto, cibum boni ſucci ac forbilem modicum dabimus. & neq; à uino ipſos prohibebimus. Vinum enim ſemicrudos humores, ſi quid aliud, coquit. Si igitur ex relatis ſedatum fuerit ſymptoma, ad conſueta munia obeunda pro ratione homoreducatur. Si uero etiam poſtera die adhuc permanſerit, de fortiore auxilio tam conſyderandum eſt. Nam ſi uires fuerint robuſtæ, ex duobus alterum, aut uenam ſecare, aut purgare conuenit, diſcrimine factio utro magis auxilio opus habeat. Si uero uires debiles fuerint, uena quidem nequaquam ſecanda eſt, ſed purgatio moderate facienda. Si uero crudi humores multi fuerint, neq; uena ſecetur, neq; purgetur, neq; exerceatur. Imò neq; omnino moueatur, neq; laetetur. Verum in omni quiete ſeruetur. Et edulia & potiones ac pharmaca exhibeantur attenuantia, & ſecantia, citra manifeſtam caſſationem. Viſtus itaq; ſit ex aceto mulſo, ita ut aliquando etiam partiſſillanæ & aquæ mulſæ exhibeamus. Quando uero etiam præcordiū omnibus talibus eleuatum eſt, & inflatū, & facile inſtantur, quicquid tandem ingeſſerint, præſtiterit aliquid piperis cum alimentò dare. Melius etiam fuerit diſpoletico uti medicamento, & ſimplici illo ex tribus piperis generibus compoſito. Sed & acetum mulſum commodiſſimum ipſis eſt. Potu uero utantur fauorum cremore cocto, maxime ubi exacuerit, & uinis leniter acidis, & edulijſ attenuantibus citra calefactionem: qualis eſt & capparis, ſi ex aceto mulſo, aut ex aceto & oleo ſumatur. At uero tenuia laſſitudo, ubi citra exercitia oboritur, multitudinem indicat ſolidas animalis partes diſtendentem. Clarum autem eſt ſi ſanguinis fuerit multitudo, optimū eſſe aut uenam ſecare, aut malleolos ſcarificare. Cæterum inflammatoria ſpontanea laſſitudo, neque paucarum horarum tarditatem ſuſtinet, nedum duorū aut trium dierum. Statim enim febrem inducit uehementiſſimam, ſi non quis præocupari ſanguinem detrahendo. Præſtat autem ſi id fieri poſſit, his detrabere una die, priore uice ita euacuando, ut ne animi deliquitum incidat homo.

Secunda uero uice neq; animi deliquitum uereri conuenit. At ſi uerum eſt, na hiſ ſecta non fuerit, bona fortuna ita affecti opus habent ut ſeruentur.

Viſtus

Spontaneæ laſſitudines

Vini coctio-  
rius

Fauorum cre-  
moris potus

Vicius senum. CAP. XXIII.

**S**enectus sicca est & frigida. Correctio uero eius fit per calefacientia, ac humectantia una cum calefacientibus. Oportet autem & fricare citra lassitudinem. Cibum autem dare debilioribus ter in die, circa horam tertiam parum panis cum melle Attico. Et postea hora septima, ubi defricti, & exercitiis conuenientibus senectuti exercitati, & loti fuerint, primum exhibere quæ aluum molliunt. deinde pisces aut auiculas. postea in cena ea quæ optimi succi sunt, & ægre corrumpuntur. Nec uero prohibeo uinis ex melle præparatis uti, & maxime in his senibus, in quibus suspicio aliqua est generationis calculorum in renibus, aut etiam podagræ. Tunc uero in ipsum inueniendum est petroselinum. Si uero quandoque pituita in uentre generata, de necessitate deligamus aliqua illam secantia, statim ad humectantem uicem transire oportet. Dandæ uero sunt ipsis etiâ maturæ ficus, ante reliquum cibum. In hyeme autem caricæ, si nullum symptoma circa dextrum præcordium sentiatur. Quandoquidem uero serosa ac pituitosa recrementa, circa senum corpus coaceruantur, mictionem quotidie promouere oportet, & uentrem subducere, maxime per oleum ablorptum ante cibos. Clarum autem est quod omnia oleracea ante cibos edere oportet, ex oleo & garo. Itemque oliuæ ex muria, & damascena. At aluo amplius suppressa, etiam mercurialis satis est efficax, & enicus. facit & terebinthina. de hac autem quandoque nucis ponticæ magnitudinem fumere oportet, quandoque duarum aut trium. Est & oleum per clysterem infusum aluo suppressæ commodissimū.

Ad rugosum corpus. CAP. XXIII.

**C**orpus erugat erui farina, uiti albæ ammixta. Aliud smegma, quo frequenter corpus confricari debet. Ficus pingues una cum bryonia tunduntur, & farina erui, & sepia testæ ustæ adijciuntur, atque hæc modico melle instillato excipiuntur.

Vi iucundum odorem spiret corpus. CAP. XXV.

**Q**uo uero iucundum odorem spiret corpus, ad idem unguentum eupresosum comam ammiscere oportet siccam tusam, aut pini corticem. Verum eius meminisse conuenit, ut mane post indutas uestes parum casia aut sabinæ degustent.

Vi recedat habitus. CAP. XXVI.

**Q**uandoquidem uero etiam habitui opitulari oportet, medicamentum defrictorio insperguli feruesciente in balneo dum lauatur utatur. Habeat autem id calamintham, sampuchum, hyssopum, baccas lauri, rorem marium, lapidem pyriten, sale, secem uini ustam, nitrum, & pumicem, singula pro ratione, & parum sinapis, & staphidis syluestris, & grani enidi. Verum à balneo acopo utatur calefaciente, & bibat uinum suluum uetus, & propoma ex uino mulso, pipere, & ruta, ac similibus.

Ad colorem uitiatum. CAP. XXVII.

**C**orporis colorem uitiatum minuit uita hilaris, & cibus gratus. cui ammiscere oportet radículas, & porrum, & uiride cicer. Bonum autem colorem facit mali puncti dulcis succus absorptus. Bonum est etiam oleum coactum in ipso bryonia radice. Hoc quoque corpus erugat. Cæterum in medicamentum defrictoria ammiscere oportet pastillos factos ex farina aliqua detergente, & ex bulbo narcissi, & bryonia radice. Bonum colorem inducunt, si cui copia detur, amygdali amaræ & radix, & fructus, si in aqua coquantur, atque hac quis pro balneo utatur.

Ad liuores. CAP. XXVIII.

**L**iuores oboriri in senibus prohibere oportet, cutem ipsorum crassam faciundo, ita ut non facile lædi possit, & habitum ualde calidum reddendo. Quo uero citius decedant, sale utendum est in balneis ad denigratam partem. Sed & spongijs raphani aut ablinthij decocto imbutis fouere prodest.

Senibus ter in die cibis dandus

Vina ex melle preparata

Terebinthina ad aluum suppressam

Rugæ tollentia

Odorem corpori conciliantia

Propomati potus

Colorem bonum inducentia

Liuoribus arcendis

Dentibus praeservandis. CAP. XXIX.

Dentes con-  
servandis

**D**entes non discedent si quis hæc faciat. Vitare oportet primum ciborum corruptiones. Vitare etiam assiduam vomitum. Vitare quoque cibos qui dentibus non sunt commodi, sicut siccas, & mel coctum valde durum, & palmulas quæ ægrè teruntur, & omnia quæ glutinum habent, & quæ uix franguntur, adeo ut dentes commoveant: & quæ dentibus stuporem inducunt, & perfrigida ac putrida omnia. Oportet etiam post coenam, dentes perpurpare.

Ut ne gravis sit auditus. CAP. XXX.

Auditus gravi-  
tati corri-  
genda

**V**T ne gravis sit auditus, primum sordes in meatu expurgare oportet. Per temporis autem intervallum linamentum dropacæ intinctum in ipsum demittere, & appressum extrahere. Nam simul & meatus expurgatio fit, & simul auditus prouocatio. Postea lana ad erui magnitudinē obuoluta, meatus ad diem obturato. Et deinde ea extracta, ad dies aliquot oleo amygdalino, aut nardino, aut chamæmelino, aut adipe anserino cum modico felle bubulo illinito. Rursus autem tempore interposito, sinapi & sicut terito, & factum ex his collyrium ad horas duas indito. Et postea hoc quidem eximito, infundito autem oleum in asphodeli radicis cavitate servatum.

Ad caliginem oculorum. CAP. XXXI.

Oculis con-  
servandis

**V**T ne caliginem habeant oculi, quum in aquam frigidam te immergis, diutius apertis suspice. hinc enim robur visus accedit. Nec uero lectio nibus ralem offendere oportet. Caueant autem a uino crasso ac dulci, & cibis qui diutius supernè manent, & qui ægrè concoquuntur, & liquidam materiam generant lentam ac crassam, crucas item & porrum, & omnia quorum acrimonia sursum attollitur. Vitare etiam oportet decubitus supini diutorem, & frigus, & uentos contrarios, & fumum, & puluerem. Ipsi autem oculis aquam hoc modo factam quotidie instillare conuenit. Ad mensis & diei unius spatium, foeniculū uiride in uas fictile forinsecus pice oblitum mittito, & aquam pluuiatilem affundito, & postea exempto foeniculo, aquam repositam seruatō ac utitor.

Foeniculi  
cremor

Derepletionē. CAP. XXXII.

Vomitūs ratio

**I**N cibis maximè delinquitur circa repletionem. Nam etiam si uenter probè concoquat, uenæ tamen nimium impletæ affliguntur, distenduntur, rumpuntur, obturantur, & flatu plenæ fiunt, & ualde grauuntur. Pellimum autem est in morbis uenarum repletionem esse. At uentris repletio quandoque sursum euacuat id quod redundat, quandoque deorsum per secessum: & in summa, debilior est repletione uenarum. Et tamen neque hæc admittenda est. Verum si quis plura ingesserit, statim uomere oportet. Periculum enim est ne facta concoctione impleat uenas, & hoc magis si quis assidue circa ciborum ingestionem intemperans, nullam euacuationem excoget. Vomere igitur oportet priusquam cibi corrumpatur. Si uero aliqua impedimenta sint ad uomitum, si quidem fluat aluius, sæpe prodest: si minus, diutius dormire, & aquam calidam frequenter bibere. Facta autem sufficienti concoctione, & maximè facta etiam alui egestionē, lauare oportet, & fomenta adhibere, & fassamentum modicum edere, & potionem aquosam bibere. Si uero neque egeret quisquam, neque cito coquet: Insuper ære liquum corpus graue, & ægrum ad motum, & somnolentum fuerit, & pigricies quædam præter rationem detinuerint quoque mentem. Hæc signa sunt repletionis uenarum. Qui uero ob hæc lassitudine premuntur, his quiescere conducit, donec ea quæ in uentriculo sunt concoxerint, & postea laboribus euacuare.

De ebrietate. CAP. XXXIII.

Ebrietatis  
medela

**E**Brietate detentis uomitus conuenit statim abortus. Oportet autem & largam aquam insuper bibere, itemque aquam mulsam, & uomere donec quamplurima relexerint, & morsus obtuderint. Post uomitus autem solio utendum

Utendum est, cum larga unctione. Reliquo uero tempore quiescendum, ita ut sub tegmine dormiant longissimo tempore, donec temulentia soluat. De his qui cibos corrumpunt. CAP. XXXIII.

Corruptione ciborum in uentre contingente, quibus quidem subeunt corrupta, hi magnum uaticum ad sanitatem habent. Quibus aut non subeunt, his irritatio facienda est, per ea quae citra molestiam subducunt. Ceterum ita affectis uomitus ante cibum conferunt, ex uini potu, & dulci uino ac passio induci. Consulendum autem ipsis est, ut nullum nidorosum, aut graueolentem, aut omnino facile corruptioni obnoxium cibum ingerant, sed eos qui boni succi sunt eligant. His uero qui hoc modo habent, etiam per moderata temporis interualla uentris subductiones conferunt, per ea quae moderate purgant.

Vini ad uentris mitigationem.

De Venere. CAP. XXXV.

Ex Venere haec commoda emergunt, repletionem euacuat, corpus leue exhibet, & ad incrementum promouet, & uirilius efficit. Circa animam uero, impeditam ratiocinationem soluit, & impotentem iram remittit. Quare etiam melancholico, si quod aliud, remedium commodissimum est coire. Redigit item ad moderatiorem mentem, eos qui etiam alio modo insaniuerunt. Et morbis pituitosis optimum est. Quidam etiam quia cibos auerfarentur, ad eos accipiendos promptiores inde facti sunt. Et quidam a seminis per somnum assidua profusione liberati sunt. Naturae uero ad Venerem idoneae sunt calidiores ac humidiores, atque haec magis quam aliae in Venerem proclives sunt. Minimè uero uiscus siccans ac perfrigerans, & aetas senilis, & tempus autumnii. Oportet itaque uiscum humidum ac calidum esse. Sit autem & laborum, & ciborum moderatio. Quemadmodum autem moderati labores conueniunt, sic etiam moderata Venus. Nam & ad opus excitat, & facilitatem quandam consuetudini exhibet. Requirit autem coitus, si quicquam aliud, etiam alimenti copiam. Quare edulia quae multum nutriunt commoda fuerint. Ex piscibus autem polypi. Nam & alias ad Venerem irritare creduntur, & quaecumque mollium generis existunt. Ex oleribus horminum, inio, eruca, & rapum. Et haec uelut medicamenta. Ex leguminibus fabae & cicer, ochri, dolichis, pisa, supra luculentum alimentum etiam statu implent. Proinde ruta quia status concoquit ac dissipat, ideo etiam coitus hebetat. Magnopere autem laudo botros uuarum. Humeant enim, & sanguinem statu implent, qui sane ad Venerem impellit. Qui Venere usus est, repletiones & cruditates uitet. Sed & lassitudines uitandae sunt, & uomitus ac purgationes praegressae. Similiter & alui profluuium repentinum. Nam in aeternum Venus resiccat. At uero uehementes Veneris appetentiae non laudo, sed tunc magis reniti subeo, & maxime eos qui morbum aliquem habent. Optimum igitur fuerit coitu uti post exercitia, & balnea, & moderatum cibum. Nam & ad robur conducit, & perfrigerationes ab eo urgentes minus fiunt. Tempus autem ad coitum oportunitate est post cibum uelut dixi, ante somnum. Obdormienti enim statim sedatur lassitudo. Et hoc tempus etiam commodum est ad liberos gignendos, tum ob alias causas, tum quod mulier dormiens genituram magis continet.

Veneris utilitas.

Venerem stimulantia.

Ruta moria.

Libere gignendi aptum tempus.

Ad impotentes ad coitum. CAP. XXXVI.

Providenda assidue unguine illinere oportet, cui pars de radice narcissi modica addita sit, aut de cnidio grano, aut pyrethro, aut staphide syluestri, aut semine curticae, aut anisi. praebendum autem est piper, aut satyrium, aut eruca, aut cnicus, aut omnia simul. Edere uero oportet ante cibum, bulbos rubicundos paruos assatos, cum sale & oleo: aut scilla marcidæ parum. Sed & compositis descriptis auxilijs ad haec utendum est. Quin & lasciuia scripta saepe legere prodest.

Coitus praerogantia.

De immodico coitu. CAP. XXXVII.

Quandoquidem ex frequentiore coitu, rarius & frigidius, & siccius, & debilius.

Venerat immo-  
dica

debilius fir corpus, ea quæ densant nimirum, & calefaciunt, & humedant, ac corroborant, adhibere oportet. His igitur qui immodicè Venere uti sunt, conuenit tegmen, tepor, quies, somnus multus, donec corporis concitatio remissionem accipiat, & seipfos ab imbecillitate recolligant.

De seminis redundantia. CAP. XXXVII.

Semen mi-  
nantis

**Q**uidam semen multum calidum coaceruant, deinde ad Venere accedentes, ipsumque excernentes, & corpus debile habent, & stomachus exolutum, & attenuantur ac resiccantur. Si uero rursus propter hæc a Venere abstineant, & capite grauantur, & anxij fiunt. Deinde statim per somnum semen profundentes, eadem perpetiuntur. Oportet itaque nihil ex his quæ semen augent exhibere, sed & cibos, & medicamenta accipere, quæ ipsum corrumpunt. Et post balneum lumbos illinere oleo rosacco, melino, & omphacino. Præstat autem hæc ipsa crassiora facta illinere, ammixta cera, & succo aliquo ex perfrigerantibus, semperuiui uidelicet, & solani, & coryledonis, & psyllij. Et his quidem per æstatem, alijs autem temporibus, rum alijs, tum lactucæ succo, & lini semine in aqua cocto. Nam & hoc perfrigerantem succum facit. Sed & lamina plumbea lumbis subiecta, seminis per somnum profusionem prohibet. Et herbæ frigefacientes cum ruta, & summis teneris uiscis uirgultis substratæ idem faciunt, uiscis item semen, & ruta si edantur. Vitare autem oportet ne lumbi uelementer perfrigerentur, ut ne rhenes lædantur.

De perfrigeratis. CAP. XXXIX.

Perfrigeratos  
recalcfacienda

**P**erfrictione multa facta, ita affectos in calidis locis reclinare oportet, illi-  
tos cyprino aut irino. Postea uero ubi paululum recalcfacti fuerint, dan-  
dum est piper, & myrrha, cum uino dulci odorato ueteri: aut succus cyre-  
naicus cum uino aut acetos aut pyrethri, aut castorium cum aceto. Alimen-  
tum autem exhibere oportet calidius.

De adustis à sole. CAP. XL.

Percalcfactos  
refrigerantia

**A**dustione in sole facta, decumbere in locis qui probè petflantur conuer-  
nit. proluere autem faciem, & manus, & crura aquis frigidis. Si uero su-  
ti uexentur, bibere aquam frigidam, quibus id facere in consuetudine exi-  
stit. Atque hæc paulatim facere oportet, & non acruatim. Cibus autem ac-  
cipere modicum, qui facile in corpus distribui possit, atque eum humidum ma-  
gis quam solidum aut frumentaceum.

De pituita in superno uentre redundantante. CAP. XLI.

Vomitur pitui-  
ta à radiculis

**S**i unquam in aliquem incidisti, qui nutrientes cibos oblatos auersaretur,  
& à cibis abstineret, & si cogeretur accipere, nausea abundus fieret, solos  
aurem acriores (si tamen & hoc faceret) admitteret, & neque his delectare-  
tur, sed uentre inflaretur & nausearet, & solis ructibus paululum alleuare-  
tur, corrumpere autem quandoque etiam ipsos acceptos cibos, ea corruptio-  
ne quæ sit in acorem: omnino cognosce summam curationis in his auxi-  
lijs sitam esse, quæ uentris pituitam extergere possunt. Ego itaque noui quen-  
dam ita affectum, à radiculis cum aceto mulso acceptis, crassissimæ pituitæ  
copiam fidem excedentem uomuisse, & euestigio penitus sanum euasisse.

Quomodo quis facile uomat. CAP. XLII.

Vomitur facie  
litas

**Q**uandoquidem his qui assidue uomunt multa absurda accidere solent,  
commodum fuerit modos referre, per quos facile uomere datur. Nam  
& pituitam euacuat, & caput alleuat, & quandoque etiam prohibet, ut is qui  
audius cibum accepit, cruditate non labore, & qui uinum uberius bibidit,  
non lædatur. Sint igitur ea quæ ingeruntur, non acerba & sicca, sed partim  
dulcioris ac humidioris modi, partim acrioris. Inter hæc autem radícula lau-  
datur, & eruca, & fassamentum uetus, & origanum uiride, & cepæ ac porri  
parum. Vomitus etiam promouent ex leguminibus, præsertim mel ammixtum  
habens, & decoctum frefarum fabarum, & carnes pingues: uerum ita ut non  
solum succos ipsorum accipias, sed etiam totam molem deuores. Ne itaque  
circa

A circa manducationem multum tempus teras, si uomere uoles: suntque omnia per cocturam mollia. Manifestum uero est quod etiam ex uinis eligenda sint dulciora. Hæc enim magis innatant. Sed & potu tepidior utendum est. Oportet autem & amygdalas melle tinctas edere, & placentas tunc gustare, & peponis ac cucumeris semen madefactum ac tritum cum melle accipere. Facit etiam cucumeris radix trita cum melle. Qui uero fortioribus uti uolunt, narcissi bulbum in aqua coquunt, & cum hac uinum miscent. Vomitum mouet quoque irinum unguentum, si quis illitis ex eo digitis proritet. Ad uomitionem etiam pertinet, non remittere, neque cessare inter uomendum: & os colluere, & faciem posca aut aqua abluere. Nam & dentibus conferri, & caput alleuat.

De subducentibus aluum, & urinam modentibus in sanis. CAP. XLIII.

Veteres quidam ad sanitatem satis esse putabant, quotidie euacuari per uentrem, & urinas inculpate ac sufficienter, pro ciborum ac potuum ingestorum copia. Et si quidem euacuationes pro ratione fiebant, laudabant. Sin minus, opitulabantur mictioni quidem, per scandicem & apium, asparagum, petroselinum, anisum, calamintham, origanum, absinthium, graminis ac cardui radicem, cytisum, adianthum, in aqua cocta, ita ut decoctum cum uino biberetur. Hæc enim sanguinem per urinam purgant, & non exiguam utilitatem exhibent. Verum uentri opitulabantur, terebinthinam dantes, olivæ magnitudine deuorandam dormituris. Si uero magis subducere uoluimus, derheo parum ammiscemus. Commoda autem sunt ad uentris subductionem, oua sorbilla, & ex oleribus betæ, maluarum, & cochlearum iusculum. Et si fortassis hæc suffecerint. Maiorem uero uim habet mercurialis in aqua cum sale cocta, & in cibo accepta, & decoctum ipsius in potu. Et sambuci folia eodem modo. Et polypodij radicis drachmas duas salamentis insperges, aut in ptisana sorbere. Sed & lactis ferum cum sale, aut melle, trium aut quatuor heminarum mensura. Et galli ueteris tusculum, tum per sextum cum cinici drachmis duabus. Quandoque etiam aloës eicerum trium magnitudinem post cenam sumere prodest. Optimum est & epithymum cum uino, potum, post moderatam cenam. Qui uero uehementiore euacuatione opus habet, ueris tempore mane epithymi drachmam ex aceto mulso bibat.

De infusis per clysterem. CAP. XLIIII.

Ceterum in his qui aluum ægre solubilem habent, & quorum stomachus debilis subducentia per os non admittit, infusis per clysterem utendum est, pituita in intestino inuidente, his que sunt ex decocto caricarum, & betarum, & nitri, & radicis cucumeris syluestris, & melle, & oleo chamæmelino aut anethino. Si uero siccitas magis inest, his que sunt ex althæa, sceno greco, chamæmelo, & oleo ac modico melle. Et quandoque oleum per se heminæ dimidiæ mensura immissum, quod opus est præstat. Sed neque hoc assidue faciendum est, ne natura his adulescens, spontaneæ excretionis obliuiscatur.

De glandibus. CAP. XLV.

Vtimur & glandibus sæpe, stercoreum excretionis gratia, & in his quibus id quod per clysterem immissum est non excernitur. Formantur autem glandes ex sale tosto, & melle ac nitro. Sed & thymus cocto mellis miscetur. Formantur etiam ex resina terebinthina, & nitro, & quandoque etiam grano crasso moderato. Excitant autem morsus. Quapropter oleo partes inungendæ sunt. Quin & pyrethrum aut piper ammiscetur, & conueniunt resolutis, & inflationibus ex frigidityte. At centaurium miscetur pisci & ce-rato, & est commodum resolutis pudendis. In infantibus autem & salis granum inditur. Efformatur quoque ficus cum nitro.

De eorumque aut neribus indita ac illita, pituitam à capite decant. CAP. XLVI.

Humores in capite per sputa euacuamus, si quidē modice hoc facere uoluerimus, piper mastichæ ammiscentes. Si uero amplius uacuare uoluimus,

11. 107

Vrinam modentia

Terebinthina ad aluum superpressam Rheon aluum subducit Aluum subducentia

11. 108

Infusorum per clysterem ratio

Nimus medicamentorum non suis nocuius

Glandium subditiarum usus

*Pituitam à capite deducētia*

mus, pyrethrum, aut staphidē sylvēstrē mandere iubemus. Sed & anemones omnis radix, si manducetur pituitam prouocat, & radice capparis cortex. Scrosum itaq; recrementū per talia euacuatur. Crassum uero & pituitosum, sinapi cum aceto mulso gargarissatum euacuat: aut sapa origano aut hyssopo in ipsa cocto. Ego autem hanc ad sinapi cum aceto mulso amisco. Si uero cerebrū à muco expurgari opus fuerit, acribus medicamentis irritantes ipsū proliciemus, quorum aliqua etiam sternutationem mouent. Purgat itaq; per nares anagallidis utriusq; succus, & anemones cuiusvis, & betæ. Sed & cucumeris syluestris foliorum succus naribus infunditur, tum ipse per se, tum cum betarum decocto, aut succo. Verū sternutatio in crudis humoribus circa thoracem & pulmonem, & caput contentis, non conducit. At oris illitio talis est. Saponem cum betæ succo illine circa palatum ac columellam, probè facit. Idem etiam naribus inditur. Saepè uero usus sum parabili medicamento, melanthio naribus illito, quandoque pridie acri aceto id macerans, deinde postera die rursus cum aceto terens, & naribus infundens: quandoq; oleo ueteri idem melanthium tero, & similiter utor. Atq; sic ipso utitur & Archigenes in narium obturatione. Priore uero cum aceto, Crito utitur in morbo regio.

*Quæ menses ducant.* CAP. XLVII.

*Menses ducētia*

Omnia quæ urinam cient, etiam menses ducunt. radice brassicæ decoctum, perseæ radix, ruta, chrysanthemum, dictamnū, crucæ semen. Mouent etiam subdititia ad os uteri apposita, uelut est ruta trita cum melle, aut porri succus, aut scordium tritum appositum, aut myrrha trita ex uino, aut leporis coagulum.

*Sudorifica.* CAP. XLVIII.

*Sudorē cientia*

EX sudorificis est chamæmelon siccum tritum oleo inspersum, ita ut cutis contentè ex eo desiccetur, seseli, pyrethrum, toris marini semen, anisum, similiter oleo inspersa. Nitrum rostum & non ualde tenuicum oleo. Salis flos oleo permixtus. Succus cyrenaiscus aqua dilutus, ad desiccationem corporis assumptus, & ciceris magnitudine in potu acceptus. Similiter & calamintha cum aqua mulsapota, & forinsecus cum oleo affricta.

*De aëre.* CAP. XLIX.

*Aër qui sit optimus, et uersa*

Optimus aër est exactè purus. Talis autem fuerit, qui neq; ex stagnatione aut paludum exhalatione, neq; ex aliquo barathro uenenosam auram remittente turbatur. Sic autem & is qui ex aliqua cloaca magnam urbem expurgante turbatur, malus est. Quin & qui nebulosus est, bonus non est. Quemadmodum & qui in cauo loco undiquaq; montibus altis conclusus, nullam auram admittit. Qui igitur hoc modo prauus est, omnem atatem, & omne temperamentum similiter lædit, quemadmodum bonus prodest. At uero circa qualitate differentia, caliditatem dico & frigiditatem, & siccitatem & humiditatem, non similiter se ad omnes habet. Nam temperatis corporibus, temperatus aër commodus est. Inreperatis, is qui contrariam temperiem habet.

*De aquis.* CAP. L.

*Aqua quæ optimus sit, et contra*

Optet etiam aquarum uirtutis ac uitij peritū esse. Multi enim usus sunt aquæ præ omnibus ferè rebus alijs, ad omnem uictus rationem. Nolle itaq; oportet optimam aquam omnis qualitatis exortem esse, tum in sapore, tum in odore. Statim autem hæc & iucundissima est bibentibus, & alpe quæ pura. Quum autem & de præcordijs cito secedit, ne querere quid meliorem oportet. Nam quæ in præcordijs morantur, & uentre feriunt, & inflant, & grauant, prauæ censendæ sunt. Neq; enim calefiunt cito, neq; perfrigerantur tales aquæ. Sed & quæ in ipsis coquuntur, tardissimè ac peius coquantur. Præstat itaq; experimento talem aquam iudicare. Qui uero etiam per notas cognoscere uolet, ex his quæ referuntur iudicet. Etenim quæ ad septentrionem conuersæ sunt, & à sole auersæ, tardè transitus sunt & inco-

coctiles.



**A**coctiles: & calefiunt & perfrigerantur tardè. Quæ uero ad orientem per meatum aliquem, aut terram puram excolantur, celerrimeq; calefiunt, & celerrime perfrigerantur, eas optimas esse sperandum est. Bonæ sunt & quæ æstate frigidiores, hyeme calidiores existunt. Quidam etiã pondere probant, leues meliores esse putantes. Verum hoc si cum alijs relatis est, laudatur solum autem non satis est, ut sit bonarum aquarum signum. Leuissimæ autem uelut Hippocrates ait, sunt pluuiæ, dulcissimæ item ac limpidissimæ & tenuissimæ, eo quod à sole id quod leuissimum ac tenuissimū est abripitur. Educit autem sol non solum ex alijs aquis, sed etiã ex mari, & ex corporibus. Quapropter etiã facillimè omnium putrescunt, ut quæ ex diuersis qualitatibus consent. Nemo uero suspicetur pessimam esse aquam quæ facile putrescit. Alterationis enim facilitas uirtuti magis quàm uitio adscribitur. Quare si aqua optimarum aquarum notas habens, facile quoq; putrescat, optimam ipsam esse putandum est. Quum tamen in his qui bibere incipiunt, raucedinis & tussis, & grauis uocis causa existit. Ex ipsis uero pluuiæ aquis, æstiuæ & cū tonitruo delapsa melior est quàm procellosa. Pessimæ autem sunt à glaciæ & hiue. Nam circa aquæ congelationem, quicquid tenuiorū partium est exprimitur. Bonum autē fuerit etiã palustres, & graueolentes, & eas quæ absurdas qualitates habent, per coctionem in melius mutare, atq; sic bibere, itemq; uino permiscere, adstringentes quidem dulciore, reliquas autem acerbiorē. Quidam etiã colare condiciunt, limosas, & salias, & bituminosas. At ualde frigidās post cibum bibere oportet, & neq; acruatim. Quidam uero cibos etiã ac potus inuenerunt aduersus aquarum uitia. Et aliqui quidem cicerū decoctum præbunt, aut etiã ipsum cicer edunt. Aliqui uero caualidas similiter cum aliquo pisciculo coctas & fœniculū eodem modo. Alij uero betas & cucurbitas prius edunt cum sale & uino diluto.

*Aqua facile putrescens*

*De balneis. CAP. LI.*

**I**audō quidem in frigida aqua lotionem, non dico autem ipsam conferre his qui uulgari uictu citra delectū utuntur, sed solis his qui exactè uitam degunt, & laboribus ac cibis prout conuenit utuntur. Satis est autē ple-  
*Frigida la-  
narium*

his, quandoq; perfrigerari amplius opus habentibus, inhatare aliquando per ætatem, si iuuenes fuerint & carnosī, & frictionibus prius excalescenti-  
*Alia*

Sint autem neq; ex Venere, neq; alijs delassati, neq; cruditate, aut tioni-  
*Alia*

tum, aut uentris euacuationem, aut uigilias perpassi. Periculosum enim est si quis ita simpliciter utatur. At calidum balneum optimū est & tutissimū, lassitudines soluens, & plenitudines discutiens, excalescens, leniens, mol-  
*Alia*

liens, status diffundens ubicunq; incubuerint, & somnum inducens, & car-  
*Alia*

nositatem exhibens. Est autem & aptissimum ad usum, & uiro, & fœminæ, & puero, & senī, & magistratū gerenti, & priuato.

*De balneis naturalibus. CAP. LII.*

**E**x balneis naturalibus aliqua sunt nitrosa, aliqua sulfuginosa, aliqua aluminosa, aliqua sulphurenta, alia bituminosa, alia aërosa, alia ferrosa. Quidam uero ex his composita. Omnium igitur naturalium aquarum uis est siccatoria ac calefactoria in totum, & maxime conueniunt humidis ac frigidis, priuatim uero nitrosæ, & quæ salē habent, capiti congrua sunt, & thoraci fluxione infestato, & stomacho humido, & hydropicis, & tumoribus ex morbis, & pleuriticis. Aluminosa uero sanguinis refectionibus, & stomacho uomentis, & mulieribus quæ inordinate purgantur, & frequenter abortiunt. At sulphurenta neruos molliunt, ac calefaciūt, & dolores miti-  
*Alia*

gant, uerū stomachū effeminant ac euectunt. Bituminosa autem caput im-  
*Alia*

plent, & sensu organa lædunt. Calefaciūt autē perseveranter, & tēporis pro-  
*Alia*

gressu molliūt. Aërosa uero ori, tonsillis, uia, & oculis insigniter comodāt. Ferrosa autem stomacho & spleni utilia sunt. Oportet autē desessu in aqua citra tumultum facere, quo uis ipsius remisso corpori allapsa immergatur.

*Balnea nat-  
uralia*

*De uictu*

De victu temporibus anni singulis conueniente. CAP. LIII.

Hyemis victus

**B**onum est & ad anni tempora habito respectu victus ratione constituere: & hyeme quidē pluribus laborib. uti, & plura comedere, praesertim qui constitutio fuerit aquilonaris. Nam si austrina fuerit, laborandum quidem est similiter, sed pauciores cibi ac potus exhibendi sunt, & in summa, copius siccum faciendum est penitus tempore humido: quemadmodum calidius in frigido. Edere autem oportet carnes calidas, & olera, & uinum bibere copiosius. Verum uere ingruente, alius per uomitus, alius per uentrem euacuetur. & alius uenam secans sanguinem detrahat, prout quisque consue- tus & paratus fuerit. At aestate quies conducit, & laborum & alimentorum imminutio: & ut frigidioris modi sint cibi: & potu largo uti, & omnia facere quae ad refrigerationem & ad humiditatem conferunt. Circa autem, gnos inducit morbos, ualde caute uictum constituere oportet, ita ut ne quis circa frigiditates delinquat, & a Venere ac frigida potione continerissimus existat. Sit mane quidem frigidum aërem, in meridie uero aestuosum declinet, & pomis non nimis impleatur. Legunt enim non copia solum, sed etiam humoris uitio, & quod flatum inducant. Nam & optima ex ipsis, ficus & uinum botri, flatu pariunt, si quis non ante alios cibos accipiat, & cibos cor- rumpunt. Si uero praesumantur, neque inflant, neque corrumpunt. Ceterum frigiditate euadere aëre, pro ratione calefacere corpus oportet, & omnia fa- cere uelut hyeme accedente. Quin & bonum fuerit post equinoctium euacuatione aliqua ex praedictis uti, quo nihil superflui in corpore detentum, in hyeme fiat molestum.

Veris victus

Aestatis victus

Autūni victus

Pomorum usus ratio

Victus negotiosam uitam degentium. CAP. LIIII.

Consueti mor-  
bi non sunt trans-  
mutandi

**E**um qui in negocijs uitam degit considerare oportet, an in priore uita exerceri consueuerit, aut iam se exercens, moderatē talem consuetudi- nem ferat: ut ne aegrotet ex eo quod assidue probe transpirat. Talem enim corporis naturam, ad aliam consuetudinem penitus transferre non oportet, in his qui ex multo temporis interposito intervallo aegrotant. Si uero assidue quis aegrotare uideatur, & hoc ob humorum copiam, scopus tibi sit per totam salubrem uictus rationem, quo moderatos humores habeat: Si uero ob humores uitiatos, quo optimos. Ex his igitur qui humorū copiam co- ceruat, eos qui statim balneum ingressi sunt, postea frictione uti, & parum moueri exhortabimur. Qui uero iam talia fecerunt, paulatim etiam ipsos hac augere consulemus, uerum de cibis detrahete, & parū nutriendos inge- rere. At eorum qui humores uitiatos coaceruant, non unus est scopus, quia neque humorum uitiatorum una species. Quidam enim frigidiore ac pitui- tosiore coaceruant. Quidam calidiores ac biliosiores, quemadmodum alii atrabiliarios. Abstinentium itaque unicuique est a cibis ac potibus, qui humo- rem eum qui in ipsis coaceruari solet, promptē generant. Verum in omni- bus his communis auxilium est uentris subductio.

Victus iter facientium. CAP. LV.

Proficiscentiū  
peregre uictus

**I**n profectionibus facillimē quis uersabitur, si unctus sit, & non ita contem- pte ac pertinaciter iter faciat, insuperque aestate fascia molli, latitudinis sex aut septem digitorum, longitudinis autem non minoris quam quinq; cubi- torum, lumbos usque ad laterum molli tudinem circumdatus. Sed & baculus commodus est ad profectionem. Nam in decliuis locis praemissus, cor- pus prouum, quali conto quodam sustentat. In accliuibus autē, dum quis ipsi innititur, motu corporis ad accliuem locum faciliorem facit. Quare oblatis, & potus moderatus, haec hora conuenit: & post prandium ante iti- neris ingressum quies. Si uero quis proficisci cogatur, & sitiat, polenta uer- nuem in aqua cum modico sale bibat. Ceterum ardore & solem uereri oportet, & ut ne corpus nudum soli exponatur, sed contectum, ut ne in itin-

nere

<sup>A</sup> nere reliccatum induretur. Sic enim & lassitudo minus contingit, & relata-  
rum affectionū nulla similiter inciderit. At ubi hyems frigida est, ante profe-  
ctionem uentre euacuato, & unctione facta, aliquem satis multum cibū hy-  
bernū, & exiguum potum sumere conuenit, & circumdare fasciā longio-  
re non solum lumbos, sed bene ac probe etiam spinam ac pectus. Vbi uero  
quiescit, si in tali recreatione frigus multum fiat, neq; ungi, neq; cibum, ne-  
que potum capere melius est, neq; aliam quampiam refectionem, si quis in  
eo loco permanere uelit. Post longas autem profectiōes, & alios fortes la-  
bores, etiamsi quis lassitudinē non sentiat, curare ipsum oportet ueluti las-  
satos. Sic enim minus molestiarum acciderit.

*Vidus nauigantium.* CAP. LVI.

<sup>V</sup>omitibus qui primum nauigantibus contingunt, neq; facile, neq; uti-  
le est resistere, plerumq; enim omnibus prodesse solent. Oportet autē  
post uomitū non multa, neq; uulgaria edulia exhibere. Sed aut lente uti sic-  
ca & cocta, modicum pulegij habent, aut pane trito in uino aquoso ac odo-  
rato. potu uero utendum est modico, eoq; aut uislo penitus aquoso, aut ace-  
to mulso. At lentem coquere oportet, & ubi mollis facta fuerit, probe tere-  
re, deinde siccare, atq; sic in uase fictili componere. Si uero ad longius tem-  
pus uomitus fiant plures, uehementiore cibi subtractione utendum est, &  
ipso potu modico, aut aceto mulso cum aqua, thymio in ipso macerato, aut  
pulegio: aut aqua cum polentæ polline: aut uislo odorato aquoso similiter  
cum polline polentæ. Ceterū ad molestos in nauibus odores, aut mala co-  
tonea olfacere oportet, aut thymum aut pulegium. Sed & quā minimum  
in mare aspicere oportet, donec ad consuetudinem perueniat quis conuer-  
sationis in mari. Ad aquas item respiciendum est, ut neq; turbatæ, neque  
grauæolentes, neq; salæ sint.

*Nauigantium  
uiscus  
Vomitū pri-  
mū nau-  
gantium*

*De carnis immutatione.* CAP. LVII.

<sup>B</sup> Vm ad immodicā carnositatem egressum fuerit corpus, eliquare  
ipsum ac imminuere oportet. Ostensum autem est, quod calidior ac  
siccior temperatura gracile efficit corpus. Talem igitur in crassis inducere  
conuenit, si ad moderationem reduci debent. Didicisti autem quod exerci-  
tia uelocia & acuta, & diæta attenuans, & eiusmodi medicamēta, & animæ  
curæ, temperamētum calidius ac siccius reddunt, & per hoc, etiam corpus  
tenuius. Qui igitur sit uiscus attenuans, manifestum est. Medicamenta ue-  
ro uehementiora sunt, rutæ semen, maxime syluestris unā cum corymbis,  
aristolochia rotunda, centaurium tenue, gentiana, polium, & quæ ex urina  
cientibus fortiora sunt, uelut petroselinum. Singula enim hæc tum per se,  
tū inter se mixta, humores attenuare ac euacuare possunt. Sed & sal ex uis-  
tiperis abunde attenuat, & theriace. discutit autem & attenuat oleum illi-  
tum, cui syluestris cucumeris radix sit incocta. Itemq; althææ ac gentianæ,  
& panacis & aristolochiæ radix oleo incocta. Sed & polium & centauriū.  
Oportet autem cibum non statim à balneis dare, sed ut prius dormiant per-  
mittere. Præstat autem balnei aquam ex discussoriā uim habentibus esse,  
si quidem ex natura talem habeamus, qualis est aqua Mitylenes: sin minus,  
salis florem aquæ marinæ ammiscere oportet. Et uino utendum est tenui ac  
albo. Quin & frictio sicca per lintea extensoria crassiora, attenuare potest.  
At pro exercitiorū ratione, etiam pauciores cibos offerre oportet. prodest  
& insolatio carnosus. Oportet autem neq; præpotationibus ipsos uti, & me-  
lius est semel tantum in die cibum capere. quin & corpus fricandum est ni-  
tro ac sale asperiore. Nitrum itaq; multum in balneis attenuat. Verum mo-  
dicum irritamento est ad bonam corporis nutritionē. Attenuat & hæc mi-  
xtura, pipēris & petroselini duplum, asari & anisi dimidium. Hæc & ad uri-  
nam & ad alium mouendam, commoda est.

*Carnem immi-  
nuentia*

*Aqua Mity-  
lenes*

*Quomodo attenuatos renutrire oporteat.* CAP. LVIII.

<sup>Q</sup>Vos renutrire uolumus attenuatos, his uinū dabimus crassum. Edulia  
uero

uero crassi succi sint, & exercitia tarda, & frictionē moderatam, & in san-  
*Picationis* ma, omnia relatis contraria adhibebimus. Commodū est ipsi etiam picasi,  
*utilitas* per tres aut quatuor interpositos dies. Si uero ieiunus lauetur, ante balnei  
 linteis corpus defricare oportet, donec rubescat. Et postea frictione dura,  
 non tamen multa, cutem spissare, quo densam ac duram efficiamus. Opor-  
*iraduenda* tet autem decoloribus & alimentū non sentientibus iracundiam inducere,  
 & commotiones animales.

*Quomodo quis partes corporis attenuatas curare possit.* CAP. LIX.

*Calide affusio*  
*nis modus*  
**Q**ui in quibusdam partibus attenuantur, pleriq; ob diuturnam ipsarum  
 quietem, aut fracturarum deligationis modum, ad hanc affectionem  
 deueniunt. Oportet igitur facultatem in parte ipsa corroborare, & largam  
 sanguinem attrahere, ex moderatarum frictionum usu, & motibus conue-  
 nientibus, & moderata calidæ aquæ affusione. Hæc autē facere oportet do-  
 nec pars rubicunda facta attollatur, & antea quā confidat desinere. Quin  
 & picationem adhibere oportet, iuxta relatos scopos. Vbi uero frigiditatis  
 sensus circa attenuatam partem fuerit, linteis, & aliquo calefactorio medi-  
 camento, ipsam confricare oportet. Vfus autē sum aliquando thapsia, quan-  
 doq; cum melle sillens, quandoq; cum cerato.

*Dignotio optimi temperamenti.* CAP. LX.

*Temperatissi-*  
*mi hominis*  
*notæ*  
**T**emperatissimus est homo, ubi corpore apparuerit exacte mediū inter  
 omnes extremitates, gracilitatem uidelicet ac crassiciem, molliciem ac  
 duriciam, caliditatem ac frigiditatem, humiditatem ac siccitatē. Et in sum-  
 ma, ubi & naturales & animales actiones inculpatas habuerit. Et ubi item  
 mediū est inter glabrum ac hirsutum, & nigrum colore ac albū. & ubi pi-  
 los habuerit, dum puer est fuluos magis quā nigros. In ætatis autem ui-  
 gore, uice uersa.

*Dignotio corporum distemperatorum.* CAP. LXI.

*Temperamen-*  
*torum simpli-*  
*cium ac cōpo-*  
*sitorum notæ*  
**Q**uæcūq; corpora moderato calidiora sunt, & dentes citius producē,  
 & similiter augeſcent. Apparent autem tangentibus calidiora, & pin-  
 gitudinis minus habent. Verū colore sunt ualde rubicunda, & nigros pi-  
 los habent, & moderatē hirsuta sunt, & amplas uenas habent. Si uero quis  
 simul sit pinguis ac crassus, & uenas amplas habeat, hic propter consuetudi-  
 nem, non natura pinguis est. At frigidioris temperaturæ signa sunt: fri-  
 giditas ad contactum, glabritudo, pinguitudo. Color autē talibus unū cum  
 capillis fuluor est. Si uero multa est frigiditas, liuidus quodammodo est, &  
 plumbeus. Sed & angustas uenas habent. Gracilis autem si quis sit, talis nō  
 ex necessitate, sed ob consuetudinem factus est. Sicca uero temperies, &  
 durior est & gracilior quā tēperata, & hirsuta. Duricies itaq; penitus inse-  
 parabilis est à sicca temperatura. Gracilitas autē non solum sequitur ad na-  
 turales temperaturas, sed etiam ad acquiratas, ex longa cōsuetudine factas.  
 Signum autem duricie est æger motus, & quod corpus ex siccantibus sic-  
 cum ac squalidum redditur. Humida temperatura in cæteris quidem si-  
 milis est tēperatæ, sed mollior ac carnosior. Et ab hac inseparabilis est mol-  
 licies: quemadmodum etiam crassitudo non ad naturalem solum tempera-  
 turā sequitur, sed etiam si ex longa quadam consuetudine conflata est. Pro-  
 priū autem humiditatis signum, grauari corpus ab humidioribus. Cæ-  
 terum calida & sicca temperatura extremē hirsuta est, & capitis pilos mul-  
 tum augeſcentes, & nigros, & multos in iuuenili ætate habet. Progressu ue-  
 ro temporis etiam caluities sequitur. Et uenæ amplæ sunt, quemadmodum  
 & arteriæ magnæ sunt, simulq; uehementissimè pulsant. Quin & firmū, &  
 articulatum, & musculosum, & pinguitudinis exors est totum corpus: &  
 cutis dura ac nigrior. At si frigida & humida sit temperies, thorax angus-  
 tus est, quemadmodum & totum corpus pilis nudum. Cutis uero tenera  
 & alba, & pilī suffului maxime in iuuentute, & senescentes non caluescūt.  
 Statim autem & timidi sunt, & minime audaces, & segniores. Et obscuras  
 uenas

Auenas habent. Et crassi sunt ac pingues, & foemoribus ac musculis imbeciles, & inarticulati. Sed & blasi sunt. Verum humiditate ac frigiditate amplius aucta, color unum cum pilis fuluus fit: si uero plurimum augetur, liuidus. Calida & humida temperies, mollior & carnosior est quam optima. Si uero plurimum fuerit aucta, putredinis morbis propere corrumpitur. Si uero paulo humidior, multo uero calidior fuerit, tales moderatis paulo molliores sunt ac carnosiores, non paulo autem hirsutiores: sed & ad contactum non paulo calidiores. Nigri autem sunt ipsis pilis, & caro pinguitudinis exors.

Si uero frigiditas cum siccitate pariter fuerit aucta, natura durum, & gracile, ac album corpus habent, & non musculosum, ac inarticulatum, & pilis nudum: ad contactum autem frigidum pinguitudo tamen ipsis, etiam si graciles sint, per carnem dispersa est. At capillorum & corporis color, ad frigiditatis mensuram respondet. Mores animae sunt, pusillanimitas, timiditas & tristitia. Vt autem in summa dicam, in coniugatis temperaturis semper qualitatibus praedominantis notae praeualebunt.

De capitis formatione. CAP. LXII.

PARUM caput prae cerebri structurae proprium signum est. Magnū uero non necessarīo bonae. Si enim propter insitae facultatis robur, quae bonam & multam materiam formauit, facium est, bonum signum est. Si uero propter solius materiae copiam, non bonum. Proinde distinguendum est iuxta figuram, & ea quae ab ipso oriuntur. Figuram quidem, si concinnū est, semper enim hoc bonum signum est. Ex his quae ab ipso oriuntur, si ualidam ceruicem habet, reliquisque ossibus optime dispositum est, & si neruosum in ipso genus uniuersum habitus ac plenius est, & firmum: & si oculi acrem usum habeant. At acuminata capita, defectuosam habent circa occiput aut frontem eminentiam, aut ulterius quam conuenit auctam. Plerumque igitur uelut magnum, ita etiam haec capita reprehendenda comperiemus. Raro uero & ex his aliqua bona sunt, formante facultate forti existente.

Capitis formatio

Caput acuminatum

Cerebri temperamenti notae. CAP. LXIII.

TEMPERATURAE cerebri animales actiones moderatas habet, itemque recrementa: & minime ab omnibus externis laeditur. Talibus capilli capitis, dum infantes sunt, suffului, pueris autem sufflaui. Perfectis autem flauī fiūt, medium modum inter exacte crispas & simplices tenentes, non tamen facile caluescunt. Si uero calidius moderato fuerit, omnia etiam circa caput, & calidiora & rubicundiora erunt. Et uenae oculorum sensui expositae. Capilli uero his generis statim in capite fiunt, siquidem multo fuerunt calidiores, nigri & fortes, & crispī: si uero non multo, subflauī primum, deinde nigrescunt, progressu autem aetatis caluescunt. Recrementa uero his sunt pauca, & inculpatē sani sunt. Replentur autem & grauantur capite, a calefactionibus edulīs ac potionibus, & odoribus, & forinsecus allabentibus. Tales temperaturae breui somno contentae sunt, & hoc neque admodum profundo. At frigidioris quam conuenit cerebri notae sunt, recrementa, plura circa proprias effluxiones. capilli recti, fului, durabiles, & facile a frigidis cauis laeduntur, & defluxionibus ac grauedinibus assidue corripuntur. Et oculorum uenae uisum effugunt, & somnolentiores quodammodo existunt.

Cerebri temperamenti notae

Cerebri temperamenti notae simplicium ac compositorum notae

Siccioris autem cerebri notae sunt, recrementa in meatuum effluxionibus nulla, & sensuum sinceritas, & uigilantissimi sunt. Et capillos robustissimos, & citissime ubi geniti sunt, producant, crispas magis quam rectas. Breui autem caluescunt. At humidioris cerebri capilli simplices sunt, & omnino non caluescunt. Et sensus turbulenti sunt, & recrementorum copia adest, & somni multi ac profundi. Ceterum calido & sicco cerebro existente, a recrementis liberi sunt, & sensibus integri, ac uigilantissimi: & cito caluescunt. Prima tamen pilorum generatio celerissima ipsis est ac plenissima, habentque pilos nigros, & calidi sunt ad contactum capitis, & rubicundi usque ad uigoris tempus. Si uero humiditas affuerit caliditati, & parum

b 3 quidem

quidem exceſſerint ambæ moderationem, bonus color adest, & calor: & in oculis uenæ magnæ. Recte menta uero plura moderatè concocta: & capilli recti & sublaui, & non facile calueſcunt. Replentur autem & grauentur capite, è calefacientibus & humectantibus. Vbi uero ad ampliorem humiditatem ac caliditatem peruenerint, morboſum fit caput, & facile à calefacientibus ac humectantibus læditur. Nec uero diutius uigilare poſſunt. Poſtquam autem obdormierunt, imaginationibus per ſomnia turbantur. Et uisus caliginofus eſt, & ſenſus non ſinceri. At uero frigide ſimulque, cæ cerebri temperatura, frigidum ac decoloratum caput faciunt. Et oculorum uenæ in iſtis non extant, & à frigidis cauſis promptè læduntur. Quapropter etiam inæqualiter ſani ſunt. Senſus autè iſtis in iuuentute quidem ſinceri ſunt & inculpabiles, uerùm progreſſu temporis cito marceſcunt. Et in ſumma, omnia circa caput cito ſeneſcunt. & capilli iſtis genitis uix emigunt, atque hi macri ac ſului. Porro humidæ ac frigidæ temperaturæ cerebri, ſoporofos & ſomnolentos efficiunt, & ſenſibus deprauatos, & recrementis abundantes, & quibus caput facile perfrigeratur ac repletur, & qui de fluxionibus ac grauedinibus facile corripuntur. Non tam calueſcunt tales.

Ventriculi temperamenti note. CAP. LXIII.

Ventriculi temperamenti  
note

Ventriculi natura ſiccioris notæ ſunt, ſi cito ſiticolofi ſiant, & modicus iſtis potus ſufficiat, & grauentur uberiore, & fluctuationes habeant, ſi id quod redundat innatet, & edulijs ſiccioribus gaudeant. Humidioris autem, ſi non ſiticolofi ſiant, & uberiorem humorem cſta moleſtiam ferat, & edulijs gaudeant humidioribus. At calidior natura uentriculus concoquit melius quàm appetit, & magis quæ dura ſunt, & difficulter alterantur. Gaudet autem calidis edulijs ac potibus, neque à frigidis quicquam læditur, ſi moderatus ſiat iſporum uſus. Frigidior autem natura uenter, bene quidem appetit, non autem bene concoquit, & maxime edulia quæ agrè alterantur ac frigida ſunt. Facile itaque in ipſo acceſcunt. Et gaudet quidè frigidis, læditur autem facile immodico eorum uſu. Cæterum ex morbo contrariæ uentris intemperaturæ, in hoc differunt à naturalibus, contrariorum nimirum appetentia, non ſimilium. Si quidem igitur probè concoquit uentriculus, temperatus eſt. Si uero non concoquit, intemperatus. Verùm ſi quidem nidoroſos fecerit ructus, immodicus eſt ipſi ac ſeruidus calor: Si uero acidos, uiceuerſa. Et qui agrè concoctilia probè concoquunt, eorū immovendus eſt calor. Debilis autem in hiſ eſt, qui hæc quidem non concoquunt, piſces autem coquunt. Conſiderare autem oportet num ob aliquem humorem aliunde influentē, hoc ſymptoma ſiat. Nam pituitoliſ ructus acidi ſiſt. Bilioſis autem nidoroſi, uiroſi, aut peregrinæ quædam qualitates. Communiſ uero ſymptomata accidunt, nauſeæ. Verùm ſi quidem prauis humoribus in capacitate uentris innataſint, redundant ac uomitu reiſciuntur. Si uero in corpore uentris, circa tunſcas ipſius contineantur, inanibus ad uomitū nauſeis fruſtra lancinant.

Pulmonis dignatio. CAP. LXV.

Sitis ex uisceribus

Non ſolū uenter ſiticolofos & non ſiticolofos efficit, & frigidi ac calidi potus appetentes, ſed uiscera etiam in thorace, cor & pulmo, & hepar. Et ſanè bibentes nō ſtatim ſitire ceſſant, & frigidus paucus potus ſitim ipſorum magis ſiſtit, quàm multus calidus. Refrigerat autè ipſos etiam multus aer inſpiratus, qui nihil alleuat ex uentre ſiticolofos. Sic autem & qui contrario modo affecti ſunt, à frigida inſpiratione ſenſibiliter læduntur. Et maximum indicium hoc eſt frigidi pulmonis, ſed & pituitam exſcreantes cum tuſſi expuunt. Verùm pulmonis ſiccitates ſuperfluatibus carent, & uocē puram habent, quem admodum humiditates obſcuram & raucā uocem efficiunt, & ubi amplius ad acutus loqui uolunt, ſuperfluatates ipſis incurrunt.

Pulmonis temperamenti  
note

Cordis note. CAP. LXVI.

Cordis rabidioris ſigna ſunt, reſpirationis magnitudo, & pulſus uelociſ.

Aetas ac densitas, quandoque audacia, ac furiosa ferocia. Est etiam ipsis thorax hirsutus, maxime pectus, & quae circa praecordia his propinqua sunt. Magna uero ex parte, & totum corpus calidum, nisi hepar magnopere relucet. Quin & thoracis amplitudo, caliditatis nota est, nisi & hic magnopere cerebrum renitatur. At frigidius cor pulsus habet moderatis minores. Et tales timidi sunt natura, ac pusillanimes, & segnes, & glabrum ipsis pectus est. Siccior autem cor pulsus efficit duos, & animi concitationem non facit, sed feram & aegre sedabilem, & plerumque totum corpus siccum, si non hepar relucet. Humidioris autem signa sunt, pulsus molles, & mores ad iram proclives, ac facile sedabiles, & totum corpus humidius, nisi hepar obsiterit. Calidi porro ac siccus, pulsus duri sunt & magni, & ueloces ac densi. Et respirationes magnae & ueloces ac densae. Et hi omnium maxime hirsuti sunt pectore, & circa praecordia. Verum ad actiones impigri ac animosi, & audaces ac tyrannici moribus praediti. Nam & ad iram celeres sunt, & in ipsa pernitaces. Si uero humiditas cum caliditate praualuerit, minus quidem hi hirsuti sunt praediti, uerum ad actiones expediti. Non tamen ferus est ipsorum animus, sed solum ad iram procliuus. sed & pulsus magni & molles, & ueloces ac densi. Humidioris autem ac frigidioris cordis pulsus sunt molles. Mores pusillanimes, & timidi ac pigri. Sunt autem hi pectoris repilis nudi, & minime furiosi fiunt, quemadmodum etiam ad iram non sunt proclives. At frigidum ac siccum cor, pulsus duriores ac paruos facit. Hi omnium maxime ab ira alieni sunt. Verum irati iram conseruant, sunt autem temperiore maxime omnium depiles.

*Hepatis temperamenti nota.* CAP. LXVII.

Hepatis calidi notae sunt, uenarum amplitudo, flaua bilis copiosior. Temperiore autem uigoris etiam atra. Calidior est ipsis sanguis, & propterea etiam totum corpus, praeterquam si cor relucet. Praecordia & uenter hirsuti sunt. Frigidioris autem notae sunt, uenarum angustia, pituita copiosior, sanguis frigidior, totus corporis habitus frigidior, nisi a corde calefiat. Praecordia & uenter pilis nuda. Siccioris uero, sanguis crassior est, & pauca uenae durae, & uniuersus corporis habitus siccior. Humidioris autem notae sunt, sanguis copiosior & humidior. uenae molliores. sic & totum corpus, nisi cor relucet. At uero calidi simulque siccus hepatis signa sunt, praecordium hirsutissimum, sanguis crassior simulque paucior, & amara bilis plurima, in uigore uero aetatis etiam atra. uenarum amplitudo & durities. Sic & totum corpus calidum ac siccum. Nam caliditas ex corde proficiscens, frigiditatem ex hepate proficiscentem superare potest: quemadmodum etiam frigiditas caliditatem. At siccitatem hepatis cor humidius ad contrarium mutare non potest. Manifestum itaque est quod ubi amborum principiorum temperaturae in idem concurrerint, totum corpus exacte iuxta illas afficitur. Calidum uero ac humidum hepar, minus quam calidum ac siccum, praecordia hirsuta facit. Verum plurimum sanguinem, & uenas magnas, & habitum humidum ac calidum, si non cor relucet. Si uero amplius utriusque qualitatis naturalem modum excefferit, facile putredinis ac mali succi morbis tales corripuntur, & hoc adhuc magis, si plurimum aucta fuerit humiditas, paululum autem caliditas: Si uero uice uersa, modice aucta fuerit humiditas, plurimum uero caliditas, utrosque humores minime in ipsis gignuntur. Frigidius autem ac humidius hepar, praecordium depile habet, & sanguinem pituitosorem efficit, iunctum cum uenarum angustia. Et totum corpus similiter frigidius ac humidius, si non a corde ad contrarium transferatur. Frigidum uero ac siccum hepar, corpus modici sanguinis, & angustarum uenarum facit, & frigidius quoque. & praecordium pilis nudum, nisi & hic cor superarit.

*Cordis temperamenti nota*

*Hepatis temperamenti nota*

*Hepar quando a corde emendatur*

*Tessium temperamenti dignotio.* CAP. LXVIII.

Tessium temperamenti calidum, uenereum est, secundumque ac masculum

Testium tēpe-  
rarentiorum  
notā

lorum generationi aptum, & cito genitales partes hirsutas facit, coniugii autem & uicinas partes. frigidū uero uice uersa. Et humidum quidem multū seminis est ac humidū. Siccum autem pauci ac crassi. At calida & sicca temperatura moderate, crassissimi seminis est ac foecundissima, & celerrime ad coitū stimulat animal statim ab initio. Tales itaq; celerrime hirsuti sunt circa genitales partes, & omnes circum circa sitas, sursum usq; ad umbilicū, deorsum usq; ad media scemora. Multum igitur concitata est talis temperatura ad Venerem, & celerrime satiatur, & si cogatur, læditur. Si uero humiditas caliditati copuletur, hirsuti quidem minus tales sunt, sed magis semine abundant: non ramen plus quam alij appetunt, sed multæ Veneri minore detrimento sufficiunt. Si uero ambo & humiditas, & caliditas, multi fuerint aucta, neque sine noxa à Venere abstinent. At si humidū ac frigidū temperamento testes fuerint, partes circum circa pilis nudæ sunt, & tardè rem Venerem agere incipiunt, & neq; ad actionem pro diues sunt. Aquosum autem & tenue est ipsi semen, & infœcundum, ac sceminarum generationi aptum. Siccum autem & frigidum temperamentū simile quidem est in reliquis superiori. uerum crassius est ipsis semen, & omnino modicum.

De omis.

CAPVT LXX.

Singularū par-  
tium tempera-  
menti notā

**S**ingulæ in nobis partes propriam quandam temperiem ac uim habent, & omnium notas nunc dicere non est nec essariū, quū in finitè ferè sint, compendiaria doctrina hic instituta. Quum autem de his dixerimus, quæ maxime præ reliquis totum corpus sibi coafficiunt, etiam de alijs per eandem methodum ratio cinationem facere iubemus, ita ut ex his quæ excernuntur, & reliquis ipsarum actionibus ac symptomatibus, temperamenta ipsarum cognoscamus. Tempus itaque iam postulat ut ad intemperietum totius corporis correctionem, sermonem conuertamus.

Calide corporis intemperiei correctio.

CAP. LXX.

Temperamen-  
ti calidi cor-  
rectio

**Q**vandoquidem in calidis intemperaturis bilis superat, si quidem deorsum ipsa subierit, manifestū est quod nihil moliri oportet. Si uero ad supernum uentrem feratur, per uomitus ipsam euacuare, post exercitiā, ante cibum, ab accepta aqua tepida. Melius autem ab ipsis exercetur, non uelox, & concitatum exercitium, sed tardius ac mollius. Quidam uero nehementer calidi, neq; omnino opus habent, sed satis est ipsis deambulatio ac balneum. Hi autem & post cibum balneis gaudent. Qui uero cum siccitate calidi sunt, humectante diæta opus habent, ex humectantibus eduljjs, & balneis, & abstinentia exercitiorum concitatorum ac multorū. Quare per ætatem & citius lauentur, & rursus secunda uice post cibum. Prodest his etiam frigida potus. maxime autem contraria est siccis temperamentis Venus. Abstinerè etiam ipsos oportet maxime à lassitudinibus, & ardoribus, & curis ac uigilijs. At humidæ natura temperaturæ, in puerili ætate, morbis ex defluxione, & plenitudine, ac putredine corripuntur. Opus itaque exercitijs pluribus, & exacta in uentriculo cōcoctione, & per urinas excretionē. Quapropter si etiam ante cibum his ac ter lauentur, & naturalibus, & quicquid calidis utantur, maxime opem sentiunt. Sed & ea quæ defluunt à corpore procurare oportet, per balnea, & exercitiā multa, & per excretionē alijis, pituitā à capite detrahentibus, aliquando & purgationibus uti. Eduljjs item boni succi, & uini urinam proritantis potu.

Frigide intemperiei correctio.

CAP. LXXI.

Temperamen-  
ti frigidi cor-  
rectio

**F**rigidarum intemperierum tres sunt differentiæ, quarum pessima est sicca. Quod enim temporis progressu senescentibus cōtingit, hoc statim ab initio his adest. Itaq; humectare ipsos oportet ac calefacere. Continget autem hoc exercitijs moderatis, & alimentis humidis ac calidis, & uini calidiore potu, somno uberiore, & prouidentibus nobis, quo recrementa quæ quotidie in corpore generantur, omnia excernantur. Venus autem omnis siccior



▲ siccores lædit, & maxime eos qui cum siccitate frigidi sunt. Solis autem calidis & humidis innoxia est. Præuæ sunt etiam frigida in temperatura cum humiditate, & hæc maxime fluidis morbis corripiuntur. Prodest autem ipsis illuxies, & exercitia plura, & uictus attenuans, & unctiones moderate calidiores. Qui uero frigidiores quidem sunt natura, moderate autem habent temperamentum siccitatis ac humiditatis, eorum caliditate excitare ac corroborare oportet, & in totius uictus ratione, quod ad humiditatem ac siccitatem attinet, id quod medium est eligere.

*Siccæ intemperiei correctio in uentriculo, uelut exempli causa. Deinde etiam reliquarum intemperierum.* CAP. LXXXII

Sicca intemperies quædam est, ubi solidæ essentia similia corpora sicciora sunt, quæ etiam in curabilis est. Altera siccitas est essentia ex humore compacta. Ad has tertia est, quum propria humiditas ex qua partes nutriuntur, penitus perditur. Continetur autem hæc in omnibus animalis partibus, instar torris in ipsis dispersa. Hanc autem ipsis partibus apponere impossibile est citra alimentum, & propterea difficilima talium affectionum curatio est. Alia uero est iuxta paruas arterias ac uenas consistens. Has siccitates curare cõuenit, ita ut singulas similes partes, ex humectante alimentum, propria humiditate impleamus. Balneum igitur commodum est temperatum, ægro diutius in aqua moram trahente. Post balneum uero statim laudandum est asininum recens mulctum. Oportet & mellis tepidi parum lacti ammiscere, & postea quiescere permittere, usque ad secundum balneum. Tunc autem fricare oportet moderate ac pinguius, an exacte confectum sit dactylus, ex rusticibus ac uentris mole coniectura facta. Moderatius autem est, tempus à primo balneo usque ad secundum, horarum æquinoctialium quatuor aut quinque, si tertio ipsum lauare uelis. Sin minus, plurius. Et sanè illinere ipsum oportet oleo, antequam induatur à singulis balneis. Si quidem igitur lacte deficiatur, & à secundo balneo ipsum dabimus. Sin minus, ptisanam ex æleo coctam, aut alicam instar ptisanæ præparatam. deinde rursus quiescere iussim, ad tertium balneum ducemus, aut contra ad cenam. Panis autem si probe præparatus, clibanites, purus. Obsonium autem ex piscibus petrosolis aquis degentibus quispian, aut asellus ex iure albo. Quo uero in summa de cibo dicam, sit concoctus facilis, & nutriendus, minime uiscosus ac superfluitatibus abundans. Potus autem sit uinum aquosum album, purum, modicum aquæ ammixtionem ferens, modice adstringens. Maxima igitur siccitatis hæc curatio est. Verum moderata ita exquisito uictu, non habent opus, & pleniorẽ dietam sufficere licet. Ponatur autem similis prioris siccitas, sed ammixta sit ipsi moderata frigiditas. In hac ad calefacientium materiam mutationem faciemus, & relatis apponemus, in lactis quidem usu plus mellis. Vinum uero minus priore aquosum dabimus. Sed & ipsa edulia calidiora danda sunt, non solum ex naturali temperatura, sed etiam à recenti qualitate. Et nardinum unguentum aut mastichinum frequenter illinendum. Quod si frigiditas multa sit una cum siccitate, primum quidem affectionem grauissimam esse scito, & quæ agrè corrigi possit. Verum ipsæ utere, & per se melaleuco ac despumato. Vinum autem elige uetustius. Optimum autem pharvacum in talibus est id quo assidue picatores utuntur, & ex ipso uentre illinere oportet, & dum adhuc calidum est auellere. prodest autem talibus etiam puer carnosus condormiens, ut semper supernum uentrem cõtingat.

Misceatur autem consequenter ad siccitatem moderata caliditas. In hac primum uictus ductum seruabimus, ita ut mel prorsum non gustent. Vinum autem accipiant minime uetustum. Edulia uero tepida, & lactosa hoc est lactis teporis exhibebimus, & uentre omphacino aut melino oleo illinemus. Cæterum hos contentiosius perfrigerare, periculo non uacat, quum febribus quodammodo hæc sit affectio, ubi caliditas redundarit. Ponatur poro rursus præualere calidam intemperiem, ammixtam autem esse ipsi humiditatem

*Temperamentum si siccitatis correctio*

*Hore æquinoctiales*

*Siccitas cum frigiditate*

*Picatorum pharvacum est ipsa picatio*

*Siccitas cum caliditate Lactosa edulia*

*Caliditas cum humiditate*

ditatem. Talem intemperiem aquae frigidae potu curauerimus. Commodus autem est adstringentium eduliorum usus. Sint & haec citra caliditatem astra. At humida intemperatura sola consistente, siccantia edulia, citra caliditatem ac frigiditatem, opulantur: & ad hanc inopia consuetorum potuum. Humidae uero cum frigiditate intemperaturae optima medela sunt, acriter omnia: adiciantur autem his etiam adstringentia, absque hoc ut manifeste frigeant. Optima uero medela & his est modicus potus, & hic ex uinis uehementer calefacientibus. Atque intemperierum quidem ex qualitatibus obortarum, eiusmodi curationes existunt. Quandoquidem uero humiditas in capacitate uentris contenta, aut in tunicis ipsius imbibita, intemperaturam efficit, commodum fuerit etiam de his dicere, prior itaque affectio si quidem semel constiterit, per uomitus purgata facile sedatur. Si uero rursus ex alia quadam, aut alijs partibus influxerit, exacta cognitione opus habet. Curatio uero statim sequetur. Vniuersam enim curationem loco affecto adhibere oportet. providere autem in tantum solum his quae suscipiunt, ut non facile influentia suscipiant. Id uero contigerit per adstringentia, & per ea quae totum corpus ad bonum habitum perducunt. Atque ro uitiatos in tunicis uentris humores, per moderate purgantia educemus: quale est aloë, & medicamentum ex ipsa constans, picea confectio ab antiqua ritudine appellata. Si uero uiscosa pituita uentri fuerit infarsa, prius ipsa danda sunt quae hanc secant. Deinde sic purgandum. Si tamen ad hoc aptus sit, à radiculis acceptis uomat. Quod si neque uiscosus neque crassus fuerit humor, sufficit etiam à prisanæ succo uomitus, & ab aqua mulsæ. Bibatur etiam absinthij succus in aqua mulsæ. Poterò ad hanc proportionem etiam intemperies in alijs partibus factas curare oportet, ita ut humoribus idoneas effluxiones inuenias. Si uero neque effluxionem habeat pars sensui exposita, per resolutionem in uaporem euacuare oportet abundantes in ipso serolos, atque reliquos humores: quemadmodum etiam, si spiritus flatuosus fuerit id quod continetur.

## De alimentorum facultatibus. CAP. LXXIII.

Quum de alimentorum facultatibus doctrina, pars sit tractationis tuendae sanitatis, iam quoque ad praedicta de illis subiungemus, paucis quibusdam ante particularem de ipsis doctrinam premissis. Nam si quid aliud, alimentorum facultates nosse oportet. Quae igitur attenuantem uim habent, transitus meatuum ab obturatione liberant, & uiscosa impacta detergunt, & crassa secant ac attenuant. Verum his qui diutius in ipsorum esu perseverant, serosas ac biliosas superfluitates congregant. Et si adhuc amplius quis immoretur, atrabiliarius sanguis redditur. proinde ab assiduo ipsorum usu abstinere oportet, & praesertim eos qui biliosum habent temperamentum. Solis enim his competunt, qui pituitam, & crassum crudumque ac uiscosum humorem coaceruarunt. Quae uero crassefacientem uim habent, abunde quidem alunt, & si in uentre ac hepate conuenienter cocta fuerint, boni succi sanguinem generant. Verum splenem & hepar obturant. Ex his autem aliis quae sunt solum crassi succi, uelut lenticula: quaedam uiscosa, uelut malua. Quibusdam ambo contigerunt, ut & crassi succi sint, & uiscosa, uelut testa interitis. Securior itaque est attenuans uictus ad sanitatis praeservationem, quam is qui magis crassefacit. At quum parum ille nutriat, firmitatem ac roborem corporibus non addit. Et oportet aliquando etiam multum nutrientia moderate exhibere, ubi quis indigentiam deprahenderit. Maxime uero citra periculum haec acceperint, qui exercitijs dediti sunt, & qui quantum uolunt dormiunt. Omnes uero qui ante cibos se exercere non possunt, crassi succi alimenta fugiant. sed neque ociosi talia alimenta admittant. Maximum autem malum ad sanitatis custodiam, ocium perpetuum existit: quemadmodum sanè moderatus motus maximum bonum. Quae uero edulia medium, inter crassefacientia ac attenuantia habent, omnium optima sunt, & moderatum compar

A compage sanguinem generant. Tale igitur alimentum corporibus nostris conueniens est. Nocium autem id quod mali succi est, quod semper fugere oportet. Sed & uarietate alimentorum uitare melius est, & praesertim si ex contrariis sunt facultatibus. Nam accepta non conuenienter concoquantur.

Varietas eduliorum nociva

De oleribus, CAP. LXXIII.

**L**actuca manifeste perfrigerat & humectat. Quapropter etiam somnifica est. Quantum uero eius in oleribus existit, probe nutrit, & boni succi sanguinem gignit. Sed & Intubus frigidus ac humidus temperamenti est, sed minus quam lactuca. Malua frigefacit quidem, sed non manifeste, magis autem humectat. Vnde etiam uentrem subducit. Hoc autem etiam ob uiscositatem quam in se habet. Beta extergendo aluum subducit. Quare etiam stomachum mordet, si amplior edatur. Obturat autem hepar & splenem.

Lactuca

Intubus

Malua

Beta

Brassica

Brassica bis cocta si edatur, uentrem cohibet. Semei autem non diu coctus, & cum oleo, garo, aut sale accepta, magis subducit, quemadmodum succus ipsius magis quam lenticulae succus purgat. Adhuc autem magis marina brassica manifeste aluum mollit, ut quae saluginosa sit & amara. Sed

Alinum

& Alinum amplioris saluginosae qualitatibus particeps uentrem subducit, uerum magis quam brassica stomacho commodat, utpote moderatae adstrictionis particeps. Lac autem & semen generat. Blitum & atriplex humida quidem sunt, & aluum subducunt, uerum parum nutriunt. Spinosa omnia, uelut carduus, & atrachylis, & huiusmodi, stomacho commoda sunt, excepta cinara. Haec enim quum dura sit, malum succum generat. Quapropter optimum est coctam ipsam exhibere cum oleo, garo, & coriandro. Apium & hipposelinum, sion, & smyrnium, urinam omnia cient. Verum smyrnium magis aromaticum est, & acre, ac urinam cient, & mulieribus menses mouet. Apium autem & hipposelinum iucundiora sunt, ideoque stomacho commodiora. Eruca calida est, & semen gignit. Quapropter & Venerem, & capitis dolorem excitat. Nasturtium & Ocymum, & sinapi, calida sunt & actra, & maxime nasturtium: agre uero concoquantur, & stomacho incommoda, ac mali succi sunt. Vrtica tenuius partium est, & aluum subducit, ac parum nutrit. Gnigidium simile est scandici, adstringentis, & amarum non paucae particeps qualitatibus. Est & stomacho commodum, ut etiam cibum auersantibus aptum sit, si cum aceto edatur. Verum modicum alimentum corpori exhibet. Caeterum syluestria olera extremum uitiosos succos generant. Capparis autem appetentiam cibi excitat, & hepar ac splenem ab obturatione liberat, & pituitam subducit. Utendum autem ea est cum aceto mulso, aut cum aceto & oleo, ante reliquum cibum.

Blitum

Atriplex

Carduus

Atrachylis

Cinara

Apium

Hipposelinum

Sion

Smyrnum

Eruca

Nasturtium

Ocymum

Sinapi

Vrtica

Gnigidium

Scandix

Capparis

De asparagis, CAP. LXXV.

**B**liti, lactuca, atriplex, malua & betae planta humida est, asparagus autem siccus. Rapum autem & sinapi, radica, nasturtium, pyrethrum, brassica, & alia calida, plantam siccam, asparagum autem humidum habent. At uero fruticulosarum plantarum asparagi, & palustris & hortensis, & qui a bryonia est, stomacho quidem commodi sunt, & urinam cient, uerum parum nutriunt. Si uero concoquantur, magis nutriunt quam olerum asparagi. Similiter & chamizaphnes asparagus.

Asparagi omnis generis

De radicibus eius aptis, CAP. LXXVI.

**B**vnia, quod & rapum appellatur, bis coctum in cibo acceptum, non minus quam aliae plantae nutrit. Verum si assidue accipiat, crassum succum gignit. Bulbi adstringunt, extergunt, appetentiam cibi faciunt, stomachum corroborant, & uiscosa in thorace probe educunt. Verum bis cocti alunt magis, sed minus probe educunt amaritudinem abijcientes. Generant & semina, & Venerem stimulant in uberiore usu, status quoque faciunt ac tormina inducunt. Qui uero cum oleo & garo eduntur, iucundissimi sunt, & status non gerant, & probe nutriunt, ac facile concoquantur. Pastinace, dauci & caeteri radices, minus quam rapa nutriunt, calidae autem & aromaticae palam sunt, & urinae

Rapum

Bulbi

Pastinace

Daucus

Caeteri

& urinae

& urinam cient. Abutentibus autem & malos succos gignunt, & communis radicum ratione ægrè concoquuntur. Quidam pastinacam sylvestrē dācum appellant, quæ magis urinam promouet. Radicula attenuatoris ac calidæ est facultatis. Verum ante cibum edere ipsam oportet, cum aceto aut garo, uentris subducendi gratia: nequaquam post cibum. Cēpa, aliū & porrum, acrem uim habentia, calefaciunt corpus & attenuant, & crassum in ipso humores secant. Et bis cocta quidem parum nutriunt, non cocta autem, omnino non alunt. Alliū tamen magis obturationes aperit, ac discors, forium est. Ampeloprason siccius est quā porrum, utpote sylvestre. In summa, exoleribus quæ cruda eduntur, magis uitiosum succum gignunt quā cocta, & ampliore superflua humiditate participant. Quæ uero ad repositionem, muria aut acida muria asseruantur, stomacho commoda sunt, & appetentiam excitant, & crudos humores secant. Verū ægrè concoquuntur, & abutentibus prauos succos gignunt.

De tuberibus et fungis.

CAP. LXXVII

**T**uber succum qui ex ipso redditur, qualitatis exortem habet, frigidiorē autem & crassum. Arfungi frigidi sunt, & pituitiosi, ac mali succiferae. his autem bolēti innocentiores sunt, & qualitatis exortes, probe cocti. Secundi ordinis sunt Ammanitæ. Cæterum à reliquis fungis abstinendum est. Multi enim ex ipsis letales sunt. Sed & ipsi bolēti, si crudiores edantur, sepe periculi causa existunt.

De frumentaceis.

CAP. LXXVIII

**E**X frumentaceis appellatis chondrus probe nutrit, & uiscosum succū generat. Verum lotus prauus est, quoniam prompte crassescens in coctus manet. Melior autem est succus ipsius totius probe cocti, instar ptisanæ. Alica in reliquis condro similis est, magis aut aluum cohibet. Triticum coctum in cibo acceptum ægrè concoquitur, & flatuosum est: si uero concoquatur, alimentum fortissimum exhibet. Arsi in panem cogatur, flatuositatem & difficultatem concoctionis deponit, ob fermentū & salis participationem. Verum ex panibus magis alit siligineus. deinde simillaceus. Tettio loco ex toto collatus, cui nihil fursurum decessit. Sordidus autē panis minus quidem nutrit, sed magis per uentrem subit. Amylum parū nutrit, uelut etiam panis lotus. Hordeum frigidam & exterforiam uim habet, & coctum quidem uelut ptisana humectat. Tostum autem uelut in potenta siccatur. At potenta in æstate ante balneum pota ex aqua, sitim sedat.

Panis hordeaceus friabilior est, & parum nutrit. Maza ægrius concoquitur, & flatuosior est quā hordeacei panes. Verum si mel addatur, aluū subit. Auena calida est & parum nutrit. Milium & paniscum, frigida sunt & sicca, & parum alunt, & uentrem sistunt. Per omnia tamen milium panisco melius est. Oryza ægrè concoquitur, & parū nutrit, & aluū sistit. Ptisana sic coquitur. Vna pars ipsius ad quindecim aquæ partes iniecitur, oleumq; moderatum ammiscetur, & postquam intumuit, etiam acrum additur. Vbi uero exacte cocta est, etiam sal tenuis inditur. In quibusdam potiorum quoque anethum ipsi ammiscetur. Similiter autem uelut ptisana, etiam Auena, & chondrus coquitur.

De leguminibus.

CAP. LXXIX

**E**X leguminibus lenticula mali succi est, & atrā bilem parit. Verum ipsa quidem, & maxime bis cocta uentrem sistit. Decoctū autem ipsius, cum oleo & garo potum, uentrem promouet. Ammiscere aut oportet ipsi thymbram, aut pulegium, propter flatuositatem. Fabæ leues sunt, flatuosæ aut exterforiæ. Faba Aegyptia nostratē faba humidior est, & superfluitates gignit. Pisum laxum quidem est, non tamen ita flatuosum. Cicer flatuosum est & exterforium, & semen gignit, & Venerem stimulat, ac calculos attērit. Tostum uero flatuositatem deponit, sed ægrè concoquitur. Lupini ægrè concoquuntur, & difficulter aluum subeunt, & crudum humorem gignunt.

**E**gnum. Fœnum græcum calefacit, & uentrem promouet, si ante cibum accipiat. Ochri & phaseli præmacerati ut radices producant, alui subducunt, ante cibum cum garo accepti. Et nutriunt magis quàm fœnum græcum. Aphasiosi, qui etiam dolichi appellantur, si integri cum siliquis uirides edantur, magis recrementitiam superfluitatem generant.

De fructibus fugacibus.

CAPVT LXXX.

**C**ucurbita frigefacit & humefcat, & alium subducit. Modicè autem nutrit. Pepon totus quidem mali succi est, & frigidus, & humidus, & uoluptuosus. Si uero non concoquatur, etiam cholera efficit. Semen autem ipsius urinam ciet, & calculos in renibus atterit, & in totum abunde extergit. Melo pepon minus quàm pepon omnia hæc possidet. Cucumis autem minus peponem frigidus ac humidus est, uerum magis urinam ciet, & egerit concoquitur, ac mali succi est, etiam si cõcoquatur. In summa uero omnes fugaces fructus frigefaciunt, & humefciant, parum nutriunt, & mali succi sunt.

De fructibus arborum.

CAPVT LXXXI.

**F**icus & uix uelut principatum inter omnes pomorum ac autumnales fructus obtinent. Nam & minus mali succi sunt, & magis nutriunt. Ex his autem ficus meliorem succum habent, & magis alunt, & alui subducunt, urinam ciet, & renes expurgant, præsertim ualde manuræ, ac ipsæ caricæ. Flauosæ autem sunt, & sanguinem non bonum gignunt. Quapropter etiã pediculos generant, si quis frequentius ipsis uratur. At uix si non secedat, neq; concoquuntur, sed & crudum humorem generant. Si uero secedant, moderatiores sunt. Vix passæ calidiores uis sunt, & stomacho commodiores, & magis nutriunt, minus autem alium subducunt. Mora quæ & syncumina, ualde humefciant, perfrigerant moderatè, & alium subducunt prima accepta, & non ualde stomacho incommodant, sed parum alunt. Cerasa quæ dulciora sunt, alium subducunt, sed stomacho incommoda sunt. Quæ uero adstrictione participant, minus stomacho nocent, alium autem subeunt. Eadem ratio etiam in uvis, moris, ac pluribus alijs habetur. Et in summa, quæ adstringunt, prima si sumuntur in cibo aut potu, ante alium cibum, uentrem sistunt. Quibus uero ob debilitatem uenter cohibetur, his si acceperint ea quæ mollire solent, uelut olera, aut pisces, aut huiusmodi quædam, & postea ingesserint adstringentia, per hoc quoddam corroborant hæc tempus, deorsum propellunt, & ad excretionem excitant. Pini fructus, strobilus appellatus, bonus ac crassi succi est, & probe nutrit, non tamen facile concoquitur. Persica mali succi sunt, & acescunt ac facile corrumpuntur. Quapropter prima danda sunt, eo quoddam prompte subeant, & non corrumpantur per moram in uentre. Præcocia & Rhodacena & Armenia, meliora sunt Persicis. Neq; enim acescunt, neq; similiter corrumpuntur. Sunt autem & iucunda. Mala dulcia alijs sunt calidiora, & facile in corpore distriuntur, & præsertim si assentur, aut coquantur. Acida uero frigidiora sunt, sed humores in uentre magis secant. Austera stomachum roborant, & uentrem sistunt. Et his adhuc magis cydonia. Pira magna ac matura, ad hæc etiam magis alunt. Mala punica frigefaciunt, ac parum nutriunt. Mespila & sorba magis adstringunt, & fluenti aluo commoda sunt. Palmulæ stomacho commodant, si non ualde fuerint pingues, uerum alium sistunt, & crassos ac uiscosos humores generant, & capitis dolorem inducunt. Oliuæ drupæ stomacho nocent, pinguem succum generant. Colymbades autem muriaq; conditæ, si ante cibum sumantur, appetentiam excitant, & alium subducunt. & amplius quæ cum aceto & aceto mulso preparantur.

Nuces regiæ minus alunt quàm auellana, & magis stomacho commodant. Virides nuces humidiores sunt, & alium subducunt. Arsecas si quis aqua maceratas interna membrana denudet, consimiles ipsas uiridibus efficit. Amygdala incidendi ac attenuandi uim habent. Quapropter uiscera

Fœni græci

Phaseli

Ochri

Phaseli

Dolichi

Cucurbita

Pepon

Melo pepon

Cucumis

Ficus

Vix

Caricæ

Vix passæ

Mora

Cerasa

Pini fructus

Persica

Præcocia

Rhodacena

Armenia

Mala

Pira

Mala punica

Mespila

Sorba

Palmulæ

Oliuæ

Nuces regiæ

Auellana

Amygdala

c & tho-

*Pistacia* & thoracem expurgant, & adhuc magis ea quæ amara sunt. Similiter e-  
*Damascena* tiam pistacia, & amplius hepar obturationem liberant. *Damascena* uentrem  
*Serica* subducunt, si ante cibum edantur cruda, & in aqua multa cocta. *Serica*  
*Silique* ægrè concoquuntur, stomacho incommodant, & parum alunt. *Silique*  
*Sycamora* ægrè concoquuntur, & aluum sistunt, & malum succum gignunt. *Sycamora*  
*Citrea mala* mora perfrigerant & humectant manifestè. *Citrei mali* externa pars acris  
 est, & difficulter concoquitur. Quæ uero uelut caro ipsius est, nutrit quidè,  
 sed & ipsa ægrè concoquitur. At interna pars siue acida, siue aquea, uerius  
 multum frigefacit. *Glandes* alunt non minus quàm frumenta cæca, uerius  
*Castanea* difficulter concoquuntur, & crassi succi sunt, ac tardè transiunt. *Castanea*  
 per omnia his meliora sunt.

De animalibus, & primum uolatilibus. CAP. LXXXII.

*Volatilium* *caro* *Pyrgite* **A** Nimalia uolatilia alimentum minus quàm quadrupeda, & præsertim  
 ires, exhibent. Facilius autem concoquitur ipsorum caro, & magis  
 perdice, & attagena, & pullo columbino, & gallina ac phasiano. Atturdo-  
 rum caro, & merularum, & auicularum paruularum, inter quas sunt etiam  
 pyrgitæ à turribus appellati, durior est. Et his adhuc magis turturis, & pa-  
 lumbi, & anatis caro. Multò autem difficilior concoquitur, & durior ac si-  
 brosiore caro pauonis est. Verum anserum & struthocamelæ caro, omnibus  
 relatis difficilior cōcoquitur, & superfluitatibus abundat, exceptis aliis. Hæ  
 enim non minus quàm aliarum auium boni succi sunt. Ciruum autem caro  
 fibrosa est & dura. In summa, iuniora uolatilia uctustis humidiora sunt. Ex-  
 cilius concoquuntur, & magis alunt, ac per aluum subeunt. Cocta uero ali-  
 sis ac in sartagine frictis similiter præstant. Et quæ ex siccis ac montanis lo-  
 cis sunt, facilius concoquuntur, & superfluitatibus carent, magis quàm ea  
 quæ in palustribus nutriuntur.

De ouib. CAP. LXXXIII.

*Ouorum sa-* *culta* *Oua suffocata* **G** Allinarum ac phasianarum oua omnium optima sunt. Anserum autem  
 & struthocamelorum non bona. Ex omnibus autem recentia uetustis  
 meliora sunt. Et tremula quidem magis nutriunt. Sorbilia uero magis sub-  
 eunt, & faucium asperitates leniunt. Reliqua omnia ægrè concoquuntur, &  
 tardè transeunt, & crassum succum gignunt, exceptis suffocatis appellatis.  
 Hæc autem sunt cruda cum garo & uino ac oleo subacta, & in duplo uale  
 moderatè cōpacta. Talia enim facile concoquuntur, bonique succi sunt. Pes-  
 sima autem sunt in sartagine fricta.

De pedestribus animalibus. CAP. LXXXIII.

*Carnes ani-* *malium* **E** X pedestribus animalibus suillæ carnes reliquis edulij magis alūt, eo  
 quod & sapore, & odore, familiaritatem quandam ad humana corpora  
 habent: uelut quidam qui per ignorantiam humanas carnes gustarunt, co-  
 gnouerunt. Alimentum autem quod ex illis contingit uiscosum est, & non  
 facile discutitur ac transpirat. Ouilla caro superfluitatibus abundat, & ma-  
 li succi est. Caprina acris est & mali succi. Pessima autem est hircorū,  
 & ad concoctionem, & ad succi bonitatē. Bubula atrabiliaria est. Le-  
 porina, crassi succi, sed minus quàm ouilla ac bubula. Ceruina dura est  
 & difficulter concoquitur. In summa, recentia animalia ac iuniora, hu-  
 midiora sunt, & molliora, & facilius concoquuntur quàm uctusta. Ita & ca-  
 strata non castratis, & saginata gracilibus præstant.

De partibus animalium. CAP. LXXXV.

*Partes ani-* *malium* **E** Xtremæ partes neruossæ sunt, & pinguitudinis exortes, & excarnes. Et  
 propterea uiscossæ sunt, & parum alunt, & uentrem subducunt: exceptis  
 uolatiliū extremis partibus, propter multam siccitatem. Rostra & aures  
 cartilaginossæ sunt, & ægrè concoquuntur. Lingua laxa est, exanguis, ac  
 pauci alimenti. Glandulæ iucundæ sunt & friabiles. Verum iucundiores  
 sunt quæ in mammis existunt, & maxime suum, ubi plenæ fuerint lacte. Hæ  
 etiam nutriunt non minus quàm carnes. Rhenes & testes uirosi odoris ac  
 saporis

A saporis sunt, & agrè concoquuntur. Verum saginatorum gallorum testes iucundi sunt, & bonum alimentum corpori præbent, quemadmodum taurorum, & hircorū, & arietum, agrè concoquuntur, & mali succi sunt. Cerebrum pituitosum est, & crassi ac mali succi, tardè transit, agrè concoquitur, stomacho incommodat, & nauſeam parit. Si uero probe concoquatur, satis nutrit. Medulla pinguis & iucundior cerebrō est, sed in reliquis similis. Pinguedo & adeps parum nutriunt, & stomacho nocent. Cor & hepar crassi succi sunt, agrè concoquuntur, & tardè tranſeunt. Sed ſuillum hepar reliquis melius est. Splen prauī succi & atrabilariū est. Pulmo facilius concoquitur uelut laxis, minus autē nutrit, & pituitosus est. Ventrīculus, uterus, & intestina, dura sunt, & agrè concoquuntur, & pituitam generant. In summa, syluestrium animalium alimentum siccior est, & minus superfluitantibus abundans quā domesticorum. Sanguis omnis difficulter concoquitur, & præsertim crassus ac atrabilariū, qualis est bubulus. Leporinus autē uelut iucundissimū in pretio est, & multis hic mos est, ut ipsum coquant cum hepate. Quidam etiā cum alijs uisceribus coquit. Aliqui & ſuēnis porcelli sanguinem edunt. At caprarum sanguinem ab aliquibus edi, etiā Homerū nouit.

De lacte.

CAP. LXXXVI.

**L**actis concoquatur, nutrit quidem, sed gingiuas & dentes lædit. Quare post ipsum acceptum, primum aqua mulla, deinde uino adstringente, os colluere oportet. Capitis etiā dolorem inducit, & præcordia ac uentrē inflat, & in thenibus calculos generat. Et quod quidem liquidius est, minus nutrit, sed magis aluum subducit. Crassius autē uice uersa, magis nutrit, & minus subit. Moderatum autē compage caprinum est: quemadmodū sanē ouillum crassius. Et statim quidem post partum, tenuius est. Progressu autē temporis crassius ac deterius fit.

De lactis potu.

CAP. LXXXVII.

**L**actis bibens ab alijs cibis abstinere debet, donec concoctum fuerit, & deorsum secesserit. Præstat igitur mane bibere recens mulctum, & ab ipso accepto, cibis abstinere, & tunc quoque laboribus nimis aliquid detrudere. Nam in laborantibus necesse est ipsum accescere. Quare leniter deambulare melius est, & interim uigilantes quiescere. Sic enim facienti primum secedit, eo autē excreto, aliud bibat. Et si hoc secesserit, rursus aliud. Ab iniuria igitur probe purgat, non quidem ita multū de reliqua mole, sed quæ in eis sunt in uentre. Postea uero tam ingreditur in uenas, & optime nutrit, & non amplius per aluum secedit. At uero in biliosis fluxionibus, & in colligantionibus ad uentrem nutantibus, lac coctum dare oportet. Coquere autem oportet primum leniter ac paulatim, ut ne pars quædam diffundatur, pars uero consumatur. Postea uero magis atque magis coquere, cauendo ut neque amburas, neque caseum ex ipso facias. Optime uero cauebis hoc, si & moliter coques, & quod motu disparatur undique dera des. Mouere autē oportet ferula leui ac tenui: & si quid ad olla labia ebulliat, etiā hoc spongia repurgare. Sape enim hinc etiā reliquum corruptum est. Hoc igitur modo uelut dictū est, lac coquere oportet, donec æqualiter crassius ac dulcius crudo euadat. Quin & per ignitos silices in lac immisos exhauritur, & consumitur id quod in ipso est tenue ac serosum. Sed & hoc alui fluxionibus, & maxime biliosis conuenit.

De lactis scisso.

CAP. LXXXVIII.

**S**erosa lactis pars a caseosa, uehementiore ad ignem luculentiore ac non fumosa coctura separatur. Deinde per colum, aut panniculum exactè excolatur. Et ad serum quidem mel moderatum, aut acetum mulsum moderatum, aut sal ammiscetur, & ad uentrē subducendum exhibetur, in uigore ætatis consistentibus, usque ad sextariorum duorum mensuram. Iunioribus autē, non minus sextario. Cæterum lac per ignitos silices immisos, aut

Sanguinis esus

Lactis uires

Lactis potus  
ad purgationēLactis coctura  
et modus

Silices igniti

Lac scissum

per ferri immillionem crassifacium, & ad dysenterias, & ventris fluxiones recte dari potest.

## De caseo. CAP. LXXXIX.

*Casei vires* **O**mnis caseus acris est, & sitim excitat, & ægrè cōcoquitur, & mali saporis est, & calculos generat. Mellior autem est recens, & laxus, & mollis, & iucundus, & moderati salis particeps. Contrarius uero pessimus.

## De piscibus. CAP. XC.

*Piscium in cibus vires* **Q**uod omnis piscis frigidioris ac humidioris sit temperamentis, manifestum est. Verum omnibus alijs præstant petrosi appellati, ut qui facile concoquantur, & boni succi sint, & moderate humescunt, ubi non habuerint carnem duram. Verum ex non petrosis, pelagij multum præstant his qui in limo nutriuntur, aut isthic ubi flumina in mare incurrunt. Deteriores autem his sunt, qui in stagnis, & mari stagnante aluntur. At particulatim Capito ubi pelagius fuerit, moderate iucundus est, & minus ægrè concoquitur, & bonum succum gignit. Verum sanguinem tenuiorem ac debiliorem generat. Similiter etiam Lupus. Sed & Mullus ipse si pelagius est, durior alijs piscibus ac friabilior est, & facile concoquitur, & alit, & iucundus est, & non pinguis.

## De testaceis. CAP. XCI.

*Pisces testa intersti* **P**isces qui testa integuntur, salum & crudum humorem generant. Ex his autem ostrea mollissimam carnem habent, & magis subeunt. Chamæ uero, & purpuræ, ungula, spondyli, buccina, cochleæ, & quæcunque talia duræ: & quæ molli testa integuntur, uelut gammari, paguri, cancri, locustæ, & squillæ, ægrè concoquantur, & nutriunt, & uentrem sistunt, si sæpe in aqua dulci coquantur. Omnibus autem testaceis succus inest qui uentrè subducit. Quare etiam cochleis terrestribus. At quum hæc duram carnem habeant, quæ ægrè cōcoquitur, & nutrit, ac malum succum generat, quidam iusculum per oleum ac garum condientes, ad alui subductionem ipso utuntur. Cæterum Echini siue erinacæ moderate perfrigerant, & modicè alunt, & urinam cient.

## De mollibus. CAP. XCII.

*Molles pisces* **M**ollia piscium genera, uelut sunt, polypi, sepia, loligines, dura sunt, & ægrè concoquantur, & magis polypi. Salum autem succum modicū habent. Si uero concoquantur, modicum alimentum corpori præbent.

## De cartilagineis. CAP. XCIII.

*Cartilaginei pisces* **E**x cartilagineo genere torpedines, & pastinacæ, mollem ac iucundam carnem habent, & cito subeuntem, faciliemq; cōcoctu, aut nutrientem. Rata uero & leuirata, & squatinæ, ac huiusmodi alia, duriora sunt, & ægrè concoquantur, & magis nutriunt. Nam in uniuersum animalia quæ duram carnem habent, & ægrè concoquantur, & magis alunt. Vbi uero concoquantur, multum ac solidum alimentum exhibent.

## De cetaceis. CAP. XCIII.

*Cetacei pisces* **C**etacea uelut balenæ, uisuli marini, libellæ, delphines, & magni thumi, duram & ægrè concoctilem ac crassi succi carnem habent. Si uero sale asseruatur talia, moderatiora sunt. Sed & ex alijs piscibus qui humidiores sunt, & superfluitatibus abundant, etiam ad inueterationem magis idonei sunt. Verū in salsamentis talis est differentia, qualis est pisciū ex quibus sistit.

## De uini facultate. CAP. XCV.

*Vini facultates* **Q**ui sanitati studet, eum etiam uini facultatem cognoscere oportet. Etenim in summa, omne uinum nutrit. Verum rubrum & crassum magis quidem nutrit, non autem boni succi est. Dulce uero & ipsum quidem nutrit, non autem stomacho commodat. Adstringens autem stomacho quidem commodat, ægrè uero distribuitur, & minus alit. Adhuc uero minus, albu. Optimum autem uinum est colore fuluum. uetustius autem calidius est ac siccus, quàm nouum. Hæc uini facultas est in summa. At uero uinum calor



**A**tem qui in nobis est fuscitat, & propterea concoctiones meliores sunt, & sanguis bonus. Alimentū autem deducit, ut quod quoquo uersus penetrat. Quapropter & ex morbis attenuatos, habiliores efficit. Nam & ciborū appetentes facit, & pituitam attenuat, & bilem per urinas expurgat, & bonū colorem inducit: sed & animi hilaritatem ac iucunditatem conciliat, & robur exhibet. Atque horum quidem bonorum causa est uinum moderate potum, contrariorum uero, immodicum. Et propterea ebrii mutantur, & delirant, & in grauem somnum delabuntur. Quare fugere immodicū ad eū uini potum oportet: quamquam longiore temporis intervallo interposito, liberaliter bibere conducit, purgationem enim per urinas largam mouet, & sudores profundit. Melius autē est ad hæc etiam uomere, aqua mulsā præsumpta, ut ne minimum quidem ab ipso lædamur. Qui uero uini potationi indulget, reliquo cibo non ualde se expleat. Dum uero potat, interim brassicam edat, & bellaria gustet, præsertim amygdalas. Hæc autem etiam capitis dolores leuant, & uomentibus nequaquam molestæ sunt. Præstat quoque absinthij cremorem ante potationes sumere. præ omnibus enim crapulam maxime atcet. Si uero aliqui ex uino morsum percipiant, frigida aqua bibenda est. Et postridie rursus absinthij cremor sumendus. Deambulationibus item ac frictionibus, & balneo, & pauciore cibo reficiantur.

*Ebrietas  
male*

*De melle & aqua mulsâ.*

CAP. XCVI.

**M**el coctum magis nutrit quam aluum subducit. Non coctum, uice uersa. Et frigidis quidem ac humidis temperaturis confert, calidis autē in bilem transit. Sed & aqua mulsâ non ualde commoda est amara bile abundantibus, utpote in bilem transiens ipsis. Conducit itaque in talibus naturis aquosiores dare aquam mulsam. Incommoda est & his quibus uiscera facile læduntur. Preparare autem aquam mulsam oportet, uel octupla portione aquæ ad mel ammixta, atque sic coquere donec spumare desinat. Assidue uero spumam ab ipsa auferre oportet, statim simulq; ubi oborta apparet.

*Mellis uires*

*Aqua mulsâ*

*De somno.*

CAP. XCVII.

**C**onsequens est ut post omnia de uictus ratione relata, etiam de somno quiddā dicamus, eo quod etiam possemus omnium plerumque admittitur. Somnus itaque ut breuiter dicam, animalium facultatum quies est, bona humilitate cerebrum rigante contingens. Quod si recte admittatur, multa bona facere potest. Nam & cibos concoquit, & humores excoquit, & dolorem mitigat, lassitudinesque lenit, & distentorum laxitatem efficit. Sed & animā, lium affectionum obliuionem inducere potest, & emotam mentis rationē corrigere. Tempus somni optimum est post cibum. Sed diurnus non omnibus commodus est. Non enim sufficit ad perfectam ciborum concoctionem id tempus in quo dormiunt. Interrupta autem ante tempus concoctione, ex meridie surgentes sæpe ructum acidum habent, sæpe etiam flatibus implentur. Quidam etiam fluctuationes habent, nisi aut ob consuetudinem, aut quod sufficienter dormierūt, hæc ipsis non fiant. Optimi uero sunt somni nocturni. Ex natura enim noctis humiditas, & quies, ad somnum procliuis, concoctionem perfectam efficit. Nam post nocturnos somnos, maxime ad excretionē festinamus. Terminus igitur temporis somni sit, ciborum perfecta concoctio, quæ tū ex ructibus, tū uentris contractione cognoscitur. post quā neque uigiliæ inutiles sunt, recte metorū ex concoctione secessū efficiētes.

*Somnus est  
quies facultatū  
totius animalis*

*De uigiliâ.*

CAP. XCVIII.

**V**igiliæ quæ in ægrotantibus iam, aut ob dolorem, aut ob febrem, aut symptoma aliquod acutius fiunt, curationē in tractatione febrium habebunt. Verum nunc de sanorum uigiliâ dicendum est. Si igitur aut obstetitia, aut curam, aut aliquam animalem affectionem uigilarint, primū quidem tristitiam, & id quod molestum est, quantum eius fieri potest, recidemus, postea etiam iucundorum sonorum auditu, cogitationē ab illis abducemus. Et quidam sanè sonum aquæ placidum ad hoc machinantur, quo

*Vigiliæ ob  
affectiones animales*

Somnium indu-  
centia

definiti ad somnum deducuntur. Sed & balneis maxime uespertinis, ubi probe cōcoxerint, utantur: & uictu humectante, uelut lactucis & similibus. Et papaueris nigri quandoque folia uiridia obsonijs ammiscant. Et pisces concoctu faciles edant, uinoq; uberiore, tenui, non uetusto utantur. Vbi uero recinari uolunt, rosaceo caput ungant, aut oleo in quo papaueris capita aut mandragoras incocta sint. Quin & anethinum oleum non uetustum ex somnificis est. Noui & post praegressam lassitudinem, quietem derepente succedentem somnum induxisse. Sed & coitus moderatus idem hoc efficit. Alijsi aut caput aut pedes perfrigerentur, facile in somnum delabuntur. Si uero ob multitudinem, aut inaliciam cibi, stomacho grauati uigilant, nam & hoc factum esse nouimus: quomodo modum rursus alij præter consuetudinem à cibo abstinentes, aut modicum cibum capientes uigilant: considerare hoc, & causam recidere oportet.

De sopore graui.

CAP. XCIX.

Sopor pro-  
fundus

At si uice uersa in profundum ac altum somnum delabuntur, à frequentibus balneis ipsos arcebimus, & à perfrigerante inunctione. Apophlegmatissimis autem pituitam per os detrahentibus utemur. Et in summa, ad calidiorem ac sicciorem & modicam uictus rationem ipsos transferemus, quum hæc affectio à frigidiore magna ex parte, & humidior materia crebrum perfrigante, oboriatur.

Dioclis epistola præferuatiua.

CAP. C.

DIOCLES ANTIGONO REGI SALVTEM.

Antigoni regis  
præstantia

Quandoquidem cōtigis tibi, ut omnium regum maximus Musceus sis, & plurimo tempore uixeris, omniscis philosophiæ peritus sis, & in mathematicis disciplinis primas teneas: arbitratus sum eam philosophiæ partem, quæ de sanitate tuenda tractat, regiam esse, & ad te priuatim pertinere. Itaq; præscripsi tibi, unde morbi hominibus oriuntur, & quibus præcedentibus signis, & quomodo quis ipsis opitulari possit. Nam neque tempestas unquam in cœlo constari poterit, non præcedentibus signis quibusdam, quæ nautæ, ac reliqui multi experimunt homines sequuntur: neq; affectio in hominis natura unquam constari poterit, non signo aliquo præcedente. Tu uero his quæ à nobis dicuntur persuasus, certitudinem ipsorum assidue ris. Hominis corpus in quatuor partes diuidimus, caput, thoracem, uentrem, uelicam. Quum igitur affectio circa caput diutius futura est, uertigo præsignificare solet, & capitis dolor, & in supercilijs grauitas, aurium sonitus, temporum pulsationes, oculi mane tument, cum uisus hebetatione, nihil olfaciunt, & dentium gingiue attolluntur. Quum itaq; huiusmodi quippiam præsignarit, caput purgare oportet, nullo quidem medicamento, sed hyssopi aut origani capitibus acceptis, tritis, ac in ollula cum passis aut sape hemina dimidia seruatis. Hoc ieiunus sorbens os eo collue, & gargarissando humores detrahe. Hac curatione nō est alia leuior in affectionibus circa caput. Optimum est & sinapi aqua multa calida dilutum. Hoc ieiunus sorbens gargarissa, & humores detrahe. Cæterum caput contectum præcalere oportet, quo liquata pituita facile fluxioni obediat. Qui uero talia signa negligunt, his hi morbi succedere solent, lippitudines, glaucomata oculorum, aures rumpuntur, strumæ in collo fiunt, cerebri corruptio, gravedo, angina, capitis ulcuscula manantia a chores appellati, teredines, uua, capitorum defluxio, capitis ulceratio, dentium dolor. At ubi circa thoracem quid futurum est, ex his aliquid præsignificare solet. Sudor contingit per totum corpus ac thoracem, linguam crassam habent, salia aut amara, aut hirsuta spunt, sub costis aut scapulis dolores fiunt citra occasionem, hiatu oris alidui, uigiliæ, suffocationes, sitis, ex somno animus tristis, perfrigerationes pectoris & brachiorum, manuum tremor. His aut hoc modo prudenter auxiliari oportet. Vomitus fiat quàm optime à cœna absque reple-

Humani corpo-  
ris partes IIII

Capitis affecti-  
onũ præsignia

Theriack mor-  
borũ præsignia

A tione, sine medicamento. Commodi sunt & ieiunium uomitum, quos aliqui uocant syrmaismos. Oportet autem cum qui ita uomere uolet, radículas tenues praesumere, nasturtium, erucam, sinapi, portulacam, atque deinde accepta aqua tepida, sic uomere. Qui uero talia signa contemnunt, eis hi morbi succedere solent. pleuritis, peripneumonia, melancholia, febres acutae, phrenitis, lethargus, febris ardens singultuosa. Postquam uero circa uentrem affectio aliqua diutius consistere parat, ex his aliquid praesignat. Aluus prius constorquetur, & ipsa in seipsa turbatur. Tibi ac potus amari apparent, genua grauantur, lumbos flectere non possunt, dolores sunt totius corporis, citra occasionem, torpor crurum, febriculae paruae. Quum horum quid praesignificarit, aluum mollem praeparare oportet cum uictu, absque medicamento. Sunt autem plura & secuta, ex quorum usu falli non possis. Betae aqua mulsa cocta, allium coctum, malua, rumices, mercuriales, placentiae ac dulciaria ex melle. Omnia enim aluum subducunt. Si uero aliquid signum auget, citius succum ad omnia decocta ammisceto. Iucundiora enim sunt, & periculo uacant. Commoda est & brassica leuis aqua multa cocta. Huius succus bibitur cum melle & sale, ad quatuor heminarum mensuram. Cicerum quoque aut erui cocti aqua, pota ieiuno, eodem modo facit. Qui uero talia signa negligunt, has affectiones incurrere solent, alui profluuium, dysenteriam, lenteriam, uoluitum, coxendicem, febrem tertianam, podagram, syderationem, haemorrhoidas, articulare morbum. Porro ubi circa uelicam aliquid affectio diutius consistere uolet, haec praesignant. A paucis cibis repleti sibi uidentur, flatus sunt, rufus, decoloratio totius corporis, somni graues, urinae liuidae, & uix prodeuntes, tumores circa pudenda fiunt. Quum igitur tale quid praesignificarit, urinam citius odoratis securissime auxiliari oportet. Licet autem scituli & capri radices macerare in uino albo odorato, & hoc bibere quotidie ieiunum mane duorum cyathorum mensura, cum aqua in qua coctum malum daucus, myrsinum, helentium, quicquid talium habueris. omnia enim prosunt. Item cicerum maceratorum aqua pota cum uino, eodem modo. At negligentiibus talia signa, haec succedere solent. Aqua intercus, splen magnus, hepatis dolor, calculus, rheum affectio, urinae stillicidium, uentris repletio. Ceterum in omnibus talibus signis, infantibus lenes curationes adhibere oportet, maioribus efficaciores. Scripsi autem tibi etiam de mutationibus temporum per annum, in quibus singula fiunt, & quae in corpus assumere te oporteat, & a quibus abstinere. Incipiam autem a solstitio hyberno. Solstitium hybernum auget in hominibus defluxio nix, ac humiditas, usque ad aequinoctium uernum. Oportet igitur cibos calidiores assumere, & parcius bibere, & uinum metacius bibere, & ab origano macerato potare, & Venere uti sunt autem ad aequinoctium, dies nonaginta. Aequinoctium uernum auget in hominibus pituita, & dulces serofos sanguinis humores, usque ad pleiadum ortum, utere igitur odoratissimis & acerbis cibis, & labori deditus sis, & Venere utere. Sunt autem usque ad pleiadum ortum, dies quadraginta sex. Pleiadum ortus auget in hominibus bilem fuluam, & amaros serofos humores, usque ad solstitium aestiuum. Utendum itaque est dulcibus alui soluentibus, & quod minimam coeundum. Sunt autem ad solstitium aestiuum, dies quadraginta quinq. Solstitium aestiuum auget in hominibus bilem atram, usque ad aequinoctium autumnale. Utere igitur aqua frigida, & odoratis omnibus, & quod minimam Venere utere, aut minore lectione quod Venere scriptum est, adnite. Sunt autem ad aequinoctium autumnale, dies nonaginta tres. Aequinoctium autumnale auget in hominibus pituita, ac tenues fluxiones, usque ad Pleiadum occasum. Oportet igitur fluxiones detrahare, & acerrima ac odoratissima exhibere, & quod minime uomitu facere, labori deditum esse, & a coitu abstinere. Sunt autem ad Pleiadum occasum, dies XLVI. Pleiadum occasus auget in hominibus pituita, usque ad solstitium hybernum. Proinde acerbissima exhibere oportet, & uinum bibere quod iucundissimum, & pinguis uti, ac labori deditum esse. Sunt autem ad solstitium hybernum, dies quadraginta quinq.

Syrmaismus

Ventriculi affectionum praenotiones

Ventriculi morborum praenotiones

Temporis mutationibus corporis officia

## CAPITA SECVNDI LIBRI.

*In hoc libro totius tractationis secundo, de febribus totus sermo habetur: primum quidem de his quæ conferunt ad signorum cognitionem, & totam ipsarum curationem. Deinde de uniuscuiusque speciei febris generatione ac curatione. Et tertio loco de consequentibus ad febres symptomatis.*

Præfatio de febribus	Cap. I	Ardentiū febriū curatio.	Ca. XXX
Quor & quæ capita in febrilib. mor		Febris ex Erysipelatis affectione co	
his inquirere oporteat	Cap. II	gnitio ac curatio	Cap. XXXI
Principiū morbi quod dicat.	Ca. III	Hæcticarum febrium cognitio.	Ca.
Vnde cognoscendū salutaris ne sit		put XXXII	
morbus, aut perniciosus	Cap. IIII	Hæcticarum febrium curatio.	Ca.
Vnde cognoscimus acutū, aut diu/		put XXXIII	
turnum morbum	Cap. V	De semirertianis	Cap. XXXIIII
Quomodo prænoscamus an iudica/		De popularib. morbis.	Cap. XXXV
bitur morbus, aut soluetur.	Ca. VI	De peste	Cap. XXXVI
De iudicatorijs diebus	Cap. VII	De his qui ob crudorū humorum co	
Quod iudicatoria signa in principio		piā syncopē incidunt.	Ca. XXXVII
apparentia mala sint.	Cap. VIII	De his qui ob tenues humores syn	
Quomodo futurā iudicationē præ/		copen incidunt	Cap. XXXVIII
noscere oporteat	Cap. IX	De alijs occasionibus, ob quas syn	
Quomodo instantem iudicationem		copæ fiunt	Cap. XXXIX
cognoscamus	Cap. X	De dolore	Cap. XL
Quomodo factam optimam iudica/		De colliquatione	Cap. XLI
tionem cognoscamus	Cap. XI	De uigilijs in febribus	Cap. XLII
De pulsibus	Cap. XII	Curatio somni grauioris.	Ca. XLIII
De alui egestionibus	Cap. XIII	Curatio doloris capitis in febribus.	
De iurinarū significatiōe.	Ca. XIIII	Cap. XLIIII	
De sputorum notis	Cap. XV	De stomachi affectionum curatione	
Diætarum febrium cognitio ac cu/		Cap. XLV	
ratio.	Cap. XVI	De immodicis perfrigerationibus	
Putredinosarum febrium cognitio.	Cap. XVII	ac rigoribus in febre.	Cap. XLVI
Cap. XVII		De sudoribus	Cap. XLVII
Putredinosarum febrium curatio.		De tussi in febribus.	Cap. XLVIII
Cap. XVIII		De sternutatione	Cap. XLIX
Tertianarum cognitio	Cap. XIX	De ciborum inappetentia	Cap. L
Tertianarum curatio	Cap. XX	De magnafame	Cap. LI
Tertianarum spuriarum curatio	Cap. XXI	De canina appetentia	Cap. LII
Cap. XXI		Desiti	Cap. LIII
Quartanarum cognitio.	Cap. XXII	De lingua aspera	Cap. LIIII
Quartanarum curatio.	Cap. XXIII	Denausea	Cap. LV
Quotidianæ cognitio.	Ca. XXIIII	De bilis uomitu	Cap. LVI
Quotidianæ curatio	Cap. XXV	De singultibus	Cap. LVII
De Hepiala febre, & rigore calefce/		De aluo suppressa ac laxa in febri/	
renequeunte	Cap. XXVI	bus	Cap. LVIII
De cōtinuis febribus.	Cap. XXVII	De sanguinis stillatione, & sangul/	
Continuentium febrium cognitio ac		nis è naribus eruptione.	Ca. LIX
curatio	Cap. XXVIII	De animi deliquio	Cap. LX
Ardentium febrium cognitio.	Ca.	Vlcerationis circa os sacri curatio.	
put XXIX		Cap. LXI	

## PAULI AEGINETAE REI MEDICI

CAE LIBER II. IANO CORNARIO

Medico Physico interprete.

De febribus, ex Galeno &amp; alijs pluribus.

CAPVT I.



OST sanitatis tuendae doctrinam, ad agrotantium iam correctionem progredientes, à morbis similium partium, uelut simplicioribus, initium sumemus. Tales autem sunt maxime qui febriles appellantur. Rursus igitur Orisbasi ex Galeno compendiarie tractatione quam maxime, imò etiam aliorum plurimorum utentes, nos quoque paucissima quaedam relicta apponemus.

Morbi similium partium, simplices, febriles

Quot &amp; quae capita in febribus maxime morbis inquirere oportet.

CAP. II.

PRIMUM quidem inquirere oportet, an salutaris sit morbus, aut perniciosus. Et si salutaris, utrum acutus aut diuturnus. Atque haec quidem etiam in alijs magnis morbis inquirenda sunt. Et tertio, utrum accuratim iudicabitur, quod maxime febrium proprium est, aut particularim soluetur.

Principium morbi quod dicatur. Ex Galeno.

CAP. III.

NON idem est capitis dolor, & febris: quemadmodum neque uigilia, & ciborum inappetentia, et totius corporis grauitas, aut lassitudinis sensus. Verum singula haec aliud quiddam à febre sunt, & febre annunciant. Febris irruens, & praesertim acuta, neque nos, neque idiota aliquem latere potest. Detur autem, si ita uolens, etiam ipsam latere, ac mirum fuerit, si ultra horam aegrum lateat. Quapropter illud tempus principium morbi esse dicemus, quando manifeste febre auspicari debuerunt.

Febris irruens  
Principium morbi

Vnde cognoscendum salutaris ne sit morbus aut perniciosus.

CAPVT III.

PERNICIOSA signa sunt, facies cadauerosa, nasus acutus, oculi caui, & reliqua ab Hippocrate relata, si haec non ex uigilia, aut uacuatione, aut inedia acciderunt. Et lucis splendorem fugere, aut lachrymari, non ex aliqua externa causa, neque oculis propriam affectionem habentibus: & alterum oculum minorem apparere: aut etiam albas ipsorum partes rubicundas, aut luidas, aut nigras, aut etiam sordes in ipsis: & in somnis albas oculorum partes apparere, palpebris fortis non commissis, nisi multa euacuatio facta fuerit, aut hoc symptoma ipsis ex consuetudine sit: & dentibus frendere, aut delirare, aut floccos legere, aut festucas decerpere. Attendendum est & ad decubitus. Nam supinum decumbere, & uelut resolutum, aut etiam de lecto defluere ad pedes, extremae debilitatis signum est. Et adhuc peius, frigidum respirare ex naribus & ore: & pulsum obscuritas, ac densitas, & deficere ipsos. Et sudare ad animi deliquium, perniciosum signum est. Si igitur omnia relata signa, aut plura ex his apparuerint, aut etiam pauciora, uerum ualida: nullo praesente salutis signo, mors euitari non potest. At spiratio bona, & pulsus bonus, & mente ualere, & bene se habere ad ea quae offeruntur: & facies & decubitus similis sanorum, bona & euasuri signa sunt. Et in summa, quae maxime sunt contraria naturalibus, perniciosissima sunt. Quae uero similia, salutaria. Ceterum de praenotione ex urinis, alui egestionibus, & spuitis, paulò post dicetur.

Signa perniciosissima

Signa salutaria

Vnde cognoscimus acutam, aut diuturnam morbum.

CAP. V.

MORBI tempus ex quatuor notis cognoscitur, ex morbi ipsius motu, ex agrotantis habitu, ex pulsibus, ex febrium specie. Ex morbi motu hoc modo. Si quidem quatuor particularis exacerbationis tempora, citius & in minimo tempore praeterierint, peracutus fuerit morbus, cuius extremus terminus

Morbi motus  
Morbus peracutus

Morbū acutū  
tū

Morbū diu-  
tū

timū

terminus est septimus dies, plerūq; uero quarto die iudicatur. Si uero in an-  
pliori quā in hoc est tempore, sed ut non excedat duodecim horarū spaci-  
um, acutus praedicitur, qui intra decimum quartum diem iudicatur. At si  
ad plures horas se extendat, ut principium solum & augmentum, in maiore  
diei ac noctis tempore perficiat, talis morbus diuturnus est. Quod si non  
habeat morbus particulares exacerbationes, sed ab initio ad finem usque,  
uelut una sit exacerbatio, quemadmodum in febribus continendis, etiam  
hunc ex acutis esse dixeris. Ceterum ex egrotantis habitu hoc cognos-  
citur, si facies, aut etiam reliquum corpus, moderatam iam habeat contra-  
ctionem, acutum morbum indicat. Si uero penitus contractum non est, neq;  
confidit, diuturnus erit. Copia enim materiae indicatur longiore tempore  
concoquenda. At uero ab arteriarum motu sic. Magnus & uehemens, &  
celer, & densus pulsus, acutum morbum indicat, contrarius diuturnus. Ve-  
rum ex febrium specie cognoscitur, quatenus calidae & ardentes, acutum  
morbū indicant. Molliores & uelut delitescentes intus, diuturnum.

Quomodo praenoscantur an iudicabitur morbus, aut soluetur. CAP. VI.

Iudicatio per  
excretionē,  
per abscessū

EX iam relatis etiam hoc praenoscimus, nimirum ex febrium specie ac tem-  
pore, & fortassis in totum ex febrium specie. Calidae enim & ardentes,  
& breuis temporis sunt, & per excretionē iudicari tales solent. Molliores  
autē, & diutius durant, & in abscessus plerūq; crumpunt. Et ex relatis ma-  
nifestum sit, quod non solum quando morbus iudicatur, praenoscimus, sed  
etiam quomodo iudicabitur. Nam acutis magis per excretionē contingit  
iudicationes, quemadmodum diuturnis foribus per abscessum.

De indicatorijs diebus. CAP. VII.

Dies decimus  
tertius

Dies indica-  
torij

Iudicatorij dies partim frequenter, & fideliter, ac bene solunt, perfec-  
tē, & manifestē, & cum certis notis, partim contrario modo. Verū de-  
cimus tertius medium quodam modo locum habere comperitur. Et sunt  
quidem ex ipsis qui iudicare solent, si uel modicum naturae impetum nanci-  
scantur, uelut est septimus & decimus quartus. Multi uero, in uehementi-  
bus quidem moribus iudicant, alias autem non possunt. Quin neq; omnes  
boni, similiter boni sunt neq; omnes mali, similiter mali. Neq; iuxta ordinē,  
utilitatem aut malignitatem habent. Primi igitur ordinis de numero bono-  
rum sunt hoc modo. Optimus omnium est septimus & decimus quartus.  
His proxime accedit nonus, & undecimus, & uigessimus. Et huic prope ac-  
cedit decimus septimus, & quintus. Et post hos quartus. Et post hunc ter-  
tius, & decimus octauus. Verum his contrarij secundī ordinis sunt hi. Pes-  
simus, & cum periculo & obscurē iudicans, uelut ex diametro septimo op-  
positus, sextus est. Huic autem similiter octauus & decimus, post quos duo  
decimus, & decimus sextus, & decimus nonus. Inter hos autem mediū lo-  
cum habet decimus tertius, ut qui non similiter reijci possit, uelut hi qui in  
secundo ordine sunt, neq; similiter his qui primi ordinis soluere sunt soleat.  
Atq; hoc quidem ordine dignitatis Galenus usus est. Verū iuxta numerō  
ordinem boni sunt, tertius, quartus, quintus, septimus, nonus, undecimus,  
decimus quartus, decimus septimus, decimus octauus, uigessimus. Mali ue-  
ro, sextus, octauus, decimus, duodecimus, decimus sextus, decimus nonus.  
Medium autem locum habet decimus tertius. Ex his iudicatorijs quidam  
etiam aliorum indicatorij sunt, quos Hippocrates etiam contemplari iussit,  
& contemplandos nominauit, eo quod iudicationes in alio iudicatorio die  
futuras, praedicerent, & contemplandas exhibeant. Velut est quartus, qui  
futuram in septimo die iudicationem praedicit, si sudores aliquos, aut hu-  
miditates, aut eiusmodi quasdam particulares euacuationes, aut significa-  
tiones prius non factas efficiat, aut etiam concoctionis signa ostendat. At  
Galenus etiam sexti indicatorij esse dicit diem quartum, etiam si ille non  
sit bonus. Verum undecimus decimiquarti indicatorius est, & decimus sex-  
tissimus uigessimi. Itaq; usq; ad decimum quartum diem contentiosissimae iur-  
dicat

Quartus dies  
sexti index

ditiones fiunt. proxime uero ipsis accedunt, quæ usq; ad uigefimum sūt. Quæ uero post uigefimum, usq; ad quadragefimum, paulatim contentione remittant. Sunt aut primæ dignitatis, uigefimus septimus, trigefimus quartus, & quadragefimus. Post hos uero uigefimus quartus, trigefimus primus, & trigefimus septimus. Sed reliqua intermedia multitudo, à uigefimo usq; ad quadragefimum, in totum nō iudicat. Quemadmodum omnes post quadragefimum diem, penitus exoluti sunt, concoctionibus magis ac abfcessibus, non iudicationibus, soluentes morbos. Proinde reliquos post quadragefimum diem, penitus contemnere uidetur Hippocrates. Sexagesimus tamen ac octogefimus, & centesimus uigefimi ratione habet. Post hos aut, alios morbos in septem mensibus, alios in septem annis iudicari dicit, alios ut uerisimile est, in duobus aut tribus annorum septenariis.

Quod iudicatoria signa in principio apparentia, mala sint.

CAP. VIII.

Concoctionis signa nunquam male apparent. Omnis enim cōcoctio natura præuolente contingit, & propterea semper bona existit. At iudicatoria signa quandoq; male apparent, eo quod iudicatio ambigua est, & modo bona, modo mala contingit: quemadmodū antea de iudicatorijs diebus dictum est. Neq; igitur in principijs, neq; in augmentis, ipsa apparere oportet, sed in uigoris tempore, in quo natura morbo superior euadit.

Quomodo futuram iudicationem prænoscere oporteat.

CAP. IX.

Si augeantur, & anticipent exacerbationes, & multò uehementiores fiant, & per tertium diem significationem de se præbeant, & signa concoctionis in urinis, aut alui egestionibus, aut etiam sputis compertantur, omnium maxime breui morbus iudicabitur. Si uero lentè moueantur, & eadem hora intrant, quotidie contingentes exacerbationes, post longius tempus futuram iudicationem expecta. Sed & eorum qui à rigoribus uehementer febriant, ut solutio fiat, fieri non potest, antequam rigor mitigetur. Nam hoc nihil remittente, contingere nequit, ut iam uigorem morbus acceperit, quapropter multo minus declinationem sperare oportet.

Quomodo instantem iudicationem cognoscamus.

CAP. X.

Molesta morbi tolerantia omnem iudicationem præcedit. Et si quidem in die iudicabitur, noctu præcedit. Sin noctu, in die. Et symptomata accedunt, uelut est capitis dolor, qui prius non fuit, & collum condolet, & præcordium reuellit, & spirandi difficultas repentina, & alia multa difficilia symptomata prius non facta apparent. Et si his contingentibus, pulsus non conderint, sed magis in altum tollantur, & uehementiores fiant, conseruetur etiam insuper iudicatorius dies, & hic maxime ex bene iudicantibus, non solum futuram iudicationem, sed etiam bonā ipsam expecta. Nec uero consisteris inter hæc, si delirantem hominem aut exiliētem uideris. Nam & hæc lationis humorum sursum uersus signa sunt, quemadmodum rursus deorsum alia, & imi uentris morsus, & tormen circa umbilicū, & lumborum dolor, & murmuratio. Quandoq; etiam alia eiusdem generis signa apparēt. Et ad hæc si per hæmorrhoidas æger uiuari consueuit, etiam huius circuitus tempus concurret. Similiter & de mensibus, si mulier fuerit quæ ægrotat, nihil absurdū est per talem rursus euacuationem, fieri iudicationē. Sed & sudores, ex prægressis uelut uerisimile est madoribus, & præsertim in die iudicatorio factis, & ex meatu apertione prænoscenti sunt.

Ceterum euacuationem per supernas partes, & his maxime cognoueris. Inspicere enim iam ad prædicta oportet, etiam ægrotantis faciem, & si qua in ipsa pars palpitet, aut uenæ in temporibus pulsent, aut gena, aut nasus, aut oculus rubicundior fiat, magis sperandum est. Si uero etiam inuiri lachrymentur: aut etiam splendores oculis obuersari imaginentur, & manus ad nases adhibcant, uelut sculpturi, tunc quidem non amplius fluxurū, sed iam fluentem sanguinem uidebis. Vbi enim semel atq; iterum scalpserint, erumpit. Morius autem stomachi, & inferni labij tremor, iudicatio-

nem

Signa concoctionis semper bona

Signa iudicatoria quando bona sint

Iudicationis breui futuræ nota

Iudicationis instantis nota

nam per uomitū saepe nobis indicauerunt. Et haec quidem sufficiunt. Accedit autem ad haec, & aegroti aetas, & natura, spem confirmans, & insuper anni tempus, & praesens constitutio. Si enim adolefcens fuerit aegrotans, aut alias natura calidus, aut multi sanguinis, adhuc magis sperabis. Si uero etiam antea ipsi sanguinis euacuatio, aut aegrotanti, aut sano contigit, uelut antea diximus; hoc uel solum sufficiens est, ad sanguinis eruptionis spem exhibendam. Quod si etiam tempus anni uideris aestatem, aut non quidem aestatem, sed alias calidam praesentem aeris constitutionem: & saepe illam potest per sanguinis eruptiones fuerint iudicati: & plenum sanguine corpus fuerit, & consuetarum excretionum suppressio: & haec spem tuam augere poterint. Similiter autem & de reliquis euacuationibus ratiocinari oportet. Si uero horum quidem nihil uisum fuerit, uerum molesta morbi colorantia, in quodam iudicatorio post uigessimū die fiat, & hoc morbo in uigore consistente: & dolores in quibusdam articulis, aut circa aures, aut etiam in alijs partibus fiant, aut non quidem dolores, sed sudores particulae iuxta aliquam partem assidue oboriantur: per abscessum iudicationem expeciare oportet, & circa illam maxime partem abscessum futurum, ubi sudores aut dolores, aut tumores facti fuerint.

iudicationis  
per abscessum  
note

Quomodo faciam optimam iudicationem cognoscere. CAP. XI.

Si quidem euacuatio conueniens post concoctionem fiat, & febris soluitur in eo qui iudicatur, & idem ab alijs symptomatis liberetur, & proportionem euacuationis coloratio fiat, & pulsus meliorem habeat, & ad euagendum robustior euadat, & quod omnium securissimum est, bona tolerantia consequatur: haec optima est iudicatio. Si uero quid ex his defecerit, tantum ab optima abest, quanta fuerit uis eius quod deficit.

iudicationis  
bonae facili  
note

De pulsibus, ex Galeno. CAP. XII.

Pulsus est motus cordis & arteriarum, per distentionem ad contractionem contingens. usus eius duplex est. Per distentionem enim, qua uelut expanditur ac aperitur arteria, frigidus aer ingreditur, uentilans & suscitans uitalem firmitatem. Vnde etiam animalis spiritus generatur. per contractionem autem, qua arteriarum extremitates ad medium conueniunt ac cohaerent, excretio fuliginosarum superfluitatum contingit. Haec uero arteriae oblongae sunt uasa caua, uelut uenae, & duas tunicas habent, tum propter relaxatum motum, tum quod sanguinem & spiritum continent: & enascuntur quidem ex corde, disperguntur autem per omnes corporis partes. Omnes igitur arteriae eodem modo pulsant, & inter se, & cum corde, ut ex una de omnibus rationem inire possis; non tamen fieri potest, ut omnium motum quis similiter sentiat, sed earum quae sunt in excarnibus corporis partibus promptius, obscurius autem earum quae sunt in carnosis. Neque autem decentior rem, neque usui commodiorem aliam attigeris, si eas quae ad manuum iuncturas sunt omiseris. Est igitur primum genus pulsuum, quod circa motum tempus, & in distentione, & in contractione consideratur. Differentiae ipsius sunt, uelox, tardus, & moderatus. Nam quicquid mouetur, aut uelociter, aut tarde, aut medio modo, in tempore mouetur. Velox itaque est, qui in modico tempore, per multum spatium mouetur. Tardus, qui in multo tempore, per modicum spacium mouetur. Moderatus, qui medio modo circa motum se habet. Alterum genus est, circa distentionis quantitatem. Quandoquidem enim omne corpus tres habet dimensiones, longitudinem, latitudinem, & profunditatem: corpus autem est etiam ipsa arteria: tres habere & hanc dimensiones necesse est. Verum dum secundum naturam se habet animal, moderate ipsam undequaque distendi comperies. Vbi uero praeter naturam se habet, aliquando deficit, aliquando excedit aliquid, iuxta quamcumque tandem dimensionem. In hoc autem meminisse oportet, qualis erat pulsus naturalis. Et si quidem latitudine maior comperiat, latum uocare. Si uero longitudine, longum. Si profunditate, altum. Clarum uero est quod

Pulsus quid sit

Spiritus animalis  
generatio  
ratio

Arteriarum pulsus  
contactus  
ubi sit  
commodus

Pulsuum genera  
X



quod etiam contrarios ipsis, & naturali minores, iuxta eandem rationē nominare oportet, angustum, breuem, & humilem. Ex his uero qui in omnibus dimensionibus similiter ad statum præter naturam mutantur, is qui penitus imminutus est, paruius qui auctus, magnus appellatur. Tertium genus pulsuum est circa facultatis firmitatem. Differentiæ ipsius tres sunt, uehemens, languidus, & moderatus. Vehemens est qui tactum medici robuste ferit. Languidus qui ægrè & debilitè. Moderatus qui medio inter hos modo, quem quidam naturalem esse putauerunt. Nam ex ira & exercitijs, uehementiorem fieri pulsuum dicunt, qui non sit naturalis. Verum his Galeus se opposuit, non durabilem, sed qui prompte transmutetur, esse dicens eum pulsuum, qui ob non naturales causas uehementior efficitur. Qui igitur uehementior est, & non prompte mutatur, hic naturalis & moderatus fuerit. Quartum genus est circa instrumenti, corporis arteriæ dico, compagem. Differentiæ huius item tres sunt. Aut enim durius est naturali instrumentum, & uocatur pulsus durus; aut mollius, & mollis dicitur: aut medio modo se habet, & iuxta hoc moderatus appellatur. Quintum genus pulsuum est iuxta quantitatem humoris arteriæ. differentiæ ipsius sunt, plenus, uacuus, & moderatus. Nam & omne uas, aut plenum est, aut uacuum, aut moderatum humore habet. Plenus igitur pulsus est, uelut Archigenes definiit, qui solidiorem exhibet arteriam, & occursum ipsius humore repletum. Vacuus autem qui bullosam arteriæ excitationem facit, ut ad digitorum impressionem, progressus per uacuum occurrat. Hæc quinque pulsuum genera iuxta unum arteriæ motum consistunt. Quandoquidem uero qualitas caloris cordis, magis quodam modo manifestè circa arteriam apparere uidetur, uoluerunt & hoc genus pulsuum sextum ad prædicta annumerare. Ex reliquis generibus, tum quæ iuxta unum, tum quæ iuxta plures pulsus sumuntur, est & quod circa quietis tempus consistit, & quod circa rythmum, & quod circa æqualitatem ac inæqualitatem, & quod circa ordinem ac ordinis turbationem. Quod igitur circa quietis tempus consistit, & septimum est à primo, diuisi dicitur in densum, rarum, & moderatum. Quum enim arteria duplici motu moueatur ex contrarijs motibus compositio, necesse est ipsi etiam duplices quietes coincidere, alteram post distentionem ante contractionem, alteram post contractionem, ante distentionem, quam etiam sensui percipi posse quidam negauerunt. Quare inter duos motus, una quies media intercedit. Cui igitur multum est quietis tempus, hic rarus est. cui breue, densus. cum medio, moderatus. Octauum genus pulsuum circa rythmum consistit. Est autem rythmus in summa, habitus aut proportio temporis ad tempus. In pulsu uero, uelut aliqui uolunt, temporis motus ad tempus quietis, uelut distentionis & contractionis, ad aliquam intercedentem quietem. Verum iuxta aliorum sententiam, temporis motus ad motum, uelut distentionis ad contractionem: aut quietis ad quietem, uelut internæ ad externam. Differentiæ rythmi primæ duæ, pulsus boni rythmi, & sine rythmo. Quin autem dico sine rythmo, non nullum habentem rythmum dico: hoc enim fieri non potest: sed eum qui malum rythmum habet: quemadmodum sine uoce, & sine collo esse dicimus, eum qui malam uocem, & malum colium habet. Pulsus autem sine rythmo triplex differentiæ est. Alius enim præter rythmum est, moderatam habens boni rythmi peruersionem. Alius alterius rythmi, amplius peruersus. Alius extra rythmum, qui bonum rythmum penitus corrumpit. Velut exempli gratia, si in puero notas colligere uelis, proprius ætati puerili pulsus iuxta rythmum contingens, boni rythmi pulsus appellatur. Qui uero rythmum corrumpit, sine rythmo. Et corruptus qui quidem propinquæ ætatis rythmum assumit, pulsus præter rythmum appellatur. Qui uero ætatis uigoris, alterius rythmi dicitur. At qui neque huius ætatis rythmum conseruat, extra rythmum nominatur. Notandum genus pulsuum est quod in omnibus relatis generibus reperitur, circa

*Pulsus naturalem  
lis putatus*

*Rythmus quid  
sit*

*Voces non prim  
nationem, sed  
corruptionem  
significantes*

*Systematicum  
pulsus genus* æqualitatem ac inæqualitatem consistens. Hoc aut in uno pulsu, aut in plu-  
 ribus consideratur. Et hoc à plurium congregatione systematicum appella-  
 tur, de quo uelut manifestiore primū dicendum. Aequalis igitur pulsus est,  
 qui consequenter æqualis est, aut magnitudine, aut firmitate, aut uelocita-  
 te, aut aliquibus alijs generibus, aut etiam omnibus. Inæqualis uero est, qui  
 consequenter inæqualis est. Si enim uerbigratia, omnes consequenter ma-  
 gnitudine æquales fuerint, æqualis magnitudine talis pulsus uocatur. Si ue-  
 ro primus & secundus & tertius æquales apparuerint, quartus autem inæ-  
 qualis, clarum est quoddam talis pulsus magnitudine inæqualis appellatur. Huius  
 generis sunt, & Intermittens & Intercidens. Non enim solum circa  
 unum aut plures magnos, unus apparet minor: sed aliquando etiam to-  
 tus motus penitus perit, & intermittens pulsus dicitur: Quemadmodum  
 alter intercidens huic contrarius, quum expectata quiete intermedia, ue-  
 lut superfluius quidam incidit. si uero secundus paulo minor fiat primo,  
 & tertius secundo, & quartus tertio, in æqualitate, & hoc ulterius con-  
 tingat, tales pulsus Miurizontas & Miuros, hoc est decurtatos appella-  
 nt, à figuris in acutum desinentibus nomen transferentes. Et qui qui-  
 dem ex ipsis perpetuò minuuntur, & nunquam à tali affectione cessant, in  
 absolutam motus interceptionē desinunt: & uocamus ipsos decurtatos de-  
 ficientes. Qui uero cessant, duplicem differentiam habet. Quidam enim ex  
 ipsis, paruitatem eam in qua primum cessarunt, seruant semper. Quidam ue-  
 ro rursus augentur, aut ad æqualem ei quæ ab initio fuit magnitudinem re-  
 deunt, aut ad minorem, aut ad maiorem: atq; hi decurtati recurrentes ap-  
 pellantur. Fiant etiam in unius pulsus inæqualitate decurtati pulsus, de qui-  
 bus paulo post suo loco dicitur. Ac huiusmodi sanè est congregatoria ap-  
 pellata pulsus inæqualitas. Quæ uero in uno pulsu consistit, aut circa unā  
 arteriæ partem, aut circa diuersas contingit. uelut in tempore motus, circa  
 unam quidem arteriæ partem inæqualitas dicitur, quum aliter inceperit, &  
 aliter desierit moueri arteria, circa unum digitum. incipiens quidem uelo-  
 cior, desinens autem tardior, aut uice uersa. Hoc autem trifariam contingit.  
 aut cōtinuo manente motu, aut interciso, aut recurrente & uelut his ferien-  
 te. Siquidem igitur continuus manens, & non intercisus, à uelocitate ad tar-  
 ditatem, aut uice uersa mutatus fuerit, inæqualiter uelox talis pulsus est, &  
 dicitur. Si uero intercisus quieuerit, & de cætero uelocior appareat, dorce-  
 diffans appellatur, metaphora à dorcade animante accepta, quæ saltando  
 sublimis in aëre consistit, & improuifum quandam secundum motū priore  
 uelociorem facit. At si post distentionem recurrerit, & prius quàm contra-  
 hatur penitus, iterum tactum ferierit, talis pulsus bis feriens appellatur. Huius-  
 modi uero quippiam & in incudibus fieri uidere datur, quū mallei qui-  
 dem semel per manum incussi ipsos ferierint, uerum incudis renixu relin-  
 gunt, rursus aut etiam tertio feriant. Non solum autem circa motus tempus, in  
 æqualitatem circa unam plagam, in una arteriæ parte fieri contingit, sed et-  
 iam circa facultatis firmitatem: non autem circa dimensionum quantita-  
 tem: nō enim fieri potest ut idem pulsus in eadem parte, magnus ac paruus  
 fiat: nec circa aliud pulsuum genus, sed in partibus diuersis. Cæterū cir-  
 ca diuersas arteriæ partes, in uno pulsu inæqualitas duplex fit. Quandoque  
 continuo manente motu, & circa aliquos digitos arteria uelocius mota, iux-  
 ta aliquos tardius. quandoque uero etiam interciso, ut aliqui digitum motum  
 depræhendant, aliqui non. Sed & circa distentionis quantitatem, inæqua-  
 litas in pluribus partibus manifesta est. Cuius generis sunt decurtati circa  
 unam plagam, & nutantes ac circumnutantes. Si enim circa interiorem di-  
 gitum, magnus & qui in gibbum eleuetur pulsus occurrens, hinc iuxta ra-  
 tionem minuatur, ita ut circa exteriorem arteriæ partem, ad agroti pollicem  
 minimus appareat, Myurus id est decurtatus appellatur, ad similitudinem  
 caudæ animalis muris: aut Miurus, quod insar caudæ decuratur ac immi-  
 nuatur.

anatur. Si uero circa medios digitos, magnus & qui in gibbū eleuetur oc-  
currens, utrinque minuatur minor apparens: hunc Archigenes nutantem &  
circumnutantem appellauit, clare declarare uolens circa distentionem bre-  
uitatem, cum utriusque extremitatis uelut nutatione. Non enim uelut acer-  
uatim recisus, sed uelut inflexis utrinque partibus, ad breuitatem contractus  
est, quum sit magnitudine decurtatus circa utraque partes. At ubi inæqua-  
litas circa magnitudinem, ut aut maturius aut tardius contingat assumptæ  
rit, & undosus, & uermiculantes pulsus fiunt. Si uero etiam positus differen-  
tiam assumpsit, & conuulsorij, & agitatorij appellati constituuntur. Inci-  
piendum igitur est ab undosis, in quibus non simul apparet circa talem in-  
æqualitatē, tota arteria distendi, sed aliqua ipsius pars primo, aliqua secun-  
do, aliqua tertio, alia quarto, motu continuo manente, ad elevationis unda-  
rum similitudinem. Et quidam in directum tendentem undam habent. Qui-  
dam ad obliquum declinantem. Et quidam in breui secundum longitudi-  
nem dimensione, altitudinem magnam habent, quidam uice uersa. Et aliqui  
latitudinem, aliqui angustiam. Similiter autem & circa uelocitatem & fir-  
mitatem inæqualiter se habent. Si uero undosus totus ad paruitem immi-  
nuitur, uermiculans appellatur, uermiculi gressui similis. Quemadmodum  
acrem undosum pulsus minorem factum uermiculans excipit, sic uermicu-  
lantem formicans, quum pereuntibus motibus multis, in unum & eundem  
penitus paruum delierit. Appellatus & hic est à similitudine ad animal for-  
micam, tum propter paruitem, tum propter motus speciem. Est enim ual-  
de paruus formicans, quo minor alius non existit. Similiter autē & languis-  
simus omnium ac densissimus, non tamen uelox, uelut Archigenes puta-  
bat. Huic propinquus est pulsus Hecticus appellatus. Quemadmodum e-  
nim febris hectica, ita etiam pulsus hecticus est, qui nullam magnam muta-  
tionem facit, sed semper similiter manens, connectensque uelut ab initio in-  
cepit, & nunquam desinens, toto habitu morbose mutato. At uero con-  
uulsorij pulsus, dum utrinque ab extremitatibus retrahuntur, & tenduntur ac  
conuelluntur, uelut chordæ cuiusdam intentæ sensum exhibere uidentur.  
Vetum in agitatorij nihil tale est, sed maior in his distentio est, ut quædam  
arteriæ partes uno & eodem tempore sursum ferantur. Et sanè motum ipso-  
rum iaculis quis maxime assimilare possit, quæ uehementer emissæ, dum ui-  
brantur ac agitantur, celeriter feruntur. Porro pulsus secantis quippiam mo-  
do se habens, tunc est quum pars aliqua arteriæ distenta esse apparet, aliqua  
uero non, duntaxat nimirum ipsa apparente. Habet etiam quid agitatorij hic  
pulsus, & uelox quidem est ac densus, non autem semper magnus. Deci-  
mum supra relata pulsuum genus est, quod ex inæqualitate generatur, & cir-  
ca ordinem ac ordinis turbationem consistit. Nam ordinatus ac inordina-  
tus, secto inæqualis, in æqualem iuxta circuitus, & in penitus inæqualem;  
ex utroque segmento generationem habent. Ordinatus quidem circa æqua-  
litatem circuitum. Inordinatus autem rursus circa absolutam inæqualitatē.  
Etenim æqualis pulsus penitus est etiam ordinatus, si quidem consequen-  
ter æqualem ipsum esse diximus. Inæqualis autem non penitus inordina-  
tus. Si enim æqualitatem corrumpat, circuitum autem aliquem seruet, uel-  
ut uerbi causa, in quantitate distentionis, si duos contingat fieri magnos,  
& unum paruum: deinde rursus duos magnos, & unum paruum, & sic con-  
sequenter; uocabitur talis inæqualis quidem, uerum ordinatus. Si uero ad  
hoc quod æqualitatem corrumpit, neque ordinem aliquē inæqualitatis con-  
seruet, supra inæqualitatem etiam inordinatus est. Similiter etiam in alijs  
generibus. Cæterum ex inordinatis quidam per totum inordinati sunt,  
neque minimum quendam circuitum conseruantes: quidam uero iuxta cir-  
cuitus ordinati. Nam in quantum continuum ordinem non seruant, uoca-  
buntur inordinati: in quantum uerò per longum, circuitum quendam ser-  
uant, iuxta circuitus ordinati. Velut si cōtingat duos fieri magnos, & duos  
paruos:

Undosus pulsus

Vermiculans  
pulsus  
Formicans  
pulsusHecticus  
pulsusConuulsorij  
pulsus  
Agitatorij  
pulsus

Secans pulsus

*Medij pulsus  
quorum sint,  
et quorum nō*

*Pulsuum  
causae*

*Magnus pul-  
sus quas causas  
requirit*

paruos, deinde tres magnos, & tres paruos, & quatuor magnos, & totidem paruos. Et rursus uelut reflectētes, duos magnos, & duos paruos, & tres magnos ac totidem paruos. Et consequenter eodem modo. Illud porro sciendū est, uniuscuiusq; aliorum contrariorum medium quendam esse. Verum æqualis & inæqualis medius nullus est: neq; ordinari & inordinari, præterq; si iuxta circuitus ordinatum, medium dicere uelis, inter ordinatum & inordinatum. Et aliorum omnium medij, secundum naturam se habēt, excepto eo qui inter uehementem & languidum medius est. Inter hos uero æqualis solum secundum naturam est. Alij autem præter naturam, & inæqualis, & ordinatus, & inordinatus. Hæc sunt genera pulsuum omnia, & differentie ipsorum secundū genera. Quidam uero etiam alia duo ad hæc annumerāt, alterum circa positionem arteriæ, iuxta quod sursum ac deorsum, & ad dextra, & ad sinistra, traducta esse uidetur: alterum quod circa hoc ut aut maturius, aut tardius contingat, consistit. Ex quibus undosos & agitatorios pulsus esse diximus. Et nos quidem breuīs cōpendij ergō, simplices tantū differentias tradidimus. Verum ex relatis facile has componentes, etiam cōpositas inueniemus. Cæterum consequens fuerit etiam causas pulsus mutantes referre, ad quas sequitur etiam prænotio quæ ex ipsis contingit. Initium autem à magnitudine sumemus, quoniam hæc alijs manifestior existit. Magnus itaq; fit pulsus, aut ob urgentem necessitatem, quæ est caliditas in corde redundans, externam appetens refrigerationem, & uelut uentilationem: aut ob corporis gracilitatem, uelut paulò post ostendemus. Augescit autem caliditas, aut propter naturales causas, uelut ætatem uigoris, aut puerilem, aut simpliciter calidum tempus, item & regionem, & temperaturam calidiorem. Aut ob causas non naturales, uelut aërem nos ambientem calidiorem, balnea calida, exercitia, cibos, uinum, medicamenta calidiora. Aut propter causas præter naturam, uelut intemperiem calidam, aut humorum putrefactionem, aut iram, aut similes. Discernes autem singulorum causarum pulsus, ex eo quod causæ naturales, durabilem & quæ ægrè transmutetur magnitudinem faciūt. Reliquæ uero facile mutabilem, adeo ut etiam adhuc tangente te sæpe, aut omnino paulò post, penitus discedat. Et magnis quidem pulsibus propter balnea calida, etiā mollitudo accedit: quemadmodum rursus his qui ob calidam, & maxime cum siccitate cōiungunt intemperiem, tales sunt, duricia. Qui uero moderate se exercuerunt, aut defricti sunt, medio modo se habent circa duriciem ac molliciē. Verum partes circa peccus calidiores magis habent, quod sanè etiā iratis contingit. At magnis pulsibus ob uinum, aut cibum, aut iram, ad magnitudinē etiā uehementia accedit. Quicūq; uero occultare student iram, aut aliud quid factum ab ipsis, citra medici permissionem: quemadmodum ille qui calidum accepit medicamentum, & cælare id uoluit medicum simul cum tactu manus interrogantem: his ad magnitudinem etiam manifesta inæqualitas adest. Ad hoc uero etiam ægroti mores ac consuetudo, nō parum conferunt ad dignotionem. Consuetudo quidem medicamenti dedita. Mores autem improbi, & ad suspicionē eximendam callidi. Qui uero ob humorum putrefactionem magnus est, is ad magnitudinem etiam contractionē magis festinantem habet. Cæterum ad hoc ut magnus fiat pulsus, non solum necessitas sufficit, sed opus est etiam facultate inferuiente, & moderato instrumento, iuxta duriciem ac molliciē. Aucta itaque in corde caliditate, ob quamcūq; tandem ex relatis causis, primū quidem fit magnus pulsus. Vbi uero non succederit necessitati magnitudo, statim ipsi etiam uelocitas accedit. Si uero neq; sic succederit, etiam densitatem assumit. Parui autē & tardi ac rari pulsus, à contrarijs fiunt. At uero ubi à magno & ueloci ac denso, ad contrarios mutatio contingit, necessitate nimirum deficiente, nō amplius id quod primum in pulsu factum est, etiam primum cessat. Sed id quod posterius acquisiuit, primum abiicit, statim quidem euadens rarus, deinde

deinde tardus postea etiam paruus. Si uero amplius deuenierit ad tarditatē ac paruitatem, rursus raritas in densitatem transit, quo per ipsam necessitas perficiatur. Atque hec quidem sunt magnitudinis, & uelocitatis ac densitatis, & contrariorum ipsis, pulsuum causae. Coniungenda uero his est, & mutatio pulsus circa unam solum dimensionem. Latitudo igitur solum augetur, propter humiditatem maxime redundantem, aut secundum naturam, aut etiam ab externis causis. Quemadmodum altitudo propter instrumenti molliem, facultate ad hoc coadiuuante. Longitudo uero ob siccitatem, & circumscripturam carnis eliquationem, manifestum fit, alijs dimensionibus collatis. Non enim longiorem quam secundum naturam, fieri arteriam contingit, & talem sanè pulsus magis propriè gracilem quis appellaret, què admodum contrarium ipsi, secundum latitudinem ac profunditatem solum autem, amplum. Contrarijs autem harum affectionibus pulsus quandoque incidit, & iuxta aliquam, aut aliquas dimensiones impeditur, humilis aut angustus, aut brevis apparet, quum talis non sit sed ob pinguedinis alicuius crassitudinem, aut carnis aut membranarum impediens. Quandoque etiam totus paruus apparet, quum reuera non sit paruus. Et languidus similiter. Et quid dicor? Saepè enim absoluta pulsus interceptio quibusdam esse uisa est per omnes arterias, quum reuera non esset, & praesertim negligenter tangenti bus, sed propter carni copiam latente motu, qui uere languidus existit. Non enim fieri potest, ut perfecta pulsus interceptio contingat, uiuente adhuc homine: quemadmodum rursus in excarnibus etiam pulsus parui, uidentur esse magni. Eliquato igitur uehementer corpore, & quæ circa spinam est arteria, saepè contingenti bus summum uentrem, motum significat: & quædam aliae in artubus, quæ prius inconspicuae erant. Quapropter omnes causas diligenter animaduertere oportet, ne qua nos lateat dignoscere. At uero pulsus uehemens præ robore facultatis fit, si nulla ex reliquis causis reluctetur, uelut necessitas exoluta, aut instrumenti duricia. Languidus autem pulsus debilis facultatis uel solius soboles est, etiam si nulla alia causa adsit. Nam uehemens pulsus omnibus causis opus habet ad sui generationem. Verum languidum uel sola debilitas efficit. Qui igitur ab initio uehemens est, ad atates, & tempora, & regiones, & temperaturas temperatas consequitur. Languidus autem ad intemperatas. Qui uero ex languiditate ad uehementiam transit, facultate ex praegressa debilitate corroborata contingit. Corroboratur autem uel per ea quæ in ipso sunt corpore, uelut humorum concoctionem, aut excretionem, aut iram: uel per externa, uelut uina, cibos, exercitia, & quæ intemperiem corrigunt. Exolunt autem facultatem, inedia, uigiliae, euacuationes immodicae, tristitia, curae, dolores maxime animi deliquia inducentes, & quæ intemperie efficiunt. Quidam uero in exercitatu durum pulsus putauerunt esse uehementem. Verum qui rationatione, & tactu exercitatus est, cum non se fellerit. Nam uehemens plerumque cum magnitudine in altum tollitur, robuste tactum feriens. Durus autem semper magnitudinem non suscipit, propterea quod arteria aegre cedit. Durus itaque fit pulsus, propter instrumenti duriciam. Hanc autem frigiditas immodica, aut siccitas, aut tensio ab inflammatione, aut conuulsio efficit. Statim autem ad duriciam, & paruitatem, & uelocitatem, quandoque etiam densitas pro magnitudine, ob necessitatem consequitur. At mollis pulsus ad humiditatem arteriae sequitur. Hanc autem humidiores efficiunt, ex his quæ præter naturam non sunt, cibi humidiores, & balnea plura, & somni multi, & uicius delicatior, & animi iucunditas. Ex his uero quæ præter naturam sunt, sopores, lethargi, hydropes, & reliqui morbi pituitosi. Porro plenus pulsus, aut humorum copiam, aut ciborum, aut uini potus redundantiam indicat: què admodum uacuis contraria. aut enim inedia, aut uacuationem. Quid si calidius hæc sit arteriae corpus, multam in corde caliditatem, reliquo corpore perfrigescente; aut conuulsoriam aliquam arteriarum affectionem signi-

*Gracilis pulsus*

*Amplius pulsus*

*Pulsus non interceptus uiuente homine*

*Durus pulsus*

*Mollis pulsus*

Catochorum  
pulsus

ficat, per uolentem motum caleſcentium. Verum Archigenes dicit ar-  
ria locum proprie in ſtupore correptis, catochis appellatis, calidiorum re-  
periri, uelut quibus conuulſio imminet cum graui in ſonnum delatione.

At uero rhythmi ratio ſi æqualis eſt in motu ac quiete, totius corporis tem-  
periem indicat, quantum in ſeipſo: aut non magnam mutationem. uelut in  
puerili ætate, & corporibus alioqui temperatis. Si uero longius fuerit quie-  
tis quàm motus tempus, caliditatem prædominari indicat. Velut in ætate  
uiſoris, & hiſ uiciniſ: quemadmodum ſanè in ſenilibus corporibus æqua-  
liter frigidis, longius eſt motus tempus quàm quietis. Id autem ſciendum  
eſt, in æqualitatem circa rhythmum meſuram eſſe eius quæ circa uelocitatē  
ac denſitatem conſiſtit. Hanc autem uelut materiæ rationem ad rhythmū ob-  
tinere. Intermittentes & intercidentes pulſus ſiunt, dum premittit & ue-  
lut grauatur facultas. Verum intercidentes, minorem leſionem deſcientes  
maiores indicant. Et in ſumma, facultas quæ premittit ac grauatur, ad in-  
æqualitatem ac ordinis turbationem, pulſus mutat, tum aliam omnem, tum  
ad eam quæ circa uehementiam & magnitudinem contingit. Quum au-  
tem decurtati pulſus duplices genere demonſtrati ſint: aut enim in congre-  
gatoria inæqualitate, aut in ea quæ ſit circa unum iſtum reperiuntur: deſi-  
cientes quidem extremam facultatis collapſionem indicant. Redeuntes au-  
tem & recurrentes, etiam ipſi imbecillem quidem, ſed adhuc repugnantem,  
& reſiſtentem, ac renuentem declarant. Qui uero circa unum iſtum decur-  
tati ſunt, & nutantes ac circumnutantes appellantur, in hiſ qui paulatim  
marcerunt maxime ſunt, & in inflammationibus nō ſolutis: imò & in plu-  
rimis quomodocumque marceſcentibus exiſtunt, dum corpora circa arteriis  
conſumuntur. Inæqualiter ueloces & dorcadiſſantes pulſus, ad febiles  
maxime caliditates conſequentur. Verum ſi quidem principia diſtentionis  
exoluat pulſus, & ſinem ipſius, ac contractionis principium acceleret, pu-  
tredinem præualentem indicat, natura ad fuliginofatum ſuperfluitatum ex-  
cretionem feſtinante. Si uero uice uerſa, contractionis principium exoluat,  
ad diſtentionem autem magis feſtinet, caliditatem magis prædominari ſci-  
to refrigerationem appetentem. Conſequitur ad hos in febre etiam denſi-  
tas plerumque, quandoque etiam magnitudo, ſi nō facultas, aut inſtrumentum du-  
ricia impediāt. Augeſcente uero arteriæ duricia, & facultate nō debili exi-  
ſtente, bis ſeruens ſit pulſus. At undofus ad humidiores affectiones maxi-  
me ſequitur, & ex hiſ magis ad hydropes ſubtercutaneos, & lethargos, &  
peripneumonias. Vbi uero ſolui incæperit facultas, adhuc tamen interim  
modice reſiſtit, undofus in uermiculantem tranſit. Extremè uero ipſa colla-  
pſa, & hunc formicans excipit. Heſticus pulſus proprie tabeſcentibus,  
& alioqui marceſcentibus adest. Conuulſorius pulſus ſit, neruorum prin-  
cipio inflammatoriā quandam affectionem habente, uelut in phreniſia  
& comitiali acuto correptis, quando etiam moriuntur ita affecti, dum ad  
huc calidi ſunt, contrario planè modo hiſ qui ſyncope corripſi ſunt. Illi enim  
dum multum frigidi ſunt, adhuc uiuunt. Agitatorius autē ſit pulſus, quū  
neceſſitas quidem opus habet magna diſtentione, & robur uitale operari  
potest, ſolum autē arteriæ corpus contradicit, quod præ duricia ad magnam  
diſtentionem eleuari non poteſt: quemadmodum in inflammationibus ma-  
gnis, & diuturnis obturationibus. Porro pulſus ſecantis quippiam modo  
te habens, in totum inflammationem ſignificat, & maxime alicuius neruo-  
ſæ partiſ. Non minus autem & pleuritidis proprius eſt, ſi remiſſus eſt, mole-  
ſtis & facile concoquendæ: ſi intentus, difficilis & ægrè cōcoctilis, quæ cum  
debili quidem uirium facultate, acutè periculofa eſt: cum forti uero, diutius  
no tempore concoquetur. Aut enim in ſuppurationem ſape tranſit, aut ta-  
bidus marcor ipſam excipit. Illud autem noſſe oportet, quod ad inæqua-  
litates, ordinis turbatio ſequitur. Raro uero inuenire datur inæqualem pul-  
ſum ordinatum. Et ſanè minores leſiones, inæquales & ordinatos: maio-  
res,

Comitialis mor-  
bi acuti affe-  
ctio  
Syncope  
affectio

**A**res, inæquales & inordinatos pulsus efficiunt. Atq; hæc quidem sunt simplices pulsuum causæ ac prænotiones. Ex his autem & compositæ non diffi-  
culter inueniuntur, uelut etiam in sermone de differentiis ipsorum diximus.

De alui egestionibus. CAP. XIII.

**A**lui egestio optima est mollis & compacta, & quæ tempore consueto, quo in sanitate prodibat, egeritur. Talis autem est subfulua, cum conuenienti compage, & non ualde graueolens. Quæ uero præter hæc est, bona non est. Quæ igitur similis colore est his quæ in cibo accepta sunt, & tenuis, & sine humorum exulceratione, & cito progressa, incocta est. Quæ uero fulua, & meraca, in principio quidem biliosorem indicat morbum. Si uero citra declinationem talis excernatur, corpus commodè expurgari indicat. Cum uirore pallida, aeruginosæ bilis nota est. Nigra, aut atræ bilis, aut sanguinis isthæc adest. Luida, frigiditatem quandam, & internarum partium non leuem mortificationem indicat. Pinguis, colliquationis pinguitudinis quæ est in corpore nota est. Quemadmodum rursus uiscosa deterior pinguis est, & animalis partium colliquationem indicat. Quæ uero ualde graueolens est, non exiguum significat putrefactionem. In omnibus autem his, si non iuxta acceptum cibum qualitas fuerit eorum quæ egeruntur, hoc modo affectio-  
nem considerare oportet. Omnium uero pessima, & perniciosa est alui egestio, quæ nigra est, & liuida, & pinguis, & cito progressa.

De urinarum significatione. CAP. XIII.

**Q**uemadmodum in alui egestionibus, sic etiam in urinis, regula sanorum uis, de ægrotis significationes sumemus. Vrina itaq; optima est, quæ sanorum urinis simillima est. Talis autem est subfulua & subflaua. Statim uero & crassitudinem moderatam hæc habet. Quum autem triplex urinarum turbatarum differentia sit, aut enim mistæ tales paulo post subsidunt, aut perpetuò similiter manent, aut puræ excernuntur, & postea turbantur: tertia ex relatis mala est, prima moderata, in medio autem ambarum secunda. Quæ uero extremè cruda est, hoc est quæ exacte aquosa est, uelut desperatæ concoctionis symptoma uenosi generis est. Vbi uero etiam cito exit, urina profluuium, quod diabetes uocatur, oboritur. Atq; hæc ex crudis urinis pessima est. consequens est tenuis adeò ac alba, uelut aqua. His proxima est alia urina, quæ in multis morbis apparet, propè admodum accedens ad uinum tenue ac album. Ab hac consequitur subpallida. Pallida uero fuerit etiam subfulua, & concoquitur iam pro coloris ratione. Verum & crassitudine in tantum ab aqua fecedere ipsam oportet, si probe concoqui debeat, quantum colore. Si uero colorem secundum naturam exactè seruans, subsidentiam albam ac leuem, & æqualem ac multam habet, concoctionis quidem exactæ nota est, uerum copiosum crudum humorem expurgari indicat. Sed & si moderatè crassior fuerit, & subsidentiam aliquam habuerit, non penitus iam cruda est. Si enim aut farinæ crassiori, aut laminis, aut fursuri similes, aut liuidas, aut nigras, aut pallicantis uiroris, aut graueolentes subsidentias habuerit, præter hoc quòd omnis huiusmodi cruda est, etiam aliàs perniciosa existit. At uero urinae boni coloris, simulq; aut subsidentias albas, & leues, & æquales: aut nubeculas quasdam consimiles: aut quædam in medio innatantia facientes, omnium urinarum optimæ sunt, & maxime quarum subsidentia talis fuerit: secundo loco sunt, quarum innatantia talia sunt. Tertiò, quarum nubeculae. Et in summa, quæ in urinis utiliter seruntur, quanto magis deorsum subsiderint, tanto meliora existunt.

De sputorum notis. CAP. XV.

**Q**uæcunq; sputa subflaua sunt, & subfulua, & subspumosa ac tenuia, solidius cruditatis notæ sunt, & nullum grauius malum indicant. Quæ uero meraco modo flaua sunt, & fulua, & spumosa, & cum uirore pallida, uiscosæ ac rotunda, & his magis adhuc nigra, mala sunt. Nam sanguine solum excepto, quisquis aliorum humorum meracus fuerit, malam affectio-

Egestionum  
alui ratio

Vrina quæ  
optima

Diabetes

Sputorum ratio

nem indicat, quæ ex flammea caliditate ortum habet. Cruenta igitur sputa & moderata sunt. flauæ uero aut atræ bilis, horrenda. Verū inspicere insuper oportet etiam educationis ipsorum modum. Si enim facile exspuantur, manifestum est talia esse bona, contraria uero mala. Perfectæ itaq; cōcoctionis nota est, sputum leue, album, & æquale, & compage neq; liquidum, neq; nimis crassum. Absolutę uero cruditatıs nota est, id quod omnino nō exspuitur. Si uero exspuat quidem, sed tenuē, cōcoctionis languidæ signū est. Sin autem meracum fuerit, fuluū aut flauū, non bonum est. Si uero liuidum, aut æruginosum, aut nigrum, perniciosissimum.

Diarrharum febrium cognitio ac curatio. CAP. XVI.

Febrib. diarris  
qui facile cor-  
ripiantur

**F**ebrium diarrharum proprium & inseparabile signum est urinarum concoctio in prima die. Sed & caliditatis iucunditas, proprium ac inseparabile talium febrium signum est. Verum post primam febris solutionem, certior rem cognitionem habebis. Nam & arteriarum motus tunc per omnia assimilatur sanotum motui, quum nulla alia febris ad naturalem statum reuertatur: & ægrī bona tolerantia, magnum etiam ipsa signum est. Facile uero his febribus corripiuntur hi, quibus defluxiones corporis non sunt uapores, sed acre quiddam, & uelut fumosum habent. Hi autem sunt calidi ac sicci temperamento, & omnino ex amara bile biliosi. Eos igitur qui ex lassitudine febrierūt, pinguiter simulq; molliter fricare oportet, ac lauare. Qui uero ob siccitatem, minus quidem illis fricare, sed plus lauare. Ex cutis autem, & meroribus, & uigilijs, & ira illapso, lauare non sæpe, sed oleo multo tepido minimum adstrictionis participantium parum fricare, & ut mos est lauare. Ex ardore uero febris correptos, statim ab initio frigefacientibus curare oportet, & balneis pluribus. Minime autem oleo largo, ac frictione. Frigefacientia sint rosaceum, & oleum omphacinum, absq; sale præparauit. Verum hæc ipsa uehementer frigefacta sincipiti affundere oportet, & declinante febre lauare. Si uero quis perfrigeratus febrierit, & hunc lauare oportet in declinationibus. Ar si una cum grauēdine ac defluxione febriant, prius quā concoquantur illæ, lauare non oportet. Verum eos qui ex ardore febriunt, etiam illo præsentē lauare cōuenit. Qui uero ex frigidityte, his caput rigandum est moderatē calefacientibus, uelut est irinum ac nardinū. In quibus autem meatuum cutis coarctatio febrem efficit, his conueniunt balnea dulcium aquarum temperatarum, & frictio rarefactoria, & exercitia, & uisus succi dulcis. Si uero ob inēdiā fiat febris, prima exacerbatione inclinata ad balneum inducantur, & oleum plurimum tepidum affundatur, lenissimeq; defricentur, & plurimum temporis in solio calido immorentur. Vbi uero egressi sunt, & uires refecerint, ad balneum rursus inducantur. Et postea calidam aquam bibant, & ptisanæ succum, quandoq; etiā lactucæ. & teneræ carnis pisces sumant ex albo iure. Communis autem uiscus species in omnibus sit, boni succi, facilis cōcoctio, nusquam circa meatum hærens. Vinum dandum est aquosum, & aspectu, & facultate. Oportet autem circa primū primæ exacerbationis febrilis insultum, aliquando horum aliquos nutrire, in quibus corporis intemperies ad caliditatem ac siccitatem emotā, febres accendit. Qui uero ex glandularū inflammationibus febriunt, ne interrogant quidem medicum quid facere oporteat. Verū uisceris ex quo inflammatio oborta est, prouidentia habita, circa exacerbationis declinationem lauantur. Conuenit autem ipsos prohibere à uino, donec inflammatio fuerit soluta, & tenuiore uisū uti.

Putredinosarum febrium cognitio. CAP. XVII.

Febbris putrida  
de nota

Pulsus compressio

**P**utredinosarum febrium cognitio contingit ex eo quod nulla externa la cessens causa præcessit. Sed & quod à rigore incēpit, neq; ardore, neque frigore uehementi prægresso, proprium & hoc ipsum est febrium putridarum: quemadmodum etiam pulsus compressio. Sic autem nomināt, quum incipiente exacerbatione satis paruos, ac ipsos inæquales habent pulsus. Hoc



**A** Hoc enim præcipue talium febrium proprium est. Quin & maxima putridarum febrium nota est caliditatis qualitas. Fumosa enim est, ut tactu per rodatur. Proprium item maxime harum febrium est, urinarum cruditas, & languida concoctio. Magna uero & memorabilis nota concoctionis, in primis urinis, nunquam in talibus febribus apparet.

*Putredinosorum febrium curatio.* CAP. XVIII.

**S**i uires robustæ fuerint, febrienti ex putrida febre statim uena secanda est, si ablit cruditas uentris. Verum uiribus debilibus, aut ætate impediens, uenam non secabis. Post sanguinis autem euacuationem, putrefacta exputigare oportet, per urinas, uentrem, & sudores. Si uero sua sponte aliquando impetum ad os uentris fecerint, etiam per uomitus: alioqui præter naturam irritare non oportet. Eligendæ uero sunt materiæ, quæ citra hoc ut eal faciant ac siccant, relatas euacuationes efficere possunt, uelut est prisanæ succus, aqua mulsæ, acetum mulsæ, fauorum cremor coctus, & apij radix. Quam autem alius non subit, aquam mulsam cum oleo per clysterem infunde. At totum corpus rarefacere non conuenit, ante euacuationem. facta autem euacuatione, rarefacere licet aliquo tepidam habente caliditatem, quale est chamæmelinum. In hoc tempore etiam uinum aquosum potum omnes excretionem mouet. Et balneum temperatum ex aqua dulci. Ceterum ubi magnitudo febris resistit, neque uino, neque balneo urendum est, neque unctio- nibus rarefacientibus: sed frigida aqua in his febribus commode bibitur, si non quid impediat etiam hanc. Si igitur facultates uirium robustæ fuerint omnes, & febris ardentissima, & concoctionis signa manifesta, frigida confidenter danda est. Si uero etiam carnosus fuerit, & constitutio aeris calida ac sicca, & in solium aquæ frigidæ ipsum immiseris, non lædatur. Modica uero si est febris, & uires robustæ, una cum concoctionis signis, talibus balnea profunt, & uini potus, & rarefacientia ungenta.

*Febris putrida de curatio*

*Frigida quando danda*

*Tertianarum cognitio.* CAP. XIX.

**F**ebbris tertiana quæ ex flaua bile mota generatur, statim ab initio rigorem non exiguum inducit, qui à quartanario rigore differt, eo quod punxi ac uulnerari corpus uideatur. In quartanis autem insultus uehementem perfrigerationem habet. Verum quotidianas febres neque præcedit rigor, sed perfrigerantur solum. Est autem & in tertianis ordo pulsuum exactus. Infert autem sitim, circa uigorem, uehementem, & hominem perurit, & paulo post in uigore consistit. & calor undique æqualiter extentus est. Si uero manum adhibeas, iuxta primum occursum caliditas multa & æris occurrit, quæ uelut cum uapore quodam effertur. Vincitur tamē paulo post sub manu eius qui perseverat. Vbi uero bibit, statim sanæ copiam calidi uaporis per cutem exungit nuncians sudores. Vomitus autem bilis comparat, aut uenter deorsum erumpit, & biliosa mingunt. Post hæc ad febris quietem definit, ubi exacerbationis tempus non plurimum quàm duodecim horarum fecit. Eam igitur quæ intra duodecim horarum tempus quiescit, tertianam exquisitam nominamus. Quæ uero diuturniorem exacerbationem habet, eam simpliciter tertianam uocamus. Quæ autem longissimè extentam exacerbationem habet, exiguum uero interuallum, eam rursus uocamus tertianam extentam.

*Rigor tertianæ ac quartanæ differentia*

*Tertiana exquisita  
Tertiana extenta*

*Tertianarum curatio.* CAP. XX.

**T**ertianam exquisitam uelut à flaua bile orientem, humectare ac friges- cere oportet, & quod in uentrē confluxit, per uomitus, ac deorsum euacuaré, sed & per urinas ac sudores uia aperta deducere. Venter itaque molli- bus insulis moueatur. Vrinæ uero, apio & anetho in potionibus maceratis promoueantur. Et si concoctionis signa appareant, confidenter iam etiam abstinthium dato. Balnea ex aqua calida potabili conueniunt, & neque nitrum, neque sal, neque sinapi, in balneis aspergatur: sed oleo quàm maxime calido affuso circumcirca, in solium immittito. Eos autem qui balnea amant etiam si bis laueris, nihil deliqueris. Si uero etiam concoctionis morbi signa appa- reant,

*Abstinthij potus*

reant, non peccaris si saepe laueris. Vinum prius quàm concoquatur modicus penitus prohibendum est. Vbi uero concoqui incepit, tenue & aquosum ac modicum prima die dato: & cibi qui humectant ac frigefaciunt, commodi sunt. Abstinentum est à melle, sinapi, salsamento, & natura calidis. Atque hæc quidem ueterum curatio erat, & nihil miri est, quum illius temporis homines in exercitijs, & alimeni inopia degerent. Nunc uero ordine peruerso, bilis ut plurimum pituita ammixta reperitur. Proinde plurimæ tertianæ, aut citra rigorem sunt, aut ualde paruus rigor ipsis cõtingit, itaque etiam curationis ratio euariat. Neque enim balneum, neque plenior ac forlidior aliquis cibus, ante concoctionem tertianarijs conuenit, præterquam panis micæ, & oua, & similia.

*Tertianarum spuriarum curatio.* CAP. XXI

*Tertianæ spuria*

**I** Auare in tertianis spurijs in principijs commodum non est, sed quando iam signa cõcoctionis apparent: neque quotidie nutrire, sed satis est alternis diebus. Quies autem & calefactio partium circa præcordium ipsis conducit, & sorbitiones concoctu faciles, & infusa ad infernam aluum non ualde mollia. Et si sanguinis detractione opus sit, neque hæc relinquenda est. Totus autem uictus fratus, non in totum perfrigerans ac humectans sit, sed etiam de modo qui magis secet insuper assumat. Maxime autem conueniunt ipsis pituitæ succus, pipere insperso, aut hyssopo, aut origano, aut nardi spica. Sed & aquæ mullæ piper inijcito, & coctam bibendam dato, itemque alia quæ urinam cient, exceptis uehementè calefacientibus ac siccantibus. Absinthium autem maxime post septimum diem dandum est. Quin & acetum mulsu multis in potu profuit, & aliquod ex his quæ moderate aluum ducunt. At uomitus à cibis acceptis commodissimus est his qui in hac breui diutorem moram trahunt.

*Quartanarum cognitio* CAP. XXII

*Quartanæ notæ*

**Q**uartana insultum facit multa perfrigeratione, utpote quæ ex frigido humore, atra bile originem habet. Sed & calorem & ardorem sebrilem non habet, uelut tertiana. Imò neque bilis uomitus consequitur. Ad hæc si tenues, & albæ, & aquosæ urinæ fuerint, quartana febris fuerit, præcipuum uero quartanæ signum est pulsus paruus & rarus. Sed & autumnoplerunque initium habent, ad erroneas febres succedentes. & quandoque ad formam per quartam diem maxime reuertentem consistit: quandoque etiam per plures dies iuxta circuitus quosdam exacerbatur.

*Quartanarum curatio.* CAP. XXIII

**E**x quartana ægrotantes leniter tractare oportet, neque medicamentum aliud quod forte adhibendo, neque euacuationem, si non sanguis ualde redundare appareat, quando sanè uenam secare conuenit. Viciu autem sanos exortem & bonum exhibere, & uentrem per consueta mollire. Si uero hec nihil efficiant, insulis per chysterem uti, mollibus primum, postea uero acerbis. A porcinis carnibus ægri prohibeantur, & ab omnibus quæ uiscosa sunt, & tardè transeunt, & à frigefacientibus ac humectantibus edulij omnibus. Vino utendum est tenui & albo, ac moderate calido: salsamento hoc & sinapi. Et per dies aliquot, medicamentum ex tribus pipere generibus constans sumere oportet, & diospoliticum appellatum. Sed & si piper solius ex aqua quotidie accipiant, recte fecerint. Quum autem in morbi uigore conquiescat, & uisceribus prospiciendum per mollientia & laxantia. Consequenter autem urinam cientibus utendum, & si concoctionis signa apparuerint, tunc confidendum, & atros humores euacuantibus utendum, non semel solum, sed saepe. post uehementem autem purgationem, etiam ex uiperis medicamentum dato, & alia quæ ad tales febres laudantur, inter quæ est & illud familiare nobis, & omnium laudatissimum, quod succum Cyrenaicum recipit.

*Medicamentum ex tribus pipere generibus. Diospolitici*

*Medicamentum ex succo Cyrenaico*

## Quotidiana cognitio. CAP. XXIII.

**Q**uotidiana nequaquam cum rigore irruit prima die, sed progressu temporis perfrigeratio magis quam rigor fit. ægrè autem calefcit, & diuturnum incrementum habet. Non tamen ægrotos perurit, neq; multam ac densam respirationem facit, neq; efflare, aut frigidam bibere cogit. Fiunt & pituitosi uomitus, & quæ per uentrem euacuantur, frigidiora, crudiora, & aquosiora, in his febribus comperies. Et circa primos dies minime exudât, neq; ad febris quietem deueniunt. Sed & ex pallido albidus est his color. Urinæ uero tenues & albæ, aut crassæ, & turbatæ ac rubræ.

## Quotidiana curatio. CAP. XXV.

**Q**uotidianam curantes primis diebus aceto multo utimur, & his quæ urinam bene promouere possunt. Et uniuersa uisus ratio incidendi uim habeat. Verum circa rigorem uentri prospicere oportet, & præsertim osculo ipsius. Deinde etiam uomere subere, à radiculis ac cibis acceptis, & pituitam subducuntibus uti multum ac diu donec sedetur.

## De Hepialo febre, &amp; rigore calefcere nequeunte. CAP. XXVI.

**V**ltrea pituita omnium pituitarum frigidissima, si imputrefacta manes, in toto corpore redundat, rigorem calefcere nequeuntem absq; febre efficit. Nam in febribus quæ ex humoribus accenduntur, putrefactio quàm maxime febrilem calorem accendit. Si uero putrescat, atque hoc per totam ipsam contingat, quod rarum est, propter immodicam frigiditatem, quotidianæ febris causa fit. Quum autem ex dimidio computruerit, non per totam essentiam suam æqualiter, sed partibus quibusdam putrescentibus, quibusdam imputrefactis manentibus, hepialom febrem efficit, in qua riget simul ac februnt. Et imputrefactæ quidem humoris partes, per totas uenas disperis, aut etiam per reliquum corpus, rigorem faciunt: putrefactæ uero febrē accendunt, dicitur autem hepialos translatione à uoce *ἥπιος* & *ἄλδης*, id est à mīti, & mari facta: quum mīte quidem appareat mare, horrēdum autē sit ubi perturbatum est: aut ab eo quod *ἥπιος*, id est leniter, *ἄλδης* hoc est calefacit. Proinde & hæc febris quum quotidianarum generis sit, nimirum à pituita oborta, illarum curationi subiicitur secundum speciem, præterquam quod tantò calidioribus ac magis secantibus auxilijs, quàm prædicta quotidiana opus habet, quantò hæc pituita frigidior quàm illa existit. At rigor ille qui calefcere nequit, adhuc magis calefacientibus opus habet quàm hepialos febris. Medicamentum itaq; ex tribus piperis generibus, & quod ex calamindha constat, & quod ex succo cyrenalco paratur, his conueniunt. Et quæ ex castorio ac similibus parantur auxilia. Latiorē autem horū curationē reperies capite XLVI. de immodico rigore ac perfrigeratione. Porro lipyriæ & fumosæ, & quæ cunctæ præter relatæ, febres dicuntur, quum ex relatarum genere sint, curationes quoq; de illis dictas ac dicendas exigunt.

## De continuis febribus. CAP. XXVII.

**F**ebres continuæ eiusdem generis sunt cum singulis intermittētib;: cū tertiana exquisita, ardens: cum quotidiana, ea quæ quotidie exacerbatur, uerum ad febris quietē non desinit. Sic cum quartana, ea quæ quarto quoq; die exacerbatur. Nam febris ardens exquisita, omnia alia tertianæ exquisitæ signa seruans, in hoc solo ab ea differt, quod cum rigore non irruit, neq; ad febris quietem desinit. Et ea quæ quotidie exacerbatur, omnes notas similiter uelut exquisitæ quotidianæ habet, uerum eo quod non desinit in febris quietem, ab eiusdem generis quotidiana differt. Eodem modo etiam ea quæ quarto quoq; die exacerbatur, sed ad febris quietem non desinit, eiusdem generis est cum quartana. Continua igitur febris est quæ ad febris quietem, prius quàm perfectē soluatur, non desinit. Quum uero nec declinatio aliqua apparuerit, generis quidem ardētium & hæc febris est, uerum acumine ab ipsis differt.

Quotidiana febris

Pituita uirens

Hepialos febris

Hepialos una de dictis

Rigor non calefcens

Lipyriæ &amp; fumosæ febris

Continua febris quæ sit

Continens

Continuentium  
febris synochos

**C**ontinendum (synochos graeci uocant) febrium generatio ex sanguine est, quandoque seruetur solum, quandoque etiam putrefacto, ob obstructionem. Quapropter exacerbatio ipsis ad finem usque una est. Signa uero sunt, pulsus maximus & uehementes, & ueloces ac densi, & aequales, non mutescentes. Urinae a naturalibus non ita ualde deficientes. Curatio est, per uenesectionem, usque ad animi deliquium. Si uero talibus uenia secta non fuerit, sebricrantes ad extremum periculum deueniunt. Quod si quid prohibeat, ut euacuatio per uenam sectam fieri non possit, alijs auxilijs obturatione liberantibus uti oportet, quae & multitudinem sanguinis euacuant, & febrem feruorem mitigant. Quum uero in ipsis concoctionis humorum notas uideris, & neque in principali parte inflammatio aliqua, aut tumor laxus aut durus fuerit, neque pars aliqua frigida, ut ad ipsam laesio irruat ac decumbat, confidenter frigidam dato, & maxime si aeger frigidae potus fuerit.

Frigida quando  
dauata

Ardentium febrium cognitio. CAP. XXIX

Febris ardens

**F**ebribus ardentibus haec symptomata accedunt, lingua sicca, aspera & nigra: Morsus uentriculi, egestationes alui pallidae, sitis uehemens, uigiliae, quandoque uero etiam delirium.

Ardentium febrium curatio. CAP. XXX

Frigida potus

**E**x duobus alterum fieri necesse est, si ardens febris perfecte solui debet. Aut ut biliosi humores excernantur, aut extinguantur. Excernunturigitur per sudores, aut uomitus, aut infernam aluum. Extinguuntur per frigidam potum, per quem nos omnes ardentes febres curauimus. Verum hac breuiter affectos, neque ex aqua solum, neque ex aqua mulsula sola, uictum instituere conuenit. Sed aqua mulsula aquosa cocta ipsis danda est. Oportet enim ita egrotantes ex solis potionibus uictum habere. Balneum uero his solis conuenit, qui citra inflammationis aut erysipelatis tumorem febris ardente laborant. Si uero etiam concoctionis signa habuerint, multo magis ipsis conducet. Qui uero ob falsum humorem, ardentem febrem habent, eis non conducit. Hos uero etiam pituitiae succo nutrire conuenit.

Febris ex erysipelatis affectione cognitio ac curatio. CAP. XXXI

Febris ex erysipelatis  
affectione

**F**ebres ex erysipelatis hoc est ignis sacri, circa uiscera affectione, cognoscuntur ex loci & seruire excellenti, & dolore uehementi. Insuperque sitis, ac ardore immodico. Et in summa, ex signis acerrimae bilis cum pauco sanguine putrescentis. Curare uero oportet hoc modo. Abstinerere quidem a bilioso in totum oportet. Aqua uero frigida circa uigorem morbi utendum est maxime contentiosa, hoc est frigidissima. Verum in principio, utendum ea non est, sed forissecus imponenda frigefaciencia. Et si nihil effecerint, etiam intra corpus ut ea eger sumat cogendus est. Maxime autem ipsis conueniunt lactucae, & quae his parem uim habent. Forissecus autem & ipse lactucae succus commodus est, imò etiam semperuiui & quaecunque alia frigefaciunt. Optimo uero quam maxime utimur tali, Liquorem alicuius frigefaciensis expressum in mortarium inieciimus, cum portulaca. Deinde contusa expulimus. Vltimo uero tempore, ammixta modica polenta subigimus, atque ita in uas indita, in frigidam aqua immisso uase perfrigeramus. Et postea linteis duplicatis in his imbutis forissecus praecordiis imponimus, non diu immora riscentes, sed aliud frigidum imponentes. Miscemus aliquando & oleum oliuae.

Hecticarum febrium cognitio. CAP. XXXII

Hectica febris

**H**ectica febris non in humoribus & spiritu solo consistit, sed solidis etiam partibus. Verum doloris exors est, & febrientes neque febre omnino se putant. Neque enim calorem sentiunt, omnibus partibus aequaliter in ipsis excelsis. Duplex autem febrium hecticarum species est. Quaedam enim ex ardentibus febribus plerumque fiunt, aut usque adeo extentis, ut temporis progressu humorem corporis cordis consumpserint: aut etiam manente adhuc multo. Illae itaque non solum hecticae sunt, sed iam etiam marcorosa.

Quae

**A** Quæ uero manente adhuc humiditate fiunt, hæc cordis corpus occupantes, hinc incenduntur: quemadmodum lucernarum flamma ex funiculo, manente adhuc in lucernis oleo. Et hæc quidem una est ipsarum generatio. Altera uero, quum ab initio statim irruerint, primam generationem diarij similē sortitæ, ob tristitiam, & iram, & lassitudinem ampliores simul cum ardore factam. Has igitur non difficile est curare. Eas uero quæ ad maiorem deuenerunt, sanare impossibile est. Et sanæ quæ in marcorem incidit Hæctica febris, facillimè cognosci potest. Oculos enim immodice cauos conspicias, & gramas in ipsis reperies siccas, & squallidam quandam affectionem. Perijt autem & coloris ipsorum uitalis flos, & frons sicca est ac circumtensa. Et plerumq; palpebris nictant, quemadmodum ad somnū procliuēs. Est autem hæc affectio non somnus, sed uigilandi impotentia. Et tempora collapsa sunt. Et quid nam aliud quàm ossa & cutis solum existunt? Et si denudatas inspexeris partes circa uentrem, neq; aliquod intestinum, neq; uiscus aliquod saluum esse putes, & præcordium uehementer retractum est, & cutis ipsis extremè arida est. Pulsus gracilis est, & densus, ac durus. Caliditas autem circa primum occursum languida. Verum paulò post uim acrem ac erosiuam declarat. Quandiu igitur aliquid humiditatis seruatur, hæctica febris solum est. Vbi uero ad id periculi deuenerit, ut non amplius quicquid eiusmodi humiditatis super sit, exquisitus iam marcor consistit.

*Marcor ex febre hæctica consequens*

*Hæctica febris curatio.* CAP. XXXIII.

**H**Æctica febre laborantes statim ab initio alimento opus habent, propter humorum mordacitatem. Maxima autem medela est uiscus humectans. Oportet itaq; quàm maxime per prisanæ succum, & per alicæ sorbitiones nutrire, panemq; insuper exhibito, ægrum moderato frigida aquæ potu curare, ubi neq; inflammatio aliqua ipsi aderit, neq; humorum putrefactio. Et si magnam indelationem fore coniectes, frigida quidem exhibitionem inhibere oportet, uerum auxilijs frigefactorijs quæ extrinsecus imponuntur uti. Sed & balnea ita affectis per omne tempus commoda sunt.

*Mordacitas humorum in hæctica*

*De semitertiana.* CAP. XXXIII.

**Q**Uum tertiana quidem cum rigore irruat, quotidiana uero sine rigore, febris quæ ex utriusq; mixta est, horrorem inducit, qui rigore quidem minor res est, maior autem perfrigeratione, & sanè dum temperantur extremitates consistit. Itaq; neq; absolum nomen huic febrī indiderunt, qui hemitritæum hoc est semitertianam appellarūt. Duplex autem est generationis ipsius modus, aut duabus exacerbationibus uno tempore coincidentibus, aut ambabus statim ab initio inter se permixtis. Quum itaque tertiana prædominatur, horridior febris sit, & circa accessionem etiam aliquid rigoris assumit. Statim autem talis & calidior est, & ardentior, & quendam bilis uomitum, aut alui egestionem, aut sudorem inducit. Vbi uero altera pituitosior præualeat, extremitatum partium frigiditates prædominantur, pauciores autem sunt horrores, non tamen siticulosi sunt, neq; æstuosi. At si æquales magnitudine fuerint, tertiana intermittens, & quotidiana continua, exacerbationis quidem insultus cum horrore sit, & quum pituitosa prædominatur febris, contractiones fiunt ac horrores. Si uero calidior præualuerit, acruatim excalescunt. Ac talis quidem est semitertiana exquisita, ex æqualiter sortij duarum febrium mixtura oriens, tertiana intermittente, & quotidiana continua. Quæ uero exquisita non est, aut biliosum humorem uberiorē habet, aut pituitosum, quæ sanè etiam magis facile curari potest, quàm paucior humor promptè superari possit, tum ab uberioris prædominio, tum ab artis auxilio. Si enim pituita præualuerit, auxilijs de quotidiana relatis maxime utimur. Si uero bilis flaua, his quæ de tertiana dicta sunt, ita ut in uniuersum aduersus id quod urget instemus, & tamen neque alterum omnino negligamus.

*Febris mixta mixtam curationem requirit*

Populares  
morbi

**P**opulantes & communes morbos nominant eos qui in multos simul incidunt: quorum ueluti generatio, ita etiam causa communis est. Communia igitur edulia praua, tales morbos pariunt. Communis item aquae uisitatione potus, & labores immodici, & labores consueti intermissi, indigentia quoque ac repletiones, ubi uel fames grassata est, uel largior rerum prouentus contigit. Sed & locorum naturae communes morbos sepe inuenerunt, quandoque palustrius, quandoque barathri uicinum habentium, quod exhalatione uenenosam ac prauam remittit. Atque haec quidem frequenter contingere solent. Verum ambiens nos aer mutat temperamenta, siue immoderate calidior, siue frigidior, aut siccior, aut humidior fiat. Nam reliquis causis neque omnes simul obnoxij sumus, neque per totum diem occurramus. Aer uero nos ambiens, & extrinsecus omnibus circumfusus est, & per inspirationem attrahitur. Necesse autem est unam cum ipsius secundum temperamentum alterationibus, etiam animantium corpora coaffici. Qui igitur haec nouit, non solum futuros morbos ex unaquaque constitutione praenoscet, sed etiam fieri prohibebit, ad immoderate ambientis aeris temperamenta, contrariam uictus ratione excogitans. Quaecumque igitur corpora propinqua ad hoc sunt, ut morbum aliquem incendant propter propriam intemperaturam, ea a simili ambientis nos aeris temperatura laeduntur. Quae uero contrario modo temperata sunt ad aerem, si praehoc quod nihil iniuriae accipiunt, etiam meliora fiunt, temperamenti immodestiam contraria immodestia castigante. Et qui hoc nouit, sanitatem conseruabit, contraria corporibus adhibens, quandoque refrigerationibus utens, si ita opus fuerit, quandoque calefactorijs, ita ut aquae inductionibus, & oleo, & ciborum inopia, & potus redundantia refrigeret: tegumentis autem & laboribus, & cibo uberiore, & potu parciori calefaciat. Sed & rogo ingenti extructio ac incenso, aerem ad caliditatem ac siccitatem multum transmutare quis poterit, si antea humidus ac frigidus fuerit, quemadmodum Acro- gentinus nem Agrigentinum fecisse dicunt.

De peste, ex Rasiscriptis.

CAP. XXXVI.

Pestis horren-  
dissima

**O**mnia horrendissima in peste fieri possunt, & nihil occultatum manet, quemadmodum in singulis morbis. Nam & deliria fieri possunt, & bilis uomitus, & praecordiorum distentiones, dolores, sudores multi, extremarum partium frigiditates, profluuia alui biliosa, tenuia, flatuosa. Urinae quoque, tenues, biliosae, nigrae, malas subsidentias habentes, & ea quae in medio innatant pessima, sanguinis de naribus stillationes, ardores in thorace, linguae torrefactae, sticuli osi sunt, anxij, uigilantes, conuulsionem uolentia, & alia multa praua. Si uero solerti ingenio quis praestet, futuram pestem praenoscet, attendens & temporibus prauis, & studiis hominum ad sanitatem non conducentibus, & alijs animalibus prius pereuntibus. Quum itaque haec consideraueris, insuper & illud tecum expende, quale sit praesens tempus. qualis item uniuersus annus. Hinc enim comperies quomodo uictus rationem optime constituas. Verbi causa, debebat esse si rectes fieret, tempus siccum, nunc uero humidum factum est, necesse igitur est per uictum reliccare, quo excedens humiditas consumatur. Habenda autem est & alui cura. Quibus uero supernus uenter pituitam habet, uomitibus euacuare oportet. Quibus autem sanguis excedit, uenam secare. Commoda est etiam per urinas purgatio, & quaecumque alia, & quae sit per totum corpus. Si uero etiam ardore aestuet aeger, & flamma ad pectus usque ascendat, non alienum fuerit, & frige-factoria pectori adhibere, & frigidae potum exhibere, non paulatim, plus enim exurit, sed acuatim, ut flammam extinguat. Si autem ardor internas partes occuparit, extremae uero partes & cutis superficies frigidae fuerint, & praecordium distendatur, & uentriculus collisquameta partim sursum, partim deorsum mittat, & uigiliae affuerint, & delirium, & linguae asperitates, his calefactorijs opus est, quo caliditas ad super-

Pestis praenotio

Frigida potus  
accruatur

perficiam

A perficiem corporis trahatur, & si quo alio modo fieri possit, ut caliditas ex profundo ad externas partes educatur. Vtendum & hac quæ præsumitur potionē. Aloës partes 11. ammoniaci thymiamatis partes 11. myrrha partē 1. Hæc trita in uino odorato fabæ magnitudine dentur, quotidie uidelicet. Haud scio inquit Rufus, an sit quis qui ex hoc potu non à peste immunis ac superior euaserit. Hæc quidem Rufus. Verum Galenus ad pestilentes putredines, armeniacū bolum in potu, & similiter ex uiperis theriacam, magno pere prodesse ait, profectio in peste quæ Romæ grassata est inquit, omnes mortui sunt, quibus neutrum horum profuit.

Potio quæ præsumitur  
seruat à peste

Bolus armeniacus

De his qui ob crudorum humorum copiam syncopen incidunt. CAP. XXXVII.

Q Vidam febricitare incipiunt, ex magna crudorum humorū copia collecta, unā cum hoc quoddam uentriculi male affectum est. His inflatum est præcordium, & totum corpus maiorem naturali molem habet. Et color alijs ad albidiorē & aquosiorē speciem mutatur, alijs ad nigriorem ac liuidiorem. Nulli talium sanguinis detractio citra maximum detrimentum fieri solet, & quidē cum opus habeant euacuatione. Imò neq; uenæ sectionem, neq; purgationem ferunt, ut qui etiam sine his derrepente animo concidant. Curare igitur ipsos oportet per frictionē. Incipere uero statim ab initio morbi conuenit, primum à cruribus supernè deorsum, per lintea moderate asperiora. Deinde etiam totæ manus confricentur supernè deorsum. Postquam autem artus satis calidi apparent, & timor fuerit lassitudinis sensus, oleo laxante utendum est: abstinendum autē ab adstringentibus. Hyc, mis uero tempore etiam discussorio utendum est, quale est oleum sicyonis ac chamaemelinum. Defrictis autem iam plurimum artubus, oleum quidē detergeatur. uerū ad spinam totam progressus fiat, & hæc similiter fricetur. deinde rursus ad crura transgressio fiat, & ex his rursus ad manus, & postea ad spinam, ita ut per totum diem id agamus. Commodissima his est aqua mulsæ, in qua coctum est hyssopum. Et neq; cibos ipsi, neq; sorbitionem, neq; aquam dare oportet, neq; permittere ut omnino largius bibant, sed sola aqua mulsæ contenti sint per primos tres dies, ita ut per successionē fricemus, & illud solum tempus remittamus, in quo somnus ipsos occupauit. Si quidem igitur pulsus ipsis ualdè paruus, & fortiter inæqualis est, extremum periculum imminet, & facere oportet ea quæ dicta sunt, nihil aliud curiosius conando. Si uero firmitatem moderate habeat, & nō probè prodant alii excrementa, infusum per clysterem confidenter adhibe. Si uero superfluitatum impetus amplius quàm oportet in uentrem fiat, primū quidem amplius aquam mulsam coquito. minus enim subducit. Si uero adhuc amplius aluus subeat, neq; sic sistere oportet, uerum pro aqua mulsæ prafanè succum dare. At si adhuc ferri perseveret, sorbitione ex alica nutrire. Quoddam si debilitatem ex pulsu didicerimus, & uires collapsas, panem ex uino diluto dare conuenit, neq; uentre, neq; hepate inflammato. Nam si inflammata fuerint hæ partes, corpore crudis humoribus repleto, desperatus est æger. Si uero quandoq; perceperis satis crassos esse humores, acetū mulsū semper pro aqua mulsæ dato, si quidem æstas est, & aquæ frigida potior sit æger, frigidum acetum mulsū huic dato: hyeme uero calidum. Aduersissima sunt his balnea, & aer nos ambiens multus calidus, aut frigidus. Hæc igitur facienda sunt à prima die, ubi ipse inceperis curationē. Si uero ubi iam animo concidunt, uocatus fueris, partibus his de quibus dixi nō inflammatis, panem quidem dato ex uino non multum, statim autem ad frictionem procedito, & iuxta relatum modum utitor: porro in quibus propter flauam bilem, quæ os uentris læsit, syncope contingit, frigidum potum assumere oportet, unumq; tenue, suluum ac uetus exhibere.

Syncope ex crudis humoribus

Aqua mulsæ amplius cocta

De his qui ob tenues humores syncopen incidunt. CAP. XXXVIII.

Q Vi uero ob tenues humores animo concidunt, cōtrario prædictis modo curandi sunt. Nam & signa notoria contraria his cōperies. Nutrire igitur

Syncope ex tenuibus humoribus

igitur paulatim assidue oportet. Sed & hos incurabiliter affectos esse putandum est, quum hepar ipsorum aut uenter inflammatione habuerit, languentibus iam uiribus. In his affectionibus letalis constitutio celeriter fit in facie. Et sane nutrire ipsos necessarium est. Similiter etiam superficiem corporis densare, quemadmodum superiorum rarefacere. Parandus quoque aer frigidus, & adstringentibus inungendi sunt. Cibi dandi sunt non ualde distantes. Dandus itaque panis est, & sorbitiones ex alica, & fructus austeri qui recte corrumpuntur, tum per se, tum cum pane. Commodum his est uinum aquosum, quod statim ab initio post cibos assumatur.

De alijs occasionibus, ob quas syncope fiunt. CAP. XXXIX.

Syncope ex uarijs occasionibus  
Cordis affectu  
perniciis

Sunt & aliae occasiones ob quas homines animo concidunt, quatuor numero. dolor uehemens, uigiliae, euacuatio immodica, & in delirantibus aliquando ipse motus. His quintam si uoles adde, principiorum intemperiem. Celerissima igitur perniciis instat corde affecto, consequenter autem crebro, parum uero hepate.

De dolore. CAP. XL.

Dolorum  
species

Dolor igitur stupefactorius ob frigidam fit affectionem: pulsatorius autem proprius est magnae inflammationis. Si uero uelut ab aculeo infixio, aut uelut a terebello forari se quis putet, crassi intestini haec doloris species est. Verum in renibus cum grauitate quadam dolor est, in uno loco firmatus, circa lumbum dextrum aut sinistrum, retrorsum magis. In colo uero dolor ex loco ad locum transit. Punctorius consistit circa pelliculas. Perfructans dolor non solum uehementissimis alterius tantum capitis partis doloribus contingit, sed etiam antiquis capitis doloribus, cephalicis appellatis. Est autem dolor perfructans, quum uelut a radice primario affectae partis initium sumens, cito in circumsitas fertur. Dissidentes utrinque dolores, neuorum sunt, quando & dolent, & ad ambas extremitates distenduntur. Minime enim ad latitudinem distensos dolores nervi ipsi habent. Tensiuos autem & stupefactorios dolores inducit membrana sub cute exrenta. Quae uero inter carnem sunt membranae, dolores uelut diuellentes faciunt. Sunt enim multae, & inaequaliter insitae, & ipsam carnem ambientes. At circumsitas ossibus membranarum dolores profundi sunt, & ipsorum ossium dolentium imaginationem inducunt. Quum igitur nulla externa doloris causa apparuerit, praegressum uisum considera. Aut enim fuerit praeter consuetudinem ociosior, aut cibis pluribus homo usus est, aut multum nutrientibus, aut consueta excreto suppressa est. Si enim quicquam horum, aut etiam omnia apparuerint, humorum multitudo causa est doloris, & quam celerissime hominem euacuato. Sic enim cum omni securitate tibi licebit his quae fluxiones repellunt uti, in partibus dolore affectis. Si quidem igitur sanguinis multitudo fuerit quae distendit, statim uena magna secanda est prope affectam partem. Vitiosis autem humoribus solis instantibus, purgatio fiat. Ambobus autem concurrentibus, utrisque euacuationibus urendum est, uena prius secta. Si uero his factis dolor remanet, manifestum sane est circa partem affectam impactum esse id quod molestat. Manifesta est etiam curatio, per discussoria futura medicamenta. Eodem uero modo & dolores ob flatuosum spiritum obortos curabimus, placantes ipsos magis attenuantibus edulcibus, insusulcibus per clysterem, cataplasmaris, irrigationibus ac fomentis, rarefacientes corpus illum continens. Si uero tumor grauans aut premit dolorum efficiat, tumor curandus est. Si ob mordacem humorem dolor fiat, aduersissima his sunt attenuantia ac calefacientia. Atherum igitur in oleo coctum, dolorem eximit, & somnum inducit, & uiride magis quam siccum.

Vene sectio  
ante purgationem

De colliquatione. CAP. XLI.

Colliquatio

Quum quid per uentrem excernitur, non a cibo aut potu accepto, sed ex humoribus ex toto corpore in ipsum confluentibus, quod simile quidem est bili, quae assidue per uomitum reijcitur, ac per aluum secedit differtur



A differt autē ab ipsa, foetoris graueolentia, & quod egestio fuluio apparet, & crassitudine habet frigine uitia, aliquando etiam oleosam, aut adiposam: syntexis id est colliquatio appellatur morbus. Nam recens compacta pinguedinis ac carnis essentia, a febris ardēte resoluitur ac colliquatur. Dicitur uero persequente malo, ex ipsis etiam solidis partibus aliquid collique scit. In hac pessima febre frigide potus remedio est, ex frigidissimo fonte petita. Talia uero esse oportet etiam cataplasmata, & epithemata frigefaciētia, tū thoraci, tū prae cordijs imposita, perfrigerantes quoque cibi exhibendi sunt.

De uigilijs in febribus. CAP. XLII.

Suigilia nimis infestauerint, manus & crura deligari iubebimus, eo tempore quo ad somnum conuertere solent, & uigilare. Tunc autem aperire & claudere palpebras cogimus, donec sufficienter fuerint fatigati. Deinde respergēte soluimus ligamenta, & lucernam tollimus, & multam quietem esse iubemus. Quod si fortiter incumbant uigilijs, in exacerbationis remissione facies proluenda est papaueris nigri caput decoctio. Idem etiam olfaciendum est. Et papaueris albi corticem tritum, & mandragorae radicē tritam, aequis portionibus, cum uino & rosaceo, in malagmatis formam redige, ac fronti impone. Serpillo item cum melisoto in passo cocto utere, & hoc in ipsis quoque exacerbationibus. Aut trita papaueris capita pane excipientes, cum rosaceo aut cerato imponimus. Sed & cibus quodam modo cariosior sit, & sorbitionibus papaueris albi semen adiciatur, trium cochleariorum mensura. Olera uero parētur, papaueris nigri si affuerint, folijs adiectis uiridibus, quantum tribus digitis capere potest: sin minus, tria aut quatuor capita sicca simul incocta eximantur. Si uero neque sic in somnum deferantur, papaueris succo, aut mandragorae succo oblinantur. Sed & elegna quod ad delingendum ex capitibus papaueris componitur, & maximum quod ex sapia constat, si cochlearij unius aut dimidij mensura bibatur, saepe somnum conciliauit. In quibus autem caput non facile repletur, utendum est si uigilijs infestentur, in declinationibus tali suffumigio. folijs, amomi, costi, zarnabo, singulorum unciam unam. carpobalsami drachmam unam. styracis, ammoniaci thymiamatis, bdellij scythici, radicis mandragorae, succi papaueris, tantundem, suffito in lignis cupressinis.

Ceratio fronti grauior. CAP. XLIII.

Faciem spongia posca laciei teporis imbuta detergere oportet, & extremas partes fortiter deligare. Odoramenta adhibeantur incisoriā uim habentia. Et in exacerbationum remissionibus cucurbitae dorso ac spinae effricatim affigantur. Persequente uero morbo, etiam sternutatoria in exacerbationum remissione adhibeantur. Sit autem & ciborum materia secandi ac diuidendi uel praedita, uelut in sanitatis praecipis diximus.

Ceratio doloris capitis in febribus. CAP. XLIIII.

Capitis dolore in febribus uexante, post convenientem superflui uacuationem, circa exacerbationum declinationes, unctione capitis utendum est, primum ex oleo communi acerbo ac crudis adhuc oliuīs expresso, aut rosaceo, ammixto ad ipsum etiam aceto paucissimo, aestate quidem, & in febre ardente, frigidus: hyeme uero, & in non ardente febre, calidus aut tepidus. Coquatur aliquando in oleo etiam serpilli ac polygoni succus. In aestate etiam calices papaueris, aut ipsum papauer, quem admodum rursus hyeme, peucedani parum. Persequente dolore in fronte, si incipit nudum fuerit, cataplasma huic adhibendum est ex polentae polline, & polygono. aut ex pane similiter ac rosas, aut modica myrto, aut serpillo. Quosdam etiam pulegium ammixtum magis leuauit. In quibusdam uero etiam quum feruoris sensus esset, psyllium polentae ammixtum profuit aut etiam per se in coctura ad uisci formam redactum, & assidue permuratum. Et coriandrum similiter cum polenta. Sed & aloē cum aceto illinitur. Et myrrha, & ammoniacum similiter & crocomagma. At pulsatiles dolores ruta & menta cum pane

Syntexis

Vigiliarum cura

Elegna ex papaueris capitibus

Suffumigium somniferum Zarnabo

Somnus grauior

Capitis dolor in febribus

diffilat, adstillato etiam rosaceo. Si uero ad relata dolor non cesserit, primū caput ad cutē attōdere oportet. deinde pinguioribus irrigatio nib. per totū ipsum utendum est. postea cucurbitæ affigendæ sunt occipitō, & extreme partes deligandæ ac confricandæ. Commodæ sunt & hīrudines appositæ. Cæterum si defluxio aliqua, aut grauedo illapsa, capitis dolorem accenderit, his quæ ad hæc proprio loco describentur auxilijs utendum est. Si uero à locis circa stomachum uapores exhalantes caput læserint, etiam his proprijs piciendum est, quemadmodum ex ordine subscriptum habetur.

De stomachi affectionum curatione. CAP. XLV.

Stomachi nas  
rue affection  
nes

**S**i imbecillis fuerit stomachus, cataplasmatibus corroborare potentibus utemur. qualia sunt quæ palmulis constant, uino, polenta, croco, mastiche, & aloë. Irrigationes autem adhibebimus ex absinthio, & oleo melino, mastichino, nardino, & uino. Et si stomachus exuratur, ammiscenda sunt etiā frigefacientia aliqua, ueluti est cucurbitæ succus, & lactuca, & portulaca, & solani, & intybi, & uuæ acerbæ. Si uero aliquid inflammati circa niscera appareat, etiam ex laxatorijs quædam ammiscenda sunt: ad irrigationes quædam, oleum chamæmelinum ac cyprinum: & de adipe, gallinaceus ac aserinus. Bdellium item aut ammoniacum, aut sinilita. Ad cataplasmata uero, apij ac foeni græci semen, althææ ac chamæmeli flos. Et in summa, cōposita hæc facultatē habeant, ex laxatoria tenuiū partiū, & amara, ac adstringēte.

De immodicis perfrigerationibus ac rigoribus in febre. CAP. XLVI.

Rigor indica  
torius

**R**igoribus qui iudicatorio modo fiunt, resistere non oportet, neq; certamen exoluere: sed & perfrigeratio quæ ex sudore oboritur, promptè sedatur, & nihil molestat. Si uero perseueret rigor, aut perfrigeratio (à frigidiore uero & multa pituita maxime oboritur) primum artus pluribus modis constringendi sunt. deinde primum illinendi oleo chamæmelino, aut cyprino, aut irino. Si uero maiore auxilio opus sit, piper quoq; oleo ammiscendum est, aut roris marini semen, aut adarce, aut castorium. Et frictio mollis totius corporis adhibenda est. Quo uero non facile oleum defluat, non ineptum est ceræ parum in ipso liquare. Quod si rigor recalescere non possit, fortioribus etiā acopis ex his compositis, & dropacibus, ac sinapismis utendū est, & alia insuper fomenta conuenienter excogitanda. Sed & aciora odoramenta conueniunt, calaminthe, pulegium, hyssopum. Quin & ante febris accessionem, aqua mulsā bibenda est, in qua piper & ruta sintineo cta. Et succi cyrenaiici mlij magnitudinem cocleo melle efformati, duabus ante exacerbationē horis dabimus. Similiter & sulphij succi. Sed & id quod ad quartanas ex succo cyrenaico componitur, multis profuit. Et qui in oleo multi calidi solia se dimiserint, inquit Archigenes, rigores pertinaciter hærentes exduferunt. At Galenus ante accessionē febris, cutem abrotano defricare iubet, aut calamintha sicca, aut conyzæ folijs & floribus, aut costo, aut pyrethro, utrisq; his cū oleo: & aut omnino nō, aut saltē minus rigeat.

De sudoribus. CAP. XLVII.

Sudor indica  
torius

**S**udores iudicatorios admittere oportet usq; ad sufficientem evacuationem, ita ut etiam adiuuemus moderata calefactione, ac quiete, ut sudor non abstergeamus. Alius enim alium ducit: & calida oris collutione ac forbitione, & somno. Sed & remissos sudores similiter ut iudicatorios adiuuabimus. Quæ igitur sudores ducunt auxilia, libro primo capite quadragesimo octauo sufficienter relata sunt. Postquam uero sudores amplius prouperint, tunc detergere oportet, & tegumenta leuare ad refrigerandum. Lassitudinem enim inducunt nimium erumpentes, adeo ut sæpe ad syncopen adduxerint. Tenue igitur sit amiculum & madefactum, & aer frigidior, somnus quoq; ac uentilatio assumat. Et myrtus nigra trita corpori inspergatur, & similiter galla, & pini cortex. Electrum item ac polenta, cum uino adstringente, partibus admittentibus imponantur. Et spongia posca imbuta facies detergeatur. Archigenes autem & calcem uiuam, & secem uin

Sudorem repri  
mentia

uiliam

Austiam, tum in his, tum in rigore recalescere nequeſſe aſſumit. Ambo enim hæc inquit, dum incaleſcunt reſiccantur, Irrigare etiã medias corporis partes iubet ſucco plantaginis, aut coriandri, aut portulacæ, aut braſſicæ, quo compactæ ſudores arceant. In ſomno uero, in cimolia terra aqua diſſoluta, pingueſcunt linteola, & ſubiſciuntur dorſo ac thoraci. Illinendum eſt autem totum corpus roſaceo, aut melino, aut myrteo, aut lentifcino, aut cera, ſi ex his paratis. Idonea enim magis ſunt his pinguiã, eo quod obſcuros meatus obturant, humoris tranſitum prohibentia. Maniſeſtũ uerò eſt quod & cibus ſicior his conducit, & uina moderatè adſtringentiã. Verũ à pluriſus potionibus, & præſertim humidioribus, & à frequentibus oris colluſionibus abſtineant. Si uero id fieri poteſt, etiam geſtationes aſſumantur, in frigidiore aëris conſtitutione. Extremæ autem partes his maxime perfrigetur. Qui uero per expreſſionem ſunt ſudores: Hi autem ob dolores, aut conuulſiones contingunt: eos & deligatone, & ſotu extremarum partium, & panniculorum lancorum defricione leuiter curare oportet.

*Sudores per expreſſionẽ*

*De tuſſi in febribus.*

CAP. XLVIII

Tuſſi in febribus, præſertim cũ rigore orientibus, reſiſtere oportet. Nam pertuſſis inſtantiam labans alioqui febris erigitur. Dandæ igitur ſunt confectiones ſub lingua tenendæ, ex melle cocto coactæ, quæ linguæ ſubditi eliquantur, atque inde hypogloſſia uocantur, & id quod bonam ſpirationem impedit diſſoluant. Tempus uſus ipſarum eſt circa exacerbationẽ uirgoreſ, & deinceps uſque ad modicum tempus ante acceſſionem. Detur item aqua muſſa cocta. In quibus uero neruorũ genus ſuſpectum non habes, tempore progreſſu confidenter etiam acetum muſſum dabis. Sin minus, hyſſopi decoctum. Hoc etiam rigentibus auxiliatur. Dabis item caſtorium, ſi febris non ſit ardens. Hoc & neruorum generi conducit. Eclegmata uero delingantur ex pini & ſtrobili nucleis, iride, ſemine lini, amygdalis amariſ, & urticæ ſemine. Pleraque ex his etiam cibis ammiſceantur. Sed & reſina terbinthina in ouo detur. Forinſecus aſſi thoraci, & partibus circa arteriam, lana ſulphurata imponatur. oleum uero aut rutaceum ſit, aut irini, aut anethinum. Ligamentum quoque robuſtum in longum deligatur, tuſſes exacerbare cohibet: in medijs dico, ac extremis partibus. Nec præter rationẽ eſt, tuſſis gratia uti ſtaphyde ſylueſtri, ita ut unã cum uuiſ paſſis, aut cum maſſi che manduceatur. Quin & extremæ partes defricandæ, contrectandæ ac deligandæ ſunt. Deinde ruſus exoluenda illa in contrarium protractio. Si uero ob febris acrimoniam tuſſis irritat, gargarizare ex aqua tepida utendum eſt. Sed & frigida ſæpe proſiuit. Conferunt & ex poſca gargarifini, & ex palmularum, aut roſarum, aut radicis dulcis decocto. Viſceribus autem ac ipſi cordi ea quæ moderatè frigefaciunt imponenda ſunt.

*Tuſſis in febribus*

*Hypogloſſia*

*Lana ſulphurata*

*De ſternutatione.*

CAP. XLIX

Sternutationes ſæpe uexant in febribus illabentes. Nam & caput replent, & uires proſtrunt. Quibuſdam etiam ſanguinem erumpere faciunt, atque alias cuiuſmodi turbationes inducunt. Quare ipſis reſiſtere oportet. Ir-tuentem itaque ſternutationem cohibet conſtrictio naſi, frontis, & oculorum, oſcitatio item, & palati diligens frictio, ruſtus, laterum mollitudinis intentio, capitis eleuatio, conuerſio ad latus, ſummarum partium cõrectatio, muſculorum mandibularium inunctio, olei calidi in aures inſuſio, puluini calidi ſub mentum ſubditio. Vitare autem oportet repentinam ex ſomno excitationem, ſumum, puluerẽ, acriores odores, piperis, caſtorij, ſinapis, mentæ. Lenis eſt odor mali, ac polentæ. Nam ſternutationẽ elapſum obtundit. Idem faciunt & ſpongix marinæ nouæ. Caterum impetu ad ſternutationem oboriente, & ſternutatione non prodeunte, labia quieſcant, & acriores odores aſſidue experiatur, & mens remittatur.

*Sternutationẽ cohibentia*

*De ciborum inappetentiã.*

CAP. L.

Si ob uitioſos humores ciborum inappetentiã oboritur, cibi ac potus illi dandi

*Inappetentiã ciborum*

dandi ipsis sunt, qui tales humores detergere, & aut per uomitum, aut per infernam alium excernere solent: aut temperare, & meliores efficere possunt. Horum materiam habes in praecedente hunc libro, qui primus est totius operis. Si uero ob uirium debilitatem inappetentes sunt, quandoquidem omnis uirium facultas propter partium intemperiem debilis est, intemperiei speciem per contraria curare oportet. Variegationem itaque de inappetentia tractationem, inter stomachica libro tertio trademus. Verum in febricitantibus statim ab initio appetentiam odoramentis recuperare conandum est, maxime aqua in qua polenta subacta est, aut posca, aut uino diluto, aut fructus alicuius odorati ac adstringentis decocto. Vnctione item leni, & moderata totius corporis frictione ac contredatione, & faciei proluitione, ac modicae aquae absorptione. Sed & digitorum immisione stomachus lancinatus, conuersus quodam modo ad hoc est, ut cibum admitteret, & praesertim ubi biliosum quid aut acetosum eductum est. Post primos dies etiam cataplasmatibus forinsecus stomachus inuitetur, quae parata sint ex palmulis, malis, cenanthe, absinthio, aloë. Cibi uero praeparantur plures & simplices, & frumentacei, & qui ex alia materia alterationes quasdam habent, non tamen procul ab usu febrium recedant, inter quos fructus quoque pomorum numerari possunt, qui non facile aescunt, neque ualde dulces sunt, sed maturi, & non usque ad satietatem, sed solum ut appetentiam ad alios cibos iritent. Ad sint autem ipsis dum cibum capiunt, qui lenissimi sint, & compescere ipsos ac cohibere possint. Remotis iam febribus, si etiam in refectionibus inappetentia permaneat, sisarum coctum cum aceto mulso, & lactuca, & oliuae muria conditae, & capparitis, & fassamentum, & bulbi, & quicquid stomacho commodum est excogitetur, ita ut & illos cibos in memoria reuocent, in quibus dum sani essent, maxime immorabantur. Deambulationes etiam ac gestationes, & uociferationes, & dropacismi, & frictiones, & exercitia assumentur. Sed & praepotationes succi absinthij, aut aloës. Aceti quoque scillini mystri mensura absorpta probe facit.

Præpota-  
tiones

De magna fame.

CAP. L.

Fames magna  
Bulinos

Si uero ad magnam famem, bulimon appellatam, ciborum inappetentia deueniat, hoc est ut excellenter animo inquatur, hos reuocabimus tum alijs odoramentis, tum suillis carnibus assatis, & hoedinis. Et in summa omnibus nidorosum odorem habentibus, nimirum ubi acumen febrium iam praeteriit. Et extremitates ipsorum deligare, ipsosque excitare oportet, & maxillas pungendo, & capillos aut aures uellicando. Reuocatis autem, panem ex uino diluto dabimus, aut aliud quid ex his quae facile distribui possunt.

De carina appetentia.

CAP. LII.

Carina ap-  
petentia

Et si hoc symptoma non ita ualde in febribus accadat, sed aliquando post ipsas, tamen tum alijs, tum ob cognationem quam ad ciborum inappetentiam habet, non malum fuerit, & de immodica dicere appetentia, quum ambae modi excedant. Quandoquidem igitur a pituita acida haec affectio maxime oritur, his quae hanc secant ac detergent utendum est. Sunt autem talia dulcia & fassa, & alioqui deterforia calefacientia. Vinum igitur ipsis dare oportet largum, & multum calfaciens, talia autem sunt fulua colore, aut rubra, citra adstrictionem. Magis uero dulciora danda sunt, etiam si non sitiant. Quum autem ad prandium accedunt, primum pinguis ipsis dare oportet, & alia omnia multo oleo praeparata, nihil austerum, aut adstringens habentia. Haec enim etiam si non palam ipsam impugnent causam, tamen incontinentem ad cibos impetum dissolunt. Verum abstinentia ab his, pituitae in stomacho collectionem minuit. Et fassamenta danda sunt. Postea uero praedicta uina largè bibant. Si enim longiore tempore ita fecerint, sedantur.

De siti.

CAP. LIII.

Sitis cause ex  
curatio

Si itum admodum paruam, propter siccitatem, aut caliditatem partium fieri putandum est, per quas potus humor ex ore ad uentriculum defertur. Et me-

**A** Et medela quidem siccitatis, est somnus. Caliditatis autem, uigilia. Aliqui tamen siccitatis ex uino fiunt, & ob eduliorum caliditatem, & horum medela est frigida potus. Appetunt autem uitiosas qualitates, quemadmodum etiam cibos, iuxta rationem prædominantis uitiosi humoris. Cæterum inextinguibili correptositi, ex qua etiam mortui sunt, aliquando uidi quosdam, qui uiperas dipsadas appellatas edissent: & qui uino ueteri se inebriassent atque hos qui in navi, in qua aqua deficeret, essent: nam qui ex ipsis marinam bibere ausi sunt, omnes perierunt. At in febribus sitim, mitigare solet capitis irritatio ex frigidissimo oleo, aut rosaceo, quæ cum delapsione instar salientis aquæ contingit. Optime uero ad sitim facit lactucæ nigrae semen commanum, & glycyrrhiza appellata, & cucumeris semen ore detentum. Dato etiam sitim eximè cataportum hoc. Cucumeris satius drach. viii. tragacanthæ drach. iiii. Tragacantham ouorum crudorum recentium albumine dissolue, & ubi dissoluta fuerit, ad cucumeris semen antea tritum adijce, & ex simul tritis ac emollitis catapotia efforma, eaq; in umbra secca, & unum sub lingua tenendum præbe, ita ut dissolutum liquor absorbeat. Dato etiam cremorem malorum cydoniorum, aut pirorum, aut mespilorum, aut pampinorum uitis absorbendum: aut mali punici succum.

De lingua aspera. CAP. LIIII.

**L**inguae asperitatem humectare oportet, ita ut seminis lini decoctum ægros in ore continere iubeamus. Efficacius autem erit, si myxæ cum lini semine fuerint coctæ. Sed & digito in hoc succo tincto, & lingua conficta, os aqua pura colluat, aut spongia detergeant. deinde rosaceo illinant. Sed & ipsum rosaceum melli ammixtum egregie efficax est. Et portulacæ succus ore detentus, & rhus qui obsonijs inspergitur, aquæ mulsæ mixtus probefacit. Et damascenorum, & myschij, hoc est myxæ ossa in ore retenta, & linguae obuoluta, & lactucæ cauliculus. Archigenes uero sal Indicus inquit, colore quidem & compage similis communi salis, sapore uero mellito, lentis magnitudine, aut ad summum fabæ, arrosus, uehementer humectare potest. Decumbant autem in latus: supinus enim decubitus resiccat, & os claudant. Nam & hiare, humorem siccant. Sternutationes quoque accersitæ, omnibus alijs magis efficaciter linguas humectant.

De Nausea. CAP. LV.

**Q**um absq; eo quod aliquid quod uomitum mouet ingessit, nauseabundus fit æger, manifestum esse opinor, ut ratiocinemur prauos humores uentriculum infestare. Quidam uero lancinantur quidem, non autem uomunt quicquam, in ipsis tunicis humore imbibito. Si igitur pituitosi sunt humores, coquere ipsos oportet, homine in quiete, & inedia, ac somnis seruat. Si uero tenuiores, uomitus ipsos efficit, qui aliquando ex pituitæ succo contingit, aut aqua mulsæ. Qui uero uiscosissimi ac crassi, attenuantibus opus habent, quale est acetum mulsum, & similia. Quod si humiditas praua in tunicis imbibita est, amara ex aloë confectio commoda est. Verum quæ adstringunt, plurimum lædunt. Quemadmodum rursus ubi humiditas multa est, citra prauam uitiationem, quæ adstringunt commodissima sunt. Verum medicamentum ex aloë ad marcorem perducit. At si frigiditas humiditatis ad est, ad adstringentia ammiscenda sunt etiam calefacientia. Signum autem frigidam esse affectionem, est non sitire, neq; ardorem sentire.

De bilis uomitu. CAP. LVI.

**B**ilem uomentibus cataplasma adhibendum est ex palmulis, malicorio, galla, coctis in uino aut posca, pane simul contrito. Sed & acacia, & hypocisthis, & balaustium, & rhus cataplasmati ammiscantur. Et cucurbita cum multa flamma affixa magnopere prodest. Cibum uero sepe, paulatim dabimus. Cæterum in his qui atram bilem uomunt, & stomachum inflatum habent, sponglas aceto acerrimo calido imbutas impone, aut hederæ folia in uino cocta appone.

De sin,

Singultus  
causae

**S**ingultus fit aut ob repletionem, aut ob euacuationem, aut humoribus ac-  
ribus stomachum mordentibus, quibus uomitu reiectis fedatur. Multi  
uero etiam ubi medicamentum ex tribus piperis generibus constans acce-  
perunt, si statim uinum insuper bibant, singultiunt. Quod uero etiam aliqui  
cibum corrumpentes singultiant, ex confectis est. Sed & à rigore multi sin-  
gultiunt. proinde in his qui ob plenitudinem aut mordacitatem singultiunt,  
sufficientem medelam esse uomitum comperiemus. Calefactionem autem  
in his qui ob frigiditatem. Quum uero ob repletionem factus fuerit singul-  
tus, uiolenta opus habet euacuatione. Hoc autē praestat sternutatio. At sin-  
gultus ob euacuationem, sternutatio non sanat. Dare uero singultientibus  
oportet, rutam cum uino, aut nitrum in aqua mulsā, aut fesci, aut daucum,  
aut cuminum, aut gingiberim, aut calamintham, aut natum celticam. At-  
que hae quidem sunt auxilia eorum qui ob ciborum corruptionem, aut ob  
frigiditates, aut ob repletionem singultiunt. Verum his qui ex plenitudine  
singultiunt, ob frigidos ac uiscosos humores, castorij obolos III. dato ex pa-  
sca bibendos. Idem etiam forinsecus cuti ad stomachum impositū prodest,  
cum oleo sicyonio aut antiquo. Conuenit etiam acetum scillinum, aut ace-  
tum mulsū in potu. Sed & detentio spiritus magnoperè commodat.

De aluo suppressa ac laxa in febribus. CAP. LVIII

Alui humores  
et ac fluida

**Q**uæ resiccata aluum promoueant, in primo libro telata sunt, quæ  
opus erat. Quandoquidem uero & in febribus hanc humectari cōtin-  
git, hic de hoc dicendum uenit. Multi enim non pro febris ratione, sed pro  
pter solum hoc symptoma perierunt. In principio igitur sustinere oportet  
ea quæ prodeunt, ita ut nihil resistamus aduersus ea quæ ex corruptione ac  
cruditate efferuntur. Verū ubi ultra modum euacuatio contingit, cohibere  
conuenit. Et si quidem acriora prodeant, oportet ea quæ exhibentur boni  
succī esse, & alioqui etiam crassiora. Talia autem sunt, sorbitiones ex alica  
ac ptisana. Sed & balnea his commoda sunt, post morbi concoctionē. Vbi  
uero pituitosiora & fluida feruntur, uice uersa sicciores sint ac calidiores ci-  
bi, quantum febres permittunt. Tales autem sunt qui ex condimentis cal-  
ctorijs parantur. A balneis autem his abstinendum est, si non quid aliud co-  
gat. Quod si debilis sit concoctoria facultas, adstringentibus edulij & au-  
xilij utendum est. Edulij quidem, in quæ maxime mala punica, aut poma,  
aut pira, aut mespila sint infecta: aut etiā his ipsis, & uino tenui odorato ad-  
stringente. Auxilij autem ex cataplasmatibus polenta, palmularum, ablu-  
thio, rosis, myrti baccis, & consimilibus materiæ. Considerandum uero in qui-  
bus maxime partibus imponenda sint cataplasmata, circa stomachum di-  
co, aut infernam aluum. Quandoque etiam circa lumbos imponimus. At  
cruentitas excretiones reprimunt ac resiccant cataplasmata ex thure. Aut po-  
lentæ pollen cum thure, aut manna, uino aut posca subacta. Acriorem uero  
humiditatem per infusum clysteris edulcare oportet, quandoq; per solam  
aquam, quandoq; per ptisanā, aut alicā, aut oryzā, aut tragi succum: atq;  
hoc non semel, sed saepe. Postea uero ammiscendæ sunt & rosæ siccae, aut  
myrti baccæ, aliquando etiam gallæ. Et ouum unā cum rosaceo, & uino te-  
nuī adstringēte, aut rosarū decocto infusum, aut etiam sedī appositū, prom-  
ptitudinē ad excernendū hebetat ac retundit, ubi uero frequēs cōtingit ad-  
eğerēdū surrectio, glomer ex calidis staminib. ad sedē efformatus apponē.

Glomeris ex  
staminibus  
usus

De sanguinis stillatione, et sanguinis in naribus eruptione. CAP. LIX.

Sanguinis  
stillatio

**Q**uandoquidem sanguinis stillatio plenitudinem in toto corpore, aut  
in capite significat, ob expressionem contingens, aut ob meatu den-  
sationem: Amplior autem excretio plenitudinem laxare ac minuere potest.  
iuxta rationem uero ipsam facere licet inde, unde natura impetum habet.  
Hac ratiocinatione facta, ausus fui in destillationibus quarta die cōtingen-  
tibus, per typham uelut mos est, uasa in naribus sauciare. Verum nō oportet mor-

Typhæ usus

tet mor

At et modico fluxu contentum esse, sed iuxta vires detrahere. Cæterum spon-  
taneas in febribus per nares sanguinis eruptiones, si iudicatorio modo sūt, *Sanguinis  
eruptio*  
sustinere oportet. Si vero immoderate sanguis feratur, reprimere conari.  
Deliguntur igitur primum ualide extremæ partes, & æger ita figuretur ut  
sublime caput habeat. Videtur autem & præputij pudendi uirilis deligatio,  
sanguinis è naribus eruptiones peculiariter cohibere. Non autem emun-  
gat, neq; irritet locum, sed grumum congelari sinat. Et nasus spongia posca  
imbuta detergeatur, & cuneolus ex linteo in narem unde sanguis erumpit,  
indatur, facta prius illitione ex aliquo sanguinem sistente. At horum medi-  
camentorum materiam, ac reliquam curationem, in tractatione de locis as-  
fectis, libro post hunc sequenti abundè proponemus.

De animi deliquio.

CAP. LX.

HIS qui ex cholera, bile supernè ac infernè prodeunte, & ob alui profu-  
sionem, & propter alias multas & acervatas euacuationes exoluuntur, a  
quam frigidam aspergere oportet, & nares apprehendere, & os uentriculi  
confricare, & ut uomāt subere, stomachumq; lancinare aut per digitos, aut  
per pinnas immittas. Sed & fortiter multis ligamentis deligare, ubi quidem  
per infernas partes euacuationes fiunt, manus: ubi uero per supernas, cru-  
ta. Excogitare insuper in his quibus sanguis erumpit, figuram sursum uer-  
gentem citra dolorem. Est & cucurbitra affigenda, ita ut ad contrarias his  
quæ euacuantur partes retrahamus. Sanat etiam uinum aqua temperatum  
exolutiones ex acervatis euacuationibus abortas, si non uiscerū inflamma-  
tio, aut capitis uehemens dolor, aut affectio aliqua mentem emouens, aut  
febris ardens, in morbo crudo prohibeat. Nam in his uinum magna detri-  
menta inducit. Et si quidem æstas fuerit, & æger calidi temperamenti, & a-  
quæ frigida potior, frigida danda est. Sin contra, calida. At uero his qui ob  
sudorem copiam animo linquuntur, cutem densare oportet, uelut antea di-  
ctum est, & flatuum frigidorum accessus excogitare. Verum fluxionibus  
in uentrem nihil horum conuenit, præterquam ut uentri & stomacho cor-  
roborantia adhibeamus, & hos lauemus. Balnea enim fluxionibus in uen-  
trem commodissima sunt. Sed sanguinis eruptiones & sudores uehemen-  
ter exasperant. Cæterum eos qui ob plenitudinem animo linquuntur, à ui-  
no & cibo abstinere oportet, & à balneis, si febricitarint. In potu detur aqua  
malsa, in qua thymus, aut origanum, aut pulegium, aut hyssopum sint inco-  
cta. Commodum his est & acetum mullum. Si uero propter prauos humo-  
res in stomacho cōtenos animo linquantur, uomere ipsos iubeto ex aqua  
& oleo, digitorum aut pinnarum immisione. Si uomere nequeant, oleum  
optimum bibant. Hoc sæpe etiam per infernam aluum euacuat. Sed & ab-  
stinium his prodest. At si ob stomachi debilitatē exoluantur, his quæ cor-  
roborare ipsum possunt utendum est, uelut antea in capite de ipso dictum  
est: & extremas partes defricare oportet, & eos qui ardore exusti sunt, ad  
balneum ducere, perfrigeratis uero, medicamentum ex tribus pipēris gene-  
ribus constans, & ipsum quoq; pipēris dare. Qui uero ob ampliorem calidi-  
tatem, aut ob solis ardorem, aut quod in balneis moram diutius traxerunt,  
animo linquuntur, eos curabis frigidam aquam aspergens, & ad uentū cō-  
uertens, & stomachum fricans, & uinum ac cibos exhibens. Si uero pro-  
pter inflammationis magnitudinem, aut malam febris afflictionem, in ac-  
cessionum insulubris animi deliquium incidant, & perfrigerētur, artus for-  
titer fricare oportet, & calefacere, ac deligare, & uigilare iubere, & à cibo  
abstinere. Hæc autem & ante exacerbationē facienda sunt. His uero qui  
propter siccitatem animo linquuntur, duabus aut tribus hōris ante exacer-  
bationem cibus dandus est, aut alicui succus, aut panis ex aqua, cum mali  
punici granis, aut pomis, aut piris. Si uero magnum periculum timeatur,  
etiam uinum detur. Sed & in his qui derepente animo linquuntur, ita fa-  
ciendum est. Et ubiq; causam, ob quam animi deliquium contingit, consi-  
derare

derare oportet, & aduersus hanc instare. Quandoq; tamē etiam symptoma-  
tis maior cura habenda est, si quidem periculum, aut mortem minetur.

Vlcerationis circa os sacrum curatio. CAP. LXXI

Ossis sacri ex-  
ulceratio

ET hæc affectio in febribus maxime diuturnis, propter decubitus diu-  
nitatem contingit. Quum igitur locus rubicundus fieri incipit, circuli  
lancum iustæ magnitudinis loco subdemus. Postea uero rosaceum aut myr-  
reum ceratum, quod spumam argenti, aut cerulam recipit, imponemus. In-  
flammatione autem oboriente, panis cataplasma cum solano, aut polygo-  
no, aut plantagine, aut brassica tenera. Si uero ulceratio pascendo proles-  
cat, lenticula cocta cum malicoto imponatur.

### CAPITA TERTII LIBRI.

*In hoc libro, qui tertius est huius Operis, de affectionibus secundum  
locos sermo habetur, cuius initium à summo capite est, & ad extremos  
pedes terminatur.*

De alopecia, ophiali ac caluicie.

Capur I

Quæ crispas capillos faciunt, & quæ  
eosdem tingunt. Cap. II

De affectionib. cutis capitis. Ca. III

De capitis dolore Cap. IIII

De cephalæa, capitis dolore anti-  
quo, & de hemicrania, dimidiæ ca-  
pitis partis affectione Cap. V

De phrenitide. Cap. VI

De cerebri inflammatione. Ca. VII

De cerebri erysipelate. Cap. VIII

De lethargo. Cap. IX

De catocio, id est soporis detentio-  
ne, siue uigilante sopore. Cap. X

De amissione memoriæ ac rationis,  
& de sopore ac fatuitate. Cap. XI

De uertiginosis Cap. XII

De morbo comitali. Cap. XIII

De melancholia, & infania, & his  
qui numine afflati putantur. Ca-  
put XIII

De incubo. Cap. XV

De lycæone, aut lycanthropia. Ca-  
put XVI

De amantibus Cap. XVII

De syderatione, semisyderatione, si-  
ue resolutione Cap. XVIII

De conuulsionibus Cap. XIX

De tetano, id est distentione, eiusq;  
differentijs. Cap. XX

De tremoribus Cap. XXI

De oculorum morbis Cap. XXII

Aurium affectiones Cap. XXIII

De narum & olfactus affectionibus  
Cap. XXIII

Ad faciei affectiones. Cap. XXV

De oris affectionibus. Cap. XXVI

De angina, & huic uicinis affectio-  
nibus, ubi & de his qui strangu-  
lantur, aut aliâs quomodocunq;  
suffocantur Cap. XXVII

De grauedine, & defluxu, & de arte-  
riacis, ac de tussi. Cap. XXVIII

Derectæ ceruicis inspiratione, anhel-  
tione, ac spirandi difficultate. Ca-  
put XXIX

De peripneumonia. Cap. XXX

De sanguinis spuro. Cap. XXXI

De suppuratis & tabe. Cap. XXXII

De pleuritide. Cap. XXXIII

De cordis affectionib. Ca. XXXIII

De affectionibus circa mammis.  
Cap. XXXV

Ad grauem alarum fortorem ac exu-  
dationes. Cap. XXXVI

De affectionibus circa stomachum,  
præcordia ac uentrem. Caput  
XXXVII

De uetris inflatione. Ca. XXXVIII

De cholera. Cap. XXXIX

De leuitate intestinorum, & colicæ  
ca affectione. Cap. XL

De tenesmo. Cap. XLI

De dysenteria. Cap. XLII

De colica affectione. Cap. XLIII

De uoluuulo. Cap. XLIII

De rhenum ac uescicæ affectionibus  
Cap. XLV

De hepatis affectionib. Cap. XLVI

De malo habitu. Cap. XLVII

De aqua inter cutem. Cap. XLVIII

De splene. Cap. XLIX

De morbo regio. Cap. L

De



De umbilici prolapſu. Cap. L I	De abſceſſu uteri. Cap. L X V
Quomodo quis impubis ac imber- his diu permaneat, & de puden- dorum ac teſtium cuſtodia, & ſi mul philoſtra. Cap. L II	De ulceratione uteri. Cap. L X VI
De herniæ ſpeciebus. Cap. L III	De cancro uteri. Cap. L X VII
De teſtium inflammatione, itemq; ſcorti, & de alijs ipſorum affectibus Cap. L IIII	De ſcirtho ac tumore duro. Ca- put L X VIII
De ſeminis profluuiſio, & eiſdem in ſomnis effuſione. Cap. L V	De mola. Cap. L X IX
De ſatyriaſi. Cap. L VI	De inflatione uteri. Cap. L XX
De priapiſmo. Cap. L VII	De uteri ſtrangulatione. Cap. L XXI
De membrorum genitalium impo- tentia. Cap. L VII I	De uteri prolapſu. Cap. L XX II
Pudendorum ac ſedis affectiones. Cap. L IX	De obſtumento in utero. Ca- put L XX III
De uteri affectionibus. Cap. L X	Non concipicntium curatio. Ca- put L XX IIII
De menſiu ſuppreſſione. Cap. L XI	De fiſſuris, condylomatis, ac hemor- rhoidibus uteri. Cap. L XX V
De nimia purgatione uteri, & ſan- guinis ex eo eruptione. Ca- put L XII	De difficili partu. Cap. L XX VI
De fluxu muliebri. Cap. L XII I	De coxendicium morbo. Ca- put L XX VII
De inflammatione uteri ac declina- tione. Cap. L XII II	De podagra & morbo articulari, ar- thritide dicto. Cap. L XX VIII
	Ad perniones in plantis ac pernīs. Cap. L XX IX
	Ad clauos ac callos. Cap. L XX X
	De affectionibus circa ungues. Ca- put L XX XI

## PAVLI AEGINETAE REI MEDI-

CAE. LIBER III. IANO CORNARIO

*Medico Phyſico interprete.*

## DE CAPILLORVM AFFECTIONIBVS.

De alopecia, ophialſi, ac caluicie. Caput. L



VE MADMODVM plantæ aliquæ ob humoris inopiā reſiccatae corrumpuntur, aliquæ uero ob humoris alieni ab ipſarum natura attractionem. Ita etiam in capillis fieri ſolet. Nam ob humorum inopiam caluicies contingit, propter uſtiatos autem humores, alopecia & ophialſi, ſigura ſolum inter ſe differentes: nam in ophialſi ſerpenti ſimilis pars læſa apparet: uerum alopecias ex eo quod hec

*Simile**Caluicies.  
Ophialſi  
Alopecia*

affectio frequenter uulpeculas infeſtet, nominauerūt. Ex colore igitur cutis, redundantem humorem conſectantes, euacuatione per purgatorium medicamentum prius utimur, deinde localibus auxilijs curationem abſoluimus. Si igitur color cutis nigrior aut albidior factus fuerit, per hiergam antidotum purgamus, quæ & pituitam, & atrabiliarium humorem euacuat. Si uero pallidior, catapotia ex aloë dabimus. Vniuſcuſque ex his deſcriptionem in libro de compoſitis medicamentis reperies. Poſt totius corporis euacuationem apophlegmaſimo pituitam per os derahente utendum eſt, non ſemel, ſed ſæpe, ex aceto, ſinapi ac melle. Melius autē eſt ſi in aceto origanum quoq; aut pulegium, aut thymus, aut hyſſopum maceretur. Sed & in alijs circa caput affectionibus, eadem methodo utendum eſt, ita ut primum redundantem humorem euacuemus, aut per purgationem, aut per

uenae sectionem, si etiam sanguinis redundantia fuerit, deinde sic ad localem curationem procedamus.

Ad alopecias. Vbi nitro preparasti, & linteo aspero, aut potius lana extexisti, & ad ruborem defricuisti, verbenacam in sole cum aceto trita illine. Aut alcyonium asperitimumustum ac tritum, cum oleo lucernarum illine. Aut atundinis radicem, aut amygdalae amarae corticemustum, oleo aut adipe ursino exceptum illine. Moderata igitur sunt haec. fortiora uero quae ex euphorbio & thapsia, & adarce, cum oleo laurino trita, aut pice liquida.

Aliud. Herinaceorum marinorum testas uistas ursino adipe excipe, & loco ex nitro preparato illine. Aliud. Piperis, stercoris ouilli sicci, itionis, seminis eruae, singulorum drach. 1111. ueratri albi drach. 111. stercoris murini drach. 1. excipe felle taurino, aut hircino aut suillo. Aliud, expectimento cognitum ad alopeciam. Radicis mandragorae, aristolochiae, radicis ari, cerae, picis liquidae, singulorum unc. v 111. axungiae porcinae non salis, nerij herbae cordis siue internae partis parum. Axungiam & nerium coquito donec herba flaccescat. deinde facta excolatione herbam abijcito, & reliqua ad axungiam adijcito ac coquito. postea ceram & picem liquidam addito, & confidenter in sole utitor. Et ubi ulcera ad cicatricem perducta fuerint, caput uulpeculae urito, & cum ipso alcyonium, anchusae nigrae folia, omnia trita supra illitionem superne inijcito, quo capiti pilis succrescant.

Aliud. Capitis muris ussi partem unam, testarum buccinorum marinarum partem unam, cum axungia porcina in olla coctis utere. potes & sicca ipsa inspergere. Medicamentum ex thapsia, ad omnes ueteres affectiones. Euphorbij, rhapsiae, baccarum lauri, singulorum unc. 1. sulphuris uiui unc. dimidium, ueratri unc. dimidium, cerae unc. dimidium, olei laurini, aut cicini, aut ueteris quantum satis est. In fortioribus etiam nasturtij unc. 1. & alcyonij unc. 1. Hoc non solum ad alopeciam, sed etiam ad omnem diuturnam perfrigerationem facit. Vbi uero preparatione pernitrum, & defricatione utendum est in alopecijs. Et pilis assidue radendi. Multos enim noui per solam defricationem, & assiduam rasuram pilos produxisse. Ad caluiciem & pilorum augmentum, ex Critone. Leporum uenires quinq; siccatos, in testaceo uase diligenter torreto, & ad hos tertiam uirgultorum myrti partem accipito, acaciae fructus, acaciae succi, rubi canini, singulorum tantundem. adianti unc. 111. Haec omnia tundito, ac tenui cribro excernito. deinde ad ipsius ursini libris 1111. additis, & adipis phoeae totidem contundito, & plumbea pyxide recepta seruato. Visus autem tempore quocunq; uoles ungento dissoluito. Conseruantia pilos. Polytrichi partem 1. ladani partes 11. nitro & myrteo oleo excipe ac utere. Aliud. Anemonae florem tritum cum oleo illine. Idem etiam pilos nigros facit. Aliud. Verbenacam rectam cum radicibus siccata ac contusam, tenui cribro excute, & ammixto oleo ut strigimentitiam crassitudinem accipias, in aeneo uase reponere. Et liquefactis pro oleo utere. Aqua pilos augens. eadem etiam nigrefacit. Aquae pluuiialis sextar. vi. rhois Alexandrini sextar. 111. polytrichi trientem, herbae sabinae trientem. ladani unc. 1. myrti unc. 1. cucurbitae siccae utic. 1. Haec ad dies uiginti in uase uitreo madescere sinito, bis per diem tadeacea spatula mouens. Deinde pestinem in aqua tinge, ac quotidie utere. Sed & althaeae semen in balneo affricatum, capillos conseruat ac auget. Similiter & oleum illitum, in quo althaeae semen coctum aut impositum fuit. Pilos attenuantia. Foliorum ficis, corticis uitis agrestis albae, pumicis, testarum buccinarum, terrae cimoliae, singulorum minam unam. Omnia in ollam nouam crudam immissa, & olla luto oblita, in camino torreto, ac terito: & aphronium mina dimidia, gallis omphacinis triginta, adiectis ac tritis excipe ac utere.

Aliud. Aphronitri minae dimidium, pumicis torrefacti ming quartam partem, aluminis scissi, iridis siccae, comae myrti syluestris nigrae, radicis bryoniae, singulorum drach. 1111. lupinorum crudorum molitorum congestam

Axungia non

salis

Nerium herba

Preparatio

per nitrum

Rhois Alexandrini

drinae

Pestinis usus

A quartam partem utere sine pingui. Ad defluos capillos. Aloē cum uino nigro austro illine. Aut purpuræ opercula cum oleo cocta. Aut myrrham & ladanum cum uino, & oleo myrteo. Aut caprinum sterus in testam utrum tere, cum oleoq; præfalsis illine.

Quæ crispis capillos faciunt, & quæ coslem tingunt. Ex Cleopatra scriptis.

Caput II.

Defricio prius capite, spondylii radix cum uino meraco capillis illina-  
tur. Aliud. Prærafo ac confricio capite, nucem pineam recentem  
sumito, & in cinerem exurito, & in mortarium confectam terito, myrteum  
ungentum affundens, donec mellis spissitudo fiat, atq; sic illinito. Aliud.  
Baccarum myrti ac betæ pari mensura utere, cum oleo africanis. Aliud.  
Gallas uiginti, adianti sextantem, in aqua marina ad mellis crassitudinē te-  
re, & ubi capillos urina aut lixiua prius confricueris, & aqua calida ablue-  
rit, ad biduum medicamentum hoc illinat, & ubi ipsum continuit ita, tertia  
die abluat, & siccatos capillos ungento myrteo inungat. Hoc tenerum fa-  
cit, & crispum ac nigrum capillum. Crispior autem fiet, si prærafus utatur.

Crispis capillis  
faciendis

A canis præseruantia, & alia denigrantia. Olei acerbi sextar. III. spis-  
sæ nardi drach. I. uinguis aromatici drach. IIII. floris iunci rotundi odorati  
drach. IIII. coquito cum oleo, & seorsim habeto acaciæ succi unc. I. uino  
dissolutam ac probe tritam. Quum autem olei tertia pars reliqua fuerit, ex-  
colato & ad acaciā ammisceto, uasculo excipito, ac unitor quotidie illinēs.

Aliud. Nucum uiridium corticis quadrantem, radicis ilicis quadran-  
tem, uini nigri sextar. III. coquito ad tertias, exprimito, & quod superest cū  
olei myrtini sextario uno commisceto. usus est quotidianus. Aqua capil-  
los denigrans. Gallæ sextar. I. rhois coriarij sextar. II. baccarum myrti ni-  
granum sextar. II. ligustri foliorum tantundem, cinnaræ manipulum, capi-  
tum papaueris tantundem, aquæ lacustris sextar. XII. Ad multos dies præ-  
nucrata ad tertias coquito, & prius defricis illinito. Quin & siccatos ca-  
pillos cimolix acetabulo uno, & calcis uiuæ pari mensura illinito. Hæc au-  
tem betarum coctarum succo dissoluta illinantur. deinde custodiæ gratia,  
betæ folia supernè imponito. Et ubi satis diu hæserint, in balneo abluito.

Vt fului pilis tingantur, & flauis fiant. Myrrhæ partem I. floris salis par-  
tem I. diligenter tere, & facta strigmenti spissitudine, præfrictum caput me-  
dicamento illinēs, & per diem ac nocte sine, & tunc abluere iube. Aliud.  
Lupinos crudos cum aqua illine. Aliud. Spumæ argenti drach. I. terræ  
creticæ drach. IIII. calcis uiuæ drach. I. cum aqua ad strigmenti crassitudi-  
nem redacta illine, & betæ folia superimponē ad duos aut tres dies, & ablu-  
e. Vt nigri capilli flauis fiant. Vinisecem in balnei strigmenta mitti-  
to, & cerati crassitudine facta illinito, ubi dormire uoles, & mane flauis sūt.

Terra cretica

Aliud. Ligustri folia in herbæ lanariæ succo macerato, & cremore utitor.  
Tinctura auræ referēs. Aluminis drach. VI. sandarachæ drach. VI. croci  
drach. II. thapsi qua tinctorēs utuntur, quā Romani herbā rubiā uocant,  
drach. VII. lixiuij pisorij sextar. IIII. Lixiuum & thapsū cōtusam ad  
dimidias coquito, & liquorem exprimito, & cum hoc alumen, sandarachā  
& crocum diluito, & in uas uitreum mittito. Vtus autem tempore præfri-  
ctis illinito. Vbi uero combiberint, ex fœni graci, ordci, ac cumini deco-  
cto abluito, ita ut aqua tepida sufficienti sapone addito prius obleueris.

Thapsus, quæ  
rubia

Lixiuum pis-  
satorij

Aliud. Fecem uini ustam, & oleum balaninum, simul mixta pilis illine.

Aliud. Saponem Gallicum cum aqua singulis balneis affricet. Aliud  
ualde prestans. Rhois rubri sextar. I. gallarum sesquilibram, steroris mu-  
rini sextantem, herbæ auræ colorem referentis, quam Romani rubeam uo-  
cant, sextantem, polytrichi fasciculos II. absinthij fasciculum I. lupinorum  
decorticatorum cyathos II. aquæ sextar. VII. omnia in uas uitreum conie-  
cta, ad dies IX. macerari finito, per diem bis agitando: usu uero postulante,  
quod satis est excolato, & in hoc spongiā imbutam capillis affricato, &  
hume,

Rubia auræ co-  
lorem referens

humectatos combibere finito. Vbi uero resiccatis fuerint, sapone in calida aqua dissoluto abluito. Vt pilis albis fiant. Verbasci albi florem uento, & aceto subigito, & ad smegma ammisceto. Aliud. Verbasci seminis drach. i. aluminis drach. i. corticis raphanorum drach. i. contundito, & glutinis taurini drach. i. ammisceto.

De affectionibus cutis capitis. Caput III.

De porriginē, siue furfuribus.

Porrigo  
Furfures

**P**orrigo tenuium ac furfuri similitum corpusculorum ex capitis, aut ex reliqui corporis superficie eliquatio est, citra exulcerationem. Fit autem uitioso humore ad caput allato, aut pituita falsa, aut bilioso, aut atrabilario sanguine. Post euacuationem igitur totius corporis, uelut dictum est, subscriptis compositionibus utendum est. Cimoliam aqua pramadefactam ad betæ succum ammiscet, illine, & donec resiccetur sine. deinde ablue, & ita cum uino ac oleo tere ac illine. postridie uero staphidem syluestrem cum oleo illine. Aliud. Nitri, fecis uini ustæ, myrobalanorum, singulorum lib. i. staphidis syluestris sesquilibram. Vino dissoluta capiti affricato. Si uero reliquum corpus pruritum habeat, sicca. Verum ad humidiores porriginē muria, aut lupinorum decocto, ad abluendum utere. Huius multam experimentiam habeo. Ad psyractia & pustulas capitis. Psyractia parua exuberantia sunt pustulis similes, in superficie ac summa cute exantes. Pustulae uero superficialia sunt ulcerationes, subrubicundæ, & asperæ. Ambo uero curantur subiectis compositionibus. Spumæ argenti drach. iiii. cerusæ drach. iiii. aluminis drach. ii. foliorum rutæ uiridum drach. ii. aceto & oleo myrteo trita illine. Aliud. Rutam & alumen trita cum melle, capiti præfuso illine. Si uero cutis capitis discedat, oleæ folia cocta cum melle impone. Aliud. Spumæ argenti, cerusæ, singulorum drach. xii. sulphuris uiui drach. vii. cerato myrteo excipe. Ad capitis ulcusculam, scilicet rubicunda, paruis papillis similia, à quibus sanies eliquatur. præfuso capite, & cum aqua ac nitro præfricto, sulphure uiuo cum urina humana trito utere. Aut melanteriam cum aceto illine.

De achoribus, id est ulceribus capitis manantibus, & ceriis, id est faui.

Achor

Ex affectionibus quæ in capitis cute sunt, est & Achor, ulcus manans, quod tenuibus ualde foraminibus cutē erodit, per quæ sanies redditur uiscosa. Similis ipsi in speciem affectio est, quam cerion, id est fauum uocant, eo quod foramina habet maiora, melleam humiditatem continentia, uelut apum faui. Generatio his est ex nitrosa ac falsa pituita. Vicium itaque consistunt ex boni succi cibo, ab omni acti ac falso abstinentes, & præsertim si inflammata sit affectio. Et post cōuenientem redundantis humoris euacuationem, præfusa pilis, bis aut ter, aut sæpius fomentum aquæ calidæ adhibes, in qua cocta sit myrtus, aut rubus, aut lens, aut lupini amari, aut asparagi radix. Quæ uero amplior sanies fluxerit, salicis folia cum aqua, aut cum lenticula, pro cataplasmate impone. Illitiones autem sint, terra cimolia, aut cretica, aut samia, aut pompholyx, aut spodium, aut argenti spuma, aut cadmia, aut charta usta, aut siccum ex charta medicamentum, omnia cum aceto.

Perdicia  
herba

to. Smegmate uero utendum est hoc. Sulphuris, herbæ perdicia dīs, & saponis, æquales partes. Composita hæc sunt. Spumæ argenti drach. xvi. foliorum rutæ drach. vii. staphidis syluestris drach. iiii. atramenti sutorij drach. ii. cum aceto ac myrteo oleo ad strigmenti spissitudinem redacta illine.

Sandix

Aliud. Sandicis drach. iiii. myrrhæ drach. iiii. sulphuris uiui drach. ii. mannæ thuris drach. iiii. cum oleo ueteri illine. Ad Achoras sanies manantes, recrementum argenti, aut plumbaginem tritam insperge. Aliud, ad achoras & humidam scabiem. Rosarum rododaphnes trientem, sulphuris uiui trientem, picis liquidæ trientem, picis siccæ trientem, ceræ sexuncem. olei myrti quod satis est. Verum in pueris laetè exoluta illinito.

Deficiat

## De fici.

**F**icus nominant eruptiones ulcerofas, rotundas, subduras, rubicundas, ad quas consequitur dolor. Nascuntur hæc plerumque in capite, sed & reliquo corpore. Optimum in his medicamentum hoc est. Aluminis scissi, floris æris toffi, glutinis taurini, singulorum æquales partes, cum dupla æris squamæ, terito cum aceto, & illinito. Commodant & menarum capita usta, & bulbi cocti, & cinis aceto permixtus. Ad scifas in capite ac mento pustulas, medicamentum siccum. Misyos drach. 15. chalcitidis drach. 115. squamæ æris drach. 1. aluminis scissi drach. 1. Hoc siccum loto large impone, ac sine. Sequenti die rursus loto, ac spongia deterfo impone. Crassissimum enim ulceris testorum decidit. Et rursus sequentibus diebus idem facito, intra paucos dies absque cicatrice sanat. Verum non parum uexat hoc medicamentum. Ad pediculos in capite. Lupinorum in aqua coctorum cremore confricare iube. Aut staphidem sylvestrem, aut sandaracham, aut ambotritha, cum oleo ueteri aut aceto illine. Aut pipæris parum, ut ne exulceret, cum oleo. Aut hederæ succum cum melle. Aut sinapi cum aceto. Aut cedriam, aut piecti liquidam, cum alumine. Aut baccarum lauri expressum retrimentum. Aut oleum raphaninum. Ego autem staphidem sylvestrem cum aceto & oleo tritam illeui, & semper successum sensi.

Ficus quæ sint eruptiones

Ficosa pustula

Pediculæ canis

De capitis dolore.

Caput IIII

**C**apitis dolor qui grauissimum symptoma est, aliquando ex sola qualitate intemperata oboritur: aliquando etiam ob humorum copiam: aliquando ex utraque causa. Quandoque uero & ob externam laceffentem causam: uelut ob ardorem extrinsecum, aut frigiditatem, aut ebrietatem, aut plagam. Vehementissimi igitur capitis dolores per acuias ac efficientes qualitates sunt, & maxime per calidam. Qui uero ob siccitatem fiunt, uehementiam non similiter habent. At humida qualitas, quantum in ipsa est, omnino dolotis exors est: præterquam si cum caliditate, aut frigiditate, aut humorum copia, coniuncta fuerit. Itaque de capitis dolore in febre contingente, in præcedenti de febribus libro dictum est. De alijs uero nunc dicemus.

Capitis dolor

Qualitates ætine &amp; passivæ

Humiditas doloris exors

De capitis dolore ex ardore solis.

His qui caput ex ardore dolent, cutis ad contactum calida, & siccior statim ad primum occursum apparet: & oculos rubicundos habent. Gaudent etiam frigidis perfusionibus, ac unguentis, & ex his opem sentiunt. Curatio uero his conuenit ea quæ ad dolentes caput in febribus relata est. perseuerante uero dolore, subscriptis cataplasmatibus utendum est. Fronti ac temporibus adhibita conueniunt, panis ex posca & rosaceo: quandoque cum amygdalis, aut rosis siccis, aut teneris, aut cum menta pulegio ammixto. Aut panis cum Petlici folijs, facit & ocymum tritum cum aceto & rosaceo. Aut hederæ corymbi aceto cocti, & cum rosaceo triti. Aut ad serpilli in aqua decoctum, farinam triticeam ammisceto. Aut cardamomum tostum ac tritum cum aceto & rosaceo. Aut fermentum cum rosaceo. Aut iris sicca cum aceto. Singula uero ex his assidue permutentur. Inefficacia enim sunt ubi diutius moram traxerunt.

Capitis doloris cause variæ

Pastilli ad capitis dolorem, ob calidam intemperiem. Croci drach. v. atramenti sutorij drach. x. aluminis drach. xvi. myrrhæ drach. vii. omphacis drach. iii. chalcitidis drachinas iii. gummi drachmas iii. uini austeri quod satis est. Vtere cum posca. Si uero etiam uigiliæ adsint, ex somnificis aliquid ammiscere.

De dolore capitis ex frigida intemperie.

Et signa & curatio eorum qui ob frigiditatem caput dolent, contraria sunt his qui ob ardorem. Nam & incontracta & decolorata ipsorum facies est: & frigidis neque gaudent, neque ex ipsis opem sentiunt. Horum autem cognitionem confirmabunt, & uictus ratio, & reliqua eiusdem ordinis. Inunctio igitur sit, oleum rutaceum, laurinum, irinum, nardinum, aut etiam balsami succus,

Balsami succus

fuccus, & maxime si crassiores & uiscae fuerint superfluitates. Oportet autem frontē ex hoc illinere, & ex his quoque quae ex pipere ac euphorbio parantur. Dandum est & uinum tenue, & iubendum ut motu utantur, & balneis calidis, & quandoque etiam uomitu à radiculis acceptis. In quibus uero qualitas est absque humorū copia, diutius durans, uteris & hoc medicamentum. piperis albi drach. II. crocomagnatis drach. II. euphorbij recetis drach. VIIII. stercoreis columbini drach. IS. ac etiam acerrimi quod satis est. Loco praefrictio illine affectam partem.

*De his qui ob biliosum humorem caput dolent.*

Signa quidem similia sunt his qui ob ardorem. Verum accedit ipsis maxime morsus, & faciei pallor, & quandoque etiam oris amaritudo. Aetatibus autem uigoris, & temperaturis calidioribus, & uitae curis oneratae, & his qui bilem flauam coaceruant, haec affectio magis contingere solet. Balneis igitur temperatis, & ungentis, & aquoso potu, in his utendum est. Et uniuersa uiscus ratio humidior, ac boni succi assumatur. Caeterum biliosus humor euacuandus est absinthij cremore, aut per aloē, aut per picram antidotum per seipsam, aut cum modica scamonia, & per cataplasia ex aloē. fons autem illinatur pastillo croceo, aut trigono, aut aliquo consimili.

*De dolore capitis per consensum.*

*Dolor capitis  
per consensum*

Si quidem ex toto corpore per consensum afficiatur caput, illi prospiciendum est, ita ut & aduersus intemperiem, & contra materiam superantem instemus. Et si quidem plenitudo fuerit, & maxime in uenis, uenam secabimus. Si uero magis qualitas, purgatorio medicamento utemur. At si alicui parti per consensum coafficiatur, uelut hepati, aut uentri aut stomacho, his auxilia adhibenda sunt. Et si quidem calida in ipsis fuerit intemperatura, partem ex uino aquoso dabimus, aut etiam sorbitiones ex alica. forinsecus autem irrigationes moderate refrigerantes ac corroborantes adhibemus, uelut antea dictum est. Si uero propter uiscosos & crassos humores in stomacho contentos, caput doluerint, etiam hos expellemus, acetum multum bibere exhibentes, tum simplex, tum Iulianum. Et decoctionibus ex hyssopo & origano, & calidioribus adhuc quam haec sunt, & quae magis secare possunt utendum est. Vomitu item à radiculis, & irrigationibus calidioribus, & cataplasmatibus.

*De dolore capitis ex uino.*

*Dolor capitis  
ex uini potu*

Si incoctum adhuc maneat uinum, iubendi sunt ut uomant ab aqua tepida potu. Si uero etiam post concoctionem caput doluerint, refrigerantibus ac repulsorijs utemur, uelut est rosaceum, & per se, & cum aceto, aut heracae aut brassicae succo. Sed & ipsa brassicae folia calida aqua rigata, & capiti circumdata ac alligata, naturaliter ebrietati resistunt. Quin & seruata brassicam edere oportet. Et lenticula his prodest, & praesertim his qui humidiores uentrem habent. Alicam item, & mala punica, & poma ac pira edant, & aquam bibant.

*De dolore capitis ex plaga.*

*Brassica aduer  
satur uino*

His qui ob plagam caput dolent, si non omnino in superficie plaga consistit, statim uenam secabimus, & conuenientibus capiti irrigationibus utemur, ex lanis nimirum oleo dulci imbutis, capiteque ex ipsis confecto. A uino autem & cibis solidioribus abstineant, maxime si febriant. Et in summa, uelut ad inflammationem partium neruolarum, & maxime cerebri membranarum, curationem adaptabimus. Si uero etiam uulnus factum fuerit, & hoc conuenienter curabimus.

*Malagma ad capitis dolorem.*

Cerae drach. VII. olei amygdalini quadrantē, terebinthinæ drach. VIII. æruginis rase, cimoliae, chalcitidis, singulorum drach. IIII. pumicis drach. III. aeris uisti, squamæ stomomaris, singulorum drach. II. Si uero durius esse uideatur, oleo amygdalino molliatur.

De Cephalæ capitis dolore antiquo, et de Hemicrania, dimidiæ capitis partis affectione. Caput V.

**V** Tragus harum affectionum perseverans capitis dolor est, qui strepitibus, clamoribus, clara luce, uini potu, & his qui caput replent, odoribus exacerbatur. putantque ita affecti sibi caput percussit, aliqui totum, aliqui altera parte, quos etiam Hemicranicos nominant. Et quibus quidem intra caluariam affectio consistit, his dolor ad oculorum radices pertingit. Quibus autem extra est, circa ipsam caluariam dolent. Dolores igitur cum grauitate, plenitudinem indicant: cum morfu, humorum aut uaporum acrimoniam: cum pulsationibus, inflammationem: cum tensione, si quidem absque grauitate & pulsu fuerint, spiritus tenuis ac flatuosi copiam: si cum pulsu, membranosi corpusculi inflammationem: si cum grauitate, plenitudinem intra membranas cõtentam. Si uero etiam putrefactus humor calidior sit, etiam cum febre caput dolent. februnt autem omnino & qui ob inflammationem dolent. Proinde ubi totum corpus humoribus plenum est, uenam secare oportet, uirium respectu habito: & infusus per clysterem uti acrioribus. Si uero adhuc redundare sanguis uideatur, etiam per nares uena aperta euacuanda sunt, quantum satis esse uidebitur. Deinde hiera exacuta danda est, & deinde utendum apophlegmatismis pituita per os detrahentibus, & euacuationibus per nares, inditis in ipsas errhinis appellatis, uelut est elaterij succus, qui cum lacte infunditur: aut etiam sicum elaterium, quod insufflatur. Item cyclamini ac porri succus. Composita uero hæc sunt.

Cephalæ  
Hemicranii.

Errhina, naris  
bus indita me-  
dicamenta

Errhinon ad diurnos capitis dolores, lippitudines, & morbum comitalem. Melanthij drach. VII. salis ammoniaci drach. IIII. elaterij drach. IIII. trita excipe oleo sicyonio, aut irino, aut cyprino, ut cerati crassitudo fiat, & nares inde contingat. Errhinon quod insufflatur. Cyclamini sicce drach. VII. nitri rubri drach. IIII. Si uero pro nitro elaterium conieceris, adhuc melius est. per stipulam insufflato. Vtere quoque epithematis capitis & ungentis, ubi diuturnior est affectio, his. Epithema ad cephalæ. Ungenti irini, peucedani, castorij, singulorum drach. I. baccarum lauri drach. II. ramulorum ruta drach. IIII. Excipe cerato rosaceo, & raso capiti per totum ipsum impone. Cæterum mulier quædam in hemicranicis etiam hoc usa, mirifice successum sensit. Radicem cucumeris syluestris uiridem in ternas partes concisam, & absinthij, in aqua & oleo donec flaccescerent coquebat. Et aqua quidem cum oleo calidis affectam partem moderate rigabat. Radicem autem & absinthium terebat, atque ita trita imponebat. Et per hoc solum hemicranicos & cum febre, & sine febre curabat. Si uero exacerbatio consequatur maxima, ut dolorem ferre non possint, utere etiam his que mitigare, & ex alto euocare ac meatus transmutare possunt, quale hoc est.

Mulier mea  
dica

Vnguentum ad cephalæam. Succu peucedani drach. XVI. succu papaueris, anili, hyoscyami, croci, myrræ, scammonie, singulorum drach. II. Excipe aceto, & fac pastillos. Vsu uero expetere, cum aceto aut posca illine eos qui ob crassos humores, aut spiritum flatuosum dolent. Sed & dropace, & linapismo utendum est. Itemque ex thapsia pastillo. Quin & medicamentum ex atramento scriptorio mirifice in eadem causa auxiliatur, & utendum est eo in his, uelut in libro de compositis medicamentis dicitur. Sed & hoc mirandum est ad hemicranicos ob crassum ac uiscosum humorem. Euphorbij partem I. castorij tantundem, aqua excepta in aurem inde, eam quæ est à do lente parte, & in balneum introire iube, & ubi paululum immoratus est ita assumare, & consueto modo lauare. Hoc modo experientia cognitum est. Non absurdum autem fuerit etiam oleo ipsa excepta, in aurem instillare. Et medicamentum ad coxendicum morbum descriptum, diurnos quoque capitis dolores, & hemicranicos perfecte sedat. Ad hemicraniam diuturnam. Allij drach. IIII. cere drach. II. axungie ueteris drach. II. cantharidum drach. II. uesperti imposita, pernoctare sine. Mane uero pustulam rum-

Atramenti scri-  
ptorij medica-  
mentum

pe, & parygro appellato emplastro cura. Aliud. Baccarum lauri decor-  
ticatarum drach. II. foliorum rutæ drach. II. sinapis drach. I. aqua diluta im-  
pone. At uero his qui à frigidis causis infestantur cōmodissimum hoc est,  
adeo ut sæpe semel ante balneum illitum, cito affectionem percurant, ita ut  
post balneum penitus sanus æger euaserit. Olei sabini lib. I. ceræ quadran-  
tem, euphorbij unc. I. Ex hoc dimidiam frontis partē illinito, iuxta tempo-  
ralem uidelicet musculum. Verum in quibus non multa frigiditas est, gal-  
læ & crocomagmatis æquales partes uino tritas illine. His uero qui ob cali-  
dos uapores aut humores caput dolēt, medicamenta ex euphorbione adhi-  
beto. Apophlegmatissimus pituita per os detrahens ad cephalæam. Si-  
napis triti & in succum redacti cum aceto & melle trientem, staphydis syl-  
uestris drach. IIII. pyrethri drach. IIII. tusa, cribrata & mixta, in sole garga-  
rissanda præbe. Si uero ob biliosum humorem, aut aliquam intemperiem,  
cephalæa sit diuturna, antea de capitis dolore relatis utendū est. At si etiam  
post hæc dolor perseveret, & neq; cucurbitulis, neq; hirudinibus prætermis-  
sis, & distributio per arterias suspecta sit, nihil absurdi est, etiam arteriarum  
retrō aures sectione uti. Verum in humidioribus etiam balnea naturalia  
recte assumuntur.

## De phrenitide.

## Caput VI.

Phrenitis

PHrenitis membranarum cerebri inflammatio est, aliquando etiam ipso  
cerebro simul inflammato: aliquando caliditate præter naturam in ipso  
consistente. Causa uero morbi est, aut sanguis redundans, aut flauæ bilis hu-  
mor. Quandoq; uero etiam flaua bilis superassata, & in atram transmutata,  
quando sanè grauissima phrenitis existit. Aliquando etiam cerebrum ex  
septo transuerso per consensum affectionem, per dispersos in ipso neruos, affec-  
tionem sustinet. At uero quæ circa ardentissimarum febrium uigores, &  
quæ ex stomachi per consensum affectione contingit mentis emotio, phre-  
nitis non est, sed solum delirium. Consequitur in his qui proprie phreniti-  
ci sunt, uigiliæ quidem in totum. Quandoq; uero etiam somnus turbulen-  
tus, adeo ut exurgant, & exsiliant, & furiose clament, qui quidem ob sangui-  
neum humorem affecti sunt, cum risu: qui uero ob flauam bilem, cum fero-  
cia: quemadmodum qui ob atram bilem, furiose adeo ut contineri nō pos-  
sint, obliuiscunturq; & eorum quæ dicuntur, & quæ fiunt ab ipsis. Et oculos  
sanguinolentos habent, ipsosq; fricant quandoq; squallidos, quandoq; la-  
chrymantes aut gramijs oppletos. Et lingua exasperatur, & ex naso sangui-  
nis destillationes fiunt, & floccos legunt, & festucas uenantur, & febrem ac-  
cutam habent per totum morbi tempus, febre in alto malignè latitante. Et  
pulsus paruos ac languidos cum quadam duricia habent. Et respiratio ma-  
gna est & rara, cerebro primario affecto. Si uero per consensum ex septo  
transuerso phrenitis fiat, & respiratio inæqualis est, & præcordia reuellun-  
tur, & caliditatem multam habent. Sicut rursus his qui ex cerebro affecti  
sunt, partes circa faciem calidæ, & subsanguinolentæ sunt, & plenas uenas  
habent. Quod si etiam pituitosus humor ammixtus fuerit bilioso, quemad-  
modum causam, ita etiam nomen compositum acquirit. Vigilans enim so-  
por appellatur. Bilioso etenim humore superante, tales uigilantes phreniti-  
ci sunt. Pituitoso uero rursus prædominante, soporose rursus in somno der-  
labuntur. Vetusiores Galeno catochon, id est soporis detentionem appel-  
lauerunt. Catochen uero & catalepsin, id est apprehensionem, recentes.

## Curatio phrenitidis.

Siquidem uires permittunt, uenam cubiti secare oportet statim, & mul-  
tum sanguinis detrahare. Si uero delirans æger manum non porrigat, aut  
etiam si porrigat, timor sit sanguinis eruptionis, dum post euacuationem  
nus sæpe lancinatur, ex eo quod furiose æger turbatur: rectam in fronte se-  
cantes uenam semel sufficienter detrahimus, & inuisus per clyster utemur  
ex oleo aut rosaceo, cum ptisanæ succo. Vigilijs autem superantibus, rosaceo, aut

Mentis emotio  
DeliriumGraue in  
oculisSoporosi-  
gilansCatochos  
CatocheVena frontis  
sectio



ceco, aut rosaceo cum aceto caput inungemus, aliquando calida aqua prius ipsum perfundentes: & medicamentum ex papaueris capitibus dabimus, si non vires debiles prohibeant. Sed & alia ad vigilias, ex supra relatis huc transferenda sunt. Decumbat autem æger in loco lucem ac temperiem moderatam habente, & in quo non sint uariæ picturæ. Hæ enim turbationem inducunt. Ingrandiantur autem eo ad ipsum amici grati, & commodè compeissent, quandoq; leniter placantes, quandoq; etiam austerius perterrites. Alimentum uero primum sit aqua mulsæ, deinde prisanæ succus, & sorbitiones ex alica, cum aliqua iucunda portione, uelut est fauorum cremor, aut hydrosolatum, aut rhodomelum, aut dulce hydromelum. Nam quod à Cebrya affertur hydromelum uinosum in paruis uasis, reprobandum est, ut quod peiora detrimenda quam uinum in talibus inducat, & præsertim in capitis affectionibus, & ante concoctionem. Et panem ex aqua lotum exhibemus, & intyba ac lactucas coctas. Si uero multus feruor sit, etiam cruda hæc danda sunt, & cucumeris internam partem dare conuenit itemq; peponis, & rhodocena, ac consimilia. Ab aqua frigida hos abstinere oportet, maxime si ex septi transuersi consensu, causam affectionis compererimus. Si uero uirina ipsis ob dimentiam, uelut uerisimile est, supprimatur, fomentum adhibebimus, & oleo & aqua calidis pectinē ac uelica perfundemus. Deinde digitis manus ad locos admotis, ad mictionem irritabimus. Et decumbentibus ipsis reliquum corpus oleo calido illinemus. Nam in quiete, quantum fieri potest, conseruandi sunt, si ualde diuites fuerint, ut a famulis contineantur, si minus, uinculis constricti. Vires enim concidunt ex inordinato motu. Sed & propter alium modum, ligamentis pedes prius perfusi constringantur ac contrectentur, reuulsionis uidelicet gratia. Si uero longior, & ægri solubilis fiat affectio, ab his quæ soporem inducunt abstinendum est, addenda uero ad capitis irrigationes ea quæ discutere solent, uelut est mentæ succus, aut serpilli, aut calaminthæ, aut rutæ. Et tunc quoq; errhinis in nasum datis utendum est. Post septimum uero diem, si uiscera fuerint inflammata, cataplasmatibus ex semine lini, & cruda ordeacea farina, cum aqua & oleo mitigabimus. Postea uero etiam cucurbitas leues, aut etiam cum scarificatione adhibemus, tum his ipsis, tum occipiti ac spinae. Si uero corpus squallidum & adustum esse coniectaueris, etiam si adhuc febricitent, balneis aquæ potabilis, & largiore illitione utendum est: & uinum dandum tenue, ac parum aquæ ferens, ad uirium refocillationem, nequaquam uerendo mentis emotionem ex ipso, uelut par est, futuram. Aut enim non contingit, declinatione instante: aut etiam si fiat, facile sedatur. procedente uero declinatione, etiam gestationibus utendum est, & conueniente uirium refectione, faciendæ sunt autem uirium refectiones, ita ut caveant ebrietas, iras, ciborum corruptiones, & præ omnibus solis ardores.

De cerebri inflammatione.

Cap. VII.

Cerebrum inflammatum sepe intumescit, adeo, ut futura in capite disperiantur. Et dolor maximus ac perseuerans consequitur, & anxietas multæ: & rubor circa faciem multus consistit cum tumore, & oculi pronui fiunt, & caput intumescit. His uenam secare oportet, & de cubito euacuare. Sed & ex naribus, & uenis sub lingua, sanguinem euacuare oportet. Vtere etiam irrigationibus & cataplasmatibus ad capitis inflammationes idoneis, quæ humectare ac concoquere possunt.

Cerebri inflammatio

De cerebri erysipelas.

Caput VIII.

Est & erysipelas, id est ignis sacer, in cerebro, & æger hæc patitur. dolet ea put tota, & flamas in ipso esse putat. Et facies ægri frigida est ac subpalida, & os siccatur. proinde ita affectio uenæ secato, & maxime uenas sub lingua diducito, & frigefactoria adhibeto, quibus etiam ad alia erysipelata uti,

Erysipelas cerebri

De lethargo.

Caput IX.

(mur.

Lethargus qui læsio est partis animæ rationalis, locum quidem eundem habet,

Lethargus

habet, quem etiam phrenitis, cerebrum disco, materiam uero cōtrariam. Ex  
pituita enim humidore ac frigidore cerebrum perrigante oboritur. Con-  
sequitur lethargicos febris debilis, non ualde mordax, cum delatione in so-  
porem. Pulsus his magni & rari ac undosi sunt. Respiratio ualde rara ac de-  
bilis. Fit somnolenti semper sunt, & ægrè excitari possunt, & difficulter re-  
spondent etiam si interrogentur, & obliuiosi sunt, ac mente moti. Hiant as-  
siduè, & quandoq; hiantes permanent, uelut qui os claudere obliuiscantur.  
Egerunt per aluum pleriq; humidiora. Quibusdam uero uisce uersa uenter  
reliccatur. Urinas mingunt quales sunt fumentorū. Quidam etiam tremunt  
& exudant. Porro soporis species quæ caros appellatur, quum ex eadem  
sit materia qua lethargus, ab hoc differt, eo quod febris soporem illum pre-  
cedat, & uehementior est; sequitur autē ad lethargum. differunt item in eo,  
quod sopor etiam ad alia symptomata sequatur. Nam & ad febrium exacer-  
bationes sepe accedit, & ad morbum comitiale, & ad cerebri compressio-  
nes, aliquando osse in fracturis, aliquando membranarū custode, anteriore  
cerebri uentriculū constringēte. Lethargus uero propriā quandā constitu-  
tionem habet.

*Curatio lethargi.*

Permittentibus uiribus etiam hic uenā fecimus. Si uero non permit-  
tant, infusus per clysterem acribus utemur. Aegrum aurē in domo amplius  
re inclinabimus, quæ moderatam habeat lucem, & caput irrigabimus oleo,  
cui castorium sit ammixtū. Quidam pro oleo, rosaceo cum aceto, unā cum  
castorio utuntur, corroborantes simulq; calefacientes per hoc caput. Reli-  
quum uero corpus, & maxime extremas partes, oleo ueteri illinunt, & cum  
nitro tosto, aut pyrethro, aut pipere, aut grano cnidiso uellicāt. Potest & ce-  
ratum ex his cum castorio factum in usum assumi. Odoramenta uero adhi-  
beamus thymum, aut origanum, aut pulegium aceto tritum. Os autem, &  
partes circa palatum, sinapi trito cum modico melle illinemus, ita ut etiam  
per digitos pituitam affixam auellere conemur. Si uero admisserint, etiam  
apophlegmatismo utere aceto mulso, cum hyssopo, aut pulegio, aut origa-  
no, aut etiā ipso sinapi. In potu uero dato aliquod ex his quæ cito transeūt,  
oxypora græci appellant, & maxime diospoliticū cochlearium unum cum  
polca. Indiuernis ac tremulis etiam castorium dandum est, scrupulorum  
duorum aut trium pondere. Si uero copia humoris sit, & non aliud quid im-  
pediat, etiam scammonia scrupulum unum castorio addemus. Perseuerante  
uero affectione, raso capite fomentum adhibere oportet ex sale & milio,  
ac similibus in sacculis. sinapismis item in capite, & sternutatorijs uti. De-  
inde cucurbitas occipiti affigere, partim leues cum multa flamma, partim  
cum scarificatione. Naturales etiam excretiones assiduè irritare oportebit  
infusus per clysterem, & urinam clientibus. Pectus autem oleo rutaceo, aut  
sicyonio, cum modico castorio rigetur. Frequentius quoq; irritanda est de-  
glutitio, ita ut calidæ aquæ aliquam ex iucundis potionibus, maxime fau-  
rum cremorem ammixtum, per angustū oris uascula instillemus. Et si alio-  
bi circa medias partes inflammatio aliqua fuerit, etiam hæc curanda est per  
irrigationes ac cataplasmata. Naribus autem admoendum est sinapi ace-  
to tritum, aut castorium ustum. Alantur ex ptisanæ, auenæ, aut alicæ suc-  
co, cum aceto mulso, aut sale, aut pulegio, quandoq; quotidie, quandoq; al-  
ternis diebus. Post cibum extremæ partes deligentur, aut etiam multū re-  
fringantur: & crura uellicentur, & quandoq; pilis ex ipsis uiolentius euellan-  
tur, quo excitentur. Sed & rubificationes formorū ac crurū sepe cōmodant.  
Declināte uero affectione, statim gestationibus cōuenientibus utendū est,  
& ad balneū deducātur, & refectoriæ diætæ ductus cōuenienter assumantur.

*De catacho, id est soporis detentione, siue uigilante sopore. Cap. X.*

*Catochus.  
Sopor ui-  
gilans*

**H**uius morbi constitutionem in capite de phrenitide iam diximus. Si-  
gna uero ut in summa dicam, communia quodam modo sunt phreniti-  
dis ac lethargi, iuxta materiam prædominantem euariantia, particula sim-  
ilem autem

A autem hæc. Detinetur æger supinus, extensus, & quandoq; sub tumidam ac humidam moderate faciē habet, uel ut lethargici quādoq; rubor in ipsis efflorescit, & supernam palpebram sibi reuulsam esse putant ac eminere, ut neq; nictare possint. Nequaquam autem respirare uidentur, sed uelut mortui sacet. Pulsus habet parum & languidum, & uehementer densum. Et urina, & aluus suppressa sunt, aut modice feruntur. Et qui moderate habent, infusum aliquem liquorem deglutunt. Victi uero, ad nares relidit. Qui igitur pituita bilem superante affecti sunt, eos à lethargicis discernimus, eo quod neq; tument, neq; liuidum colorem habent, uelut lethargici, præterquam modice sanē, & quod moderate exudant. In maiore uero periculo uersantur, quibus uigiliæ multæ adsunt, & urina supprimitur, & spirandi difficultas intenditur, & exudant, & quibus potus ad nares reliditur. At si mulier ita affecta fuerit, discernetur ab ea quæ uteri strangulatione correpta est, ex eo quod naturaliter facere uidetur, & loquentes sentiat, & quod excitatur, & rursus in somnum delabitur. Aliquando uero soporis detentionē, aliud esse dicunt à uigilante sopore, quod non amplius composiram, sed simplicem quandam causam habeat. frigidiorē enim & sicciorē materiā, quæ posteriorē cerebri uentriculum obturauit, eam affectionē efficere. Quæ cor, repens æger derepente, in illa figura manet, in qua correptus est, stans uidelicet, aut sedens, aut clausis oculis, aut uidentibus & apertis. Quapropter etiam catochos id est detentos, ipsos ueteres appellarunt. Recentiores autē catochen, & catalepsin, id est apprehensionem ac detentionem appellauerunt affectionem ipsam. Curatio uero similis relatis est, sed euarias iuxta symptomatum diuersitatem.

Catochi diffinitio ab uteri strangulatione

Catochi  
Catoche

#### Curatio catochi:

Et nunc quoq; uenæ sectionem adhibere oportet, & maxime in quibus facies rubicunda est, uiribus rursus consentientibus: aut infusis per clysterem uti, quandoq; excitantibus, pituita prædominante: quandoq; mitigantibus, bile redundante. Eodem modo etiam aliorum auxiliorū ductu utendum est, & similiter nutriendum, quandoq; quotidie, quandoq; alternis diebus. Est autem ualde periculosa affectio, si ob aliquod cibi aut potus peccatum fiat. In his itaq; cogere ipsos oportet, ut statim uomant, & in cibi contradictione custodire, & aluum irritare, & irrigatione uiscerū ex cumino, aut ruta uri. Qui uero propter ebrietatem affectione correpti sunt, post solutā crapulā, humidiorē alimentis curentur, talis est pristinæ succus. Caput quoque conuenientibus illitionibus rigetur, si æstas fuerit, frigidis: si hyems, tepidis. Si uero crapula nequaquam soluitur, neq; ad sobrietatem redeat, pro desperato relicto ipso, longē fugere oportet.

Ebrietatis causa  
catochi

#### De amissione memoriæ ac rationis, & de sopore ac fatuitate. Cap. XI.

Memoriæ amissio aliquando per se contingit, aliquando etiam cum aliqua rationis læsione: quemadmodum etiam rationis læsio per se prius contingit, & deinde memoriæ læsio sequitur. Vtriusq; uero affectus, fatuitas appellata consistit. Causam uero habent communem, consistentem ac consistantem ipsas intemperiem. Verum si hæc humida solum fuerit, & memoriæ & rationis uitiationem inducet, & torpores, & in somnum delationes, & somnos longos ac profundos. Si uero cum frigiditate, sopores & lethargos. Eodem modo etiam siccitas, sola quidem uigilias inducit cum caliditate uero, deliria, & phrenitidas. Consistunt autem hæc intemperaturæ quandoq; in humoribus, quandoq; in cerebri uentriculis, aut in ipsis uasis, aut in dispersa humiditate, aut in ipso cerebri corpore, aut etiam muscularis temporalibus tale quid perpetientibus. Si uero humores fuerint inter se permixti, etiam affectionem talem inducent. Vtrum autem simplex sit, aut composita intemperies efficiens, ex eorum quæ excernuntur specie cognoscet. Nam quod memoriæ & rationis amissio, ex frigiditate proveniat, scimus: An uero cum humiditate aut siccitate coniuncta sit, ex his quæ excernuntur

Memoriæ  
amissio.  
Rationis læsio  
Fatuitas

nuntur discemus, & ex ægri habitu ac temperamento, & ex uictus ratione, temporeq; anni ac regione. Curatio. Si quidem frigida fuerit intemperies, calefacere oportet: si uero cum humiditate, etiam siccare. Si rursus cum siccitate, humectare simulq; calefacere. Eodem modo etiam in intemperie calida, frigefacere: si uero etiam siccitas sit, etiam humectare. Si cum humiditate, frigefacere simulq; siccare. In quibus autem sanguinem cum humorem redundantem compereris, uenam secare, aut infusus per clysterem uisceribus, deinde etiam hieram dare, & apophlegmatismis uti, & unctiones adhibere capiti, frigefacientibus ac siccantibus ad oleum ammixtis, rosam inquam, ac myrto, & lentisco, ac similibus. Sed & toti corpori prospiciendum est. Si uero ex ardore solis ac lassitudine, oborta fuerit intemperies, utendum est irrigatione capitis ex aceto & rosaceo, & reliquo ductu frigido ac humido, tum aliis, tum in cibo ac potu. Si uero soporis species caros appellata, ad fatuitatem, aut obliuionem accedat, etiam huic prospiciendum est, uelut antea in lethargicis diximus, ubi etiā discrimē ipsorum exposuimus.

## De vertiginosis. Caput XII

Vertigo

Vertiginis affectio ex frigido ac uiscoso humore cerebrum occupante conflat, unde ex parua occasione promptē etiam hi cōcidunt, quandoq; dum circumagi quædam uident forinsecus, uelut rotas, aut turbines: aut dum etiam ipsi circumaguntur. quandoq; uero etiam capite calefacti, dum commouentur humores in ipso, aut etiam spiritus: Aliquando uero dum anteriores cerebri uentriculi comprimuntur, circa caluarie fractæ perforationes. In quibus etiam uehementes dolores fiunt. præcedit autē in his qui ex primaria capitis affectione afficiuntur, dolor in ipso uehemens, & sopor, & aurium sonitus. Et quibusdam olfactus læditur, quibusdam gustus. Qui uero ex oris uentriculi consensu afficiuntur, eos cōsequitur osculi uentris morsus, & nausæ quoq; concomitantur. Curatio. Vertiginosos in aggressionē consistentes excitare oportet, & idoneorum odoramentorum usu, & frictionibus, & consimilibus. Vbi uero in remissione sunt, ad destruendam affectionem, uenam primū secare oportet. deinde per hieram purgare. Et tempore interposito, infuso per clysterem acriter utendum est, ex centaurij aut colocynthidis decocto. Post tales autem euacuationes, lancinandum est caput localiter, per cucurbitas occipiti affixas cum scarificatione. & post hæc, pituitam per os detrahentibus ac sternutatorijs utendum est. Verum in quibus caliditas capitis, & aurium sonitus est, utpote uaporibus calidioribus per arterias allabentibus, etiam arteriarum sectionem adsumimus retrō aures, quemadmodum in chirurgica tractatione dicitur.

## De morbo comitiali. Caput XIII

Comitialis morbus

Morbus comitialis qui conuulsio est totius corporis, cum principalium actionum læsione, aliquando in ipso cerebro consistentem causam habet: aliquando in ipsius uentriculis uniuersis. Hæc autem est quandoq; pituitosus, quandoq; a trahiliarijs humor. Quin & propter os uentriculi per consensum oboritur: quemadmodum etiam in colicis, uelut in tractatione de illis dicitur. Aut etiam ex aliarum partium distributione, aura aliqua ligida ad cerebrum perueniente, aliquando à crure, aliquando à digitis manus. Visus est quoq; aliquando ab utero in aliqua muliere, quo tempore prægnans fuit, post partum autem sedatus fuit. Fit hæc affectio maxime pueris, & ex his amplius recens editis, postea uero etiam adolescentibus, & in ulgore consistentibus: minime autem adultis & senibus, præcedit igitur in comitialibus corporis & animæ seditio inuoluntaria, & tristitia, & familiarium obliuio, & insomniorum uisiones turbulentæ, & capitis dolor, & repletio capitis assidua, maxime ex iracundia, & faciei pallor, & linguae morus inordinatus. Quidam etiam ipsam mordent. At in his qui per consensum ex stomacho afficiuntur, etiam ipsius stomachi palpitatio præcedit, & agitatio ac morsus: & in inedijs, aut dilatis cibis exacerbantur. Insistente uero iam

Præcedentia morbum comitalem

Palpitatio stomachi

A ro iam symptomate, collapsio ipsis derepente contingit, & cōuulsio, & quan-  
 doq; nihil significans exclamatio. Præcipuum uero ipsorum signum est o-  
 ris spuma, quum reliqua etiam alijs morbis quodam modo communia sint.  
 Quibusdam autem etiam urina & stercuris inuoluntarie excernitur. aliqui-  
 bus etiam semen. Quum igitur in aliquibus acutissima sit affectio, cito occi-  
 dit, tum exacerbationum assiduitate, tum symptomatis uehementia. In qui-  
 busdam uero in longum extenditur, ad eò ut si non circa pubertatem, aut lu-  
 nares purgationes, aut impregnationes soluta fuerit: aut si post hoc tempus  
 contracta fuerit, plerumq; commoriatur, præterquam si conuenientem cu-  
 rationem consequatur. Declarant autem comitiales sufficia hæc, bitumen, la-  
 pis gagates, cornu caprinum. In cibo uero acceptum hepar hircinum, & he-  
 patis dum affatur odor. Curatio. Si adhuc puer infans fuerit qui æ-  
 grotat, nihil curiose moliri oportet: nam & ætate ad biliosiores ac sicciore  
 constitutionem transeunte, & uictu ad moderationem commutato, plerumq;  
 sua sponte affectio sedatur. Oportet autem uictus rationem non solum in-  
 fantibus, sed etiã nutricibus ac lactantibus prospicere. Qui uero post pue-  
 rilem ætatē in comitiales illapsi sunt, his conuulsas ac distortas partes pin-  
 guiter irrigare oportet, deligareq; ac dirigere. Deinde disparato ore, digitũ  
 aut pinnam oleo irino illitam immittere, ad pituitæ educationem. Oportet  
 etiam odoramentis sensum irritare, ueluti peucedano, succo cyrenaisco, bi-  
 numine, pice cedrea. Post exacerbationes, si nihil impediatur, utendum est ue-  
 nez sectione in cubiti flexura. Si uero nihil remittat exacerbatio, extempe-  
 rates sinapismo integantur, & cucurbita præcordijs affigatur. Si neque ac  
 hæc remissio contingat, minimum spei est. Et tamen confidens medicus ca-  
 storium per uim ori infundat, & cyrenaiscum succum cum melle & aceto.  
 Et per sedem infundat centaurij decoctũ, aut colocynthidis. Qui uero exur-  
 gunt ab ipso morbo comitiales, post refectionem, purgatione per hieram eu-  
 acuandi sunt. Atq; hæc sanè est recentis & acuti morbi comitalis cura-  
 tio. Consequenter autem quæ ad inueteratam destructionem commodant tra-  
 demus. Affectus itaq; in aqua potu diu continere oportet. Et in curationis  
 aggressionem uenâ secare, si nihil prohibeat: & interpositis quatuor aut quin-  
 que diebus corpus reficere, & sic purgatorio medicamento euacuare, maxi-  
 me quidem ueratro nigro, aut colocynthide, aut certè scammonia. Opor-  
 tet autem ueratrum citra internam partem tufum ac cribratum, aquæ mulse  
 cyathis quinq; uel sex inspergere: aut melle cocto excipere cum modico pi-  
 pere. Colocynthidem uero eiectioni semine, medullam adhuc habentem pas-  
 so exple, & per totam noctem sine. Mane uero passum euacuatu bibendum  
 præbe. Utendum etiam purgatorio medicamento ex ueratro albo, est autē  
 hoc. Baccarum lauri depuratorum drach. viii. piperis albi drach. viii. aly-  
 piadis drach. viii. euphorbij drach. viii. ueratri albi drach. viii. hæc pro  
 una uice præbe, cū passo quod est in colocynthide. pro be per uomitus pur-  
 gat. post sufficientem purgationem, lauare ipsos oportet. Tertio post die  
 cucurbitæ affigendæ sunt cum scarificatione præcordijs ac dorso. Deinde  
 multis diebus interpositis, & corpore refecto, hiera ex colocynthide danda  
 est. postea capiti ac occipiti cucurbitæ affigantur. Sequenti die cataplasma  
 adhibeatur ex pane cocto in aqua mulla, & contrito cum amygdalis ama-  
 ris, aut serpillio, aut menta, aut calamintha, aut ruta: & ad tres dies hoc faci-  
 endum est. Et postea caput radatur, & peucedani succo in aceto dissoluto,  
 in quo spondylium coctum est, illinatur. Interpositis autem rursus aliquot  
 diebus, & corpore refecto, antidoti ex colocynthide obolos ix. in aqua  
 mulla dato. Et rursus interpositis diebus antidotum dato. Deinde sternuta-  
 torijs utere. Et post quinq; aut decem dies castorium in aqua mulla præbe.  
 Et rursus interposito tempore centaurij & colocynthidis decoctum per cly-  
 sterem infunde. deinde rursus hieram præbe: & consequenter pituitam per  
 os & nares detrahentibus utere. deinde sinapismum capiti adhibe. Oportet

Veratri nigri  
 preparatio  
 Colocynthidis  
 preparatio

Medicamentum  
 ponderis sine  
 spectu

*Acrium eius* item acrium esu tempestive uti. prodest his & acetum mulsium scilicet <sup>4</sup> quotidie bibere. Et mel in qua scilla contabuit cochlearij mensura. Viscus ratio his conuenit incidendi ac attenuandi usum habens, & proinde cappar-  
*Peoniae radicis de collo flexu* ris & salamentum assidue in cibo competit. Abstineant autem a carnibus, & leguminibus, & uino largiore, Veneredq; multa, ac à balneis, & à sinapi, & à potu statim post balneum, praesertim uini meraci. Vtantur exercitijs & frictionibus, ita ut postremum omnium caput defricent.

Curatio comitalis ex stomacho oborti. Si uero stomacho primario af-  
*Peoniae radicis de collo flexu* fectio affectio fiat, bonam concoctionem aegroti prospicere oportet, & cir-  
*spensio* ca tertiam horam panem diligenter preparatum exhibere, ex uino diluto le-  
 uiter adstringente ac albo. Dato etiam his de medicamento ex aloë, his aut  
 ter singulis annis. Noui autem inquit Galenus, puerum quendam, qui om-  
 nino non correptus fuit à morbo, ex quo radicis pæoniæ gestabat magnam  
 ac recentem partem de collo suspensam. Sed & agaricij comitialibus pro-  
 dest, seselidj ac spondylii semē ac radix. Et aristolochia rotunda ex aqua po-  
 ta. Auxiliatur etiā his magnopere scarificatio crurū si frequenter adhibeatur.

Curatio comitalis ex aliqua parte oborti. Quum symptoma futurū est,  
*Acetū mulsium Iulianum* ubi senserint partem, siue manus sit, siue pes, laqueo superpositam partē for-  
 titer apprehendere oportet. In remissionibus autem curationem moliri, ex  
 ustorij medicamentis aliquod parti adhibendo, uelut est lepidium, & quæ  
 ex cantharide constant, & similia. Acetum quoq; mulsium Iulianum comi-  
 tialibus magnopere prodest, particulatim materiam excuties. Post omnia  
 relata, & theriacā, & balnea naturalia, locum habent. Per totum uero uite  
 tempus caueant maxime cruditatem, & nutrimenti ingestionem ante con-  
 coctionem, & cibos crassi succi, & cibi dilationem, & uehementem ad Ve-  
 nerem imperium, & multi uini potum, & potum post balneum, uelut dictū  
 est, praesertim uini meraci, & uina ualde uetusta ac crassa, & acria odoramē-  
 ta, & quæ caput replent, & ne intentē inspiciant ex alro, & ne diutius mo-  
 ram trahant in balneo, & ne caput ardori solis exponant.

De melancholia, & infania, & his qui numine afflati putantur. Caput XIII

*Melancholia* **M**elancholia delirium quoddam est circa febrem, ex atrabiliario humo-  
 re, qui mentem occupauit, maxime oriens, quandoq; ipso cerebro pri-  
*Hypochondriae ac melancholia* mario affecto, quandoq; una cum toto corpore permutato. Sed & tertio me-  
*ebolia* lancholiz species est, quam flauosam & hypochondriacam, id est præcor-  
 dialem nominant, ex inflammatione præcordiorum circa stomachū obor-  
 ta, quæ aliquando auram quandam prauam, aliquando etiam de humoris  
 essentia partem, ad cerebrum transmittunt. Signa omnium cōmunia sunt,  
 timor, tristitia, hominum auersatio, & quoddam putant aliqui se animalia beuta  
 esse, & illorum uoces imitantur: aliqui uero uasa testacea se esse putant, &  
 ne frangantur timent. & quidam ex ipsis cupiunt mortē, quidam uero rur-  
 sus timent ne moriantur. Et aliqui semper rident, aliqui plorant. Quidam  
*Numine afflati* uero etiam putant se ab aliquibus maioribus potestatibus impeti, & futu-  
 ra prædicere, uelut numine afflati, quos etiam priuatim numine afflatos no-  
 minant. propria uero signa melancholicorum per consensum totius corpo-  
 ris sunt, gracilitas corporis, & nigricia, & hispiditas, & habitus atrabili-  
 ris, aut ex natura, aut acquisititius, per curas quasdam, aut uigilias, aut ui-  
 tioforum ciborum ingestiones, aut hæmorrhoidum aut mensū suppressio-  
 nem. Eos autem qui propter præcordia melancholici sunt, cruditates decla-  
 rant, & acidi ructus, & ardor ac grauitas ipsorum: & quoddam reuulsus est præ-  
 cordium, & aliquando etiam inflammatus, maxime circa initia. Deinde ubi  
 hæc maiora sunt, sequuntur melancholica symptomata. Et hæc leuantur  
 concoctionibus, aut excretionibus, aut flatibus pluribus, aut uomitibus,  
 aut ructibus. Nullo uero ex his, aut omnino paucis ex ipsis cōtingentibus,  
 signa melancholica apparentia cerebrum primario affici indicant, ex atra-  
 biliario humore. Si uero aliquando flauæ bilis nimium affata, mutatio in  
 atram

Atram fiat, infantiam, maniam appellatam, inducet: in qua ferinò modo furiant, adeo ut eos qui minus prouide cum ipsis conuersantur interficiant. Infamia

Curatio. Eos igitur qui ex primaria cerebri affectione melancholici sunt, per balnea assidua, & boni succi ac humidum uicium curare oportet, una cum conueniente animi iucunditate, citra aliud auxilium, ubi nondum obtemporis longitudo inest, humor affligens difficulter euacuari potest. nam si contra habet, tortiores & magis uariegas medelas adhibere oportet. Purgare igitur ipsos conuenit ab initio, epirhymo, aut aloë. Horum enim etiam si modicum singulis diebus acceperint, maxime prodest, & leniter subducit. Purgatione igitur facta, uelut dictum est, absinthium dandum est, ita ut modo herbam in aqua maceres & coquas, & inde cyathos duos exhibeas: modo succi drachma dimidium aqua liquefacias, ac assidue præbeas. Sed & acceti acerrimi parum insuper sorbeat dormitū iturus. pleraque etiam ob-

*Aloë usque quod  
tidiani  
Absinthij  
potus*

sonia in hoc tincta edat. præstat autem aceto ammixtam esse scillam, & polium, & tenuem aristolochiam. At uero ubi in incipientem morbum propter totius corporis consensum, uelut dictum est, incideris, & corpus fuerit compactum, omnino à uenæ sectione incipiendum est. post sectionem autem uenam, resecis uiribus deorsum purgare oportet, per cucurbitam syluestrem, & per ueratrum nigrum, medicamento dato. Sed & hæmorrhoidum ora aperiemus, & menses prolucemus, si ob horum suppressionem affectio fuerit oborta. Commodæ sunt etiam urinam cientes facultates, & sudoris purgationes. Si uero ob præcordiorum afflictionem consisterit affectio, etiam horum curam habere oportet, & fouere ipsa irrigando, rutæ, anethi, absinthij, pulegij, seminis uiticis, & baccarum lauri decocto. Nam hæc & dolores mitigant, & status minuunt. Coquantur autem in oleo, & imponantur. Habeant etiam horum cataplasmata, ea quæ ad flatum faciunt, apium, aut anisum, aut cumjnum. Nec malum est & cyperum, & iridem, & rorem marium, in cataplasmata addere. Sinenda uero sunt hæc, ut diu incumbant, etiam per diem, & ubi cibum accepit, & ubi ieiunus adhuc est. Postquam autem detraxeris, aliud opèrimentum, lanam latam imposito. Sed & cucurbitis utere, ad flatum quidem, leuibus: ad dolores uero & inflammationes scarificatione facta. Cæterum curationi attendendo, neque sinapis obliuiscere, uterique etiam acris simegmatis, & dropacibus, & in dorso, & ad uentrem. In inueteratis porro optimū auxilium est purgatio ex ueratro per uosmitum. Victus autem omnibus melancholicis boni succi, & moderate humidus conuenit, ita ut uident bubulas ac ceruinas carnes, & lenticulam, & brassicam, & cochleas: uina item crassa ac nigra, & in summa, omnia quæ atram bilem generant. Atram bilem  
generantia

Curatio infantie. Infantentes quoque similiter ueluti melancholicos curabimus. priuatim uero horum capiti rosaceum, & acetum ac rosaceum adhibebimus. Et uena ipsis secia, per picram antidotum purgabimus. Hirudinibus quoque ad caput utemur. Maxime autem ipsis prodest hippomarathi radix ac semen, si in aqua bibantur. Bryoniæ item radice drachma una cum aqua quotiè die. Si uero delyrantes ad purgatoria medicamenta bibenda induci nequeant, ammiscenda sunt ipsa latenter, quandoque edulij ipsorum, minimum buccellis, aut carcis, aut palmulis: quandoque etiam potibus. præ omnibus uero aut uinciantur in lecto, ut ne mali quippiam faciant sibi ipsis, & his qui ad ipsos accedunt: aut intra sportam cancellatim textam cõclusi, in lecto ex alto suspensio, in altum attollantur.

De incubo. Caput XV.

**E**phialten id est incubum, aliqui à uero nominatum esse dicunt, aut ab eo quod hi qui in hac affectione constituti sunt, aliquem sibi insilire ac incubare imaginantur. Themison autem decimo epistolarum libro Pinguionem id est Suffocatorem nominauit, à suffocando uidelicet nomine imposito. Consistit autem circa crapulosos, & assidua cruditate laborantes. His Ephialtes  
Pinguionem

uero qui in hac affectione constituti sunt, adest æger motus, & torpidus sensus in somnis, suffocationis imaginatio, & uelut irruente aliquo oppressio, cum exclamandi impotentia, aut uociferatione nihil significante. Quidam uero imaginantur etiam audire se eum qui in ipsos irruit, & Venerem appetere, uerum fugere, digitis ad apprehendendum contractis. Cauendum igitur est malum ab initio. Nam ubi diu durat, assidue nocte irruens, magnos morbos, syderationem, aut insaniam, aut comitalem denunciat, ubi ad caput feratur causa. Quæ enim comitales interdum, ea incubo oppressi dormientes perpetiuntur. Oportet igitur uenam secando, & purgationes adhibendo, totum affecti corpus euacuare. Maxime autem opitulatur his ueratrum nigrum drachmæ unius pondere, si scammonia obol. iiii. ammi. sceas, & quædam odorata, anisum, daucum, petroselinum. Sed & ex cucurbita syluestri hiera magnopere auxiliatur. Est autem Ruffi. Videtur tenuis. & flatuosa uitare oportet. Opitulatur ipsis & pæoniæ semē: ex eo uero quindecim grana nigra cum aqua trita, assidue bibenda dato.

De Lycaone, aut Lycanthropia. Cap. XVI.

**Q**ui lycanthropia corripuntur noctu exeunt per omnia lupos imitantes, & ad diem usque circa monumenta uersantur. Cognoscere autem ita affectum ex his signis. pallidi sunt, & obscure uident, & oculos siccos, & linguam siccissimam habent, & salua ipsis omnino non prodest. Sunt etiam siticulosi, & tibias eo quod frequenter impingant, incurabiles ulceratas habent. A c talia quidem sunt signa. Verum nosse oportet melancholia speciem esse lycanthropiam: quam curabis tempore accessionis uenam secis, & sanguinem usque ad animi deliquium uacuans, & boni succi cibis agrum nutriendus. Utatur etiam balneis dulcibus. Deinde lactis sero ad triduum usus, etiam purgatione per hieram ex colocynthide iterum atque iterum utatur, post purgationes autem, theriaca quoque uiperis utetur, & reliqua quæ de melancholia dicta sunt adhibebis. Inuadente uero iam morbo, irrigationibus somnum inducere solitis uteris, opio quoque narēs illinēs dum ad somnum se conuertit.

De amantibus. Caput XVII.

**A**d cerebri affectiones etiam amores adungere, nihil absurdum est, quum curæ quædam existant. Cura autem animæ affectio est, ratione in motu deficiente constituta. Comitantur autem amantes hæc. Oculi caui sunt, & non lachrymantur, uerum apparent uelut uoluptate sint repleti. Et palpebre ipsis frequenter mouentur: & quum reliquæ corporis partes non collabuntur, soli oculi in amantibus contrahuntur ac concidunt. Pulsus autem amantium proprius nullus est, uelut quidam arbitrati sunt, sed qualis est curiosorum. Vbi uero eius quod amant recordatio incidit, aut per auditum, aut uisum, & præsertim de repente, tunc anima turbata, pulsus alterari contingit, & neque equalitatem secundum naturam, neque ordinem conservare. Hos igitur tristes & uigilantes, quidam ignorantes affectionem, illuuiæ & quietis & tenui uictu consumpserunt. Verum sapientiores comperto amore, ipsos ad balnea, & uini potum, gestationesque ac spectacula, & ad audiendas fabulas animi ipsorum abducunt. Quibusdam uero etiam timorem impendere oportet. Nam qui semper amoris uacant, ægre desinentem affectionem habent. Oportet igitur & contentiones aduersus aliquos excitare, pro uitæ à singulis delectatæ proposito, & in totum ad alias curas rationem transferre.

De syderatione, semisyderatione, siue resolutione. Cap. XVIII.

**C**omuni neruorum principio affecto, quum ex hoc omnes corporis partes simul & motum, & sensum amiserunt, apoplexia id est syderatio appellatur affectio, ita ut simul etiam principales actiones læsæ sint. Si uero circa alteram partem obturatio fiat, semisyderatio & resolutio uocatur. At si circa unam aliquam partem læsio constricta, illius partis affectio dicitur. Itaque Hippocrates ait, syderatum ipsi crur fuit. Seruatur igitur in syderatis breuis quædam respiratio, quæ si multum à naturali actione euariauerit, maximam

Incubus non  
tenuis comi-  
tialis morbus

Hiera Ruffi

Lycæones  
Lycanthropi

Amoræ afe-  
ctio  
Cura quid sit

Syderatio

Semisyderatio  
Resolutio



A maximam affectionem inducet. Sin parum, breuem. pessima uero est quā intermittit, aut etiam cum magna uiolentiā contingit. Constituitur autem affectio acruatim, frigida pituita principalissimos cerebri uentriculos implente. Si uero medullæ spinalis principium totum ita affectum fuerit, omnes infra faciem partes resoluentur, ipsa illaesa manente, eo quod sensum & motus partes quæ in ipsa sunt, & cerebro accipiunt. Si uero ex dimidia parte, semifyderatio illarum partium oboritur. At si olfactus patiat, aut anterioribus cerebri uentriculis intemperiem adeptis, aut meatibus in ossibus, quæ instar colli sunt, obturatis, talis affectio contingit. Syderati itaq; iacent sine uoce, sine motu, sine sensu, absq; febre, præcedit affectionem, capitis acruatus & acutus dolor, & uenarum iugularium eleuatio, & uertigo, & splendores oculis obuerfantes, & extremarū partium frigiditas præter rationē, palpitationesq; totius corporis, & æger motus, & dentium stridores inter dormiendum. Minguntq; uelut æruginosa, & nigra pauca, & farinæ crassæ similem subdentiā habentiā lotia. Contingit autem affectio circa ætatē senilem, pituitosioribus temperamentis, & tali uictu usis. Si uero quandoq; in iuuentute, & tempore æstatis oborta fuerit, magnam necessitatē indicat.

*Dentium stridores inter dormiendū*

Curatio. Syderationis affectio nunquam, aut raro curatur. præsentem enim mortem minatur. Si uero etiam soluta fuerit, plerunq; cum partis aliquius corporis resolutione discedit. Eis itaq; qui quomodocūq; curari possunt, statim uena secanda est. & si remissionem aliquam habuerint, repetita sectione detrahendū sanguinē oportet, eadem aut sequenti die. Ventre quoq; acri infuso per clysterem subducere, muria ac melle permixtis. Deinde oleo mulo sulphurato totum corpus illinatur. Et caput oleo chamemelino, aut anethino, in quo coctum sit spondylium, aut calamintia. Instillanda est quoq; aqua mulsæ. Et odora menta adhibenda, opopanax, sagapenum, galbanum, aut castorium. Oportet etiam ore uiolenter aperto, digitū aut penam immittere oleo imbutam, ad efficiendum ea quæ in ipso hærent. Perungenda etiam est sedes his quæ flatus educunt, dandumq; acetū mullum, aut aqua mulsæ in potu. Vtemur item pituitam per os detrahentibus, ex thymo aut origano coctis in aceto. Remissione uero cōtingente, tenerum & succulentum, & qui facile distribui possit, cibum exhibebimus. At uocis priuatione permanente, & uiribus permittentibus, etiam cum curbitas occipiti affigemus cum scarificatione, & si fieri possit etiam præcordijs. Deinde gestentur sella, aut lectica, aut pensili lectio. Frequētius etiam adhibenda sunt sternutatoria, & pituitam per os detrahentia. Post diem decimumquartum ad reliquas gestationes perducemus, & uocis ac loqueliæ curā habebimus, & ueterem fauorem cremorem dabimus, cum micis panis, aut alica. Et postea dandum est etiam modicum de hiera. Post uigessimam primam diem ad balneum ducebimus, & uinum uetus bibendum dabimus, calida aqua instillata. Et de cætero per balnea & unctiones faciemus refectiones. Degant autem si id fieri possit, in maritimis locis.

*Syderatio est incurabilis*

*Oleum sulphuratum*

*Vocis priuatio*

Curatio resolutionis. At si resolutio fuerit partium omnium, aut aliquarum, citra principalium actionum affectionem ac læsionem, etiam hic molestantem humorem euacuare oportet, qualiscūq; tandem fuerit. Deinde danda hiera, quæ & castorei partem habet, initio factio dimidia drachma, cum pauco melle & aqua calida dissoluta, aut per se, aut piperis scrupulo dimidio addito, deinde quatuor diebus interpolitis exhibeatur drachma perfecta, & postea sesquidrachma, deinde duæ & tres. Et rursus totidem diebus interpolitis dentur drach. iiii. si modo æger sumere possit, adiecto mellis cochleario uno. Ipsis autem partibus imponere oportet medicamenta quædam diffusoria, unā cum his quæ rubificare possunt, adiecto ad hæc castoreo, aut pipere, aut pyrethro, aut rosmarini semine, aut euphorbio. Ad hæc prosunt irrigationes ex oleo rutaceo, aut sicyonio, aut ueteri. Cibi sint frumentacei, sorbiles, aut alioqui concocti faciles, & non recrementicij. Cur-

*Resolutionis curatio*

curbita affigantur partibus resolutis, si multae fuerint, particulatim; si pau-  
cae, unī. Post cucurbitas cataplasmata conueniunt ex pice, aut resina, aut  
manna thuris. Optime uero facit artemisia simul cocta, & calamintha, & co-  
nyza, & nitrum. Ammisceatur & aquae parum, quae & ipsa in coctura con-  
sumatur. Alius rursus subducatur per aloē, aut polypodium, aut scammo-  
niā, aut per pultem ex colocynthide. Fiant etiam pingues illitiones ex  
oleo uetusto, in quo scilla inueteratur ad dies quadraginta ad solem. Si ue-  
ro hoc non adsit, coques in oleo scillae sextantem, & illines. Aut rorisinari,  
ni semine similiter preparato utere, & ceræ unciam adde, ut ne diffusetur.  
Quod si etiam galbani, castorij, euphorbij, adarces, & nitri, singulorum se-  
muncia addetur, medicamentosius reddetur. Commodat etiam exquiliæ  
batrachium herba, si in oleo cocta ad solem inueteretur. potiones conue-  
niunt, castorij drach. i. opopanacis magnitudo fabae deglutita. Misticæ fa-  
cit & sagapenum erui magnitudine in aqua mulsā. Et castorium cum opo-  
panace. Et succi cyrenaisi misij magnitudo. Prodest & ex tribus pipēris ge-  
neribus antidotus. Vtemur etiam acopis calefacientibus, & pituitam per  
os detrahentibus. post decimum quartum diem, solidiorem uicium exhibe-  
mus. Et multa oboriente utilitate, ad balneum ducemus. Post trigesimalum,  
dropacem adhibere conuenit, & ad balneum ducere, & de cætero cataplas-  
mata ex sinapi imponete, ita ut in his quibus & motus, & sensus petij, at-  
tendamus ne nimium adurantur, eo quod sensum non habent. In his autem  
qui sensus participes sunt, rubificationes solum adhibere oportet. Verum  
postquam intumuerint, ad balneum ducere oportet, & ceratis molibus cu-  
rare. Sed & à uena uomitu utantur, & à radiculis præsumptis. Gessentur  
quoque sella, aut curru, qui manibus aut iugo trahitur. de cætero uero ad na-  
ruralia balnea ducantur. Vicius autem conuenit siccor, & modicus potus,  
& frictio. Siccos itaque cibos edant, & sitim quantum possunt ferant.

*Refoluitur per laxationem, aut distentionem.*

Quandoquidem partes resolutae aut conuelluntur, aut laxantur: & hoc  
aut à repletionē, aut ab euacuationē, rursus attentione opus est, quando san-  
guinem detrahē oportet, & quando non. Er deinde in laxatis, adstringētia  
ad laxantia ammiscere, & frictionem intentam facere. In contrarijs autē, la-  
xantibus solum uti, unā cum hoc ut molliter fricemus. Habeat autem oleū  
in laxatis, parum nitri, & fecis uini usque tritae additum. perfundantur autē  
uehementer aqua calida, & maxime marina, in qua coctae sint lauri baccæ,  
aut uiticis germina, aut sampsuchus, aut tale quippiam. Si uero aestas sit, na-  
tent etiam in mari. Rubificationes autem his maxime conueniunt. Proin-  
de exdantur etiam partes ferulis, aut urticae ramusculis. Si uero permaneat  
resolutio, carnem inter articulos mediam laxatam attrahere oportet, & can-  
terijs paruis ac tenuibus transmissis urere. Contractis autem partibus assa-  
duē dropacem imponere oportet.

*De resolutione in singulis partibus consistente.*

Resolutio partium quae ex nerui diuisione contingit, incurabilis est. Quae  
uero ex intemperie, aut humore aliquo oboritur, in cōmuni quidem ex re-  
latis remedium facultatibus opem sentit. Sunt autē & propriae quaedam  
ad singulas ex ipsis, quas subiiciemus. In his igitur qui casu modo conuel-  
luntur, maxillam in contrariam partem per capistrum deligaturam reduces.  
Conuenit & sanguinis detractio à ualis sub lingua, & cucurbitae primo ut  
riculo affixae, & pituitam per os detrahentia, & purgationes per narium in-  
fusa. Nosse igitur oportet non eam maxillam quae distorta apparet, resolutam  
esse, sed oppositam. At si deglutitio resoluta est, cucurbitas mento affige-  
re oportet, & medicamenta illinere ex castorio, & sagapeno, ac succo par-  
thico. prodest & acrium gargarismus. Si uero lingua resoluta est, secun-  
dæ sunt in ipsa uenae, & cucurbitae mento affigendae, & apophlegmatismis  
ex sinapi utendū, & exercitijs linguae. Quod si uocis instrumenta resoluta  
sunt,

Puls ex colo-  
synthide

Siccorum esus

Natationes  
marinæ

Nerui diuissio  
incurabilis

Canina con-  
uulsio

Capistrum de-  
ligatura

Deglutitio  
resoluta

Lingua re-  
soluta

A sunt, thoraci adhibere auxilia oportet, & spiritus detentione, ac uociferatio-  
 ne uti. At in supercilliorum, aut palpebrarum resolutione, unctiones si-  
 militer profunt. Ad finem uero etiam futura sursum uersus. Si uero uesica  
 resoluta est, siue supprimantur urinae, siue inuoluntariò excernantur, pecti-  
 ni & intercapedini inter anum & scrotum, medicamenta adhsbeantur. In  
 sedem uero oleum rutaceum infundatur, aut sicyonium cum butyro, & ca-  
 storio ac galbano, aut opopana ce, aut silphij succo. Sed & in uescam trans,  
 missa hęc per colem, magnifice profuerunt, aut etiam sola suffecerunt. Quin  
 & ex centaury ac colocynthide in intestinum infusa per clysterem, cum  
 oleo sicyonio commoda sunt. Commodant etiam urinam scientia in potu,  
 & castorium similiter. Et prae omnibus, catheteris instrumentum immitten-  
 dum est, in his qui nihil urinae emittunt, & infessus, & cataplasmata ex la-  
 xantibus adhsbenda. In his autem qui inuoluntariè excernunt, astringen-  
 te ductu utendum est per corroborantia auxilia. Cibis uero siccis, & aquae  
 frigidae potu. Verum in resectionibus, etiam rubificationibus, & naturali-  
 bus balneis frigidis utantur. At uero eos qui in spina resoluti sunt, ex uul-  
 nere, aut casu, aut luxatione uerticuli, si lateralis signorum concussiones  
 adsint, curare impossibile est. Si uero coles resolutus fuerit, his quae ad ue-  
 sicam relata sunt utendū est, & ad easdem partes, & ad lumbos. Insuper au-  
 tem & teniginem scientibus utemur. Incommodum his est lac, caseus, & reli-  
 quae placetae, lactucae item, ac reliqua olera. Rectio porro intestino resolu-  
 to, in quo aliquando inuoluntariò stercus excernitur, aliquando supprimi-  
 tur, ipsidem utendum est, & quandoq; per clysterē immittenda, nunc ea quae  
 adstringunt, uelut est cupressi, lentisci, rubi decoctum; nunc ea quae laxant,  
 uelut est adeps suillus, & anserinus, & oleum maluae; interdum autem mor-  
 dentia, uelut est muria, aut colocynthidis, aut similia decoctum. Nihil e-  
 nim ita ad motus prodest, uelut uaria moliri. Si uero frigiditatem sentiant,  
 etiam acopon ex euphorbio oleo dilutum per clysterem immittatur. Cae-  
 terum artus resoluti, cum communi curatione, flectantur, ac fricentur, & ex-  
 tendantur iuxta relatum modum. Plurimum enim spei in frictione sua est.

De resolutione ex colico morbo oborta.

Nostra aetate colicus quidam morbus homines uexauit, in quo absoluta  
 motus priuatio in artubus consequēbatur, & maxime in his qui superstitēs  
 euasuri essent. Verum sensus tactus illaesus conseruabatur, uelut uerissimile  
 est, iudicatoria quadam transiitione ex alto contingente. Vnde sua sponte  
 detest plerisque motus temporis progressu. Qui uero difficilior curari po-  
 tuerunt, his simpliciores ex relatis illationibus profuerunt. Praecipua uero  
 ad ipsos comperta sunt acopa, & id quod ex populo nigra fit, & quod ex  
 abiete paratur. Multis uero etiam corroborantia, & moderatè frigefacien-  
 tia magnopere profuerunt.

De conuulsionibus.

Caput XIX.

Atractionem de resolutione, de conuulsionibus sermo consequitur,  
 eo quod ambae neuorum sunt affectiones. Quapropter etiam de tremo-  
 ribus consequenter dicitur. Quum igitur ab initio, aut non longè post ini-  
 tium morbi, exorsa fieri conuulsionē permanent, ex repletionē genera-  
 tionem habent. Quum uero post sudores multos, aut uomitus, aut alui ege-  
 stiones, aut sanguinis eruptiones, aut uigilias, aut famem, aut motus mul-  
 tos & uehementes, ob euacuationem fiunt ac consequuntur. Et ubi aliquē  
 sanum derепente conuelli contigerit, necesse est à repletionē fieri. Si uero  
 ex febribus ardentibus resiccatum fuerit totum corpus, & nerui: & de in-  
 de ob siccatem conuulsi fuerint, maximum hoc malum est, & ferè incu-  
 rabile. Primum igitur delegare oportet partes, quae contrahuntur ita  
 ut cedant, & inordinatis resistere motibus, defricareque oleo rutaceo,  
 aut sicyonio, aut ueteri, aut aliquo huiusmodi, & aquam mulsam praebi-  
 endam dare. Et qui quidem ob euacuationem conuelluntur, oleo, aut

Vocis instrue-  
 mēta resoluta.  
 Supercillia  
 resoluta  
 Vesica res-  
 soluta

Catheter ins-  
 trumentum

Spinae resola-  
 tio  
 Coles resola-  
 tio

Intestini recti  
 resolutio

Artus resoluti

Colicū mora-  
 bus tempore  
 Pauli

Conuulsiō

aqua & oleo calido perfundendi sunt. Nulla aut re prohibente, etiā ad balneū abducemus, tēperatoq; solio utemur, cum oleo ac frictione mollissima. Nutriemus ipsos sorbitionibus ex chondro & alicā, & utrum tenue, aquosum, & quod facile distribuitur dabimus, praterquam si febrant: tūc enim ptisanę succo utemur: & somnum conciliabimus. At uero conuulsiones ob plenitudinem, aut inflammationem obortas, curabis plenitudinē euacuando, inflammationem autem proprijs ipsis auxilijs persanando. Fit etiam conuulsio quum uomentes uehementius lancinantur. Optulatur autē conuulsis acanthij radix, & spinæ albæ semen potum, itemq; spinæ Aegyptiæ. Sed & centaurij tenuis succum quidam bibendum dant, quum ob repletio nem conuulsio contingit. Non solum autem bibendum dato, sed etiam forinsecus ad cutem illinito castorium cum oleo sicyonio. Si uero non sedetur, cucurbitas affigito cum scarificatione, si quidem crura cōtrahantur, ad coxas & ultimū uerticulum: manibus autem conuulsis, & dorso, & primo ipsius uerticulo, & ei quod humero superincumbit. Si tamen toto corpore ab affectione immuni, labium contrahatur, aut palpebra, aut lingua, graue symptoma putandum est, & quod magnos timores afferat, etiam si affectus partes parua esse uideantur. In his igitur detractiones sanguinis ab occipite, & a primis uerticulis faciendæ sunt.

De tetano, id est distentione, eiusq; differentijs. Caput XX.

**T**etanus quum & ipse conuulsio quædam sit, uelut compactis corporis, & maxime spinæ musculis oboritur, ex frigido humore intrinsecus ac forinsecus concreto. Vnde affecti neq; se ipsos flectere possunt. Verum quū in anteriorem partem corporis, partes tenduntur, affectio Emprosthotonos appellatur: quum in posteriorem, opisthotonos. Vbi uero æqualiter intrinsecus partem tenduntur, tetanus affectio nominatur. At pelops has affectiones distentionem & distentionem esse dicit musculorum ac neruorum circa collum, per quos inclinatio, & nutus, & conuersio capitis contingit. Verum si circa posteriores colli musculos consistat affectio, opisthotonos ex contingente: si uero circa anteriores, emprosthotonos: si circa utrosq; tetanus appellatur. Causam autem repletionem esse dicit musculorum, ex spiritu & aëre crasso ac nebuloso. Dicit autem frigidū ualde ipsum esse ac congelatum, & propterea ægrè mobilem. Vnde non sicca potius his fomenta, sed humida conuenire. Atq; hæc quidem sunt tetani differentiæ. Cæterum curatio communis quædam est, & iuxta has differentias non euariat. Optimum igitur omnium auxilium ipsis est febris insuper accedens, quæ ab initio non fuit. Signa horum sunt respiratio suspirabunda, & pulsus rarus ac paruus. Et quandoq; etiam risus Sardonijs ipsis cōtingit. Et rubor in facie est, & oculi ipsis in mole maiore apparent. Et aut omnino non mingunt, aut uelut aqua ipsis emittitur, aut urina sub cruenta, bullas quasdam habens. Et alius resiccanus, & uigilantiores sunt, & præ conuulsionibus sæpe periclitantur ne ex lecto excidant. Et quandoq; etiam singultire incipiunt. Et dolent alij caput, alij scapularum nexus, & lumbos. Quidam ex ipsis etiam tremitus sunt. Facit porro affectionē, quanquam raro, etiam lassitudo, & humi dormitio, & grauis oneris eleuatio, & casus, & uulnus, & uestigio & plaga, & alia quæ eandem læsionem nerui inducere possunt. Curare uero ipsam oportet uelut conuulsiones ex euacuatione obortas.

Curatio tetanorum. Qui tetanica distentione conuelluntur, in principio uenæ sectionem adhibeant, & partes lanis oleo imbutis regant, sicyonio, aut castorio cum oleo ueteri. Aut etiam uesicam amplam oleum calidū habentem tendinibus imponant, & cucurbitas cum scarificatione. Nam leues noxiæ sunt. Affigantur autem & ceruicī, & utrinq; ad spinam, & musculi pectoris partibus, & præcordijs, & ad uesicæ ac rhenum locum. Nec paræ detrahendum est, ita tamen ut non acruatim detrahamus, sed particulatim. Sudores autem lanis oleo imbutis excipere ac abripere oportet.

A cet, ut ne latenter nobis non animaduertentibus perfrigerent. Si uero diu-  
turnus fiat retentus, bis in die in olei solium demittantur, non tamen in ipso  
moram trahant. Nam olei solium maxime uires exoluit. In potu danda est  
aqua mulla tepida ad dimidias decocta, & panacis drach. i. robustis, sin mi-  
nus, obol. iiii. aut minimum obol. i. Nam quod stomacho in commodat, id  
in ipso quis uereri possit. Dandum est & ammoniacum, & succi cyrenatici  
enima gnitudo, cocto melle oblita deuoretur: & radices silphij cochlearia  
ii. tribus aquæ mulsæ cyathis inspersa dantur, aut cum ipsius decocto. Aut  
myrrhæ drach. i. ex aqua mulla, aut hyssopi decocto. Minime omnium ue-  
ro offendit, & efficacissimum est, ut demus castorij cochlearia ii. aut iiii, di-  
uisa ipsius copia. Non enim offendet etiam si post cibum ex ipso dederis. Sed  
& ipsum potum, & reliqua, lente ac paulatim accipiant. Nam quæ difficul-  
ter deglutiant, in nares potum relidunt, unde uehementer lancinati ad con-  
uulsionem irritantur. Sedes oleo rutæ cum opopanace illinatur, & eadem  
per clysterem immittantur. At uero frigida assulionem, uelut Hippocrates  
dicit, quum maxime temeraria sit, & propterea à posterioribus damnata, et-  
iam nos reprobamus. Vngentum. Nardini sextar. i. ceræ sextantem,  
folij amomi, styracis, mastiches, singulorum unc. i. castorij, adarces, euphor-  
bij, piperis, singulorum unc. i. spicæ nardi, opobalsami, singulorum unc. i.  
Potio ad opisthotonicos. Radices panacis, piperis albi, costi, myrrhæ,  
succi papaueris, singulorum æquales partes, dato araci magnitudine ad som-  
num. facit & ad recta cecruice spirantes. Sit porro uisus his attenuas, & qui  
facile coqui ac distribui possit, & penitus sine recrementis.

Solum olei

Frigida affusio  
sio Hippo-  
cratis

De tremoribus. Caput XXI.

Tremor in uniuersum quidem ob neruorum debilitatem fit. Hoc autem  
testatur senilis ætas. Verum particulatim multæ causæ hunc efficiunt.  
Nam & ob frigidam sit intemperaturam, & ob frigidæ aquæ potum, & præ-  
sertim in febribus intempestiue acceptæ. Insuperq; ob frigidorum ac uisco-  
sorum humorum abundantiam, & ob copiosiorē uini usum. Qui igitur ex  
delictis palam tremunt, ab his quæ læserunt abstineant. perseverante uero  
tremore in febribus, primum totum corpus oleo sabino irrigetur. Verum  
in accessionum remissionibus, uetusto aut sicyonio. Extremæ uero partes  
præillitæ, lanis mollibus integantur. deinde affigantur cucurbitæ, à primo  
urticulo usq; ad spinâ & lumbos, intestis antea partibus unâ cum præcor-  
dijs, cruda ordeacea farina. Tegantur autem & hæ partes lanis ueteri aut si-  
cyonio oleo imbutis. Si uero diurnæ fiant febres, alternis diebus in olei,  
aut aquæ & olei solium insideant, & mollibus frictionibus utantur. Si uero  
affectio prorogetur, & frigiditas sit suspecta, aqua mulla cum castorio præ-  
bibenda detur, & calidis locis gestatio fiat. Cæterum cibum qui facile con-  
coqui ac distribui possit dabimus, primum sorbibile, postea etiam uolucres,  
& pisces mollis carnis. Solutis autem febribus lauent, ita ut frigide solium,  
& uini potum uident. At si crassorum ac uiscosorum humorum copia fue-  
rit, secantibus & attenuantibus utendum est: quale & hoc est, rutæ ramulo  
num, spondylii, singulorum quantum tribus digitis præhendi potest. casto-  
rij, nitri, singulorum obol. ii. Dato quotidie cochlearium unum cum aceto  
mullo, ad triduum ieiunis. Aut panacis & piperis, singulorum grana v. in  
aquæ mulsæ cyatho uno bibendo præbe. Simplicia uero quæ tremulis præ-  
bibenda dantur profunt hæ: castorium, leporis cerebrum in cibo, althææ  
radicis decoctum, damasonij foliorum drach. iiii. in aqua mulla, eupato-  
rium cum aqua. Si uero prædominetur frigiditas, etiam zosimi uingento, &  
acopis ad resolutiones descriptis, & unctionibus ac rubificationibus ute-  
mur, exercitijs item ac defrictionibus. Eos uero qui ob uini potum tremunt,  
à uino abstinere oportet, donec penitus liberentur.

Tremoris  
causæDamasonij  
foliaOculorum morbi  
bi ac afflictio  
net haria

De oculorum morbis, ex primis de dolore, ex Galeno.

Cap. XXII.

Qum dolores uehementiores in oculis fiunt, considera ex qua nam affe-  
ctione

etione oculum dolere contingit in inflammationibus. Aut enim eo quod mordentur uehementer ab influentium acrimonia: Aut quod repletae uisceribus aut propter crassorum humorum, aut spirituum flatuosorum intensionem, dolores uehementes in ipsis fiunt. Morbus itaque per purgatoria uacuando curare oportet, & oui candidum infundendo. Concocta uero iam inflammatione, & corpore à superfluitatibus libero, conuenientissima his sunt balnea. At inflammationes ob repletionem, & per sanguinis euacuationem, & per uentris subductionem, & infernarum partium frictionem, curare conuenit. Intensiones autem, toto corpore præeuacuato, & humorum momento deorsum reuulso, consequenter localibus discussorij curandæ sunt. Fomenta igitur ipsis adhibere oportet, & sceni græci decoctum infundere. Verum in quibus intensio est sanguinis crassi in oculorum uetralis, citra plenitudinis affectionem in toto corpore, his uini potu utendi est, quod & percalefacere potest, & euacuare, & obturationes referare.

De turbatione, & ophthalmis, id est lippitudine, proprie appellata.

Turbatio oculi  
lorum

Turbatio quidem humiditas est oculi, & caliditas cum rubore præter naturam, quæ non ex corpore, sed ab aliqua forinsecus causa contingit, uelut à sole, fumo, puluere, uento. Quare etiam citissime soluitur, dum causa sum mouetur. Est & lippitudo quædam perturbatio, non solum forinsecus, sed etiam citra manifestam causam oborïens, & permanens usque ad tertium, aut quartum, aut quintum diem. Curatur autem facillime, forinsecus irritanti custodiâ, pauci cibi usu, aque potu, deambulatione, & facili alui solutione.

De inflammatione.

Inflammati-  
oculorum

Si uero inflammatio relicta fuerit in oculis, post totius corporis euacuationem, substitutionibus utendum est, per ea quæ humorum allationem repellere possunt, & irritationem mitigare. quale est collyrium Nili ex rosâ, aut etiam Chia cum, & Nardinu. Inflammata uero tunica agnata, collyrijs non homeris ab unius diei usu appellatis utendum est, cum oui candido infusis. Postridie si non inflammatio intendatur, nardinum illinatur. Fomento uero utendum est ex decocto meliloti ac sceni græci. Quod si crassus sit humor qui lippitudinem facit, medicamentis utemur quæ neque meatus obducunt, neque humores crassos faciunt, sed diffundere, & humectare, ac excernere possunt, uelut est collyrii Chia cum. Si uero circa caput impacti sunt humores, cucurbita occipiti affigatur, aut scarificatio fiat, aut hirudines fronti adhibeantur ad dolentem oculum. Et cataplasma fiat ex pane puro aqua madefacto, cum modico rosaceo: aut ex polenta in caput papaueris decocto cocta, eodem modo. Sed & efficaciore utendum est cataplasmate, ex croco, & meliloto, & palmularum carnibus, & coriandri folijs teneris, & ouorum uiscellis assatis, & miscis panis sapa madefactis, & modico rosaceo, contritis his in papaueris caput decocto. Sed & papaueris semine aliquando ammiscemus, doloris sedandi gratia. Si uero magna sit doloris necessitas, etiam opij minimum quiddam ammiscendum est. Verum citra maximum dolorem, reprobanda sunt quæ torpesciunt. At si moderata fuerit inflammatio, aloen per se, aut aqua, aut oui candido dissolutu illine. Quo uero etiam paratum sit auxilium. Croci drach. vi. aloes drach. xvi. gummi drach. ix. aqua pluuiâ excipe, & collyria effinge. Quin & ex croco diacrocâ appellata collyria, ad lippitudinum initia commoda sunt. At in quibus tumor est laxus & exalbidus, & circa palpebras, & circa tunicâ agnatam, citra tunicarum lationem, bene faciunt & liquida uocata collyria, quæ ex croco, & atramento sutorio, ac melle parantur. Sed & hoc optimu est.

Diacrocâ col-  
lyria

Collyrium liquidum dolorem eximens.

Melanterix coriariæ, mellis Antici, succi sceni græci, æquales singulorū partes, coquito ad spissitudinem mellis. deinde per specilli nucleum siue caput summum ambos angulos continge.

Ad alia

*Ad fluxionum allationem impetuosam.*

Ad fluxionum impetuosas allationes in principio conducit inedia, & aquæ potus, & præ omnibus Veneris abstinētia. Et alius subtrahatur, & posca aquosa facies proluatur, maxime si seruens fuerit fluxio: Sin minus, atramento sutorio cum melle, frons & palpebræ illinantur. Quidam uero atramentum sutorium aqua dilutum proluendum exhibent. Verum in his qui absq; inflammatione fluxione infestantur, aut cum inflammatione, ramen ut supra caluariam structura affectionis consistat, agglutinatorijs utendum est in fronte, simplicibus quidem, uitis solijs uiridibus, aut rubi succo, aut portulacæ, aut malorum cotoneorū succo, cum tenui polenta, aut galla trita cum uino, ac tenui polenta, aut cicuta, aut psyllio cum aqua, aut solano, aut cochleis unā cum testis tritis impositis a tempore ad tempus: & in summa adstringentibus & perfrigerantibus. Compositis autem his. Pollen tritici, & myrrha, aut thus, cum oui candido illinatur. Aut samia terra cum myrrha, & manna, similiter cum oui candido. Verum in frigidioribus fluxionibus, sulphuris uiui, bituminis, picis, colophonæ, singulorum dtach. II. Miste item pastillus, & Aster, & consimiles probe repellunt. Et theriaca uino adstringente diluta, & fronti illita, frigidas fluxiones sistit. Hec tamen etiam pota magnifice his prodest. Supra ipsum uero oculū, lanam, aut lin-teum tenue oui candido imbutum impone. Et caseus recens similiter oculo impositus, acres maxime fluxiones cohibet. Et collyria sistentia appellata illita, & aquosa instillata, hoc faciunt. Si uero per profundum, & sub caluariam consistat humor, & ad longum tempus extendatur, post uniuersales euacuationes, & errhinis, & apophlegmatismis, ad pituitā detrahendam utendum est, & rasura, & rubificationibus capitū. Verū in his etiam chirurgias in capite assumunt, uasorum uidelicet dissectionem, & arteriarum sectionem, & hypopspathismum, & circum caluariam incisionem, & usionem in uertice ad os usq; Sed & cucurbitæ sincipiti affixæ cum scarificatione, in fluxionem reuellere possunt. Signa uero fluxionum extra caluariam sunt, distentiones uasorum circa frontem & tempora, & uelut unsculum capitū. Et quod siccantia agglutinatoria profunt. His uero non presentibus, influxione moram trahente, & sternutamentis aliquando uexantibus, sub caluaria humorem esse putandum est.

*De Chemosi.*

Chemosis dicitur, quum præ inflammatione uehementi, ambe palpebre euerse fuerint, ut oculi uix ab ipsis cōtegantur, & candidū oculi sublimius fuerit quam nigrum, & rubicundum, & multam nigri partē occuparit. Curare uero ipsam oportet uenæ sectione, & medicamento purgatorio, & collyrio ex rosīs albo, & spodiaco, cum lacte muliebri, aut candido oui. Eodem etiam oblinendæ sunt palpebræ, & tempora, & frons. Fomentis quoque & cataplasmatibus utendum est mitigatorijs. Remittente uero inflammatione illinantur acriora, uelut est uiride ex rosīs.

*De sugillationibus ac inflationibus.*

Sugillatio est ruptura uenatū membranæ agnatæ, ex plaga maxime obortiens. Instillare igitur ipsis oportet sanguinē palumbi aut columbæ, aut lac muliebri calidū modico thure cum ipso trito. Aut murtam instilla, & præsertim quæ est ex Cappadocico sale. Et fomento utere ex decocto hyssopi. Verum ad tumores circa oculos factos ob plagas, facit fomentum assiduū exposca, & spongia ex posca incumbens. Medicamentum uero illitioni ac commodatum hoc est. Lapis specularis ustus, & columbinū stercus, æquis portionibus uino, aut aceto trita. Cataplasma autem sit ex caseo recēti, aut raphani cortice, aut uua passa exemptis uinaceis, singulis in posca, aut in aqua malsa. Eadem faciunt etiam ad inflationes.

*Ad inflationes pruriginosas, & scabras lippitudines.*

Inflatio tumor est palpebræ laxus. Scabra uero lippitudo, pruriginosa palpebræ

Fluxiones in  
oculis impetuosæ

Chemosis

Sugillatio oculorum

Inflatio  
Lippitudo  
scabra

palpebrae scabies est, ex falso ac nitroso humore oborta. Conuenit igitur<sup>a</sup> ipsis posca, & lentium decoctum, itemq; rosarum, ut his fomenta fiant. Collyrium autem liquidum hoc. Aeris drach. vi. misyos tostos, myrrhae, singulorum drach. iiii. croci drach. is. pipēris drach. i. uini chj, & passi cretici, singulorum sesquicyathum. coquito ad mellis spissitudinē. Haec est Erasistrati panchrestos ab omnimoda utilitate appellata, faciens etiam ad anginā, & ulcera in ore, & in pudendo, & ad auris dolores. Inungant autē & oleo palpebras, ubi dormire uolent. Abstineant ab acidis, & fallis, & acerbis.

De dura lippitudine, & de sicca lippitudine.

**Lippitudo dura** Lippitudo dura duricies est, & difficilis oculi motus, cum dolore ac rubore, citra humiditatem. Fouere igitur ipsos assidue oportet spongijs ex aqua calida. Et ad somnū ituris imponere palpebris ouum cum rosaceo, aut anseris adipem, ita ut fugiamus frigida & indurantia. Tegatur autem & ungatur caput, & alius subducatur. Lippitudo uero sicca, est pruriginosa, colorum affectio, citra fluxionem. Curare oportet ipsam balneis, & unctio nibus, & boni succi ictu. In communi uero utriusq; cōueniunt medicamenta acra, ut & lachrymas prouocent, per quas & duricies remittetur, & scitacitas humectabitur. Talis autem est & panchrestos Erasistrati, & collyrium diacenteton appellatum, & quod stratioticum uocatur.

De palpebrae euerfione.

**Stratioticum collyrium** Palpebrae euerfio contingit, aut ob cicatricem, aut ob nimiam carnē excrecentem. In diuturnis igitur euerfionibus ob nimiam carnem excrecentem, æruginem rasam tostam tritam adhibet aut plumbum ustum & lotum: aut utraq; pariter, æruginem & plumbum admoue. Nam ex cicatrice obortam palpebrae euerfionem, si quidem omnino curetur, chirurgia sanat.

De Aegilope & Anchilope.

**Aegilops** Aegilops abscessus est inter magnum oculi angulū & nasum, qui & rum-  
**Anchilops** pitur, & in fistulam abit, si neglectus fuerit, usque ad os ipsum. Priusquā uero in ulcus eruperit, abscessus, Anchilops uocatur. Bene igitur faciunt glaucium & crocus, si cum perdicidis succo imponantur. Verum assidue alterare oportet, & ad transmutationem non peruenient. Aliud. Alica cocta in aceto, & probe trita, non solum incipientes, sed etiam in pus transmutatos sanat, & rumpit, & ad os usq; subit. Huius usū non modo Aegilopas, sed & Anchilopas curabis. Aliud. Ruta fatiua cum lixiuo protofascio, ex cinere calce adiecta parato trita, cocta ac imposita, ualde probe extirpat aegilopas, & ad os usq; subit, ab initio mordens, postea non item, & quod mirū est, neq; cicatricē indecoram inde ferunt. Aliud. Corychleas cū testis tritas impone, aliquando etiā aloē & myrrhā ammisce, aut tea q; in pus aegilops transmutatus fuerit. Sed & postq; ruptus fuerit, ipsum

De Trachomate, Sycofi, ac Tylosi.

(relicat.

**Trachoma** Trachoma asperitas intra palpebram est, huius intensi ut uelut incli-  
**Sycofi** ras habeat, sycofis à ficus similitudine uocatur. Vbi uero diu durauit & cal-  
**Tylosi** lum contraxit, tylosis id est callositas nominatur. Collyrijs itaq; utendum est, tum eo quod ex uino, tum eo quod ex duobus lapidibus paratur. Sed & ipso hæmaritæ lapide per aquam loto ac subiecto, palpebra conficitur. Quin & Hæmaritæ collyriū, cum modico cygnario, aut eo quod ex croco constat, ad hæc etiam scabris lippitudinibus citra exulcerationem conducit, si in uersa palpebra illinatur. Si uero durus sit callus, & his non cedat, in uersam palpebram per pumicem rademus, aut per sepia testam, aut fici folijs, aut etiam per instrumentum blepharoxyston ab hac opera appellatum.

De grandinibus.

**Blepharoxyston** Grando oculi Grando lenti humoris circa palpebram concretio est, cui ammoniacum aceto tritum cum galbano illines. facit & terebinthina cerato excepta.

De Ordeolo.

**Ordeolum** Ordeolum abscessus paruus est, iuxta palpebrae marginē oblongus. Oportet



**A** Oportet igitur ipsum cera alba fouere, aut de musca capite abiecto, reliquū corpus affricare, aut ordeī cremore perfundere.

*Ad pediculus in palpebris.*

Expurgatis prius pediculis, aqua marina tepida proluere oportet, deinde marginem subscripto medicamento contingere. Aluminis scilli partes II. staphydis syluestris partem I. tritis utere.

*De Madarosis, aut Milphosis.*

Defluuium pilorum palpebrarū hæc affectio est. Post totius igitur corporis curam, smegmatis calliblepharis, ab ornandis palpebris uocatis, utere. Aut terræ ampelididis, croci, celticæ, ladanī, singulorum æquales partes ter ac utere. Aliud. Stibij tosti loti drach. I. plumbi usti loti drach. IIII. croci drach. IIII. nardi Indicæ drach. III. tritis utere. Hoc etiam scabiosos oculos sanat. Aliud Neapolitæ, ad milphosos, & diuturnas palpebrarū affectiones. Stibij cadmiæ, chalcitidis, misyos peregrini, singulorum partes æquales, cōtundito crassiore modo, & melle subacta torreto, ac tritis utitor.

*De pilosis.*

Pilosis crassities est palpebrarum callosa, rubicunda, quibus contingit etiam sæpe pilorum defluuium. Præter relata igitur etiam hoc summè facit. Stercus murinum uisum ac melle contritum illine.

*Ad pilorum superciliorum defluuium.*

Oleo aut adipe anserino illitis digitis plumbum confricato, & hoc illinito. Aliud. Hoc etiam subnigros facit. Nuces auellanas uistas cum caprino aut ursino adipe confricato. Aliud. Hoc etiam ad barbarum alopecias facit. hyoscyami drach. II. stercoris murini drach. I. polytrichi drach. I. angeli trini cochlearia IIII. Ad reliqua probe trita unguentum ammisce, & fomento prius adhibito illine. Si uero præaferis, magis efficax est.

*Ad pilos palpebrarum pungentes, Trichiasin appellatam.*

Pilis pungentibus præcuisis, locum sanguine ranarum per se statim illine, aut cum cinere chamaeleonis albi. Aut cimicum sanguinem, aut fumariæ inter ordeum nascentis succum, cum gummi. Aut tellinarum falsarū cinerem, cum cedria. Aut loti cinerem. Aut alumen liquidum, phorimum appellatum. Aut ricini à cane auulsi sanguinem, ualde efficax est.

*Pilos agglutinantia.*

Pilos introrsum refractos glutinat bitumen, mastiche, colophonía, glutinum, cochleæ glutinositas.

*De carnis in angulo magno incremento ac decremento.*

Encanthis naturalis in magno angulo carunculae incrementum appellatur. Et rursus huius decrementum Rheas. Incrementum igitur his quæ ad palpebræ euerisiones relata sunt, & similibus uistorijs, aut corrodetibus consumpseris, non tamen totum, ut ne rursus decrementum fiat: sed ad naturalem usque magnitudinem. Decrementum uero, tota quidem carne consumpta, aut à parum artificiosa chirurgia, aut per medicamenta, incurabile esse scias: si uero pars ipsarū imminuta fuerit, moderatè adstringentibus & incarnantibus ipsam renutrueris. Qualia sunt quæ fiunt ex croco, glaucio, & aloë. Et collyria ex croco. Ethyoscyamos in uino coctus ac impositus, & modicum alumen cum uino.

*De ulceribus.*

Ulcus in oculis quidem unum est, differentiarū uero particulas plures. Nam quod in cornu formi membrana cauum, & angustum ac purum ulcus est, Bothrium id est fossula cognominatur. Quod uero latius bothrio est, minus autem profundum, Coeloma uocatur. Argemon autem ulcus dicitur in iridis circulo obortum, circumcirca occupans, ut circa externam iridis partem rubicundum appareat. Circa internam uero album. Epicauma uero ulcus est fordidum, & impurū, ac crustosum, quod dum repurgatur, sæpe humores in oculo effluunt. Sed & alia plures ulcerum differentia

Pediculi palpebrarum

Madarosis  
Milphosis  
Calliblephara

Pilosis

Alopecie barbarum

Trichiasis

Ricinus à cane

Encanthis  
Rheas

Ulcus oculi  
Bothrium  
Coeloma  
Argemon  
Epicauma

riæ sunt, de quibus in communi dicemus. Si igitur cum inflammatione ulcus confiterit, etiam curatio per ea quæ inflammationem mitigare ac concoquere possunt, facienda est, unà cum proprietate quæ ulcus requirit. Talia uero sunt collyria, libyanum, & cygnus, & pelaria appellata, & alter, & similia: & quæ ex amylo, terra samia astere dicta, & cerusa componuntur. Omnibus autem magis dolorē sedare nouimus collyrium Nilamoniæ, sed in ipsius usu non diu immoramur, propter uehementē stupefaciendi facultatem. Optimum est & collyrium ex decoctis, quod neque habet uim stupefaciendi. Si uero cum fluxione ulcus fuerit, ex collyrijs ad illam commodis aliquod ammiscebimus, quale est quod ex hydria fit, & chiaci, & cygnus fuscus, & quæcumque repulforiam non mordacem uim habet. Quod si sordida ulcera fuerint, aqua mulla moderatē aquosa, & foeni græci decocto utemur, tum per se, tum cum collyrijs ad hoc facientibus, acrioribus quidē ulceribus existentibus, Seueriano, & eo quod ex foeni græci succo paratum non acris aut, dialmyrnis & nardinis. Verū purgata ulcera probe ad cicatricē perducere solet collyriū Cleon, ad hoc quod etiam cicatricē cōcolorē

De prolapsu oculi.

(efficit.

**Prolapsus oculi** Prolapsus est pronuētia tunicæ aciniformis, ex corrosione, aut ruptione corniformis tunicæ oborta. Quæ sanē ubi adhuc parua est, ut muscæ capiti similis sit, Myocephalon uocatur. Amplius autem aucta, ad acini uisum similitudinem, Staphyloma. Plurimum uero, ut ultra palpebras excedat, Malum. Si uero callosum factum fuerit, hoc clauus appellatur. Si igitur modicē ad capitis muscæ similitudinem prolapsus factus fuerit, restringentibus ac repellentibus compositionibus urendum est, chiacio uidelicet collyrio, & sulco, & nardino, & Theodotio, & eo quod ex oleæ frōdibus fit, & quod ex cornu. Spongiam quoque posca aut uino adstringente, aut rosarum decocto imbutam, aut etiam splenium, citra compressionem deligare oportet. Principatum autem habet ad prolapsus, & ulcera omnia, olympiacum siue olympus appellatū collyrium, cum succo oleæ, aut polygoni, aut polij. Eadem hæc etiam Malis conducunt, & staphylomatibus, prius quàm in albescant. Vbi uero alba aut callosa facta sunt, incurabilia existunt.

De suppurulenta.

**Suppurulenta oculi** Suppurulenta fit aliquando corniformis tunica, quandoque per profundum, quandoque in superficie, ut ungui simile figura pus sit. Quare etiam affectionem unguem appellant. Scopus igitur curationis est, aut pus discutere, per ea quæ moderate hoc faciunt, uelut est aqua mulla, & foeni græci succus, & quæ ex ipso parantur collyria, & Libyanum, & quæ ex thure sunt. Aut rumpere & repurgare per fortiora, qualia sunt collyria dialmyrna, & hygidium appellatum. At uero ad purulentos absque ulceratione, etiam hoc liquido collyrio utendum est. Atramenti sutorij, croci, singulorum drach. viii. myrrhæ drach. iiii. mellis libram i. Quin & pustula quum sit corniformis tunicæ eminētia, humore quodam strias ipsius subexcoriante, paralentorum curationi subiijctur. Liquidum Bassi, ad oculos suppurulentos. Croci, aloës, myrrhæ, singulorum unc. i. uini quadrantem, mellis optimi sex uncem. Crocus cum modico uino teritur. deinde aloë, & myrrhæ, & ubi crassa facta fuerint, adijcito mel, & unita in uitreo uase reponet. Vtere autem bis in die. Si uero res urget, ter. Nam oculum simul & purgat, & incarnat, ac cicatricē includit.

De cicatricibus ac albuginibus.

**Cicatrices Albugines Nubeculae** Quæ in superficie in oculis sunt cicatrices, quidam hoc ipso nomine solum cicatrices, quidam Nubeculas uocant. Quæ uero in profundo consunt, albugines. Horum medelæ sunt ea quæ affricta detergent. Nubeculas itaque anemones succus deterget, & parui centaureij succus cum melle. Diuriores autem cedria attenuat, & æs solum aqua tritum uelut collyrium, & collyria extensoria, quale est id quod ex cornu fit, & quod Rinariū appellatur,

*A* pellatur, & Hecatombe, & similia. Albugines uero nitrum cum oleo ueteri tritum diligenter, ac illud probe extertit. Et sepiā testa usta, & cum melle trita. Ex collyrijs autem hoc probe & leniter extertet. Mamerā, ammoniaci thymiamatis, myrrhæ troglodyticæ, stercoreis crocodili, singulorū æquales partes. Fac collyrium & utere. Aut crocodili terrestris stercoꝝ aqua tritum, ac in collyria redactum illine. Bene autē feceris, si saltem Cappadociū aqua dissolueris, & cū hac aqua collyria ad albugines cōmoda infilla ueris.

*Cicatricum infusura.*

Gallæ, acaciæ, singulorum drach. IIII. atramenti sutorij drach. II. uterē. Collyrium uero hoc. Florum mali punici, id est cýtinorum, atramenti sutorij, acaciæ, gummi singulorum drach. II. stibij, gallæ, singulorum drach. II. tere cū aqua. Si flores mali punici non adsint, membranosum illud quod intus inter grana in malo punico est admisce.

*De pterygijs.*

Pterygium, unguis à quibusdam uocatus, neruosa est tunicæ agnatæ eminentia, enascens quidem ab angulo, progrediens autem ad coronā usq; Vbi uero nimium aucta fuerit, etiam pupillam tegit. Magna igitur & diuturna pterygia per solam chirurgiam excinduntur. Recentiora uero & moderate magnitudinis, etiam exterforia auxilia consumunt, qualia sunt quæ ad aspretudines ac albugines adhibentur. Ex simplicibus igitur sunt æs ustū, aut atramentū sutorij cū felle porcino probe hæc faciūt. Efficacius autē hoc est. Atramētū sutorij partē I. gummi parietē dimidiā. Vino trita illinimus; aut etiā collyria formamus. Quidam etiam fel caprinū melle mixtū illinūt.

*Ad pterygia, & purulentos oculos, ac hebetes uisum, Oribasij.*

Lapidis magnetis, aruginis rasis, sinopidis, ammoniaci thymiamatis, singulorum drachmas IIII. croci drachmas II. mellis Attici cochlearij dimidium. facit & ad albugines.

*De carbunculatione & carcinomatē.*

Carcinoma est affectio tuncq; urniformis, quæ dolorem habet, distentio nem, ruborem tunicarum, dolorem punctorum usq; ad tempora, & magis si concussi fuerint. Cibum etiam non appetunt, & acerbis exacerbantur. Et est hæc affectio incurabilis, & tamen lenire affectos oportet lactis potus, & frumentaceorū ac aliās boni succi edulcorum exhibitione, citra omnē acrimoniam: & collyriorum tenerorū infusione, uelut est spodiaceum, Seuerianum, & similia. prouidendum quoq; est ut bonum sit totius corporis tementum. Carbunculatio uero etiam ipsa malignum ac crustosum ulex est, aliquando in bulbo, aliquando in palpebra, quemadmodum & in alijs corporis partibus consistens. In bulbi igitur carbunculationibus, ab initio per clysterem eū curare oportet primum, deinde per lac coctum moderate purgare. Postea fomento per spongiā adhibito, farinam crui aut tritici in aqua in uasa coctam imponere, & aliquando etiam iridem tritam addere: & oculum lacte eluere. Si uero proserpant ulcera, lenticulam cum melle imponere, aut cū malis cydonijs coctis. Si uero amplius depascendo proserpant, oleæ folia cocta, aut malicorium coctum in uino, tritum cum melle. At se, data nomē proserpente, & crusta elapsa, per dicendi medicamenti impositionem, & puris factis ulceribus, cataplasma ex uitellis ouorum assatis, cum croco & melle tritis imponere oportet, usq; ad cicatricem inducunt. Medicamentum uero hoc est. Spodij drach. IIII. myrrhæ non ualde tostæ drach. III. obolos III. Tritis in uino aminao donec liccata fuerint, passum creticū uetus amisce, & simul trita liquida pyxide sicili excipe, & inunge. Ceterum ad carbunculos in palpebris, malum punicum acidum totum concisum in aceto coquito, & flaccidum factum ac probe tritum in linteū indito ac utitor, bis aut ter permutans in die, & semel in nocte.

*De Mydriasi, id est pupille dilatatione.*

*Q*uoniam pupilla colore quidem nihil alterata apparet, uerum multo latior quam

*Mameræ*

*Unguis*

*Pterygium*

*Carcinoma*

*Carbunculatio*

*Mydriasi*

quàm pro naturali modo, & quandoq; uisum in totum impedit, quandoq; multum, & quæ uidentur ab ipsis omnia minora esse putantur, Mydriasis appellatur affectio. Causa uero eius superfluus quidam humor est. Curare igitur ipsam oportet uena in cubiti flexura secunda, aut purgationes sin minus, saltem in angulis uenas diuidere. Deinde cucurbitam occipiti affigere, & aqua marina faciem & oculos proluere. Si marina desit, muria aut posca uni. Medicamentis uero ad pustulas conuenientibus utendum est.

*De tabe, & macie.*

*Tabes oculi*

Tabes affectio est pupillæ, quæ angustior & hebetior ac rugosior fit, & quæ uidentur maiora his apparent. Causa autem est densatio à siccitate magis oborta. Differt tabes à macie in hoc, quod tabes angustiores pupillam facit. Macies autem totum oculum minorem ac humiliorem efficit. Curare hos oportet exercendo, & diligenter fricando, & caput, & faciem, & oculos, & faciem aqua proluendo, & caput ungento aliquo calefactorio ungendo. Oculi uero rarefaciente & acriore medicamento sublinantur, quale est subscriptum. Ammoniaci drach. i. crocomagmatis drach. iiii. croci drach. ii. æruginis drach. iiii. trita in aqua in collyria efforma ac utere.

*De Nyctalope.*

*Nyctalopes*

Nyctalopas dicunt, quum interdiu quidem uidere contingit, occidente uero sole obscurius, & nocte penitus nihil. Curare igitur & hos oportet euacuando, & de cubiti flexura, & de angulis. deinde purgando, aut per clysterem euacuando. deinde pituita per os detrahenda, & sternutationes mouenda. Dandum est ante cibum hyssopum bibendum, aut ruta. Si uero non cedat, rursum dandum purgatorium ex scammonia ac castorio. Oculi uero illinantur melle despumato, & claudantur, ita ut etiam comprimant ipsos ad continendum illitum liquorem. Aut aluminis usti partes ii. salis fossilis partem i. trita cum melle illinito. Aliud. Hepar hircinum assato, & sinem inter assandum collectam illine. Ipsum uero hepar edendum præbe. Et dum coquitur uaporem oculis apertis admittere iube.

*De glaucomate & suffusione. Ex Rusti.*

*Glaucoma*

*Suffusio*

Glaucoma & suffusionem ueteres unam quandam affectionem esse putant. posteriores autem glaucomata humoris crystallini affectionem esse putauerunt, qui præ humiditate ad glaucedinem transmutaretur. Suffusiones uero esse præterfusionem inter tunicam corniformem, & crystallinum humorem. Sunt autem omnia glaucomata incurabilia. Suffusiones autem sanantur, sed non omnes. Curandi igitur sunt qui suffusione tentantur, antequam consistat affectio, sanguinis à cubito detractio, & purgatio, & infusio per clysterem acrioribus, uelut sunt quæ sunt ex centaurij aut cucumeris amari decocto, & alui solutione frequentiore. Affigenda etiam cucurbitæ occipitio cum scarificatione. Oportet etiam aquam bibere per os uisum, & uti cibis attenuantibus. progressu temporis conferet & pituitam per os detrahentibus uti per aliquot dies. Quibus uero ueluti calices oculis obuersantur, ex uisio aliquo humore, aut uaporibus biliosis, ribus allatis, his amarum ex aloë medicamentum assidue dabimus, aut etiam per hoc purgamus. Ad oculos uero medicamentis utendum est primum simplicibus, uelut melle, & oleo, cum foeniculi succo. Postea etiam compositis, quale & hoc est. Sagapeni drach. ii. succi cyrenai, ueratri albi, singulorum drach. vi. teruntur in mellis heminis octio. Nos autem inquit Orisanius, subscripto utimur. Succu eucalidum, chamædryos, coronopodis, singulorum paribus portionibus contritis. Faciunt etiam collyria, & quod ex succo foeniculi paratur, & proteus, & Thalasseri appellatum, & quod fit ex opobalsamo. Sed & quæ ex his præparantur prodesse solent. Et forniculi decoctum in principijs affusum prodest, & quod ex succis fit, & opobalsami, & melle, ac oleo, & similibus.

*De obfuscatione ac hebetudine.*

*Obfusatio*

Obfusatio est perfectum ut plurimum uidendi impedimentum, citra manifestum

**A** manifestam circa oculum affectionē. Hebetudo uero est obscuritas uidendi, ab occulta aliqua causa oborta. Curatio cōuenit in communi ea quæ est ad suffusos relata: priuatim uero, sanguinis ab angulis euacuatio, & hirudinum ad tempora admotio, & infernarū partium frictiones. Temporis progressu etiam sternutatorijs utendum est, & uomitibus dum ieiuni sunt, & sublationibus, primum quidem ex melle & oleo paribus portionibus. Deinde subscripto cōposito. Croci obol. ii. fellis hyænæ drach. i. piperis communis grana LXXXV. succi feniculi drac. xvi. ammoniaci thymiamatis drach. i. siccis tritis cū succo, mellis cochlearia iiii. adde, præpara, & area pyxide exceptis utere. Ante illitionē foueat oculos spōgia aqua marina calida imbuta.

De Strabismo.

Infantes ex natiuitate strabones, curantur larua faciei pretenta, quo in di rectum intueantur (est enim strabismus conuulsoria affectio musculorum bulbum mouentium) & lucerna e directio posita, & nō ex obliquo allucen te: & ubi ad nasum oculi nutarint, floccos puniceos agglutinare angulis ad tempora oportet, quo ad illos intenti oculos corrigant.

De expressione oculorum.

Exprimuntur aliquando oculi, ut prominentes permaneant. Eis igitur quibus ex strangulatione expressi sunt, uena in cubiti flexura secanda est. Si uero aliquo alio modo id acciderit, purgatio facienda est ueratro nigro, aut scammonia. At uero expressiones oculorum ex doloribus partus, sapie quidem purgationes in partibus succedentes solunt, quare has procura re oportet. Verum in uiris post uenæ sectionem, si non sedetur, cucurbitam occipitio affigere, & lanam melle illitam imponere, aut floccū cum aqua, superneq; linteam duplicatum leniter deligare. Conducit his etiam aqua marina frigida faciei affusa, & inrybi ac polygoni succus cū papaueris suc co illitus. Item alia quæ constringere ac contrahere possunt.

De confusione.

Confusiones ex plaga obortas, uenæ in cubito sectione, & totum ocu lum replendo sanguine recens maciati turturis, aut in illius penuria, colum bæ, curare oportet. Deinde lanam mollem, ouo cum uino ac rosaceo con quassato imbutam imponere, ac deligare. Postera die idem faciendum est, & tertia fomentum adhibendum, & lac instillandum, & quæ commodant imponenda. deinde sublinenda quæ ad ueteres affectiones pertinent, quæ le est collyrium chiacum.

De Myopia.

Myopes dicuntur qui ex natiuitate ea quæ propinqua sunt uident, quæ uero longe distant, cernere non possunt. Incurabilis est autem hæc affectio, præ uitij spiritus debilitate oborta. Cæterum senes contrarium habēt his affectionem. Nam quæ propinqua sunt non uident, præcul dissita cernūt.

Aurium affectiones, et primum de dolore.

Cap. XXXIII.

**A**urium dolorem ob frigiditatem obortū, & ex tempore, & ex prægres so uictu, aut etiā ex ægri narratione, si ex lacessente aliqua externa cau sa obortus fuerit, ed oculi: & ex eo quodd dolor in profundo firmatus est, citra grauitatem, aut distentionem, aut feruorem, calefacientibus auxilijs curabi mus, oleum rutaceū calidum, aut nardinum, aut laurinū calidum, aut ama racinum, aut soliatum, aut spicatum, aut commune cum euphorbio, aut pi pere, aut castorio: aut comagenū uocatum ungentum, aut opobalsamum, in auditorium ineatum instillantes. Sed & oleum in quo coctum est allium aut cepa, instillatum prodest. At uero dolorē ex calida intemperie, in quo feruorem quendam, citra grauitatem aut distentionem sentiunt, contrarijs curaueris, album oui tritum instillans, quemadmodum in oculo, & lac mu liebre cum aliquo dolore sedante collyrio: aut perdicias succū cum mo dico rosaceo, & ipsum rosaceum, aut acetum ac rosaceum, aut solani succū, aut cortandri, aut asphodeli: aut oleū in quo inestina terræ, aut aselli circa

Hebetudo

Strabismus

Expressio oculi  
lorum

Confusio oculi

Myopes

Aurium dolor

Perdicias

Buccinorū na-  
turale auxilium

hydrias nascentes, in cocti sunt: aut amygdalinum oleum per se, aut buccinis tribus uisus in ipso coctis. Hoc naturaliter efficax est. Verum dolorē ob uiscosos ac crassos humores, & ex capitis, & ex auditus ipsius grauitate, & prægresso uictu cognosce. Dissentio uero sola citra grauitatem, flatu, sum spiritum qui exitum non habet indicat. Utendum igitur est in utrisque medicamentis obturatione liberantibus ac incidentibus, uelut est aphronitrum cum aceto & melle, & sel ouillum cum oleo communi aut amygdalino, & porri ac cepæ succus tepidus cum melle. Aut origanum cum melle ac lacte muliebri tritum instilla. Ad fortiores uero obturationes, sel caprinum cum porri succo instilla. In quibus autem dolor multus & diuturnus, & auditus grauitas adest, utendum his est, uelut est dracontij succus, & arii & bryonij, & similia. Priuatim uero ob spiritum dolentibus flatuosum, cucurbita aqua calida prius seruata, & ad aurē apposita maximo opere prodest. Si uero grauitas, & dissentio simul calida, & dolor pulsatorius fiat, aut etiam aeger febriat, aurem inflammata esse scito. Et præ omnibus utendū est ucnæ sectione, deinde fomentum faciendum frequenter cum oleo dulci calido, per auricularium specillum lana obductum. Instillandus autem est in meatum, & anserinus adeps, & uulpinus: Aut regium medicamentum cum rosaceo, aut cyprino, aut irino. forinsecus imponenda sunt quæ mitigare ac cōcoquere possunt. Quod si dolor cogat, his quæ moderate sensum torpesciunt utemur. Non enim exiguum est periculum, quum cerebrum uicini sit auditorio nervi inflammato. Probe igitur hoc mitigat, opij partem I. castorij partes II. cum lacte muliebri, aut oui candido, aut uino dulci, tepida instilla. Sed & croceus pastillus, & Asker, & Philonis antidotus, saepe his profuit. Oportet autem frequenter fomentum adhibere, aut ex oleo communi, aut ex aliquo calido ungento, ita ut in hoc ipso lanam mader factam auri imponas, & nequaquam quantum eius fieri potest, inflammata partes contingas. Perseuerante uero dolore, & in pus transituro, utere medicamento ex lini seminis succo, instillans ipsum dissolutum cum rosaceo aut chamæmelino. Porro si ex aqua medicata in auditorio meatu contenta doleant, si quidem multa fuerit, per os, aut etiam per stipulam, ipsam exugere oportet. Si uero modica, hac extersa per auricularium specillum, na obductum, oleum quoddam tenuium partium instillare, aut rosaceum, aut oui candidum, aut lac muliebre. Calida uero omnia moderate esse oportet quæ auribus adhibentur.

Ad ulcera cum inflammatione.

Ulcera auris  
inflammata

Lyciū & papaueris succū paribus porcionibus trita cum melle immitte.

Ad dolores maximos, & pur, & auditus grauitatem.

Amygdalas depurgatas Ꝟx. aphronitri drach. III. opij drach. III. thuris drach. III. croci drach. IIII. galbani drach. II. myrrhæ drach. I. aceto trita instillato, si dolor adest, rosaceo diluta: si pure fluant, uino mulso aut aceto mulso: si auditus grauitas sit, aceto. Verum recentia ulcera glaucium curat aceto solutum, & collyria quæ ex ipso fiunt, & quæ ex rosis, & croco, & myrrha, appellationem habent. Quæ uero pure manant citra dolorem, crementum ferri cum aceto sub caniculæ astu tritum.

Ad sordium duriciem.

Sordium auris  
duricem

Nitrum aceto dilutum cum aqua infunde, & deterfione facta, nitrum aceto dilutum cum rosaceo instilla. Aliud ad sordes. Nasturtium, & nitri parum, caricis exemptis granis excipe, & facta inde collyria in aurē infunde, & per triduum exime. Ducit enim sordes multas, & abunde leuat, facit & ad carnis excrefcētiās, dolores diuturnos, & ulcerationes: aut aloēs, thuris, myrrhæ, singulorum drachmam unam. misyos drachmas quatuor, cum aceto in pastillos efformato. usus autem tempore, aceto & rosaceo solutos infunde. Item Andronis pastillum, &

Neren, & Musæ inscriptum.

Ad dia-

*Ad diuturnas ulcera.*

<sup>A</sup> Cedriam melle mixtam illine. Aliud. Misy ustum ac tritum insusilla. Cæterum ante eorum quæ insunduntur usum, aures per auricularium clysterem eluuntur posca, aut aceto mulso, aut uino mulso, aut decocto aliquo ex repulsoijs, uelut lenticula, aut rosarum.

*Ad cruentatas aures.*

Eluito quidem cū lentisci decocto, instillato autem polygoni succū cum paucissimo aceto. Aut lycium, aut amurcam, aut acaciam, aut porri succū.

*Aures cruentate*

*Ad carnem excrecentem.*

Nitrum cum aqua calida, unā cum aeris squama, ac sandaracha, æquis portionibus insundito. crusta uero inducta melle repurgato.

*Caro in auribus excrescens*

*Ad vermiculantes aures.*

Eluito absinthij, aut centaurij, aut porri decocto: instillato autem capparis foliorum uiridium ac fructus succū, aut cedriam, aut urinam humanam ueterem, aut ueratrum album cum melle, aut calaminthiæ succum, aut scammoniam cum aceto, aut absinthij succū. Oleum autem meatui instillatum ad summum usq; emergere ipsos facit. Melius tamen est oleum & acetum. Sed & ad illabentia auribus animalcula hîdem utere.

*Vermiculantes aures*

*De calculis & similibus in aures illapsis.*

Lanam circum specillum obuolutam terebinthina, aut gumini, aut aliquo glutinoso tingito, & sic ipsum extrahito. Si uero non concesserit, oleū calidum frequenter meatui instilla. Et si non exciderit, aut relictum fuerit, adhuc alijs modis utere, uelut in chirurgia referetur.

*Auribus illapsa*

*De sonitibus aurium.*

<sup>B</sup> Si in febribus, aut harum sudicationibus sonitus fiant, nihil moliri opus existatim enim plerumq; sedantur. Si uero etiam post morbum permaneat, fomento ex absinthij decocto adhibito, acetum ac rosaceum insundito, aut raphani succum cum rosaceo, aut ueratri nigri cum aceto. Verū ad diuturnos sonitus, ob crassos ac uiscosos humores obortos: cognosces autē hoc ex eo quod nō acruatim, sed particulatim consistunt: aceto & nitro ac melle colluito. Aliud. Veratri nigri drach. ii. castorij drach. ii. croci drach. iii. nitri drach. xvi. fac pastillos, & aceto tritis utere.

*Sonitus aurium*

*Ad diuturnos sonitus ac sibilos.*

Euphorbio cum oleo cyprino trito ac calcfacto utitor. In his autem qui ob multam sensus subtilitatem, uapores aut flatus afferri sentiūt, castorium & cicutæ semen, tritum cum aceto instilla.

*De auditus difficultate ac sorditate.*

Quæ ex natiuitate, aut etiam post natiuitatem quidem, uerum diuturnissimæ & perfectæ sorditates consistunt, incurabiles sunt. Quæ uero non perfectæ, diuturnæ tamen, & hæ incurabiles sunt, aut uehementer ægre curari possunt. Quæ tamen ob biliosum humorem sursum repentē consistūt, euacuationibus per medicamenta bilem ducenria nō difficulter sanaueris. Quidam uero etiam sua sponte liberantur ab affectione, bile ipsis subtus egressa. At ob crudos ac crassos humores consistentes sorditates, aut auditus grauitates, uenæ sectione curato, aut omnino per hieram purgato, utēs etiam pituitam per os ac nares detrahentibus, & balneis naturalibus, aut aquæ marinæ. Ad meatum uero auditorium instillare conuenit, & ea quæ ad sonitus descripta sunt. Priuatim uero hæc. Urinā capræ, & fel caprinū. Aut fel per se solū instilla. Aut rutæ succū cū melle. Aut castorij cū oleo anethino. Aut cespypū medicamentū cū ungētō nardino. Aut fel caprinū cum galbano. Aut hoc, castorij drach. ii. nitri, ueratri albi, singulorum drach. i.

*Auditus difficultas  
causæ  
Surditas*

*Ad aurium contusionem.*

Hippocrates monet ut nihil ipsis adhibeamus. Quandoquidem uero ab ipsis affectis saepe cogimur, utendum his est. Myrt hæ, aloës, thuris, acacia, singulorum æquales partes, cum aceto aut ouis candido illine. Aut

*Aurium contusio*

panis calidi internam partē, cum melle in pīsa contusam impone. Aut hoc, bituminis, thuris, aloēs, carniū cochlearum, bulborum Aphricanorum, singulorum æquales partes aceto tritas impone. Si uero inflammatio oboritur, cataplasma ex sesamo impone, aut ex alica cum aceto cocta. Sine autem leuia cataplasmata, & circa deligationem; aut leuiter deligantur. Ex lana oleo imbuta meatui auris indatur.

De parotidibus.

Parotides

Parotis affectio est glandularū circa aures, quæ fit dum iudicatorio modo in febribus, materia quādoq; de capite, ab impactis in ipso humoribus, quandoq; de reliquo corpore expellitur. Si quidem igitur adhuc in profundum hærens parotis, non in molem attollitur, a diuturnis naturæ attractoribus auxiliis adhibentes, aut etiam cucurbitam apponētes, aut frequentibus fomentis utentes. Nam si in profundum recurret materia, periculum nō ualere sequetur. Si uero inflammata in tumorem attolletur, uice uersa mitigare ac concoquere potentibus utemur cataplasmatibus: quale est quod ex farina ordeacea, aut triticea, aut seminis lini, cum aqua mulsā, aut sceni graeci, aut althææ, aut chamæmeli decocto coquitur. Itemq; quod ex rumice & axungia nō falsa paratur. Si uero etiam sanguis tibi redundare uideatur, euacuabis ipsum uenæ sectione, uiribus præsertim permittentibus. Vbi uero tumor non discutitur, suppuratorijs medicamentis utendum est: quale est triticea farina, cum caricarum decocto ac oleo. Itemq; ex polline consians, & quod ex fermento paratur medicamentum. Transmutato autem abscessu, aut per sectionem pus excernimus, aut acri medicamento rumpimus: quale est quod similitum appellatur, & quod ex alijs paratur. Ceterum mitiores parotidas etiam fomentum ex muria discutit, & ex apyrano medicamentum. Hoc etiam transmutatum iam pus discutit, ad hoc dolores maxime sedat. Verum ad inueteratas parotidas, buccinorū aut purpurarū ultimum cinerem, cum melle aut axungia imponemus. Aut ficus aqua marina coctas. Aut marrubium cum sale. Induratas autem iam mollit emplastrum Mnasææ, & Ariobarzanium. Optimū est & quod ex succo seminis lini parat. Ante hæc uero, cataplasmata ex ammoniaco imponēda sunt, ammixta pice liquida, aut adipe taurino, aut bdellio, aut styrace, aut medulla ceruina.

De narium ac olfactus affectionibus. Cap. XXIII

Narium affectiones  
Olfactus lesus

**O**lfaciendi facultate læsa, si quidem uox illæsa conseruetur, anteriorum cerebri uentriculorū affectionem esse suspicandum est, qui aut ob uitiam intemperiem læsi sunt, aut ob uitioforum humorum copiam. Si uero etiam uox simul læsa fuerit, laboriosior quodammodo facta, propter olfactum coliformium obturationem, affectionem factam esse suspicare, atq; hoc rursus à uitiosis quibusdam humoribus. Vbi igitur cerebri intemperiem per sæpe relata compereris, contrarijs auxilijs utere. Humores autem per detrahentia pituitam per os euacua, & per ea quæ fortiter euacuant naribus indita. Et odoramenta adhibe tenuium partium, quemadmodum in defluxionibus. Si uero plenitudinē totius corporis deprehenderis, hanc prius euacua, aut per uenæ sectionem, aut per purgationē per hieram. Atq; sic etiam in polypode & Ozæna utere. Deinde etiam localia auxilia adhibe. Ertheriace sæpe pota magnifice profuit. Est autem polypus tumor præter naturam in naribus obortus, essentia sua similis polypi carni. Eiusdem essentia est etiam carnositas in naribus præter naturā producta. At ozæna ulcus est putredinosum, ex acrum humorum influxu proueniens.

Ad polpos et carnositates.

Carnositas in naribus

Squamæ aeris drach. vii. atramenti futorij drach. vi. sandarachæ drach. iiii. ueratri nigri drach. ii. Insuffla ac utere ut optimo. Nam in tredecim diebus utilitatem suam manifeste declarat. facit & atramentū futoriū cum aceto. Aliud. Malicorij drach. x. atramenti futorij drach. x. chalcitidis drach. vii. fellis taurini, amomi, myrrhæ, calaminthæ, marrubij, singulorum



Aloë drach. iiii. croci drach. ii. ueratri albi drach. iiii. utere sicco. Aliud. Diphryge tritonares continge, & linamento ex ellychnijs nares distende.

Ad Ozenas.

Misyos, chalcitidis, myrrhæ, singulorum drach. vii. atramenti sutorij drach. vi. aluminis scissi, gallæ, squamæ aris, singulorum drach. iiii. aluminis rotundi drach. ii. thuris drach. i. acetum sextar. i. coquito hoc totum in æreo uase, & mellis spissitudine in linamentis utere. Aliud. Aeruginem, & squamam aris, æquis portionibus sicca adhibeto.

Ad narium graueolentiam.

Myrrhæ, acaciæ, amomi, singulorum drach. i. melle cocto excepta, ad summum narium interseptum agglutinari iubeto. Aliud. Amomi, myrrhæ, rosarum siccarum, singulorum æquales partes ungento nardino excipias subline. facit & Hedichroum magma cum uino.

Narium graueolentia

Ad narium ulcera.

Ceruse lib. i. spumæ argenti quadrantem, recrementi plumbi quadrantem, aut plumbi usti. Sint autem omnia lota. Excipe uino & oleo myrteo.

Ad ulcera dulcia appellata.

Spumæ argenti drach. iiii. rutæ recentis drach. iiii. aluminis scissi drachmas duas, oleo myrteo & aceto excipe.

Ulcera dulcia

Sternutatoria.

Veratrum album, castorium, piper, herba lanaria, cyclaminus, euphorbium, nitrum, cuminū, herba sternutatoria uocata, singula per se, aut simul omnia. Non autem insuffilare oportet, sed penna aut digito penitissime naris indere. Si uero sternutatio redundet ex medicamento, sedare oportet infuso nardino, aut rosaceo, aut oleo dulci. Olfactum uero sedant sternutatio nem, anisum, ocymum festucae rusæ. præ omnibus autem siccandum est caput sinigmati ex nitro & pumice aut etiam appellato Aesculapio utendum est, & sapone Constantini, & sale Cappadocico, & similibus.

Sternutatoria

De sanguinis ex naribus eruptione.

De sanguinis ex naribus in febribus eruptione, dictum est libro secundo in illarum tractatione. Verum de ea quæ aliter quomodo cunque sit, & simpliciter ægre suppressi potest, nunc dicetur. Chalcitidem tritam linamento ex ellychnijs, aut priapi forma, aqua madefactio excipe, ac naribus inde. Aut oui testam uisam, & gallæ dimidium ipsi amisce. Aut lycio Indico cōtinge. Aut stercoris asinini usti cinerem in suffula. Aut expressum de asinino stercore succum instilla. Aut lapidis molaris usti & aceto extincti uaporem olfaciat. Aut etiam meatus obducente hoc utere. Mannæ thuris partem i. aloë partem dimidiam, candido oui excipe, & per linamentum ex ellychnijs utere, forinsecus leporis pilis ad illitionem apposis. Aut lysimachium appellatum in nasum indito. Aut cucurbitam leuem, magnam, & perseveranter apponito ad præcordium è directio naris unde sanguis erumpit. Aut aures firmiter obtures. Et fronte spongijs ex aqua frigida iriget. Aut cucurbita occipitio affigatur cum sanguinis detractio. Aliquando etiam uenæ secare conuenit, si nihil impediatur & extremas partes deligare, brachia præsertim ac femora, quemadmodum in uenæ sectionibus. Iubendūq; sunt ut ipsa moueant, manus quidem fricando, pedes autē ambulando. Dum enim uenæ quæ isthic sunt sanguine implentur, uasa circa nares sanguine destituantur. Sed & spongia sæpe in posita frigida imbuta, & extrinsecus ad sanguine manantē narē cū adstrictione apposita, quod opus fuit efficit. Prestat aut hoc facere, oblongo ad cuneoli formā linamēto prius in narē subdito.

Sanguinis ex naribus eruptio

Lysimachium

Ad faciei affectiones. Caput XXXV.

Ad faciem à rugis conseruandā. thuris drach. iiii. fuci drach. iii. spumæ argenti lotæ drac. vii. Omnis in cremore glutinis pisciū cōtuli dissolutis, & in pastillos efformatis utere. Aliud. Ramenti eboris drac. vii. thuris masculi, glutinis pisciū, singulorū par pondus, utere uelut dictū est.

Rugis a facie

Ad fa-

Ad faciei nigredines.

**Nigredines faciei** Iridis, ptisanæ, fabæ fresæ, singulorum sesquiseptentarium, salis ammoniaci, cornu ceruini uisti, ammoniaci thymiamatis, singulorum sextantem. Aqua dissoluta in pastillos efforma, & rursus aqua tritos, ante balneum illine. Aliud. Ptisanæ, erui, thuris, fabæ fresæ, iridis illyricæ, aphronitri, costis, singulorum chœnicis quartam partem. amygdalas amaras x x. efformato cum candido ouorum & lacte asinino, & utere uelut antea dictum est. Facit etiam pastillus peponatus.

Peponatus  
pastillus  
Macule  
solares  
Lentiginis

Ad maculas solares, &amp; lentiginis.

Terræ cimoliæ torrefactæ hemina dimidiū, aphronitri tostī drach. viii. farinæ erui drach. iiii. ramentorum fellis taurini drach. viii. trita affricato. Aliud. Fecis uini drach. x. farinæ erui drach. x. fabæ fresæ drach. x. ueratri albi drach. v. aphronitri drach. x. alcyonij drach. x. tritis confricato.

Ad fugillata.

Fugillata

Postquam ab initio quidem sceni græci decocti, postea uero etiam meliloti decocti fomentum adhibueris, collyrium Nili ex rosas aqua dilutum illine. Deinde collyrium ex myrrha. Si uero nihil efficiant hæc, collyrium ex sandiceustum illine. Aut hyssopum cum aqua impone. Aut hyssopo in lin, teolum illigato, & calida aqua tincto, fomentū adhibeto. Aut cum acrimuria foueto. Et raphani corticem cum melle tritum imposito. Hoc etiam ad diuturna facit. Cæterum ad fugillata ac liuedines inueteratas, tordyli partes ii. terræ famiæ partē i. cum melle impone animaduertens ne exulcerentur. Aliud defricatorium. Hyssopi, thapsiæ, cassiæ, singulorum drachmas duas, ceræ drachmas duas, terebinthinæ drachmam unam. Impone cauens ne exulcerentur, & propterea assidue rollens.

Ad Varos.

**Vari** Vari parui ac duri sunt circa faciem tumores, eos aceto mulso illinito ac confricato. Aut spumam argenti cum terebinthina, & modico oleo albo tritam, illine affricando. Aut alumen scissile cum terebinthina. Aut amygdalas amaras aceto tritas affricato. Ad callosos uaros hoc facit. Saponis gallici drach. quatuor. thuris, ammoniaci thymiamatis, singulorum drach. i. Aqua diluta illine, & post horam ablue.

Ad uaros, pilos, &amp; aspretudines faciei.

Ceræ drach. x. terebinthinæ drach. i. uisci drach. ii. oleo affuso diquato, & hoc faciem confricato. Radicitus enim tollit. Aliud. Papaueris tritum, aut pulegium cum sale & aceto imposito.

Ceratū Thaidis ad faciem rubicundam faciendam.

Thaidis ceratū

Crocī radices erythrodani, fuci, thuris, myrrhæ, singulorū drachmas ii. excipe adipe uitulino & oleo mastichino. Deinde illinito, & tempore interposito spongia calida imbuta detergito. Conueniunt autem hæc ad faciem medicamenta etiam reliquo corpori.

De oris affectionibus, &amp; primum de dentibus. Cap. xxvi.

Oris affec-  
tiones  
Dentium dolor

**D**entibus dolentibus citra gingiuarum inflammationem, aliquando in ipso proprio dentis corpore, aliquando in nervo qui ad ipsos deferunt, dolorem esse contingit. Vchementissimis igitur opus est medicamentis, & propterea plerique ipsorum ex aceto acerrimo præparantur. Verum gingiuis ob inflammationem dolentibus, optimum medicamentū est oleum lentiscinum temperatum ore detentum. Sit autem recens. Nam uetussum tantō deterius est recenti, quāto ætate antecellit. Seruetur autē & hic cōmunis ratio, quod præuacuatū esse oportet humorē in toto corpore redundare.

Ad dentium inflammationem.

Dentium in-  
flammatiō

Os colluat aceto in quo cocta sit galla, aut haliacabī radix, aut hyoscyami semen, aut folia, aut pulegium, aut solani succus, aut capparis radix, aut myrti folia, aut polium, aut cucumeris syluestris radix, aut rutæ folia cum aceto mulso, aut cornu ceruini, aut etiam acetum scilliticum. Aut pyrethrum cum

cum hyssopo. In corrosum uero dentem, styracem cum opio indito. Aut galbanum, aut sulphur uiuum cum lycio. Aut hyoscyami seminis cocti uaporem admittat per infundibulum. Sed & Philonis antidotus denti oblita dolore eximit. Si uero fluxione infestentur dentes, myrti, & lentisci, & galli decoctum colluant, aut rhois Syriaci, & balaustiorum, & malicorij. Insuper, gito autem salis partes II. aluminis uisti & aceto extincti ac triti partem I. Deinde uino colluant. Cruentis uero gingiuis alumen tenue tritum insperge. Aut aloë cum uino colluant, aut rubi radicem uino feruifaciam, aut rhoen syriacum. Cruentis autem & fluore uexatis gingiuis, thunni salamentum in olla exurito, ut in carbones redigatur, & cinere contingito. Siste autem commotos dentes aloë insperfa, aut rhus syriacus, aut alumen scissile, aut galla, aut rubi radix, aut per se, aut cū uino cocta. Aliud. Nucis uiridis corticē terito, & in liquorem ab ipso expressum, myrrham Minorem, & alumen scissile inijcito, & simul unito. Vfu uero experiente infunde, & ad gingiuas immitte, ad dentis dolentis partem, & sanabitur. Aliud. Allium, & piper, & staphidem syluestrem trita, linteo excipe, & in paruos globulos efforma, ac sæpe permuta. Hoc humorem in capite purgat, & dentes curat. Aliud. Ad dentes mobiles, & gingiuas fluidas, & ad omnem nomen in ore proserpendo depascentem. Chalcitidis tostę drach. XII. cadmię drach. VIII. utere sicco cum aceto.

*Ad dentem circa dolorem tollendum.*

Farinam cum tithymali succo imponito, & superhię hederę folium addito, & ad horam finito. Sua sponte enim conteretur.

*Dentifricium etiam ad parulis.*

*Dentifricium*

Aluminis plinthisidis trientem, salis ammoniaci trientem, myrrhę, costi, pyrethri, singulorum drach. II. piperis grana LXXX. Aliud. Sulphuris uiui, piperis, aluminis scissilis, singulorum æquales partes.

*Ad parulas, et Epulis.*

*Parulis  
Epulis*

Parulis est inflammatio circa partem aliquam gingiuarum, quę non soluta suppuratur. Suppurata uero scalpello uenę sectorio diuisa, linamento disparatur. Epulis autem est carnis excrescentia ab inflammatione, circa intimum dentem molarem, aliquando cum febre & dolore. Opus igitur habet compressione. Quare utendum est arugine rasa per se, aut cum pari galla. Aut sorci combusto, aut omni alumine uisto, aut galla per se, aut igne amaris cum aceto trita ad sufficiens dies, ac resiccata.

*Dentifricium.*

Aristolochię radix uista, cornu cerui uistū, cum modica mastiche. Aliud. Sol albus melle subactus, & fici folijs inuolutus ac uistus, donec ad carbones redigatur. Aliud. Buccina sale impleta ac uista. Cochleę terrestres uistę cum melle. Lanę succidę uistę cum modico sale. His singulis grati odoris gratia ammisceatur, iunci odorati rotundi flos, aut nardi ipica, aut folium malabathri, aut cyperus, aut iris. Aliud, quod dentes dealbat, & gingiuas adstringit, & tucundum odorē inducit. Pumi cis, salis tostę, iridis, singulorū drach. II. cyperi drac. V. spicę nardi drach. I. piperis drac. VI. tritis utere.

*Ad dentium stuporem.*

Ad dentium stuporē facit portulaca cōmansa, aut oleum crudū affricitū, aut amurca in æneo uase ad mellis compagem cocta, & inueterata illita.

*Dentium  
stupor*

*Ad dentes detritos.*

Dentibus detritis commodant. baccarum lauri, aluminis scissi, aristolochię dematitidis, singulorum æquales partes.

*Ad gingiuas corrosas.*

Floris rosarum drach. VIII. gallarum drach. II. myrrhę drach. II. Cetrerium erosas & fluidas gingiuas sanant si colluantur hæc. Lac asininum, totiorum olea decoctum, ac etū scilliticum: sicca uero si admoueantur. rubigo ferri, mali punci flores. Ad tumidas uero & carne excrescentes facit portulacę

lactæ succus ore detentus, oliuarum colymbadum muria, oleum caudum ca-  
lidum, aut lentiscinum, aut melinum, amurca. Sicca uetis, ferrugo, aut æro-  
go, aristolochiæ radix, plantaginis semen, diphryges, attramentum suto-  
rium tostum, mali punici flores.

*Ad labia rupta.*

*Labia rupta* Amurcæ coctam illine. Aut hoc. Adipē anserū, cum melle & terebinthi-  
na, æqualibus portionibus, floris rosarum, cæsypii, rosacei, singulorū parū.

*Ad ranunculum appellatum.*

*Ranunculus* Ranunculus tumor est inflammatus, sub lingua consistens, maxime in  
pueris. Confricatio itaq; locum ex misyos, & æruginis rasæ æquis partibus  
siccis. Ad mentum uero utendum est emplastris, anthero, aut sphærio, aut  
parhygro ex ouis. Verū in adultis uenæ sub lingua prius secentur. Aliud.  
*Vlcera oris* Facit & ad feruida oris ulcera. Aæruginis rasæ, gallæ, chalcitidis, singulorū  
*feruida* æquales partes. Hoc cum passō etiam collui potest. Aliud. Farina enul-  
cum melle ubi prius desiccueris, gallam tritam cum melle illine. Aut rosarū  
flores similiter. Aut oleæ foliorum decoctum colluant.

*Ad tonsillarum inflammationem.*

*Tonsillæ in-  
flammatæ* Siquidem in febre inflāmata sint tonsillæ, & columella, gargarismi con-  
ueniunt ex decocto fursurum, aut rosarum, aut palmularum, aut myxarum,  
aut lenticulæ. Remittente uero inflammatione, aut decrecente, mel ad ipsa  
decocta ammiscendum est, quod in principiis facere non oportet, neque in  
augmentis, ut ne acrimonia sua fluxionem aliquam attrahat. Si uero suppo-  
ratae rumpanitur, aqua mulsa per se gargarissetur, aut cum lentium aut rosa-  
rum decocto, ita ut in his perseveremus usq; ad perfectam solutionem, aut  
etiam stomaticam collutionem exhibeamus gargarissandam. At si peli-  
sora ulcera in tonsillis fiant, utendum quidem est etiam præscriptis. priuatim  
uero exhibendum est medicamentum ex moris, cum aqua calida. Aut aqua  
mulsa habens florem rosarum inspersum, aut costum, aut rhoem, atq; hæc  
sicca, aut incocta. Aut glaucij foliorum siccorū decoctum. Est quidem hoc  
amarū. Vetum optime facit, si succum quemadmodum in collytia utimus,  
in aqua mulsa solueris. Ipsius aut fruticis usus optimus est, si siccus insillier-  
tur, aut cum digito admoveatur. Conandum uero est ut omnino non adhi-  
beamus manum, aut ualde leniter cōtingamus. prodest & pastillus Andro-  
nii. Cæterum post irritationes ab his factas, gargarissandum est glycyrrhi-  
zæ decoctū, aut gargarismus dandus, qui paratur ex uino scybelitæ, & cro-  
co, & mastiche chæ, & myrrhæ. deinde etiam ex amylo & tragacanthæ. Pol-  
trā quā autem nome depascēs sedata est, gargarismo ex lacte ac terra Samia  
utendum est. Aliud ad antiadas. Malum punctum dulce unā cum puta-  
mine cōtundito ac exprimito, & succi parres sex ad unam mellis ammiscer-  
*Gallæ omphac* to, & ad mellis spissitudinem coquito, ac illinito. Aliud. Gallæ omphar-  
cis sexrantem, aluminis scissi unc. i. salis ammoniaci tosti unc. i. sicca admo-  
*Antias quid sit* uero. Aliud. Gallæ drach. viii. misyos drach. ii. salis tosti drach. v. uter-  
que resicco. Est autem Antias tumor durus tonsillarum.

*De Columella.*

*Columella in-  
flammatæ* Columella inflammata utendum est gargarismis iisdem quibus ad tonsil-  
larum inflammationem, & moderatè adstringentibus, qualis est mali puni-  
ci succus per cochlearium, aut per instrumentum uuæ leuanda commodè  
subiectus, & perse, & cum melle satis cocto. Aut radice dulci ad mali puni-  
ci succum ammixta. Facit & radice dulcis succus cum melle. Reprimit aut  
tem & lapis hæmatires, & phrygius ustus, & Ageratus, & medicamentum  
ex lapide phrygio ad pudenda descriptum, & terra samia, & erectia, & sno-  
pis, & lemnia, & omphacium per se, & cum aliquo ex relatis, & spinæ Aæ-  
gyptiæ fructus, & alumen scissum. Verum rosarum semen, & folia, mitiorē  
efficaciam habent. Adhuc autem mitius est gummi, & tragacantha, & sar-  
cocolla, & amyllum: quibus utendum est ubi magis compressa fuerit, dum  
ab ad

ab adstringentibus constringitur. At si æqualem crassitudinē habet, quam sanē columellam uocant, gargarismis fidendū est his qui ex myrrha, & croco, ac cypero parantur. Vitandæ uero cōtusiones, & illisiones per pinnam potius fiant. Compositum facit hoc. Rhois syriaci drach. viii. croci drach. iiii. costi drach. viii. seminis rosarū drach. iiii. facit & ad gingiuas. Porro filum lanæ purpura marina infectæ, quod obligatum est collo uiperæ, ipsamq; strangulauit, deinde pro amuleto appensum est, mfrisce quodam modo iuuat tonsillas, & colli affectiones, uelut Galenus testatur.

*Filiū quod uiperam strangulauit*

*Ad sanguinis ex ore eruptiones.*

Porro solia cōtusa imponito. Aut spongiā nouā pice crūda tinctā comburito, & trita utitor. Commodæ uero ualde sunt etiam collutiones, rosarum siccarū aut uiridiū decoctū frigidū, aut pampinorū uitis, aut foliorū lentilei, aut rubi, aut malorū cydoniorū, aut rhois, aut uinaceorū, aut lentū.

*Sanguinis ex ore eruptio*

*De angina, & hinc uicinis est stranguis, ubi & de his qui strangulantur, aut aliis*

*quomodo curant, suffocantur. Caput XXXV II.*

Internis faucium musculis inflammatis angina fit, quæ synanche appellatur. Externis uero, quæ parasyranche. Eodem modo interni summi gutturis musculi inflammati eam efficiunt quæ cynanche uocatur. Externi uero eam quæ paracynanche. Consequitur ad omnes rectæ ceruicis spiratio, & dolor cum spirandi difficultate. In aliquibus etiam febris, ruborq; faciei ac collis, & in quibusdam tumor. Et os apertum habent, & deglutire non possunt. In cynanchicis quandoq; etiam suffocatio sequitur. Fit etiam in pueris raro tamē talis affectio, collis uerticulis ex elapsu ac discessu affectis. Verum illorum uelut incurabilium curationem non aggrediemur. Reliquis uero statim uenam de cubito secabimus, & non aceruatim euacuabimus, sed saepe copia partita. Nam ex a ceruata euacuatione si in animi deliquitū inciderint, suffocationis periculum succedit, ac eruatim confluentē materia ad affectum locum. Si uero non statim leuentur, uenæ etiam sub lingua secandæ sunt, aut etiam ipsa lingua scarificanda, si prominentior cum tumore appareat. Alius quoq; acriori infuso per clysterem eluenda est, & pedes aqua calida perfundendi, & deligandæ fortiter extremæ partes, & collū intergendū lanis succidis, aut etiam oleo imbutis, & cataplasmata ex cruda ordeacea farina imponenda. Ab initio gargarismis utantur ad tonsillarū inflammationem relatis, aut simplici medicamēto ex moris, cum rhos de cocto, præstat autem ex syluestribus moris esse id medicamentum. postea uero etiam composito ex moris, aut medicamento ex nucibus iuglandibus illinantur. Vigente uero morbo, etiam niiri parum ammiscendum est, aut sulphuris uiui, nisi acrimonia aliqua id prohibeat. Sed & caninū stercus aridum tritum, & cum melle illitum, optimum est medicamentum, & maxime quod album est. Et syluestrium hirundinum cinis eodem modo. Si diuturna fiat affectio, & illirione ex besasa, hoc ruta syluestri utendum est: ita ut quandoq; exoluamus, quandoq; intendamus ipsius facultatem, aliorum medicamentorum ammixtione. Cucurbitæ quoq; aut hirudines adhibendæ sunt mento & collo. Et fortioribus gargarismis utendum, ex iride, hyssopo, melanthio, abroto no, glycyrrhiza, caricis in aqua mulla coctis, aut rutæ succo cum lacte, aut sinapi cum aceto mullo. Si uero ex his aliqua acrimonia oboriat, dandum est ipsi oleum optimum calidum, aut rosaceum per se, aut cum ptisanæ succo, aut scenigræci succo gargarisandum. Alimenti sit aqua mulla ad tertium usq; diem. Postquam ptisanæ succus, cum aliquā ex iucundis potionibus, deinde etiam ouorū uitelli liquidū. Et ex alica fortioribus utendum est deglutitione directiore euadente, & cibis agroti uiribus congruis. Declinatione uero apparente, ad dembulationem & balneum ducemus. Locos autem ex cerato rutæ eo integemus, & reliquo refectis uictus ductu conuenienter utemur. Ex his uero qui strangulantur, manus non admouebimus his quibus iam spuma circa os est, Hippocrati cre-

*Angina  
Synanche  
Parasyranche  
Cynanche  
Paracynanche*

*Stercus caninū*

*Strangulati*

dentes. Alij uero reuocantur aceto & pipere instillato, aut uttica semine in aceto acerrimo trito. Laboriose uero admittunt, quare cogere oportet. dissolutis autem circa collum ruboribus, statim suspiciunt, & relaxantur. Similiter etiam in naufragis, & in summa in omnibus qui suffocantur. Refusctatur enim horum calor.

*De grauedine, & defluxu, & de arteriâ, ac de tussi.* Caput XXVIII

**C**omune habent hæ affectiones hoc, quod superflua humiditas ex capite ad subiectas partes deferitur. Et ubi quidem hæc ad nares irruit, grauedo appellatur affectio. Vbi uero ad fauces & palatum, simpliciter defluxus. Si uero ad summum guttur ac asperam delabatur arteriam, ut membrana quæ hanc intrinsicè ambit exasperetur, raucosa uox fit, & raucedo, & arteriaca affectio appellatur. In quibus non solum ex capite, sed etiam per uchementer uocationem, & frigidi spiritus inspiratione, asperitas inflammatoria contrahitur. Diuturno uero facto morbo, & fluxione ad thoracis ac pulmonis partes delabente, tusses oboriuntur malignæ. Sed & ob intemperiem sæpe tussis fit, quandoq; calidam, uelut in febribus: quandoque frigidam, uelut in aqnilonaribus constitutionibus, quæ etiam sicca magis existit. Quin & aliorum morborum symptoma aliquando fit tussis, uelut pleuriticorum, hepaticorum, tabidorum, peripneumoniceorû. Galenus igitur in diuturnis tussibus, grandinum quarundam educationem è thorace factam esse narrat. Alexander etiam lapidem quendam graue, qualis est qui in urinarijs meatibus nascitur, in diuturna tussi educum esse dicit, atq; inde quoq; tussim sedatam esse. Nos autem in sanguinis reiectione lapidum excretionem uidimus, uelut ubi ad eum locum deuenierimus, exactius referemus. Qui igitur ob ardorem habent grauedinem, aut defluxum, his caloris sensus circa partes contingit, & tenuium humorum fluxus per nares, & per os, ruborq; circa faciem & nasum. Qui uero ob frigiditatem, his distentio fit partium circa caput & frontem, & coliformium meatuum obturatio, ut uox supernè per nares personare non possit. In diuturniore autè affectione etiam tusses accedunt, & pituitæ educio, aliquando crudæ & liquidæ, aliquando cum uirore pallidæ. Quibusdam etiâ febris accedit, quæ quidè ob ardore affectis nihil prodest, ob frigiditatè uero affectis cõcoctione efficit.

*Curatio defluxus & grauedinis.*

Siquidem igitur calida intemperies prædominetur, auxilia conuenient ea quæ competunt caput dolentibus ob eiusmodi causam. Sed & balneis utendum est. & calida ubertore perfundendum est caput. Cibi uero his conueniunt sorbiles, & oua sorbilia, & amyllum, & dulciaria liba, & sesama, & oryza, & amygdalæ, & nucis peneæ nuclei, & quæ ex lacte sunt placentæ. Ex uinis dulcia, & non uetusta. & ex capitibus papaueris medicamentum delinçile, & composita ad hæc auxilia. Si uero frigida fuerit intemperies, & morbus ægrè solubilis, modicus cibus assumatur, & capitis illitio per calida & tenuium partium ungenta, nardinum ac rutaceum. Irinum uero nõ solum illinendū est, sed etiam naribus instillandum, quæ etiam intrinsicè thure, & myrrha cum oleo illinendæ sunt, & præsertim in his qui grauedinem ex frigiditate habent. Quibusdam etiam odoramenta per linteum combustū, aut melanthio, aut cumino, combustis & linteo illigatis profuerunt. Et cyphi seleniacum olfaciant, & fronti illinant, cui etiam unum ex emplastris inflammationem arcentibus agglutinetur, uelut est Icesium, aut Oxerum, aut Barbarum, aut Athena appellatum. Verum ad defluxum ob frigiditatem etiam bibere cyphi conducet. Thoraci uero illinendus est balsami succus, ipseq; cõcalesciendus per lanas succidæ cum styrace, & irino, aut anethino. Cibus etiam calidioribus ac concoquentibus utendum est. Ma-

teria uero iam concocta, etiam apophlegmatismus per os pituitam detrahens ipsis conuenit, & smeigmata capitis, uelut sapo Constantini, & consimilia.

Arteriæ

## Arteriacoꝝ curatio.

A Arteriaci uero qui & raucosi appellantur, conueniunt quidem & relaxa-  
ta, priuatim uero ubi inflammatoria est affectio, circa arteriam & summam  
ipſius partem, in principio meatu obducentibus utendum eſt auxilijs, do-  
nec inflammatio moderatior fiat. Talia autem ſunt quæ ex paſſo cretico, &  
tragacantha, & gummi, & amylo parantur, & pinguum palmularū deco-  
ctum: & radicis dulcis cum ſapa, ad mellis compagem: & hypoglottidum  
ab eo quod lingue ſubſciantur, appellatarum uis. præ omnibus uero à ut  
ni potu abſtineant hoc tēpore. Vbi uero moderatior facta fuerit inflamma-  
tio, uinum dulce ſumant, & ſorbitionibus ex melle & lacte, cum amylo aut  
pane ſiliginæ oſitemq; ex amygdalis utantur, & butyrum ſumant. Humidi-  
tate uero in partibus relicta, ad ea quæ magis extergunt deueniendum eſt,  
uelut eſt ſaba freſca elixata, & quæ ex melle parantur, & braſſicæ, & porrum  
probe coctum: Medicamēta uero calidiora, & quæ ad tuſſim faciunt, ex ſa-  
pa de caricis coctis, & thure, & iride, & terebinthina, & ſyrace, & galba-  
no, & pipere, & cinaſommo ac caſſia, & hiſ ſimilibus.

Arteriaci qui  
ſintSapa ex ca-  
ricis

## De tuſſi.

Sed & tuſſes eadem methodo curare oportet, ita ut hoc ſolum reſpiciat,  
mus, an etiam ob aliarum partium conſenſum, uelut gurgulione, aut  
capite deſtillantes: & ſi ad alios morbos acciderint, ut etiam horum quantū  
fieri poteſt prouidentiam habeamus, iuxta relatum ac referendum modū.  
At compoſitorum auxiliorum expoſitio conſequenter ſubiecta eſt.

## Catapotia ad deſluxum &amp; tuſſim.

Styracis, myrrhæ, opij, galbani, ſingulorū pares partes paſſo excipe, aut  
per ſe tuſa in piſa, ad erui magnitudinē redige, & tres, aut quatuor, aut quin-  
que eiuſmodi piſulas dormitū ituro præbe, & paſſum in ſuper ſorbeat. Hæc  
ad acrem & tenuem fluxionem faciunt. Aliud. Seminis hyoſcyami  
drach. XII. nucleorum nucis pineæ drach. VI. croci drach. II. Excipe ſapa  
aut paſſo, & utere. Eclegma. Mellis unc. I. butyri ſemunciam, ſimul cocta  
dato, & hyſſopi, ac ficuū, & nucleorū nucis pineæ, & iridis decoctū ſorbeat.

## Catapotia diuturnioribus.

Styracis drach. VI. myrrhæ drach. III. terebinthina, galbani, opopana-  
cis, iridis, ſingulorum drach. II. pipereis albi, nitri, ſeminis hyoſcyami, ſucci  
papaueris, ſingulorum drach. I. Citra aliquem liquorem in piſa contuſa, in  
catapotia effingito, & uelut dictum eſt utitor.

## Ad guttaris aſperitatem, &amp; tuſſim, &amp; ſputa cruenta.

Amygdalas amaras dealbatas XXV. ſeminis lini toſti drach. III. traga-  
cantha drach. II. nucis pineæ nucleos XXX. oui in ſermento oblito aſſati  
uitellum. Tragacantha aqua maceratur. Totum uero paſſo excipitur. Si ue-  
ro etiā ſonus uocis fuerit fractus, mel pro paſſo amiſce, & maxime in qui-  
bus educi quid opus eſt.

Guttaris aſpe-  
ritas  
Sputa cruenta  
Voch ſonus  
fractus

## Arteriaca hypoglottis ſub lingua tenenda.

Ad uocē abſciſſam, raucos, & cruēta reieſtantes. Tragacantha drach.  
VI. gummi drach. VI. myrrhæ drach. I. thuris drach. IS. pipereis albi grana XX  
croci drach. I. ſucci radicis dulcis drach. VI. palmularum III. carnem, paſſi  
cretici quantum ſatis eſt. Facit etiam ipſe ſolus tragacantha ſuccus ſub lin-  
guam ſubditus. Cæterum pro radicis dulcis ſucco, ipſius coctæ decoctum  
ad ſpiffitudinem redactum, quadruplum reiicitur.

## Arteriaca ad ſonos abſciſſos, conueniunt etiam phoniſci.

Porri capita VI. ad tertias coquito, & ipſa quidem abſcīto, ad aquam ue-  
ro aliq; ſuccum amiſce to, & mel, & oporum prius coctorum uitellos III.  
ſimul coquito, anethi ramulis agitando.

Phoniſci

Pulegij ſextantem, nucleorum nucis pineæ, ſeminis cniſci, ſeminis lini,  
ſingulorū unciā unā. pipereis albi trientem. Excipe melle cocto. Aliud.  
Hyſſopi,

Hyslopi, pulegij, piperis, singulorum unciam unam. petroselinij unc. s. mel-  
lis heminam unam.

*Concoctio duntaxat insit.*

Mellis drach. XVI. terebinthinae drach. II. galbani drach. XIII. simul  
cocta ad fabarum magnitudinem, & ad nucis ponticae magnitudinem effice-  
mato, & his succu utatur. Aliud. Tussim siccam curant & arteriaca, &  
aquae aliquando sorbitio feruifacit. Nam ob crassitatem pituitam non edu-  
centes, ex humectantibus opem sentiunt. Conuenit ipsis etiam hyslopi, &  
iridis, & nucleorum nucis pineae decoctum:

*Pestellus suffragibilis ad asidnam insit.*

Styracis, piperis, mastiches, petroselinij, singulorum unc. I. sandarachae ser-  
pul. VI. lauri bacca s. II. melle excepta suffito prunis iniecta, ut tussis per in-  
fundibulum fumum inspiret. facit ad quomodocumq; perfrigeratos.

*De recta ceruicis spiratione, anhelatione, & spirandi difficultate.*

Caput XXIX.

*Spiratio recta*  
*ceruicis*  
*Anhelosij*  
*Orthopnoici*  
*Spirandi dif-*  
*ficulatis*  
**Q**ui citra febrem spiritum densum habent, uelut hi qui uelociter cucu-  
rerunt, hos a symptomate anhelosos nominant. Eisdem uero ab eo  
quod thoracis figuram totam erectam seruant, ob timorem ne suffocentur,  
orthopnoicos id est recta ceruice spirantes uocant. Fit autem affectio cras-  
sis ac uiscosis humoribus, cartilaginosis pulmonis partibus infarctis. Ac spi-  
randi difficultas commune symptoma est, & his & alijs pluribus affectioni-  
bus accedens. Ceterum anhelatorum curationis scopus est, consumere  
crassum ac uiscosum humorem, per attenuantia ac extergentia medicamen-  
ta. Acetum igitur ipsis conuenit scilliticum, & acetum mulsum ex hoc pa-  
ratum, potum. Et ipsa scilla assata trita cum melle. Et ex antidotis hiera. Et  
purgatio assidua ex medicamentis fortissimis. Et uomitus ab acceptis rapha-  
nis, & aristolochia rotunda pota, centaurij magni radix, sphondylii semen  
& radix, calaminthae coma, hyslopum, iris, melanthium. Asellorum subhy-  
drijs degentium sextarium in fictile uas conijcito, & ad prunas torreto, de-  
albatos autem terito, & melle cocto exceptos, mystri mensura ante & post  
cibum dato. Si uero necessitas urgeat, etiam uenam ante omnia haec seca-  
to, & pro uiribus euacuato. Alius quoq; infusus per clysterem irritetur. Ca-  
taplasma uero extrinsecus thoraci imponatur ex ficis, & loliacea achorde  
acea farina, resina, cera, ac melle adiectis. Insuper gatur ipsi etiam iris & man-  
na thuris: non inutilis est & cruda hordeacea farina cum resina, cera, iride,  
& manna. Vnguentis autem utendum est calidioribus, irino, anethino, na-  
taceo. priuatim uero hoc. pumicis partem I. fecis uini ustae partes III. asce-  
nici partem I. floris iunci rotundi odorati partes I. alcyonij partem I. aphro-  
nitri partes II. tusa cribrata ungento excipito, & ex hoc partes circa thora-  
cem confricato. Sed & malagmatibus utendum est, quae serosos humores tra-  
here possunt.

*Anhelosis portiones.*

Polij, abrotoni, castorij, chamaepityos, ammoniaci thymiamatis, singu-  
lorum aequales portiones melle subactas dato. Alia. Quidam aphroni-  
tri cochlearium unum in tribus aquae mulsae cyathis dederunt. Alia. A-  
phronitri drach. IX. piperis drach. I. silphij drach. s. Dato cochlearium cum  
aqua calida. Alia. Castorij, ammoniaci thymiamatis, singulorum drach.  
VI. piperis grana XL. Excipe passos, & fabae magnitudinem praebe cum aqua  
mulsae. Alia. Sinapis drach. I. spumae nitri, obolos III. elaterij diechalcon,  
hoc est oboli dimidium. Totum hoc in pastillos VII. digere, & duos ad dies  
duos praebe. purgant enim sursum citra molestiam. Verum isti hi qui suffo-  
cantur aphronitri drach. III. cum aquae mulsae cyathis III. praebe. & aliquan-  
do cum cardamomo, & statim auxiliatur. Facit & ad coxendicum morbum.

*De peripneumonia, & Caput XXX.*

*Peripneumonia*  
*monia*  
**P**eripneumonia inflammatio pulmonis est, plerumq; ex defluxibus forti-  
bus, aut angitis, aut anhelationibus, aut pleuritide, aut alijs morbis ob-  
oriens



**A** oriens. Quandoque uero ipsa per se affectionē auspicatur. Sequitur bos spirandi difficultas, febris acuta & ardens, grauitas & tensio pectoris, impetus & perceptio multæ repletionis circa faciem, materia sursum uersus impetū faciente instar ignis. Rubicundæ igitur ipsis apparent malæ, & oculi tumet, & cutis supercilijs incumbens deorsum nutat, & corniformis tunica subpinguis apparet: si uero signa ad maiorem ardorem inclinant, inflammacionem sacri ignis naturam in pulmone habere putandum est. In his igitur qui ex transmutatione aliorum morborū ad hunc deuenierunt, uenæ sectio, nem reprobare oportet, & præsertim si diuturni fuerint, aut etiam ab initio uenam secuerint. Verum in remissionibus insusum per clysterem in aluum mittatur, quæ ægrè subduci potest. Et cucurbitæ affigantur ad pectus & ad latera, si nihil prohibeat, atq; hæ multæ cum scarificatione. At si statim ab initio peripneumonix affectio auspicetur, permittentibus numeris ad hoc requisitis, uena secetur. Sin minus, etiam his saltem cucurbitæ affigantur, ita ut pro uiribus sanguinis euacuationem faciamus. Sorbitiones autē accipiant ex pitifanæ, aut alicæ succo, cum melle: aut ex amygdalis amaris, cū similagine aut alica, ex iucundis potionibus aliqua ammixta, hydromelo; aut fauorum tremore cocto, aut hydrosolato. Commodum est & butyrum recens trium cochleariorum mensura. Præbiant autem ficuum cum hyssopo decoctum, aut iridis coctæ in aqua mulsæ. Aut iridis tritæ cochleariorū II. mensuram inspersam aquæ mulsæ. Hoc etiam deorsum purgat. Verū ad uirium conseruationem, frequentius potent aquam mulsam per se, & cum nucis iucis pineæ, & cucumeris semine. Verum ad totum thoracē ac costas laterum imponere oportet ceratum cyprinum iridem inspersam habēs: Aut ceratum ex oleo rutaceo & fride sicca. Aut id quod ex cera, resina, mella, butyro, cefypo, iride sicca, & ungento nardino præparatur.

De sanguinis spūto. Cap. XXXI.

**S**i quidem ex ruptione uasorum, sanguinis spūtum fiat, multus euacuarii tur: & quandoque ex manifesta causa, uelut casu, clamore, ac similibus; quandoque ex obscura, uelut plenitudine, aut immodica frigidityte. Nam frigidum uenarum ruptorium esse Hippocrates ait. Si uero ex corrosione, nō acuatim, sed paulatim sanguinis educio fit, acribus quibusdam ac prauis edulijis prægressis, aut inedia, aut acri defluxu. At si ex uasorum apertione, ex relatis nihil, præterquam plenitudo aliquando præcedit: uerum uiscus humidior ac calidior, & balnearum immoderatus usus, & in ualde calidis locis habitatio, his causa apparebit: & neq; in inflammationibus, neq; in febribus, neq; in doloribus erunt ita affecti, uelut hi qui ex corrosione. Imò miscueris lenius ferent, dum ut par est euacuantur. Si uero etiam hæmorrhoides, aut muliebres purgationes suppressæ fuerint, etiam à periculis liberabuntur. Eadem bona cōtingent etiam his qui ob plenitudinē ex ruptione euacuantur, præterquam si propter ulcus, aut immodicam euacuationē lædantur. Cæterum sanguinis ex corrosione euacuatio, nunquam ad bonum contingit. Et si quidem per uomitus efferatur, manifestum est quod ex locis circa stomachum aut uentrē fertur. In quibus etiam per sedem descendēs quandoque euacuatur. Si uero cum tussi, à partibus respiratorijs. Verū si quidem spumofus fuerit & subalbidus, & per interualla efferatur, citra dolorē ac compressionem, ex pulmone ferri indicatur. In quibus progressu temporis etiam febris continua sequetur, & maxime in his quibus ex corrosione: & de pulmonis essentia aliquid, aut cartilaginosa pars, aut uena efferetur. Noui autem aliquem ex his qui sanguinem ex pulmone expuunt, progressu temporis cum maxima tussi, & sanguinis copia, quatuor aut quinque lapides expuisse asperos, ueluti tribulos, magnitudine uero siliquarum triū aut quatuor pondus habentes: & statim quidem alleuatus est, paulo post autē in tabem transiit, & mortuus est. Si uero aliquando pituitosa educio fiat, cum leuiore tussi, aut etiam excreatione, & quod efferatur spumofum fuerit

Spūtum sanguinis

Frigiditas uenarum ruptorium

Lapides cum sanguine reiecti

ac leue, ab aspera arteria educationem esse scito. At si niger fuerit sanguis & grumofus, & doloris significationem circa locum de se præbeat, de thorace elatio indicatur, transsumptione per pulmonem aut guttur contingente: quæ uero cum excreatione cõtingit elatio, ex partibus circa fauces per palatum educetur. Si uero aliquando à capite destillet, cum irritatione aliqua ac tussis emittitur, defluente ipso ad summum guttur, & arteriæ caput, ita ut rursus sursum efferatur. Verum in his plerumq; acris defluxus, aut capitis dolor, aut grauitas præcedit. Continget etiam aliquando per palatum sanguinis euacuatio, & propter hirudinem deuorata, & adhaerentem in aliqua eius loci parte. Sed de hac in tractatione de uenenis dicitur.

Curatio. Eis qui ob defluxum sanguinem spuunt, statim uenam secabimus, si nõ ualde acris fuerit defluxus: & moderate pro uiribus detrahemus. Extremæ partes deligentur ac confricentur cum oleo ueteri calido aut scilicet onio, capite excepto. Cibus detur frumentaceus, cui additus sit succus alii, cuius ex austeris, uelut mali punici, pomorum, pirorum: aut illa ipsa simul coquantur. Dormire uero uolenti pastillum ex succino dato. Et tertia die mellis cocti parum delingendum dato. Si uero hæc superata fuerint, morbo diuturno facto, raso capiti medicamentum ex stercore syluestrium columbarum impone, & post tres horas ablato pharmaco, ad balneum ducito, nequaquam illinens caput. Deinde sorbitionibus nutrito, ad somnũ theriacem antidotum dato. Et ubi rursus post tridie dederis, similiter confricato totum corpus, capite excepto. Huic autem ceratum ex thapsia imponendũ est, aut aliud quoddam. Et rursus sorbitionibus utendum. perseuerante malo etiam cucurbita ad occiput affigatur. Si uero ualde acris defluxus fuerit, uenæ sectio reprobetur. Cibus uero & auxilijs antea in capite de defluxu relatis utendum est, & his quæ paulò antea relata sunt cõmodis. At his qui ob frigiditatem sanguinem spuunt, thoracem calefacere oportet cũ his quæ simul siccant. Et medicamentum ex duobus piperis generibus dare, uenæ cum pastillo ex succino. Sed & qui ex respiratorijs partibus, obruptionem aut apertionem uasorum, sanguinem educunt, his uena secanda est, si non sanguinis copia feratur. Omnes porro decumbere oportet in locis ad aërem expositis, in lecto immobili, figura sursum uergente, ita ut uicent uel hementem respirationem, & ne loquantur. Affectus autem locis injiciendæ sunt spongiæ ex posca tepida. Post septimum diem lanæ succidæ cum rosa ceo, aut myrteo, aut lentiscino, quandoq; cum aceto, quãdoq; cum uino austero. Si uero multa elatio contingat, pollinem & mannam thuris cum aceto imponemus. Aut alumen, & acaciã, aut malicorium, aut gallam cum aceto, aut palmulas cum polenta & malis cydonijs coctas in uino austero. Postea uero etiam emplastrum ex salicibus imponendum est, præsertim si moderatio elatio existat. per os uero accepta hæc faciunt. portulaca comestita. Efficacior autẽ succus ipsius est potus. balaustium, rubi fructus, & flos, quercus mēbranosa sub cortice pars, & quæ sub putamine glandis est membrana. Maxime uero his coctis urantur. fagi autem & ilicis membranæ efficaciores sunt: famius aster ad omne sanguinis sputum facit, lemnium sigillum, lapis hamatites leuissime tritus, cum succo mali punici, aut polygoni. Quantitas autem lapidis sit scrup. i. Composita uero hæc faciunt. Pastillus ex succino, & qui ex corallio constat, & qui ex Aegyptia spina. Item puluis siccus ex terra astere, lemnio sigillo, corallio, symphyto & amylo, omnibus æqualibus portionibus. Verum in his qui ex corrosione sanguinem spuunt, & maxime defluxu prægresso, etiam opij partem dimidiam ammittimus. Sed & id medicamentum quod accipit famij asteris, lapidis agerati, lemnij sigilli, æquales singulorum partes, commodum est si duorum cochleariorum mensura bibatur in duobus cyathis succi plantaginis. Aliud. Sigilli lemnij drach. xvi. famij asteris drach. xviii. amyli drach. viii. farcocollæ drach. iiii. gummi drach. ii. puluilli ex his sicci cochlear. i. cum decocto

decocti palmularum cyathis duobus datur. Sorbeant etiam poscam frigida, aut palmularum, aut malorum, aut pirorum, aut uitis pampinorum, aut eiusmodi cuiusdam decoctum. Cibus uero accipiant si uires urgeant, circa secundam aut tertiam horam. Sin minus, circa quartam. Sit autem panis lotus ex aqua frigida, aut alica, siue chondrus, cum aliquo ex succis alitrin- gentibus, uelut mali punici, aut myrti baccarum, aut omphacomelitis: aut oza forbillia, aut placentæ ex lacte cum aliquo ex adstringentibus. Ex ole- ribus intybum, cichorium, plantaginem sumant, cocta cum oleo crudo & aceto. Ex fructibus, mala, pira, melipila, mala punica, corni fructum. Potus non febrientibus sit uinum aquosum, modicum, febrientibus aliqua ex rela- tis potionibus, aut hydromelum cebyraticum. Ad eos uero qui sangui- nem uomunt, eodem ductu utendum est, solum ut uitement ne frequenter ci- bum capiant. facile enim hi curantur, eo quod auxilia quæ præbuntur, ita- tum ipsi partibus unde sanguis erumpit occurrunt. Porro si sanguis in uen- tre in grumos coactus fuerit, coagulum bibatur, maxime leporinum, aut li- xiuum ficulnæ cum aqua, aut thymus, aut thymbra cum aceto. Aut etiam per laccissum euacuentur, aut per aloën. At in his qui de palato per screa- tionem sanguinem spunt, gargarismis ex adstringentibus utendum est: & fronti ac capiti adhibenda ea, quæ his quibus ex naribus erumpit sanguis adhibentur. Atque hæc est sanguinem spuentium curatio, quam studiosè fa- cere oportet, propter instans ex immodica euacuatione periculum. Nam copia eius qui euacuatur, quemadmodum in his quæ maculantur, breui mor- tem inducet. Si uero affectio perseveret, transitionem ad tabem minatur. Omnibus igitur secundum rationem peractis, & desinente sanguinis lati- one, reficere ipsos oportet, ita ut piscem exhibeamus, & ex iuuenulis sut- bus pedes, & cerebella: & corpus confricemus, ac iubeamus ut uiuent assi- duum balneorum usum, & uini potum, & iracundiam, ac Venerem.

Cebyraticū hy-  
dromelum

Sanguis grum-  
mosus in uentre

De suppuratione & tabe. Cap. XXXII.

Suppuratio in uacuis thoracis partibus, aut circa membranam succin- gentem costas consistit, quandoque ob sanguinis educationem ulcere ad ci- tricem non perductio: in quo etiam tabes statim sequitur, si ex pulmone educio fiat: quandoque inflammatione prægressa, deinde ad abscessum per- mutata, ac rupia: quemadmodum in pleuriticis etiam aliquando cōtingit. Aut etiam ob cōfluxionem ex capite obortam. Signa igitur suppurationis quæ adhuc colligitur, sunt, grauitas thoracis, & tussis iugis sicca cum dolo- re, quandoque etiam cum humiditate, ex qua etiam leuari sibi uidentur. Et fe- bres ab initio ipsis fiunt debiles, & inordinate, ac quæ ægrè iudicantur. Vbi uero prope ruptionem est abscessus, uehementius februnt cum quo- dam horrore, & inter loquendum impelluntur dum à spiratione uexantur. Rupto autem abscessu, pus educitur, quandoque purum, quandoque foeculen- tum. Et aliquando sursum rumpitur abscessus, quando etiam periculosos est: aliquando etiā deorsum. Et in quibus deorsum rumpitur, partim ad uen- trem & intestinum transsumitur, partim ad uesicam, transsumptione per ua- sa quadam cōtingente. februnt autem semper hectica febre, usque ad repur- gationem. Quæ si non diligenter procuretur, cito in tabem transit suppuratio, pulmon ulcerationem sustinente. Quæ iam consistente, & genæ liue- scunt, & circa frontem ac collum exudationes fiunt, & carnes colliquescent, & ungues incuruantur, & pingues, & exalbidæ, aut ualde pallidæ apparent. Cæterum affectione prædominante, & uenter exturbatur, & præcordium reuellitur. Et sitis ipsos diutius tenet, & cibi inappetentia, & quod effertur sursum, ualde graueolens est.

Suppuratio  
thoracis  
Tabes

Curatio. Oportet igitur primum quidem suppurationis concoctionem adiuuare, & per spongiarum fomētā, & per cataplasmata ex farina hordea- cea, cum caricis coctis, & modica resina, & columbino fimo, & nitro ac hi- bisco. Adiuuat ruptionem etiam decubitus ad latus non affectum. Sorbeant

Impetio the-  
rakis suppu-  
rationem

i 4 autem

autem ex interuallis aquam mulſam, & ptiſanæ ſuccum cum melle. Quæ uero robuſtiores ſunt, etiam hyſſopi ac thymi decoctū bibant cum melle. Adiuuat item ruptionem ſaſamentorum eſus, & hieræ ex colocynthide catapotia ad ſomnum accepta. Vbi uero pus excerni cœpit, rurius dandū eſt hyſſopi decoctum, & fridis ac glycyrrhizæ, ſint autē hæc cocta in aqua mulſa. Aut glycyrrhiza trita cū ſelamo. Cataplaſma ſit ex polline, in aqua mulſa & oleo cocto. At ſi ulceratio ægrè repurgetur, compoſitis utendum eſt. uelut eſt quod ex marrubio paratur ſimplex ac compoſitum, & quod ex eruo, & dodecatheon, & philoxeni appellatum. Verū ad tabem diſtēſis, porrum capitatum in alicæ aut ptiſanæ ſorbtionibus eliquatū dato. Imo etiam per ſe bis coctū dandum eſt. potus ſit aqua pluuiæ, & aqua mulſa ex illa parata. Ab initio uero remiſſionum, cataplaſmata adhiſbeantur ex lini ſemine ac polline, cum decocto ſœnigræci aut makuæ, oleoq; ac melle, & ſoliæ althææ. Tempore uero progreſſo, ad cerata tranſeundum eſt ex butyro, & cyprino, & laurino, & fride. Sed & Mnafææ emplaſtro utendum eſt. Thorace uero fluxionibus infeſtato, emplaſtrum ex ſaliſibus imponendum eſt. præbiant etiam antea relata ad ſuppuratos ſimplicia, & quædam ex compoſitis. Cæterum tuſſi grauiter obtinente, thymum & hyſſopum cum glycyrrhizæ ſucco melle cocto excipe, & efformata ſub lingua tenēda præbe. Conueniet iſtis etiam Mithridatis Antidotus ex interuallis, & quæ ex uiperis paratur. Optimum uero his auxilium eſt Armeni boli potus, & Amidotus Eſdra non minus quàm prædicta.

## De pleuritide. Caput XXXIII.

Pleuritis

Quæ proprie pleuritis dicitur. Inflammatio eſt membranæ intrinſecus coſtas ſuccingentis, cui adeſt ſpirandi difficultas, & tuſſis, & febris continua, & dolor pertingens uſq; ad clauiculam, & præcordiū. Diſcernes autem pleuritidem ab hepatis inflammatione, nam & in illa omnia hæc apparent: eo quod in pleuritidis punctorius eſt dolor, & tuſſis aliquando ſine ſputo, quando etiam crudus indicatur morbus, aliquando uero etiam ſputum efferunt, quod indicat humorem morbum efficiētem. Rubicundum enim & ſuberuentum educitur, ſanguine redundante: ſtauum uero & cum pallore ſubuiride, bile: quemadmodum ruſus album & ſubſpumoſum, pituita: In atrabiliario uero humore, nigrius: & pulſum durū, & ſecantis quipſam modo ſe habentem habent. At in hepatis inflammatione, neq; punctorius eſt dolor, neq; pulſus adeo durus. Sed & tuſſis ſemper ſicca & ſine ſputo eſt, & facies decoloratioſa apparet. Quæcunq; uero pleuritides propter externorum muſculorum ſunt inflammationē, quæ ſanè neq; proprie ſunt pleuritides, in his unā cum hoc quod neq; tuſſiunt, neq; ſpuunt, neq; durum pulſum habent, ſi quis manu affectum locum contingat, dolent ægroti, & ſi non fuerit diſcuſſus, tumor ſuppuratus ad hoc deuenit, ut forinſecus incidatur, quā pleuritis ex membranæ coſtas ſuccingentis inflammatione oborta, ad hoc nō deueniat. Illa enim ſi non fuerit expurgata aut foras, aut intus, in ſuppurationem, & multo prius in peripneumoniā tranſit.

Pleuritis nō  
uera

Curatio. Si quidem igitur ad clauiculam dolor ſe extendat, uena ipſa ſecanda eſt. Si uero ad præcordiū, purgandum. Recentiores autem omnibus uenam ſecāt, uerū ut arbitror turbationem ex purgatione. At uinibus non permittentibus, neutrum faciendum eſt, ſed acribus per clyſterem inſuſis utendum. Et ſi quidem moderatus fuerit dolor, poſt inſuſum danda eſt ipſis aqua mulſa, & ptiſanæ, aut alicæ ſuccus. Dedinante uero affectione, porrum ad ſuccos inſiciatur. Aut calamīnthen, aut pulegium, aut urticæ ſemen, cum melle deſtingant. Verum uehementēſes dolores poſt euacuationem mitigandi ſunt, lana calida, aut ſulphurata impoſita, aut etiam ſomentis ex millo, aut furfuribus, in ſacculis admotis: aut per calidam aquam, aut oleū in ueſica. Lanæ quoq; ſuccidæ imponantur cum oleo, ac uino marinam, & quam ammiſtam habēte, aut ſale ad ipſum inieſto. Aut cataplaſma ex me-

Lana ſulphurata

dicar

A dicamento ex feminibus adhibeatur, cum decocto chamæmeli, & althææ, caricarū, iridis & absinthij, cum modico melle, & oleo nardino. Circa quartam autem diem sorbitionibus nutrito, cum pauco melle. post septimū diē eclegma ex amygdalis & urticæ semine, in melle cōtritis dabimus: & quod ex butyro ac melle simul coctis sit eclegma, & hypoglottide ex melle cocto utemur. Epithematis uero, & graueolente, & eo quod ex sampſucho paratur, & rutaceo emplastro, ad locos dolentes utemur. Sed & bulbi cum axungia inpositi saepe satis fecerunt. Infusumq; ex butyro ac rerebinthina ipsis per clysterem immittatur. Ex efficacioribus autem eclegmatis dabimus id quod ex nucleis piceæ, amygdalis amaris, semine lini, nucleis pineæ nucis, & anylo, singulis æquis portionibus, cū melle paratur. Vigils si infestentur, medicamentum ex capitibus papaueris delingere conueniet. Antidotum istum & Athanasia, ac alijs ad hoc compositis utemur. At post decimum quartum diem permanente affectione, cucurbitæ ipsis affigantur, & in uiscu tenuiore conferuentur. Et postea declinatione facta, ad balneum ducantur, ita ut frigidum uirent, & solidiore ac pleniore uictu utantur. Si uero non discussa succingentis costas membranae inflammatio, transmutationē ad pus ostenderit, supra relatis utemur.

Ad dolores laterum sine febre.

Laterum dolores sine febre sanant bdellium, & costus, ad brassicæ caulium ustorum cinerem, & adipem ammixta. Est enim hoc medicamentum forti discussoria facultate præditum.

De cordis affectionibus. Cap. XXXIII.

COr ipsum primaria affectione affectum, longè ab eo abest ut medicorū auxilium admittat, citam mortem inducens, & in inflammationibus ipsius, & in igne sacro, & intemperamento uehementi in acutissimis febribus, & in sanguinis eruptione, ubi uulneratum est circa sinistrum maxime uentriculū. At ex consensu affectum, & ex cerebro, & hepate, & ore uentris, tristitiaq; ac timore, & alijs pluribus, animi concisionem, syncopen apellatam inducit, quæ acruata uirium collapsio existit, & exolutionibus ac animi deliquijs, & pulsuum paruitate, & extremarum partium perfrigerationibus, & exudationibus cognoscitur. Atq; hæc sanè etiam ipsa auxilium non admittit, si fortis existit. Si uero uires adhuc aliquo modo consistunt, aliquando auxilium sentit. Sed & palpirationes cordis uehementes saepe sunt, ob sanguinis in ipso copiam aut feruorem. Hoc uero calefactum quidem, magnam & densam efficit respirationem. frigefactum uero parum & raram. Quomodo igitur cordis syncopas in totum corrigere oporteat, in febrium symptomatis libro secundo diximus: Tantum tamen hic addendū est, quod inualeſcente symptomate, post extremarū partium defrictiones, & unctiones, & pauimentū purificationes, ac reliquum refrigeratorium ad reuocandam animam ductum, inspergenda est exudantibus corporis partibus myrrus trita, aut terra cimolia, aut succinum, aut malicorium cum thuris manna, aut samia terra cum gummi. Extremis uero partibus perfrigeratis usq; ad inguinā ac sub alas, cataplasma imponendū est ex sinapi, aut pyrethro, aut adarce. Cibus aut sit panis ex aqua, aut ex uino frigido diluto, pedes suilli, articuli, ac rostra, uolucres, omnia frigida. Capiti ac fronti illinendum est omphacium, aut aliquid adstringendi uim habēs cum gummi, aut tosarum decocto. Cataplasma conuenit præcordijs & stomacho, ex palmlis, rosis, cœnanthe, acacia, hypocisthide, alumine.

De palpitatione cordis.

Noui quendam inquit Galenus, qui singulis annis uerno tempore, palpiationis cordis symptoma patiebatur. Et postquam tribus annis expertus esset uenæ sectionem sibi cōmodam, quarto anno uenam secuit ante quam symptomate corripereur, & correptus non est, atq; sic consequenter fecit per plures annos, unā cum hoc quod conueniente uictu utebatur. Attamen

Cordis primaria affectio descripta

Syncope quid sit

Palpitationes cordis

Historia palpiationis cordis

& hic

& hic mortuus est ante senectutem, quemadmodum & alij omnes, quorum aliqui in febris acutis acervatim in syncopen collapsi, similiter mortui sunt, aliqui vero ipsorum etiam citra syncopen, syderationis modo, de repente vitam commutarunt. Plerique vero ex ita affectis aetatem agebant infertilem quidem annis quinquaginta, verum quadragesimum annum transgressi.

De affectionibus circa mammam.

Cap. XXXV.

Mammarum  
affectiones

Post partum lac saepe velut in caseum concreescens, inflammationes circa mammam efficit. Ab initio igitur his utendum est. Spongiam teneram posca repida imbutam ac expressam imposito, ac apposite deligato. Aut palmas cum pane & posca tritas. Aut ovo toto utendum est, cum rosaceae modico cerato. Aut alumine & psyllio, cum coriandro. Aut portulacae impone. Aut lapidem pyritem cum cerato imposito deligato. Distentione vero aut grumositate contingente, panem ex aqua & oleo, aut uino mulso imposito. Aut panem cum perdiciae uiridi, una cum cerato, bis in die. Aut farinam fabaceam cum aqua mulla, aut sapa. Si uero gravitatem non ferant, irrigatione ex oleo dulci calido utendum per molles lanas. Fomentum autem ipsis adhibeatur ex aquae calidae uapore, aut sceni graeci, aut althaeae, aut seminis lini decocto. Caraplasma ipsis imponatur ex polline cum lini semine, aut ex foenograeco cum aqua mulla, aut ex sesamo cum melle aut butyro trito. Reprobare uero oportet mammarum excisionem, ut quae per fectum amplius ad ipsas attrahit. Declinante inflammatione, cerata adhibeantur haec. Betam donec flaccescat in oleo coquito, & ipsam quidem abscito, ad oleum uero ceram comoderatam adiecto ac utitor. Aliud. Oorum crudorum uittellos decem, ad ceratum ammisce, quod habet cere sextantem, & unciae dimidium, & rosaceae trientem, & ad haec cum spatula agitata, melle quantum admittere possunt affunde, & rursus spatula agitata utere. Ceterum ad mammarum duricias facit emplastrum ex melle, & omnia mollientia medicamenta. Si uero tumor ad abscessum uertatur, his quae ad parotidas relata sunt, & quae in tractatione de abscessibus referuntur, utendum est.

Archigenes ad erosiones mammarum cum malignitate.

Vinum Adri-  
anum  
Mammarum  
erosio  
Galla om-  
phacina

Vini Adriani boni sextar. XX. rhois coriarii lib. I. psularum cupressilib. I. gallae omphacinae nigrae sextuncem. cassiae sexuncem. Contusa in uino ad dies decem macerantur. Deinde coquantur, & spatula cupressina agitantur, ad dimidiae ferme partis consumptionem. Et tunc quidem herbae reiectae sunt. Succus autem ad mellis spissitudinem coquitur, & uase uitreo excipitur. Vtere in ulceribus proserpendo depascentibus meraco. Si uero crassus fuerit, uino humectetur. Accommodatum est medicamentum, utpote cutis usus aduersus nomas in mammis resistere possit, & ad aures punilentas, & gingivas humentes ac putridas, & dysenterias. Mitigat etiam dolores lacte dilutum. Aliae porro mammarum ulcerationes communi re liquis ulceribus modo curandae sunt.

Mammis conseruandis.

Mammis con-  
seruandis

Cum inum in aqua trinum mammis imposito. deinde spongia ex posca extrinsecus imposita, pectus fascia constringito. post triduum uero ablato cumino, lilij bulbos cum melle mammis imposito, & deligatos rursus ad triduum finito. Atque hoc ter in mense facito. Aliud. Cicutam tritam ad dies nouem impone, & spongiam uelut dictum est, forinsecus adhibe, & paucis interpositis diebus idem facito. Quin & coctis Naxiae dum ferrum in ipsa acuitur de trimento, mammam uirginum conseruat.

Ad grauem alarum factorem ac exudationem.

Cap. XXXVI.

Alarum factor

Aluminis liquidi partes II. myrrhe parte I. uino dissolutis utere. Aliud. Plumbaginem ultimam & uino odorato extingam, cum uino terito, modica myrrha adiecta, donec strigmentitia fiat crassitudo, & utitor. Aliud. Spumae argenti drachmas XV. myrrhae drach. II. amomi drach. I. uino ex-  
cipe.

*Alud.* Aluminis liquidū drach. viii. amomi, myrrhæ, spicæ nar-  
di, singulorum drach. iiii. uino tritis utere.

*De affectionibus circa stomachum, præcordia ac ventrem.*

*Cap. XXXVII.*

**D**E ciborum quidē in febribus inappetentia, & de fame magna, ac de  
canina appetētia. Itē de stomachi debilitate, ac animi deliquio. Et insu-  
per de siti, singultu, nausea, ac syncope, in tractatione de febribus lib. 3. hūc  
percedente sufficienter dictum est, nec tempestiuū est rursus de iisdem ser-  
monem instituere. Ceterum inflammationes oris uentriculi & hepatis,  
adstringentium ammixtione opus habent. Si enim quis per solum laxato-  
rium ductum curet, periculum uitæ inducet. Oporter igitur siue oleum fue-  
rit id quod affunditur, siue cataplasma, aliquid ex adstringentibus ammi-  
scere, uelut est absinthium, nardinum aut melinum unguentum, aut malum  
cydonium incoctum. Ceratum uero quo assidue utor hoc est. Cere albæ  
unc. i. zeste uero drach. vii. aloës, mastiches, singulorum drach. i. olei om-  
phacini, aut melini, & nardini, usus tempore quantum satis est ad compa-  
gem. Si uero amplius ad strictione opus sit, ut neque cibos retineant, ammi-  
sceatur etiam omphacii drach. i. aut iucci absinthii tantundem, & tertiu in-  
super hypocistidis & cenanthes & rhois succus. Cerati uero copiam au-  
gere oportet, pro reliquorum pharmacorum numeri proportionē. Diutur-  
na autem iam inflammatione ac indurescente, magis uaria medicamenta  
adhibere oportet, quæ & aromata quædam habent, & mollitoria, ac discus-  
soria, uelut est quod ex meliloto paratur, & philagrianum, & odoratum di-  
ctum: & uiridis laspidis torques de collo suspensus, ut stomachum contin-  
gat, magnifice prodest. At in calidis stomachi intemperamentis, & ardore,  
cum exolutione aut animi deliquio, aut aliqua ciborum inappetentia, ex  
qualicunq; causa, excepta febre, frigidam aquā dato cum uuæ acerbæ suc-  
co, aut malorum cyoniorum decoctum, aut pampinorum uitis, aut cucu-  
meris semen tritum cum frigida. Stomacho uero imposito uesciam aqua  
frigida plena, aut cucurbitæ ramenta. Sed & catapotia sitim eximentia dan-  
da sunt, uelut capite de siti dictum est. Refrigeratorium autem & corrobo-  
ratorium humidi stomachi hoc est. Foliorum rosarum siccarum drach. vi.  
iucci glycyrrhizes drach. iiii. Excipe uino dulci, & fac catapotia sub lin-  
gua tenenda. Verum in his qui ob pituitæ crassitudinem, calefacientibus  
ac fecantibus opus habent, commodum hoc est. Corticis radicis feniculi  
sextantem, acetii sextar. i. aloës quadrantem, mellis lib. iiii. Radices cum  
aceto coctæ exprimuntur, ac reioiuntur: & mel additum ad compagem co-  
quitur, & tunc aloë trita inspergitur. Dato cochlearia tria cum aqua. Qui-  
dam sine aloë ipsum preparant. Et medicamentū ex calamintha in his com-  
modum est. Quibus autem cibus accecit, coriandri seminis drach. i. uelut  
polentram aquæ inspersam bibendam præbe, aut mastiches cochlearium i.  
aut lactucæ albæ seminis cochlearia duo. Compositum uero hoc, piperis  
drach. i. seminis anethi drach. iiii. cumini drach. iiii. trita dato cochlearij  
mensura ad somnum, in uino diluto. At in his qui bilem generant atram,  
& stomacho inflatis, in aggressionē spongiæ imposito acerrimo aceto im-  
butas, post has uero si permaneant affectiones, alumen cum ære trito melle  
exceptum imponito. Bibat autem intybi succū. Aut mentam potui insper-  
gito. Quibus uero stomachus inflatur ac distenditur, his calaminthæ de-  
coctum ammixto melle, ac modico pipere dato. Verū ad stomachi subuer-  
siones, succi nucleorum mali punici acidi partes iiii. succi mentę partē i.  
coquito ad spissitudinem, & ante cibum mystum i. dato.

*Ad stomachi saluationem.*

Acetum scillinum, aut oliuarum muria conditarum iusculum, aut oliuæ  
frondium decoctum colluat. Aut etiam minimum quid ex ipso deglutiat.  
præ omnibus uero facit aloë aqua diluta. Verum ad eos qui cibum nō con-  
dunt, quos ueteres priuatim stomachicos nominant, sceni græci farinam,  
& maluæ

*Ventriculi ac  
hepatis infla-  
mationes ad-  
stringentia re-  
quirunt*

*Lapidis usus*

*Cibus in uetris  
culo accescens*

*Stomacho  
inflati*

*Stomachi sub-  
uersio*

*Stomachi sa-  
linatio*

*Stomachici qui sint* & maluae semen tritum siccum, melle ammixto pro cataplasmate impone. A Ceratum uero facit, ex cera, olei irini fece, & castorio.

*De ciborum inappetentia.*

*Ciborum in-*  
*appetentia* Ciborum inappetentia est ciborum auersatio, aut intemperie in stomacho existente, aut humorum redundantia. Calidam autem intemperiem cognoscas, & sili, & nidorosis ac coenosis ructibus, si coacti aliquid ederint: & ex eo quod frigidiora, & concoctu difficilia, magis concoquere possunt. frigidam uero contrarijs. Neque enim siliunt, neque frigida sustinent, & ructum acidum aliquando habent. Qui uero propter humores, cibos auersantur, qui quidem obtenuas ac mordaces hoc patiuntur, stomacho morsum percipiunt, & nauseant magis, & siliunt. Quibus autem computruerint humores, aliquando etiam febriunt. Qui uero ob crassos ac uiscosos humores, morsum & silium omnino non percipiunt, uerum commune symptoma omnibus est nausea. Verum si in cauitate uentris fuerint humores, etiam hos ipsos reuomunt. Si uero in tunicis ipsius infarcti aut imbibiti, nauseant solum, non uomunt, praeterquam cibos si forte assumpserint. Qui igitur ob calidam intemperiem cibos auersantur, his uisus ex refrigerantibus constituendus est, & maxime ex his quae parantur cum aceto. Panem igitur ex posca dare his conuenit, & ipsam poscam bibendam, & lac acidum, & apud Romanos Melcam appellatam: Est autem obsonium quoddam ex lacte: & in thyra, & lactucas, & aliquando etiam frigidam aquam, omnia moderate iuxta praesentis intemperiei oppositionem. Nam immoderatus horum usus non solum non prodest, sed etiam incurabilem saepe fecit affectionem, Qui uero ob frigiditatem, eos contrarijs sanare conuenit, ita ut uinum uetus bibendum praebeamus, & conditum, & hydrogarum, & anisi ac rutae & peritroselini decoctum. Et piper ex aqua calida comuni, aut etiam ipsam ex tribus piperis generibus medicamentum, aut quod ex calamintha paratur. Da, his etiam theriacem ex uiperis, quae neque his qui ob humorum copiam cibos auersantur, incommoda est. Alium uero his & ut cibus, & ut medicamentum, commodum est. At si ob humorum copiam ciborum fastidium fiat, tenuis quidem & mordaces euacuabis, aut per uomitus, aut per infernam alium. Voment igitur facilius, si temperatam aquam, aut aquam mulsam aquosiorum praebuerint. Melius autem si ante haec humectantes cibos dederis, uelut prisanæ succum, aut ouorum uitellos. Verum quomodo quis facile uomat, libro primo dictum est. Si uero aeger difficulter uomat, melius est ad infernum uentrem materiam promouere, uberiore ac temperato cibo hos prae humectando. purgatorium autem medicamentum sit, aut ex aloë amarum appellatum, aut id quod ex malis cydonijs paratur ac recipit scammoniam, aut quod fit ex rhodomelite. Quod si fieri possit ut citra scammoniam, ex aloë copia magis ipsos euacues, melius feceris, propterea quod scammonia est stomacho infesta. At uero crassos ac uiscosos humores ciborum fastidium inducentes, attenuabis ac secabis per acetum mulsum, & quae ex hoc, & muria componuntur, uelut est capparis, oliua, sinapis, & similia. Nec uero incommoda his sunt ea, quae ad eos qui ob frigidam intemperiem cibos auersantur relata sunt, & maxime post euacuationem. Euacuabis autem ipsos per acetum mulsum Iulianum. Forinsecus autem calfacere ac corroborare stomachum potentibus utendum est ungentis ac malagmatis, quae sunt maxime, & quod ex uua acerba paratur, & Marciaton appellatum, & consueta ungenta. Epithemata uero Baïum, & odoratum, & similia. Exercitia etiam ac frictiones maxime adhibeantur. Carterum his qui aegre concoquunt ac cibos auersantur, propter humorem frigidum ac humidum, aut talem intemperiem, quae ex malis cydonijs parantur conueniunt, dico autem id quod Meloplacurion appellatur, & quod ex succo sit malorum, & quod ex carnibus ipsorum, & quod ex citrio praeparatur. Malagmata uero Marciaton, & quod ex tuuæ acerbae succo paratur, & Baïum, & polyarchion, & quae



A & quæ eiusdem cum his generis sunt. Si uero ulcus est in stomacho aut uentre, ab omnibus abstinendum est acris cibis ac potibus, & medicamentis. Utendum autē mitigantibus, uelut sorbitionibus absq; oleo, & his quæ ex amylo fiūt, & terra samia, & lemnio sigillo, & lacte ac melle paucissimo, quo citra mordacitatem perurgent. Epithema cōuenit ex palmulis, & malis cydonijs ac polentra. Ceratum ex melino aut rosaceo cum ammoniaco, & thure. Et Nilei epithema, & emplastrum ex salicibus, ac Icesium. Cognoscet autem ulcus, ex eo quod sanguis, aut pus, aut etiam ulceris tectorum uomitu reijcitur.

Stomachi aut  
uentris ulcus

Ad exolutos ac debiles stomachos, & propterea non coquentes, aut etiā cibum uomentes. Aloës, masucha, maltiches, styracis, singulorum sextantem, abinthij tridentem, cœnanthes quadrantem, gleucini sexuncem, melini quadrantem, uini quod saris est. Quidam etiam cyphos & rosarum, singulorum sextantem. Trita hæc purpura aut lana excipiuntur, & stomacho imponuntur. Quidā etiam ceræ sexuncē admiscentes, epithema ex ipso faciūt.

Masucha

Ad uoluuolosas stomachi affectiones, hoc est uehementes ac cōuulsorios dolores, optimum medicamentum est Amazonum pastillus. At huius descriptionem, itemq; reliquorum stomachicorum compositorum materiam, reperies libro ultimo, in tractatione de compositis medicamentis.

De uentris inflatione. Cap. XXXVIII.

FLatuum in uentre generatio, humoribus aut cibis, præ tepida caliditate in uapores dissolutis, contingit. Nam frigiditas eo quod attenuare ac dissolvere non potest, nihil flatuum gignit. Vehemens uero caliditas, non attenuans solum, sed etiam discutiens, status collectionem impedit. At minor caliditas, diffundit quidem ac transmutat cibum, uerum defectuosius, atq; inde est flatuum generatio. Conuenit igitur ipsos per calefactoria medicamenta attenuare, cum in oleo cocto, & apio, & spondyljo, & dauci semine. Si uero frigiditas affectioni adest, ruta, & lauri bacca, & melanthium, & fœniculum, in oleo coquatur, & ammisceatur bitumen, ac oleum laurinum. Quod si etiam inflammatio doloribus adsit, pro calefactorijs utris laxatorijs, anethum coquens, ac miscens adipem gallinacum ac anserinum. Facit etiam ad inflatos, polij fasciculus coctus, aut calaminthæ decoctum, ammixto modico melle, & piperis drachma una. Atq; hæc quicū uehementi dolore irruēte adhibenda sunt. In mediocri uero sufficient somenta ex milio. Cæterum cucurbita bene magna umbilicum complōdens, sepe acerrimam symptomata submouet. Prodest ipsis etiam castorium potū ex posca, & forinsecus cum oleo sicyonio impostum: & si cum tormine sunt inflatio nes, ipsas sanat. Sed & talus suillus uisus & potus, tormina ac inflationes sanat. Aristolochia item rotunda. Verū dolores ob alui obnurationes, aut inflationes ob crassiciem, aut ob frigiditatem, uinum meracius potum post cibum sanat. Si uero somnus accedat, etiam perfectē ipsas summouet.

Ventris in  
flatio

Flatuum ge  
neratio

Tormina

De cholera. Caput XXXIX.

CHolera immoderata est uentris exturbatio, & infernē, & per uomitum contingens, propter assiduam ciborum cruditatem. Fit autem cruditas quandoq; ob multam ciborum prauitatem, quandoq; ob prauorum humorum redundantiam. Siquidem igitur nauseat, & lancinatur æger, manentibus adhuc cibis crudis in uentre, aquam tepidam ipsos bibere iubebimus, ac reuomere, digitis aut pinnis immisis. Adiuuanda est etiam uentris excretio. Post superfluum euacuationē, quiete & calefactione partium circa præcordia utendum est, per oleum dulce cum modico uino, aut per mastichinum, aut nardinum, si hyems fuerit: & ut dormiāt permittendum est. post perfectam autē concoctionem, balneis utendum est, & cibis boni succi. Si uero euacuatio immoderata fiat, sufficiūt in principio etiam ea quæ libro secundo de uentris exturbatione dicta sunt. Perseuerare uero lationis impetu, & uentre collabēte, & pulsu immūto ac densato, cataplasma ad-

Cholera quid  
sit

k hibeatur

habeatur ex palmulis, cū cenanthe, & acacia, & hypocisthides succo, ac ma-  
 llicorio. Detur autē aqua moderatē frigida cyathus forbendus. Melius au-  
 tem est si decoctum fuerit rosarum, aut cenanthes, aut rhois, aut pampino-  
 rum uitis: aut mali punici acidodulcis succus detur, modica menta insper-  
 sa. Si uero acriora fuerint quae excernuntur, ardoreq; ac siti accedente, cucu-  
 meris semen dandum est cum aqua cyathis tribus. Intybaq; ac lactucas co-  
 ctas in posca, in cibo accipiat. At si lationis impetus sisti non possit, uinum  
 aliquod austerum dandum est, non febrientibus Palmatianum, aut Amia-  
 narum, aut spathites, aut omphacomelites. febrientibus uero ex malis puni-  
 cis, rhoites appellatum, aut myrtites, aut Cebyriticum hydromelum, & in  
 potu, & cum micis, aut alisca, aut chondro. Si uero frumentacea edulia acer-  
 sentur, ex fugacibus fructibus aliquos manducantes, mespila uidelicet, aut  
 pira, aut mala cydonia, aut mala punica, id quod carnosum ac durum est  
 expuant. Quod si cibum non contineant, cucurbitam maximam leuem sio-  
 macho affigant, & hac incumbente ex aliquo ex relatis nutrantur. Cete-  
 rum ad conuulsorias contractiones, oleo imbuta linteola calida musculis  
 circumdari oportet, & cerata liquida, quae & castorij, & sicyonij quid habe-  
 ant. Antea haec uero, artus calida aqua perfundantur. Si uero uigilijs uexen-  
 tur, ad uigilijs descriptis utantur. Et si uires non prohibeant, medicamen-  
 tum quoq; ex papaueris capitibus bibendum detur. Declinatione uero con-  
 tingente, ad balneum perducantur, & reficiantur pullis gallinaceis, aut co-  
 lumbae, aut pedibus suillis, aut similibus. Quin & alui profluuium, quod  
 ciborum corruptio est, plerumq; sua sponte sedatur, si non alantur ipsi usq;  
 ad perfectam concoctionem ac euacuationem eorum quae corrupta sunt. Si  
 uero perseueret, utendum est his quae ad choleram relata sunt.

De leuitate intestinorum, & colica affectione.

Cap. XL.

**I**ntestinorum leuitas. **Q**uum duplex sit intestinorum leuitas, altera ob superficiariam intelli-  
 norum ulcerationem, uel ut aliqui sentiunt, ob cicatricem ex dysente-  
 ria plerumq; aut ex alijs fluxionibus obortam. Altera ob facultatis cibi re-  
 tinentis in uentre debilitatem: secundam differentiam arbitror cum colica  
 affectione copulandam esse. Nam in hac, debili existente uentre ad con-  
 coquendos ac distribuendos cibos, laeua & cruda ac liquida egeruntur, ab  
 uo in omnibus fluxione laborante. Verum in laeuitate intestinorum, & transi-  
 tus ciborum uelox fit, & cruditas magis intenta est, ut acceptus cibus ma-  
 nifestus fiat: & per haec maxime a coeliacis discernuntur. Imponendum igitur  
 ipsis est lini semē cum palmulis. Egregie facit etiam lentiscus & rubus,  
 si in aceto mulso coquantur. Si uero etiam inflatio adest, cuminum & ane-  
 thum, & ruta ammisceantur. Augescente autem fluxione, adijcimus etiam  
 mala cydonia, alumen liquidum, acaciam, hypocisthidem, gallam, aut quod-  
 dam ex his, aut omnia. Cerata faciunt ex oleo myrteo, cum aliquo uino ad-  
 stringente. Epithemata autem calidiora, & quod ex baccis lauri paratur, &  
 quod ex seminibus. Magis autē adstringūt, & quod ex cenanthe fit, & quod  
 ex uinaceis, & Antylo inscriptum. Sed & id quod Erythron inscribitur mi-  
 rifice facit. Diuturno uero euadente morbo, etiam dropace ad uentrē uten-  
 dum est, & cerato ex sinapi, & ipso sinapi. In potiones conueniunt, simpli-  
 cia quidem, plantaginis semen, rumicis semē, malicorium, sorba sicca, ma-  
 aminae acerba sicca trium obolorum pondere, febre carentibus cum uini  
 austeri cyath. vi. febrientibus cum aqua pluuiali. Minus autem stomachū  
 offendit uenterculus gallinarum siccus potui inspersus. Sed & urinae aien-  
 tia, apium, adiantum, & similia si bibantur, fluxionem transferunt. Ex com-  
 positis autem est sigillum polyidae, & pastillus ex succino, & ex spina Ae-  
 gyptia, & Clidion appellatum, & ex seminibus constans. Sed & hoc opti-  
 mum est. Seminis rumicis syluestris unc. i. s. seminis plantaginis unc. i. suc-  
 ci hypocisthidis drach. vi. gummi aut acaciae drach. iiii. Excipe malorum cy-  
 doniorum decoctio ad tertias redactio. Aliud. Cumini, pipēris, rhois sy-  
 riace

Ariacæ, balauftij, fingulorum unc. i. s. malicorij unc. i. s. filphij unc. s. aut pulueris eius sicci drach. i. Inpergito in posum, aut aceto mulso ammixto dato mane ac uesper. Aliud. Myrti baccarum nigrarum cochlear. s. anifi, rosarum siccatum, cenanthes, fingulorum cochlear. s. palmulas ꝛꝛ. fac pastillos, & præbe drach. i. cum aqua aut uino diluto. Theriaca quoq; ex uiperis optimum his auxilium est. Cibus si acris & biliosus est excretio, ex alica, chondro, & oryza, ac similibus sit, ita ut adstringentium quid simul coquantur, pirum, malum cydonium, mespila, & similia. Coctum quoq; lac his conuenit. Potus autem uel uinū a quosum tenue, aut aliqua ex iucundis sit positionibus. Si uero pituitosiora excernant, ad contraria cibum transmutamus, & semina quædam stomacho grata ammiscemus, anisum, aut cuminū, aut apij semen. Sed & lenticula bis cocta sæpe ipsis profuit, comesta cū modico aceto, aut aceto mulso. Brassicæ quoq; & ipsæ bis coctæ. Præstat aut secundam ipsorū cocturā in posca facere. Vinū uero uetustius ac calidius bibāt.

De tenesmo.

Caput XLII

Tenesmus aliquando dysenteriam præcedit: aliquando etiam ipse solus non diu durans cessat. Est autem affectio ad excernendum promptitudo, quæ difficili ac deuitari non potest, nihil educens præterquam pauca cruentū aspectum habentia, aut etiam mucosa, quæ fere totius morbi sunt causa, & inflammatio laxi tumoris in intestino recto oborta, incumbens stercoris suspensionem ipsis præbet, quod excretionem quærat. At uero Galenus narrat etiam lapidem quendam per sedem excremum esse, circa tenesmi affectiones. Sæpe uero etiam ob stercoris obturationem in tenui intestino consistentem, tenesmus sequutus est, ex adstringentibus & meatus obducentibus amplius augescens. Verum ex insusis per clysterem acrioribus, uelut est aqua multa cum sale: aut ex aliquo alui molliente per os accepto: uelut sunt damascena, aut caricæ, mercurialis, serum lactis: stercore excreto, statim sedatus. Citra igitur eiusmodi causam tenesmo oborto, conuenit inflammationem cruda ordeacea farina calida, & irrigationibus ex uino, & oleo myrteo, aut rosaceo, aut omphacino, ad lumbos ac pectinem adhibitis mitigare: & mucosa quæ intestino recto infarcta sunt, per aquæ mulsæ insusum detergere. Sed & muria insusa per clysterem sæpe quod opus fuit efficit. Satis autem est ut salis drach. vi. in heminam calidæ aquæ infectis muria fiat. Mitigare uero oportet dolores ac distentiones, per infusus scæni graeci, aut maluæ, aut seminis lini. Sæpe uero & hic infusus successum habuit. Rubi, myrti, floris mali punici, lauri & cupressi ramulorum uiridum, fingulorum aquas portiones coquito in aqua. Est autem Marcelli. At in profundo si est inflammatio ac irritationes, frumenta cæi succi cum aliquo adstringente cocti infundantur. Sed & olei dulce insusum & pluribus horis retentum, dolorem soluit. Si uero frequens ad egerendumurrectio fiat, etiam glomerem ex staminibus calidis sedi apponant, aut fures calidos in fasciculum deligatos, aut spongiam, aut tale quippiam.

De dysenteria.

Caput XLIII

Dysenteria est exulceratio intestinorum, quandoq; ex tenesmi transmutatione, aut aluitus ex relatis alui exturbationibus ortū habens: quandoq; uero ipsa affectionem auspicatur. Et in ipsa excretiones sunt primum biliosæ, uariæ. Deinde pro ratione cruentæ, & ad finem saniosæ, quales à mortuis corporibus defluere solent. Quæ uero ab atra bile initium sumit dysenteria, letalis est, cum exulceratione cancrum indicans. Si igitur ulcerationis signa stercori ammixta excernantur, cum doloribus ac torminibus: in tenuibus intestinis ulcerationem esse scito, quæ auxilijs per os acceptis maxime opus habet. Si uero sine mixtura stercus exeat, crassum est intestinorum ulceratio, quæ insusis per clysterem magis cedit. Quum uero multi sanguinis per se excretio contingit, affectionem ipsam sanguinolentam dysenteriam uocant. Excernitur tamē quandoq; etiam sanguis nigrior quam

Tenesmus

Lapis excretus tenesmo

Muria paranda modus

Glomeris ex staminibus nylis

Dysenteria

Cancer exulceratus

pro natura sua, & splendidus, hepate non probe concoquente alimentum quod distribuitur. Quin & ob debilitatem retentricis aut alteratricis ipsius facultatis, excernuntur per uentrem similia carniū recens maciatarum loturæ: hepaticam autem hanc uocant dysenteriam, de qua in sermone de hepate dicitur. In communi igitur his quæ ad coeliacos, & alias præter naturam excretiones, relata sunt, utendum est. Priuatim uero lemnium sigillū, etiam depascendo proserpentem iam dysenteriam sanat, & potum, & per clysterem infusum, intestino prius per aquam mulsam eloto, deinde per muriam. Et portulacæ succus, commodus est dysentericis potus. Et ipsa portulaca cocta in posca comesta. Conuenit etiam plantago, & rubi fructus ac folia, & radice althææ decoctum, hippuris ex aqua aut uino pota, & succus ipsius, Mori immaturus fructus siccatus, & hoc magis rubi mora similiter siccata. Siccant etiam fluxiones per aluum, oua aceto cocta & comesta. Melius autem est si miscueris ipsis aliqua ad dysenteriam commoda, & in sartagine fricta ad edendum dederis. Vtilissimū est ad hæc omphacium, rhus ruber, & succus ipsius, malicorium, galla, uinacea, mespila, myrti bacce, corna, cochlearum integrarum ustarum cinis. Compositū uero hoc. Cochlearum cineris partes 1111. gallarum partes 11. piperis partem 1. In puluillū redacta obsonijs inspergito, aut in aqua, aut uino albo bibenda dato. Generose auxiliatur hoc dysentericis, quibus nondum putredinosum factum est ulcus. Sed & canum qui ossa comederunt sterces siccum, cum lacte per canesentes silices immixtos feruifacit potum, magnopere prodest. Composita uero, pastillus ex spina Aegyptia, & Philippi pastillus, & qui fit ex cornu ceruino, & qui ex seminibus, & trigonus. Et ex macere catapotia admiranda sunt. Optimus est & hic, opij, croci, lycij indicia, acaciæ, rhois, thuris, gallæ, hypocistidis, malicorij, myrrhæ, aloës, singulorum æquales portiones aqua excipe, & obol. 111. præbe. Aliud. Rhois drach. viii. gallæ, malicorij, singulorū drac. 1111. dato cochle. 1. ex uino. Aliud. Rhois drach. viii. gallæ, acaciæ, gūmi, singulorū drac. 11. opij drac. 1. dato drac. 1. in uino diluto. Eclegma uero ipsis conuenit hoc. Myrti nigrae baccarum sextar. 1. rhois syriaci sextar. 1. palmularum Thebaicarum lib. 11. carnis malorum cydoniorum lib. 1. mala punica acida cum ipsis corticibus x. Vini adstringentis sextar. xii. coquito ad tertias, & excolato ac inijecto mellis lib. vi. & ad spissitudinem coquito ac delingenda dato. Manifestum uero est quod etiā cataplasmata ex adstringentibus erunt, quorum materiam habes. Infusa autem per clysterem dysentericis commodant, propter tenesmos uexantes, succus oryzæ, aut alicæ, aut alicuius huiuscemodī, cum adipe caprino aut hircino, & quæ in capite de tenesmo relata sunt. Si uero sanguis destillat, infundatur succus polygoni, aut plantaginis, cum acaciā, aut hypocistide, aut tali quopiam. At si resurget, etiam ex sanguinē sistentibus aliquid infundatur. uelut est cinis lanarum succidarum, aut spongiæ noxæ, pice liquida, aut sanguine bubulo, aut alumine liquido, aut stercoreis asinini succo imbutæ, & ustæ. Sed & Andronis pastillus bonum medicamentum est, & Musæ inscriptus, & cōsimiles. Sed & subdititia collyria ex efficacissimis existunt, maxime in quibus etiam dolores circa excretionem fiunt. Vlcerē uero depascēte circa intestina consistente, quod & scetore, & putredine eorū quæ excernuntur cognoscimus, & quod non statim ab initio, sed post tempus fiat, crustam inducentibus infusis utemur. Velut sunt pastilli fasinij appellati, & qui ex charta fit, & bithynus, & thronus, & qui ex subreparatur, per lenticulæ, aut alicuius ex adstringentibus decoctum, per clysterem infusi. Sed & hoc infusum ex his est quorum multam experientiam feci. Omphacitidis ustæ: est autem cauum illud ex quo quercina glans enascitur, quo coriarij utuntur: auripigmenti, symphyti, rhois syriaci, singulorum æquales portiones. De his contusis cochlear. 11. excipe succo oryzæ, aut succo anchusæ: quæ spinosum & latum ac nigrum folium habet, quam

**A** choero spelethron, id est iugerum porcinum uocant; & candido ouorū, ita ut de singulis ex æquo sextantem, aut quadrantem accipias, & per clysterē immittes. Epithemata uero faciūt quæ ad celiacos relata sunt. Sed & uentris illationes, quæ adstringentem ac siccantem materiam habent, cum aliquo ex glutinosis, gummi, thure, glutine, polline, in his quæ cataplasmaris similes sunt locum habeant. Cibus his ab initio sit lac ouis permixtum deinde ex frumentis acets sorbitiones, per se, & cum lacte coctæ. Ipsum quoque lac moderate coctum optimum est. Olerum usus non est necessarius, atramen gustanda deniur, seris cocta, inrybus, & plantago, & brassica his cocta: & ex fructibus adstringentes, carnibus ipsorum sputo reiectis, aut his quæ alias insectina exasperare possunt. Si uero multa fuerit calida intemperies, etiam inrybus crudus detur. Et aquam frigidam sorbeant. Reliquus uero potus sit aqua pluvialis. Languente uero stomacho, etiam uinum, postea uero etiam de uolucris sicciores & concoctu faciles sumant. Et balneis utantur dulcibus. Si uero ab ipsis fluxione infestentur, spongiam magnā, aut panis filii, ginei micas, uino Ascalonite, aut aliquo adstringente calido imbutas, per totum superiorem uentrem imposito, deligato, atque sic lauare iubeto.

De colica affectione.

Caput XLIII.

Auchusa inge-  
rum porcinū  
dictaVinum Asca-  
lonites

**C**olon quod crassi intestini pars est, exortum quidem à dextera lateris mollitudine habet, fertur autem ad sinistram, instar cinguli. Verum do-  
lores huic grauissimi sunt, ob plures causas. Aut enim ob crassum ac pitui-  
tosum humorem intra tunicas ipsius interclusum: aut ob spiritum crassum  
ac flatuosum, qui transitum non habet: aut ob intestini inflammationē, aut  
ob acres ac mordaces humores. Qui igitur ob crassum ac pituitosum hu-  
morem dolent, his dolor per totum abdomē in profundo sentitur, maxime  
circa colū situm, doloris sensu uelut à terebellæ perforatione contingente.  
Tormina autē hos uexant, & ructus, & nausæ, & uomitus omnigeni, ma-  
ximè pituiti. Et uenter ipsis sistitur adeo grauiter, ut neque status pertranseat.  
Excretum uero quandoque stercus bubulo simile uidetur, leue, & flatu plentū.  
Præcedit in his maxime frigidorum ac crassi succi eduliorum assidua inges-  
tio, repletioque ac cruditas, & ocium, & quæ his consona sunt. His autem  
qui ob spiritum flatuosum dolent, tensionis magis sensus contingit. Qui  
uero ob inflammationem, feruoris in loco sensum percipiunt, & febris ad-  
est non ingenerosa, suppressioque stercoris & urinarum. & pulsus uixat cir-  
ca uentrem, & sitis ac ardor hos infestat, & nausæ, & bilis magis uomitus  
nihil alleuantes. Et in summa, grauissima hæc est ex colicis affectionibus,  
transicionem ad uoluulum minans. At ob acres ac mordaces humores do-  
lentibus, quemadmodum etiam his qui ob inflammationem, ardor, & sitis,  
& uigiliæ adsunt. Februnt autem omnino, aut minus quàm illi, & acre lo-  
rium emittunt, & biliosa egerunt, & sæpe in alui egestionem magis dolent.  
Et calidiorum eduliorum ac porum ingestione magis exacerbantur. Do-  
lores igitur ob frigidos & uiscosos ac crassos humores sanare conuenit, nō  
uehementer calfaciendo. Nam à calfacientibus multū diffunduntur, & ma-  
gis inflantur tales humores. Conuenit igitur ipsos secare ac cōcoquere per  
ea quæ status discutiunt, & attenuant, ac siccant, circa uehementem calidi-  
tatem, ab initio morbi. Stercoribus igitur ex uentre per conuenientia infu-  
saprius educitis, infundendum est oleum, in quo coctum est cuminum, aut  
ruta, cum adipe aserino, aut gallinaceo. Aut radicem cucumeris syluestris  
decoctum, cum myrrhæ drach. i. & melle, ac oleo. Sed & oleo sæpe cōmu-  
ni infuso, pituita uistrea coexcreta statim dolorem sedauit. Si uero ob dolo-  
ris uehementiam, etiam infusum retineat, glandula indatur ex melle, cumi-  
no, nitro, rutæ semine sicco. Aut brassicæ caulis probe densus, & muria ma-  
ceratus. Aut brassicæ cinis melle subactus. Aut colocynthis trita cum mel-  
le, & nitro, ac cumino. Sint autem glandulæ digitorum sex, quo musculum  
adstrictorium transgrediantur. Illinatur etiam iedes cyclamini succo, cum

Colica affectio

Colistus

Glandule ues-  
iæ subditiciæ

melle & nitro. Aut centaury cum melle & nitro. Dolor perseverante supra relata infundatur resina terebinthinae unc. i. aut opopanax drach. i. aut galbani drach. iiii. bituminis tantundem, cum nitri drach. i. & aquae unc. i. & olei rutacei quincunces, aut amplius. Irrigationes autem partibus dolentibus adhibeantur ex oleo rutaceo, aut anethino, aut scyonio. Cataplasma sit ex medicamento trispermo, cum cumino, baccis lauri, apij semine. Epithemata sint, & quod ex seminibus constat, & quod ex baccis lauri, & quod ex meliloto paratur, & polyarchium. Insideant autem in decocto foeniculi, nigraei, althaeae, chamamelis, artemisiae, anethi, lauri, & similibus. Sed & in oleum calidum, aut aquam & oleum demittendi sunt. Portiones singulorum & cuminum, aequis portionibus. Aut panax cum aqua, aut castorei & anisi. Aut piperis drach. i. cum aceto mulso. Dolor vero non remittente, medicamentum ex tribus piperis generibus bibendum datur, aut theriae. Sed & sinapismo & dropace utendum est in remissionibus, & balneis naturalibus. A balneis autem aquae potabilis abstineant, nisi ob doloris afflictionem cogantur, quando sane praemisso aliquo ex relatis medicamentis lavare oportet, & iubere ut calorem admittant intra scruidos parietes, inspersis quibusdam nitrosis smegmatibus. Si vero dolor vehemens est, etiam moderate mitigantibus utendum est. Velut est pastillus ex castorio, tum infusus, tum potus, & medicamenta eiusdem generis. Nam vehementia stupefactoria vitanda sunt, ut quae ad breve quidem tempus mitigent, diuturniorum autem affectionem faciunt, eo quod materiam crassefaciunt, & intestini meatus densant. Attenuata vero iam pituita, per hieram amarā ipsos purgamus. Aut per hanc catapotia. Aloes, euphorbij, grani cniidi puri, scammoniae, singulorum aequales partes. Dantur huic scrupuli ii. Vicus autem calidior ac siccior his convenit, ut qui ab initio a cibo abstinent, postea vero etiam acrium esum assument. Porrum igitur his dandum est coctum cum condito, & apium, & asparagus palustris, allium crudum, maxime his qui haec non molestè admittunt. Et ipsum Conditum bibant, & panem ex ipso accipiant. postea vero etiam reliqui boni succi & cooctu faciles cibi ipsis dentur, ita ut vident repletionem & cruditatem. At si fuerit spiritus flatuosus qui dolorem efficit, post infusa, & portiones flatus discutientes, etiam cucurbitae maximae leves ignitae, per totum superiorem ventrem affixae, ad curationem saepe suffecerunt. Si vero inflammatio in intestino sit, uenam in cubiti flexura secabimus. Et si urinae difficultas inualescat, etiam eam quae ad malleolum est secabimus: & relatis auxilijs utemur, exceptis acerbis ac vehementer purgantibus. Verum mitigantibus magis infusis, & cataplasmatibus, & irrigationibus, & demissione in oleum utemur, cucurbitasque etiam his affigemus. Ceratum quoque superiori ventri imponemus, quod habet cereae quincuncem, olei chamamelini sextantem, rosacei sextantem, faryngis fabaceae unc. s. vitellos ouorum v. cum succo seminis lini terito. Vicum autem tenuem & febricitantium ipsis constituimus, usque ad inflammationis solutionem. Quod si ob acres & mordaces doleant humores, infundatur ipsis oleum in quo coctum est foenum graecum, aut althaea, cum simplici adipe recentis anseris aut gallinae. Aut etiam ptisanæ succus cum rosaceo, aut succus seminis lini. Detur ipsis in potu amara ex aloë antidotus. Et balneis utantur aquarum dulcium. Et cibis sorbilibus ex alica, aut ptisana, piscibusque petroselinis. Et in summa totus vicus humidior sit ac frigidior. Abstineant autem ab acerbis omnibus edulij ac pharmacis, & ab irrigationum ac cataplasmatum fomento, uniusque potu, & praesertim veteris. Inualecente vero dolore, etiam sensum stupefacientibus utendum est. Minime enim praeter alij has affectiones laedunt, ut quae tenues & mordaces humores crassefaciunt, & moderate perfrigerent. Porro arbitror etiam eam quae nunc inualuit colicam affectionem, ex talibus humoribus generatam esse, quae ab Italiae quidem regionibus initium coepit, sed & in alijs multis Romanae reipublicae locis grassatur.

Parietes feruidi  
di balnearum

Conditum

Colica affectio  
tempore Pauli

Ata est, pestilenti quadam distributione: in qua plerisque ad morbum comitialē, alijs ad artuum resolutionem, seruatō sensu, quibusdam ad ambo, delapsus contigit. Et qui quidem ad comitiale delapsi sunt plerique perierunt. Qui uero ad resolutionem, plerique seruati sunt, uelut in iudicatione causa translata. Sic igitur aegrotantes medicus quidam in Italia curauit, incredibili quodā ac temerario frigefactorio uictu constituto. Lactucas enim ipsis exhibebat non coctas, frigefaciens ipsas, intrybach similiter supra satietatem edenda, uuas item & mala, & pisces duræ carnis, omniaq; testa interiecta, & pedes bulbos, & bulbos, & similia, non solum potentia, sed & tactu frigida. Vinum uero raro, aliquando tamen dabat, & frigida aqua miscebat. Sed & frigidā aquam, aut etiam poscam frigidam dabat, ab omni alio calido ac medio cibo abstinens. Et plurimos hoc modo, præter omnem opinionem sanauit, & ex his aliquos qui iam ad comitiale, aut resolutionem delabi coepissent.

De uolulo. Cap. XLIIII.

Qum acutissima & dolorosa affectio sit uolulus, habet quoddā sym-  
proma periculo grauius. Nam superati miserima morte pereunt, sicut  
tandem per os reddentes. Conflatur autem affectio ex cruditatibus &  
oburationibus, ubi corrupta permanserint, & ex uenenosis medicamentis,  
& ex intestinorum ad scortum delapsu, & ex inflammatione intestinorum,  
plerumq; colica affectione malū auspiciata. Pueros igitur irrigationibus, ca-  
plasmatis, infusis, glandulis, & fomentis, uelut de colicis dictum est, cura-  
bimus. Adolescentibus autē & in uigore constitutis; uenam secabimus ci-  
tra dilationem, repetita sanguinis detractione. Sin minus, cucurbitas affige-  
mus per totum superiorem uentrem multas & leues. Ad dolentes uero par-  
tes, etiam cum scarificatione. Desiccantur autem & constringantur ipsorum  
artus, & tunc efficaciora infusa adhibeantur, & in oleum calidum demissio-  
nes, antidotiq; ac purgationes, & in summa, omnia ad colicos relata, excep-  
tis his quæ adhibentur ob acres ac mordaces humores eorum dolentibus.  
Mirifice uero facit, etiam si uomant, anethum coctum ac potum. Post portū  
uero, pane in calidam aquam iniecto, statim calida frusta edenda dato. Ci-  
bum uero non continentibus rhoem & cuminum simul trita, in aceti mulsi  
cyathis VI. bibenda dato. Ateos qui ex ueneno accepto uolulum inci-  
derunt, ab aquæ calidæ potu ad uomitum cogere oportet. Habes autem o-  
mnium uenenorum acceptorum notas libro quinto. deinde bibendum de-  
tar oleum calidum, aut iuscula pinguis, ut rursus uomant. post aliquot dies  
etiam theriace detur. Perseuerante uero obturatione; lacte scisso cum modi-  
ca scammonia, aut aloë, aut aliquo purgatorio altum euacuato. Si uero ob  
delapsum intestini in scortum affectio facta est, statim ipsis sursum uergen-  
te figura reclinatis, delapsum intestinum ad inguem retrudemus, & liga-  
mento hoc retinebimus.

De rheum ac uesica affectionibus.

Caput XLV.

De calculo.

Ordinem hunc docendi persequi nos cogit morborum cognatio. Com-  
mune enim est colicis, & lapidem in rhenibus habentibus, ut & ab ini-  
tio alius sit adstricta, & uehementer doleant, & cibum fastidiant, & nō con-  
coquant, & tormina habeant. Proprium uero colicis quidem, ut hæc omnia  
magis intenta fiant: Nephriticis uero minus: Et quod colicis circa dexterā  
lateris mollitudinem magis sint dolores, & ascendant ad stomachum usq;  
& hepar, ac splenem: & quod sterco penitus sit suppressum, ut neq; flatus  
penetrent, & si ad necessitatem ipsum excernant, quod flatuosum sit, simili-  
ter uelut bubuli: & quod aliquando pituita uitrea excernatur, & urina co-  
piofior ac pituitosa reddatur. Nephriticis autē dolor circa ipsos rhenes fie-  
ratus est grauis, instar pali impacti: & testem ē directio dolent, & torpor sce-  
moris ē directio sit, raroq; sua sponte alius excernit, omnino autem infusus  
per clysterem immisissus, flatus & sterco biliosus: Urinæ uero pauca & are-  
nosæ magis redduntur, & meatus urinaris est adstrictus. Hæc sunt calcu-  
lorum

Medicus qui-  
dam temera-  
rius felix

Volulus

Stercus per os  
redditum

Calculus  
rheum

Nephritic

lorum in rhenibus signa, quæ in uiris perfectis magis fiunt. At calculorum in uesica coactio, pueris magis fieri solet. Notæ horum sunt, cruda & subalbida urina cum arenosa subidentia. Fricant assidue ac contrecant pendendum, & attrigunt, & assidue ad urinam reddendam urgentur, & urinae stitilicidium habet. Materialis igitur calculorum generationis causa est crassus ac terreus humor. Efficiciens uero, feruida rhenum aut uesicæ caliditas. Cæterum ad rhenes, atterentibus calculos, & secantibus medicamentis utendum est, absq; hoc ut manifeste calfaciant. Talia autem sunt, asparagorum regionum radix, & rubi radix, & uitrum ustum, & graminis radix, & adianton, & bdellium, radices lauri cortex, althææ semen, cicer nigrum arietinum, lapides spongiarum, acetum scilliticum, phumeon, asarum, carpesia, saxifraga, lion & comestum & potum, cardui radix, erysimon, & prionitis. Balneis etiam assidue utantur, & post balneum statim aliqua ex relatis bibant. Irrigationibus quoq; & cataplasmatis, & fomentis ac infusibus laxatorijs ac mitigatorijs utendum est, ex colicis ipsa transferendo. Compositæ potiones sunt. Rutæ syluestris, maluæ syluestris, & apiij radices coquito in uino, & expressum liquorem aqua temperato, & cyath. ii. bibendos dato. Insuper file uero hoc est. Fructus balsami, lapidis spongiarum, pulegij sicci, seminis maluæ agrestis, singulorum æquas portiones contundito, & cochleariij i. cum uini diluti cyath. ii. dato. Sed & siccatus sanguis hircinus, & cicadæ siccæ sine alis ac pedibus, & lapis iudaicus siue te colithos ex uino mulso, in calido balnei folio dentur, & quæ ex ipsis parantur composita medicamenta. Et posca nephritica & condita ad hoc composita. Quin & troglodytes laudatissimum auxilium existit. Est autem auicula siue passerulus omnium uolucrum minimus, solo regulo excepto. Nam ut paruus sit, illo tamen forlo maior est, & ipsi similis, colore inter cinereum & cum uirore pallidum, tenui rostro præditus, in parietibus maxime ac sepibus degens. Hic totus saepe seruatus, & crudus assidue comestus, & calculos natos per urinam expellit, & de cætero generari uetat. Sed & usti totius usuentis una cum penicinis cinis, totus per se, & cum pipere & folio modico, ex uino mulso potus, idè efficere solet. Cæterum ad dolorum acumen, & uigilias, antidotus sotira, & Philonis, bona sunt pharmaca. Venæ quoq; sectio adhibita sæpe dolorem leuat, uelocem lapidis excretionem faciens. Præseruantia uero à calculi generatione sint, primum boni succi & moderatus cibus, & exercitia. Deinde à leguminum omnis generis, & à frumentaceorum assiduo usu prohibeantur, & à caseo ac lacte, & obsonijs quæ ex ipso parantur. A uino idè nigro, & carniū multitudine. Et in summa, ab omnibus crassi succi cibus abstineant, & à ualde calidis & acribus, hydrogaris inquam, ac conditis, & similibus. Hæc enim non solum nondum generatos lapides cōcrescere prohibent, sed etiam iam generatos atterere & excernere solent. Bibant autem acetum mulsum, cum aliquo ex simplicioribus urinam cientibus, adianton, apiij, graminis decocto. Et post balneum ieiunij, ante uinum, aquam temperatam bibant. Et in medio prandio frigidam insuper sorbeant, si nihil prohibeat. Si uitiatorum humorum copiam simul sentiant, per uenæ sectionem aut purgationem euacuetur. Omnium uero optimum est ad præseruandos calculos, post balneum, prius quàm uinum aut alium cibum capiant, aquam temperatam bibere. Porro uesicæ calculos in pueris, fortioribus auxilijs conficies, quæ ex relatis deliges. Nimum uero aucto lapide, aut etiam iuxta uesicæ collum obturato, catheteris instrumento, aut etiam lapidis extractione utendum est, uelut in chirurgia dicitur.

De inflammatione.

Rhenū aut uesicæ inflammatio

Si rhenū aut uesicæ inflammatio fuerit, quæ & ex feruore loci cum grauitate, & dolore cognoscitur: & quod febriunt, & mente mouentur, & uomunt biliosa meraca, & melere non possunt, & præsertim uesica inflammata: uena statim secetur. Et mitigatoriæ irrigationes, ac cataplasmata ex ruta, & ane-



A anetho, & fœnogræco, & althææ radice adhibeantur. Et per clysteres in-  
fusa ex oleo, papauere, & adipe anserino. In uesica autem & opij obolus di-  
midius, cum myrrha, & croco, & oleo, in sedem immittatur. Aqua etiam  
nulla ipsis præbenda detur, ita ut abstineant à fortibus urinam ciētibus,  
& multo potu, præterquā si acris & biliosus humor in ipsis redundet. Tunc  
enim & multo potu utendum est, & acervatim, ex aliquo urinam cientium  
citra mordacitatē. Bstant item de seminis lini partibus duabus, amyli par-  
te una, cochlearium unum ex aqua. Cucumeris quoq; ac peponis semen ac-  
cipiant. Si uero feruoris sensum circa rhenes percipiant, linteola ipsis ini-  
ciantur ex uino & rosaceo, aut aqua & rosaceo, aut melino. Aut ceratum ex  
cera, & rosaceo, & chamæmelino, aut melino, & utellis ouorum composi-  
tum, cum modico aceto aut polygoni succo. Postea uero etiam emplastro  
ex succis, cum chamæmelino utendum est. Abstinentium autem à ualde ca-  
lids, propter mutationem in pus: & à ualde frigidis. Nam ab his rhenes fa-  
cile in scirrhum indurantur. A balneis quoq; inflammatione instante absti-  
neant, & uisū febricitantium & inflammationem arcente utantur.

De abscessu & ulceratione uenarum partium.

Dolores circa laterum mollitudines, & horrores inæquales, & febres in-  
ordinate, abscessum in rhenibus significant. Verum circa uesicam absces-  
sum, supra relata indicat etiam dolor circa locum. Affectum autem rhenem  
comperies ex eo quod in sanum latus decumbens homo, ex opposito do-  
let, uelut rhenem dependente. In quibus infestibus ex aqua & oleo utendum  
est, & cataplasmatris ex polline, oleo, ac resina. Aut ex erui farina cum mel-  
le: Aut ex nasturtio, aut simo columbino, cum caricis. At uero pus per uri-  
nas excretum, abscessus ruptionem, & ulcus in parte esse indicat. Quando  
quidem uero etiam absq; abscessu partes uenarum ulcerantur, ob ualis rupti-  
onem, aut corrosionem ex materia acris, aut ex lapidis deraſione, distinguē-  
da est ulceratio in rhenibus, ab ea quæ in uesica est, aut iuxta uenarum me-  
atus, hoc modo. Rhenibus exulceratis circa lumbos dolent cum grauitate,  
& circa impedimentum urinam emittunt, & pus urinis ammixtum reperit-  
ur, carnis particulis in ipsis innatantibus. Vesica uero ulcerata, pectinē  
& inum uentrem uehementer dolent, & ægre urinam eijciunt, & pus post  
missionem deorsum subſidet, & squamæ in ipso graueolentes aut lamina-  
re feruntur. furfuraceæ uero subſidentia scabiosam esse uesicam significat.  
At meatibus uenarum ulceratis, & puris ammixtio medio quodā modo se  
habet, & pilis similia magis in urinis feruntur, & dolor in medio loco inter  
rhenem ac uesicam fit. Si uero pus aut sanguis excernatur, etiam citra urina-  
rum emissionem, nullius relatorum, sed pudendi ulceratio indicatur. Qui  
igitur partes uenarum exulceratas habent, aquam mulsam aut fœnigræci  
decoctum præbiant cum melle: aut cucumeris semen cum passo. Qui ue-  
ro pus mingunt, eis detur armenica bolus, aut ferularum uſtarū cinis, quan-  
tum tribus digitis præhendi potest, cum passo. Lactis quoq; potus magno-  
pete his prodest. Composita uero hæc. Seminis lini, seminis cucumeris, tra-  
gacanthæ singulorum drach. ii. in pastillos efforma. Aliud. Nucleis pi-  
næ nucleos xx. seminis cucumeris fatiui grana xl. amyli drach. i. Excip-  
pe duabus heminis decocti nardi ac seminis apij. Archigenes autem in epi-  
stola ad Atticum, ad urinæ difficultatem urgentem se accepisse ait, papau-  
ris albi toſti drach. i. inspersam in decoctum iunci rotundi odorati, aut cala-  
mi, aut glycyrrhizæ. Vlcerosos autem dolores eximit hoc. Seminis cucu-  
meris purgati grana xxx. nucleos pineos xii. amygdalas amaras dealba-  
tas xxxv. croci quantum ad colorem satis est. Ieiunus accipiat quotidie  
cum lacte, aut uino protropo. Mitius autem fiet, si pro nucleis pineis, mal-  
tiz semen pari mensura accipiat. Sanare uero potest inquit, ulcerationes in  
uesica cyphi, & cyphiformes antidoti. Ego uero in uetustioribus hoc utēs,  
nō opus habui uariatione. Chamædryos, chamæpityos, singulorū drach.

Uenarum  
partium ul-  
ceratio

Protropum  
uinum

xxxiij. asari, piperis albi, singulorū drach. vii. cinamomi drach. i. Ieiunū me quantum eius fieri potest triti cochlearia duo praebeo, ex cretico passo. Si uero febricit, aquae cyath. iij. Quod si morsus ulcerosus adsit, etiam amyli cochlear. ii. & seminis cucumeris grana xv. adiiciens, quod expeto alle quor. Atq; haec ex Archigene. Sed & ex physalide medicamenta, & antidotus ex semine maluae, & ex bellarijs confans antidotus comoda est. Ad intercapedinem ani ac scroti, & ad peccinē imponantur cerata ex oesypo loto, butyro, adipe anserino ac styrace. In uesicam uero infundatur per parui clysterem aqua mulsā aquosissima, aut lac cum paucissimo melle, aut cū cucumeris semine. Aut oui candidum cum pompholyge, aut aliquo ex relictis medicamentis. Ulcere uero pascendo proserpente, pitillus ex charta immittatur, aut bithynus. Et cataplasma ex palmulis, uua passa, cum galla, acacia, hypocisthīde, alumine imponatur.

*De sanguinis ex rhenibus eruptione.*

*Sanguis e rhenibus eruptio*

Rhenes debiles saepe urinam retinere nō possunt, sed ampliores existentes, aliquid sanguinis ex uena emittunt, simulq; alias quasdam crassitudines. Erumpit etiam sanguis saepe ex rhenibus per circuitum, quemadmodum in haemorrhoidibus. Euacuati uero alleuantur. In his nihil cito inturbare oportet, si sanguis rursus sistatur. Si uero perseueret, uena in cubito secetur, & medicamenta ad sanguinem spuentes, & alias sanguinis eruptiones destinata, etiam ad rhenes ac uesicā, unde sanguis erumpit, in usum assumantur. Maxime uero symphyti radix, & tragacantha uino macerata ipsis detur, & polygoni ac plantaginis succus cum posca. Aut amygdalae amarae cū passo. Aut hoc caluminis scissi drach. i. tragacanthae drach. ii. gummi obol. v. Excipe passo. Imponatur autē cruda ordeacea farina cum posca & rosaceo. Aut cataplasma ex palmulis, & pane siligineo, cum acacia, aut hypocisthīde coctis in uino adstringente, aut posca. At sanguine ex uesica erumpente, etiam cucurbitis ad laterum mollitudines ac coxas affixis utemur. Dinoscitur autem affecta pars, dolore circa locum, aut quod ammixtus est urinae sanguis, aut nō, uelut de pure dictum est. Si uero grumosis factus est sanguis in uesica, cognosces quidem hoc, ex eo quod acruatim suppressa est urina post sanguinis mictionem: & quod uibices quidam sanguinis, uelut par est, exeunt, aut cruentae humiditates. Dato autem artemisia decoctū bibendum. Et elichrysi, aut conyzae, aut raphani semē: aut silphij succū, aut cyrenaicum, aut apij succū, singula aceto diluta: aut leporis coagulum, aut hinnuli aut hoedi, in aceto mulso: aut lixiuium cum oleo. Et foris spongia muria aut lixiuiū calido imbuta imponatur. Si uero non soluat, intercapedo ani ac scroti secetur, uelut in calculosis, & grumis sanguinis ablati, congrua curatio adhibeatur.

*De duricia rhenum.*

*Duricia rhenum*

Quae uero duricies circa rhenes sunt, dolores quidem non amplius exhibent, uerum uidentur ipsis uelut ex laterum mollitudinibus pendere. Et coxae quidem ipsis stupore torpent. pedum uero impotentes sunt. Mingunt pauca, toto uero corporis habitu similes sunt his qui aqua inter curem laborant. Hos igitur mollire oportet ceratis, & malagmatis, frictionibusq; ac foetis. & urinam cientia exhibere, & uentrem infuso per clysterē subleuare.

*De diabete.*

*Diabetes Diplosos*

Diabetes uelox est eorum quae bibuntur transitus, ut quae talia minguntur, qualia pota sunt. Quapropter etiam immodicē sitiūt, unde & diplacos appellata est affectio, quae conflat ubi debilis est facultas retentrix rhenis, fortis autem magis attractrix, quae totum corpus humore priuat ob immodicam caliditatem. Aduersus hanc igitur instantes, cibos plures & agre commutabiles, & non adeo humectos dabimus, uelut est alica cum rosato, aut rhodomelo, aut hydromelo, aut uino non uetere, aut alias calido aliquo. Exoleribus intyba, seridem, lactucas. Ex piscibus petrosos. Et pedes ac uulues

*Rosatum*

suillas, pira item ac poma, & mala punica. Bibant autem frigidam. Præbiant etiam polygoni succum, & helenium in uino nigro, & palmarum ac myrti baccarum cremore. Cataplasma adhibeatur præcordio ac rhenibus, ex polenta in aceto & rosaceo. Item ex folijs uitis, coryledone, helxine, ac portulaca. Sudores ipsius excitentur, & uomitus, ex aqua frigide potu. Et ab omnibus urinæ cientibus abstinēat. Neque absurdū est ab initio uenā secare.

*De urinae stititidii cunctis reddendæ difficultate.*

Si neque inflammatio, neque calculus, neque aliud quicquam ex relatis adest, & acris fuerit urina, & totus habitus, aut etiam reliqua signa, bilem ostendunt, ob hanc sanè aut urinæ difficultas, aut eius stititidium consistit. Et oportet alterantibus ac temperantibus hanc uti, pisanæ succo, pisetibus, balneis, & uictu congruo, ita ut ab acris abstinēamus, & à uino ac exercitijs, & ab iracundia, & tarda cibi acceptione. Si uero urinarum tenuitas, & albedo, ac reliqua signa, frigidam indicant intemperiem, uinum calidū cōueniet, & condita, & urinam cientia medicamenta ac cibi. Et infessus calidiores. Si uero supra albedinem etiam crassiores appareant urinæ, pstititium humorem esse opinandum est, qui uesicæ collum obturauit: & oportet aceto mulso uti, & hyssopo, ac pulegio, aut origano, aut thymo, aut silphio, coctis in aqua mulsa: & irrigationibus calidioribus. Siue autē humor crassus, siue lapis, siue grumus, aut huiusmodi quiddam obstructionē induxit, & urinarum transitum impedit, catheterem adhibere oportet, si non inflammatio partis adstet. At uero urinæ in febribus difficultatem sanat irrigatio extutaceo, aut anethino, aut ueteri oleo. Si adstricta sit aluus, sceni græci aut malux decoctum infundatur. Insideantq; etiam hi in aquam & oleum, aut in decoctum quoddam ex relatis speciebus, cum oleo. Ceratum uero ipsius conueniet hoc. Malux syluestris radices in oleo sicyonio cū modica aqua coquantur, donec torrefiant, & ipsæ quidem abijciuntur, ad oleum uero ammisceatur rutæ succus quarta parte, & ceræ, & castorei quod satis est.

Deresoluta uesica, ad quam aliquando urinæ difficultas, aliquando inuolutaria urinae excretio sequitur, in tractatione de resolutione antea dictū est.

*De perurinentibus stratum.*

Laxatio musculi circa uesicæ collum, hanc affectionem inducit. Quapropter pueris maxime contingere solet. In communi igitur corroborantibus quàm maxime utendum est, uelut uinum ac oleum calidum est, ac consimilia, ita ut uitemus uehementer frigefactentia, magis uero concalefaciamus ipsos, quantum etus fieri potest. Nam perfrigeratio uelut resolutionis imaginem repræsentat. Naturaliter autem hæc efficacia sunt. Galli guttur uisum ieiuno bibendū dato ex aqua calida. Aut leucanthemi flores similiter. Aut leporis testem derafum in uinum odoratum bibendum dato. Aut calamintham & myrrham ante cænam bibenda dato. Aut rutæ syluestris semen totum bibendum dato ad triduum. Illinatur etiam pudendum ipsius cimoto terra cum succo perdicidis.

*De hepatis affectionibus. Cap. XLVI.*

Quum uarias sustineat hepar affectiones: nam & debilitate, & inflamatione, & igne sacro, & induratis scirrhis, & abscessibus, & ulceribus, & obturationibus corripitur: primum de debilitate ipsius dicendum est, à qua propriè hepaticos uocare affectos solent. Si igitur in succum quidem commutata, uerum liquidiora euacuentur alui excrementa, distributione ad hepar defectuosius, aut omnino non contingente, si ab affectione immunis est uenter, attractricem hepatis facultatem debilem esse opinandum est. Si uero similia loturæ carniū recens macerata, alteratricem & sanguificatricem appellatam. At si ob calidam debilem fuerit intemperiem, temporis progressu recrementum seculentius apparet, & ualde graueolens, & bilis abunde colorata crassa. Iam uero etiam essentia hepatis cum ipsa colliguescente, & totum corpus colliguescit, & februnt, & cibum fastidiunt, & bilem

Urinae stititidium  
Urinae difficultas

Vesicæ resoluta

Perurinentes stratum

Naturalia auxilia

Hepatis uariæ affectiones

Hepaticol

bilem uomunt. Si uero frigida intemperies est, neq; assidua, neq; multae, ac  
 cretiones sūt. Diurna enim est affectio, & per aliquos dies uenter magis  
 acuatim erumpet, uerum minus graue olentia erunt excrementa, ueluti  
 mus sanguinis crassi propinquus atrae bili. Quin & plures & uariationes  
 colores, frigidam intemperiem indicant, & febris ipsis languida apparet,  
 & facies collapsa, & magis cibos appetunt. Vtra uero harum intemperie-  
 rū fuerit, si sicca fuerit ipsi adiuncta, sicciora apparent excrementa, & siliunt  
 magis. Si uero humida, liquidiora ac plura, & minus siliūt. Porro si inflam-  
 matum est hepar, dolor in communi omnibus adest in dextro praecordio,  
 transiens sursum ad clauiculā usq; deorsum ad spurias usq; costas, & febris  
 acuta, & tussis sicca, & sitis, & cibi inappetentia, & spirandi difficultas, &  
 lingua primū quidem rubicunda apparet. postea uero nigra. uomuntq; bi-  
 lem & alius suppressa est. Quum autem consimilia quodam modo sint si-  
 gna etiam in pleuritidis, differentiam ipsorum in capite de pleuritide dixi-  
 mus. At si erysipelas siue ignis sacer constitit in hepate, & inflammatio-  
 nis ardor extenditur, & exuruntur, & marcor succedit. Priuatim uero simis  
 hepatis partibus inflammatis, nausea, uomitibus, ciborum auersionibus, flamm  
 mei ardores, & animi deliquia intenduntur. Et saepe perfrigerantur, ut aquae  
 praeterfusiones hinc initium sumant. Gibbis uero ipsius inflammatis, ad re-  
 liqua relata, etiam tumor manifestus certa descriptione ad uisum ac tactum  
 expositus adest. Atq; haec quidem si uehementis & magna est inflammatio. Si  
 uero obscura fuerit, subebimus aegrum ualde respirare: & si circa dextrum  
 praecordium dolere se dixerit, moderatam hepatis inflammationē esse cen-  
 sendum est. Si uero iuxta incumbentium musculorum situm, oblongus in-  
 flammationis tumor appareat, nullo ex relatis praesente, illos ipsos inflam-  
 matos esse cognoscimus. Grauitatis autem cum distentione ac dolore sen-  
 sus in dextro praecordio, citra tumorem ac febrem, obturationem uenarum  
 significat, qua parte uenae in porta & simis hepatis partibus, cum his quae  
 in gibbis sunt committuntur. Proinde si in abscessum inflammatio uertatur,  
 & dolor, & distensio ipsis augetur, & rigores praeter rationem accedunt, &  
 in sinistram laus decumbere nō possunt hepate magis dolentes. Rupto au-  
 tem abscessu, aut per urinas, aut per uentrem, acruata puris excretio con-  
 tingit. Si uero ad scirrhi duram affectionē tumor transmutetur, dolores qui  
 dem minuantur, tumor autem cum duricia manifestus est. Corpora uero  
 circumfusa attenuantur. progressu uero temporis difficilis fit cognitio. Nam  
 aqua inter cutem accedit, & totum praecordium ab humiditate contegitur.  
 Ad calidam igitur hepatis intemperiem utendum est perfrigerantibus ac  
 corroborantibus uiscus moderatē, qualis est seris, & cichorium, quandoq;  
 crudum comestum, quandoq; coctum cum coriandro. Decoctū item ipsius  
 potum, & succus, & ipsum adeo siccum aquae mulsae inspersum, & ad calid-  
 as & ad frigidas hepatis intemperies facit. Intybum autem troximum ap-  
 pellatum, & sonchus, ex consimilibus sunt. facit & citrii succi cyathus ex  
 aqua mulsā. & filicis succus similiter. Si uero etiam cum moderata obtur-  
 atione intemperies fiat, cum uino aliquo tenui & urinam cientē, illa dato. Ca-  
 rapotū uero sumitur hoc. Cichorii drach. iiii, radicis chamepityos drach.  
 iiii. Excipe melle cocto, & nucis ponticae magnitudine praebē, & aquam  
 calidam insuper sorbeat. Et ex opio achyoscyami semine facta ipsis praebi-  
 benda dentur, & ipsa Philonis antidotus. In quibus autem calor intēditur,  
 etiam rosaceum optimum aut melinum ipsis bibendum dato. Cibum uero  
 pitisanē succum, aut alicam, cum hydrososato accipiant. & panem similiter  
 ex aqua, cum aliqua eiusmodi iucunda potione. Et in summa, cibos moder-  
 atē perfrigerantes citra obturationem sumant, a uino in totum abstinē-  
 tes, praeterquam si ob aliam causam, uelut est stomachi debilitas, urantur, &  
 tunc tenuē quoddam, & parum aquae ferens, aquosum ipsis datur. Sed & in-  
 gnem sacrum in hepate similiter curare oportet. At uero si frigida est intem-  
 peries

Hepar inflam-  
 matum

Hepatis ery-  
 sipelas

Intybum trox-  
 imum

Hydrososati

peries, per cōtraria procedendum est. Panis igitur ipsis cum uino detur, & his aut ter cocta brassica. Castaneas item gustent, & uuas passas, & de gallinis quod satis est, & uinum bibant. Præbibendum uero ipsis detur eupatorium, aut asarum, & medicamentum ex pipere, & ex descriptis antea ad cœliacos ac dysentericos commoda deligantur. At cōfectiones cyphiformes appellatæ, ad calidas quidem intemperaturas omnino non conueniunt, nisi modicus quidam calor cum largiore humiditate fiat: Verum ad frigidas optima sunt auxilia, & magis si cum humiditate aut obturatione hepatis fiant. Si uero à crassis ac uiscosis humoribus obturatio fiat, myacantha, & maxime ipsius fructus detur, & radicis lauri cortex; & eupatorium ex aceto mulso, aut lupinorum amarorum decocto, cum ruta & pipere, facit & farina lupinorum pota, & radicis capparis partes 11. costi pars 1. cum uino, & medicamentum ex cacano; ad crassorum ac uiscosorum humorum obturationes, iris item, & pistacorum fructus ac cortex, & marrubium, & amygdalæ amaræ, & pastillus ex ipsis, draconij quoq; ac ari radix, & agaricum, & acetum scilliticum, & acetum mulsum. Hepar autem lupi siccum tritum cochlearij mensura datum, omnibus hepatis affectionibus conducit, cum uino dulci. Quin & Theodoretus antidotus optimū est medicamentū, & in obturationibus hepatis, & in scirrhis induratis, & in diuturnis inflammationibus, in colicis itē, ac morbo regio. Similiter & picea ex aceto mulso. Cibi porro his dandi sunt calidiores & ab obturatione liberantes, uelut est porrum ex aceto mulso, & palustris asparagus, & capparis similiter. Sed & reliqua obsonia cū aliquo ex calfacientibus ac aperiendi uim habentibus condimentis cocta. Et uinum sit tenue ac uetus, ita ut crassi succi omnia uitemus, & balnea assidua, & maxime post cibum. Diuturna uero euadente affectione, etiam uenæ sectionem ac purgationem assumemus, si nihil prohibeat. Inflammato uero hepate citra dilationem uena secetur de cubito dextero, & multus sanguis detrahatur, uiribus sufficientibus. forinsecus autem cataplasma imponatur uisceri, ex farina ordeacea, scenogræco, semine lini, cum palmulis, aut malis cotoneis, & flore meliloti, & absinthio, ac chamædino. In uniuersum ita ut mollitorijs adstringētia ammiscantur. Epi themata uero sint, Nili, & odoratum, & Philagrianum, & Apollaphanis, & ex melilotis, & nufise, copton appellatum. Ad maximas autem inflammationes ualde multæ experientiæ hoc est. comæ absinthij, nardi celticæ, asari, croci, singulorum unc. i. iridis, myrrhæ, styracis, bdellij, ammoniaci thymiamatis, singulorum sextantem, medullæ uitulinæ trientem, cerati lentij, scini lib. iiii. Dandum etiam ipsis acetum mulsum, & simplicia auxilia, uelut est asarum, nardus celtica aut Indica, iuncus rotundus odoratus, petroselinum. Et uentrem irritare oportet per urticam & mercurialem, cocta in cibo accepta. In declinationibus etiam epithymū ac polypodium dentur in aqua mulla. per clysterem quoq; aluus euacuetur, in principio ex aqua mulla infusa cum sale aut nitro. Verū declinatione contingente, misce hyssopum, aut origanum, aut cnicum, aut centauryum, & colocynthidem. Et in summis, simæ hepatis partes per uentrem, gibbæ per urinas expurgantur. Cibus uero his detur prisanæ succus, in quo apium coctū est. Quod si inflammationi sacri ignis speciem præferat, curationem antea diximus. Si uero abscessus fiat, ruptionem eius adiuuabimus cataplasmate ex trispermio, cū resina, manna thuris, pice, althææ radicibus, simo columbino, stercore caprino, præbibendum uero detur decoctū polij, fumarie circa sepes nascentis ad tertiam redactum. Item thlaspi decoctum, aut eichorij, & radicis chamædyos. Ruptione autem facta aqua mulla, & quæ ad ulceratos rhenes relata sunt. forinsecus emplastrum Monastæ, & reliqua mollitoria, & lœsum imponatur, aut quod ex salicibus constat. At si in scirrhum induratum est hepar, modica curationis spes est, ad aquam inter cutē affectione translatabente, aut tamen ad mollitoria ammiscenda sunt, ammoniacū, bdellium, medul-

Ex cacano medicamentum

Lupi hepar

Hepatis inflammatio

Copton medicamentum

Hepar induratum

la, & adipēs, & quæ his parem uim habent. Bibenda uero dentur quæ ab obturatione liberant & extergunt ipsum uiscus, uelut est piper, urinæ ciemtia, & calculos atterentia, cum his quæ paulo ante ad hepatis obturationem relata sunt, ciborum quoque esu convenienter exhibito.

De malo habitu. Cap. XLVII.

Habitus malus

**P**Rincipium affectionis hydropicorum malum habitum uocare consuevit. Curare uero ipsum oportet uenæ sectione, si nihil prohibeat, partita sanguinis detractio, ad tertium usque ac quartum diem faciendo detractio. Evacuandi autem maxime sunt qui ob hæmorrhoidum, aut mensium purgationis suppressionem, in affectionem collapsi sunt: quem admodum qui ob plenitudinem humorum, à uenæ sectione abstinere debent, omnino autem purgandi sunt per hieram ex colocynthide. Vicius tenuis sit & refecatorius. Et naturalium aquarum usus assumatur, aluminosarum ac nitrosarum magis. deinde sulphurentiarum. Reliquum uero balneum ex longioribus intervallis assumant, & uariis modis se exerceant, maxime per iatraliptas, unctionis doctos medicos. postea uero etiam ueratro utantur. Mirifice ipsis prodest & absinthij præpotatio, & sinapismi, & dropaces. Si uero ad hydropem affectio delabatur, ad hydropicorum curationem deducatur, iuxta modum qui referetur.

De aqua inter cutem. Cap. XLVIII.

Aqua inter cutem

**H**EPATE uehementer perfrigerato, quandoque primaria affectione, aut inflammato, aut in scirrhum indurato, aut alio quopiam modo affecto: quandoque per consensum cum alijs partibus, sanguificationis successus non contingit, & uocatur affectio Aqua intercus. In qua aliquando flatus copia cum paucissima humiditate coaceruatur, inter membranam peritonæi appellatam, ac intestina, adeo ut si uerberetur superior uenter, insit tympani sonitum edat. Vnde etiam tympanites hydrops uocatur, conflatu ab inflatione circa stomachum, & uentrem, & colon, & à febris diuturnis: quandoque uero etià à duricia peritonæi membranæ, aut uteri in mulieribus, aut scirrho indurati. Aliquando uero uiscerum humoris copia cum paucissimo flatu, in iisdem locis coaceruatur, uelut in utro quodam comprehensa. Vnde affectio Ascites hydrops nominatur, conflatu & ipse ex relatis causis: plerumque uero à duricia & scirrho, circa splenem & hepar, & à diuturnis circa intestina fluxionibus, in quibus uentrem in tumorem eleuari contingit, reliquum autem corpus alimentum non sentiens consumit. Quandoque uero etiam per totam corporis molem frigidior ac pituitosior sanguis continetur, qui interdum ab hepate talis affertur, interdum etiam omni corporis carne uelut exaquescente generatur, adeo ut albu ac pituitosum appareat corpus, mortuo simile, & uocatur Leucophlegmatias, hydrops sub carne, aut intercus, conflatu à longis febribus, & malo stomachi habitu, & diuturnis hæmorrhoidibus suppressis, & à fluxu multebri, & spirandi difficultate, & uigilijs præter rationem obortis, & ab alijs his similibus causis. Curantes igitur ipsos in communi quidem ab euacuatione initium facimus. Verum in ascite ac tympanite, per medicamentorum aquam ducentium exhibitio nem. In intercute uero, per uenæ sectionem, maxime si ob hæmorrhoidum aut menstruæ purgationis suppressionem conflatu fuerit affectio, nisi dum in malo habitu constituti fuerint uenæ sectionem præmiserint. Et tunc igitur uelut in malo corporis habitu euacuationem partiri oportet. Deinde bubuli bouis armentarii sterces siccam exactè tritum, in posca aut aceto mulso coquito, & sulphuris quarta parte inspersa, toti uentris capacitati imponito. Aut caprinum sterces, in urina pueri aut capræ, ad strigenti spissitudine redactum impone. Hæc per uentrem summe ipsos purgant. Quin & ex fermento cataplasmatas, & ex caricis, & caletæ, & nitro, & iride, & nasturtio, & sulphure uiuo, & ammoniaco, laurique bacis ac staphide syluestri, & syluestrium columbarum stercore, aut omnibus aut quibusdam ex his assum-

Intercutio

Tympanites

Ascites

Leucophlegmatias

Leucophlegmatias

Leucophlegmatias

ptis, cum

Apis, cum aceto mulso utendum est. post hæc epithema spongiola appella-  
 tum, ex caprino stercore, mirificæ humiditatem euacuat, tum per obscuros  
 meatus, tum per uentrem, postea uero resiccantia emplastra imponantur, id  
 quod ex salicibus constat, icessu, tonforis, ex baccis lauri: aut epithema po-  
 lyarchium, aut ex seminibus. Sed & hoc mirum in modum efficax est. Ex  
 profundo enim abripit humiditatem. Lapidis pyritæ drach. XII. sulphu-  
 ris uulgi drach. XI. ammoniaci thymiamatis drach. XII. cumini drac. XVI  
 niri drach. XI. Excipe modica cera ac terebinthina, & pelli indurata per to-  
 tum uentrem impone. Præbibenda uero ipsis detur sambuci radix in uino  
 cocta. Aut cucumerem sylvæ in uino austero maceratum ad triduum  
 dato, ita ut de uino cyathum unum bibat, additione quotidie facta usque ad  
 cyathos III. Multæ uero mixturæ hoc est. Balsami, nardi, cassiæ, cumini, gly-  
 cyrrhizæ, hyperici, iunci rotundi odorati, asati, dauci, amomi, smyrnii, per-  
 troelinii, calami aromatici, piperis, seselis, spondylii, singulorum æquales  
 partes. facit & unumquodque ex his per se. Similiter etiam omnia urinam ci-  
 entia. Citra grauitatem uero urinam ciet scilla assata cum melle trita, & ue-  
 lutelegma delingenda exhibita. Potest etiam aquis quæ bibuntur incoqui.  
 Bonum est & hoc. Internæ scillæ partis lib. II. in uini austeri sextariis III.  
 ad tertias coquito, & de uino bibendum dato quotidie, initio à mystro fa-  
 cio usque ad unciam unam. Optimum est & hoc ad ciendam urinam. Alumi-  
 nis liquidi magnitudinē fabæ aqua diluito, & per linteum excolato, & ad  
 triduum, aut alternis diebus bibendum dato. Conuenit etiam his pica ex  
 aceto mulso, & antidotus Theodoretus, & ex amaris amygdalis pastillus.  
 Caterum aqua ducentia plura sunt, experimento uero cognita hæc. Gra-  
 na cnidia XL. aut L. aut lathyrides XX. uel XXX. Aut euphorbii siliquæ  
 V. aut VII. Aut squamæ aris drach. II. aut III. Excipiuntur micis panis, &  
 in catapotia efformantur. Aut corticis radices sambuci succus potus cum  
 condito. Aut foliorum chamelææ, & squamæ aris, & anisi, singulorum pa-  
 res partes dato ex aqua, ab initio quidem drach. I. interposito autem inter-  
 uallo etiam II. & plures. Sed & hæc catapotia admiranda sunt. Aloës, eu-  
 phorbii, grani cnidii, singulorum unc. I. Rhei unc. s. excipe brassicæ succo;  
 & catapotia efforma. Dato de his siliquas VII. aut IX. Quin & antidotus  
 ex charyophyllo mirificæ aquam ducit. Sed & ut uinum aquam ducēs ipsis  
 demus conandum est. Est autem optimum hoc. Scille quadrantem, seminis  
 apii, capparis radices corticis, piperis, singulorum drach. IIII. grani cnidii  
 decorticati drach. I. folij malabathri pilulas II. Vini optimi heminas XII:  
 mellis crudi lib. VI. coniusa ac cribrata uino macerantur, scilla uero simul  
 conteritur. Dantur huc cyath. III. At post humoris euacuationem etiam  
 theriaca utendum est. Bubuli quoque stercore usti cochlearij mensura, quo-  
 tidie ex uino pota magnopere prodest. Insusis etiam per clysterem utendū  
 est, nisi alius sua sponte liquida egerat. Tunc enim magis resiccare ipsam  
 conuenit. Porro in mulieribus hydropicis etiam pessum hoc subditiū ad  
 uulnam utendū est. Anisi, cardamomi, cumini, niri, aristolochiæ, fœnigre-  
 ci, pulegii, sicuum internæ partis, singulorum pares portiones, fusino exce-  
 pta apponantur. post hæc etiam naturalibus balneis utendum est perseue-  
 rant, & arenæ ingestione, ab alijs uero balneis abstineant. Et ubi lauerint,  
 in balneo utantur inspergionibus ex nitro, sale, sinapi, calce, ac similibus. At-  
 que hæc quidem etiam citra balneum commoda sunt, si sicca cum oleo uen-  
 tri affricentur. At in hydropse subter curæ etiam alijs partibus se exercent,  
 quantum eius fieri potest, & sicca frictione in sole utantur. Sed & reliquus  
 uicius scior assumatur. Salsamenta igitur edant, & sinapi, & allium, & ex  
 uolucris syluestres ac siccas. Et ex oleribus asparagum, gingidium, por-  
 rum, sinapi, caucalidas, & reliqua syluestria. Et salem theriacum aut iambli-  
 chi obsonijs adspargant. Vinoque utantur, ueteri, tenui, urinam ciēte: & si  
 adsit, mari mixto, ita ut ab omni largiore potu abstineant, & ab aqua in to-

Spongiola  
 epithema

Aquæ du-  
 centia

Folij malaba-  
 thri pilule

Pessum uulue  
 subditiū

Arenæ in-  
 gestio

tum. Si uero cū febre consistat hydrops, ab omnibus calidioribus & acrioribus edulijis ac auxilijs abstinentum est. Verum mixtim his utendum, aduersus id quod urget insiliendo. Ceterum in tympanite hydrope, & purgatoria, & quæ totum corpus colliquat tollantur, & quæ efficacius urinā ciunt. Quæ uero flatus attenuare ac discutere possunt, intrinsecus ac extrinsecus utenda dentur. Et cucurbitæ leues assidue toti uentri affigantur. Qui uero hydropem ascitem habent, si non relatis cesserit auxilijs, ad perpunctionem deducantur, quæ nulli alij hydropi conuenit.

De splene.

Cap. XLIX.

Splenis morbi

**Q**Uum splen ab hepate trahere soleat atrabiliarium humorem, qui uelut sanguinis fex existit, si quidem attractoria huius uis debilis fuerit, aut obturatus meatus, per quē prius illum traxit, splen niger conflat, dum sanguis impurus per totum corpus fertur. Verū si quidem grauitas, aut distentio fuerit circa splenem, aut etiam dolor, obturatio indicatur. Si uero nihil horum, attractoriæ facultatis debilitas. Vomitus autem atræ bilis, absq; febre & alia malignitate contingens, retentricem splenis facultatem debile esse indicat. Expulsorie uero ipsius facultatis debilitas, inappetentiā inducet, dum non amplius atrabiliarium incrementum ad os uentris affertur, appetentiāq; excitat. Quod si atrabiliarium humor in ipso splene obturatur, primum quidem inflammatio huius sit, quam & seruo, & dolor, & tensio indicat. postea uero etiam in scirrhum induratur, ubi seruo quidem ac dolor cessauit, manet autem tumor ac duricia. His igitur & os graueolens sit, & gingiuarum corroditur, & ulcera in cruribus absq; cicatrice manent. In quibus hepate coactio, uelut diximus, hydrops oboritur. Intemperies inque ipsius similiter uelut hepatis curabimus. Inflammatione uero præsentē, uena de sinistro cubito secetur, aut circa summam manum, eo quod ex longiore distantia reuulsio fiat, aut etiam ob naturalem quandam cognationem.

Oris graueolentia ex splene

Splen inflam-matus

Deinde imponantur cataplasmata attenuantia citra manifestam caliditatem, ita ut etiam nūc aliqua adstringentia ammiscamus. Talis autem est ex iua natura salis flos appellatus. Est & hoc cataplasma admirandum. Foeniculi trientem, farinæ ordeaceæ, nasturtij, singulorum unciam i. sicum pinguium lib. i. herbæ uerbenacæ siccae unc. i. sicus aceto acerrimo macerare oportet, & cum alijs prius contulis coquere, & postea rursus coquere. Aut sterco caprinum cum cruda ordeacea farina in posca coctū imposito. Habeat autem si uoles, etiam salis florem. Vbi uero prius cyprino cum aceto modico foueris, utere malagmatis primū simplicioribus, quale est hoc. Cerae sesquibram, adipis taurini lib. i. nitri quadrantem, terebinthinæ, seminis uiticis, corticis radicis capparis, singulorum quincuncem, coctis quæ liuari possunt sicca inspergito. Sed & Nili malagma optimum est. Si uero inflammatio in scirrhum delabatur, fortioribus utendum est, ut etiam cantharinent, quale est quod ex stercore caprino paratur, & Citrinum, & Machæionis, & Tonforis, & quod ex lauri baccis constat, & quod ex salicibus. Hoc uero etiam ipse cum successu expertus sum. Auripigmenti sextantem, sandarachæ sextantem, ceræ, terebinthinæ, singulorum lib. i. picis siccae lib. i. galbani unc. i. opopanax unc. i. corticis radicis capparis, myrobalani, singulorum trientem, ammoniaci thymiamatis sexuncem, nardini aut cyprini quadrantem. Sed & ammoniacum cum aceto illitū spleni saepe profuit. Itemq; potum scrupulorum III. aut IIII. pondere, cum castorei scrupulo i. in balnei solio, ubi caricas præmanducarunt ac expuerunt. Aut ammoniaci partem i. castorei partem i. dato drach. i. Hæc etiam in scirrhum induratis profunt, quemadmodū etiam capparis cortex aceto tritus ac impositus: qui etiam bibitur cum aceto aut aceto mulso, & crassos ac uiscosos humores euacuat: quandoq; uero etiam sanguinem. Salicis quoq; cortex similiter illinitur. Facit & cinis ex officina fabrilis, cum cruda ordeacea farina impositus ex aceto mulso. Et centaurei succus forinsecus impositus, & potus.



**A** potus. Et lupinorum amarorum decoctum, cum ruta & pipere potum, & farina ipsorum pro cataplasmate imposita. Et aqua in qua sæpe ferrum extinctum est, febrilentibus per se data cyathorum III. mensura, nō febrilentibus cum uini & acetī cyath. I. Aut rumicis syluestris radicis cum scilla obol. III. Aut chamaedryos aut serpilli acetabulum, omnia cum aceto, aut aceto mulso. Aut anagallidis ceruleum florem habentis succi obol. II. cum posca bibendos dato. Aut acetum scilliticum, aut acetum mullum. Compoluta uero hæc. Radicis panacis, ammoniaci thymiamatis, corticis radicis capparis, herbarum lanariæ, scillæ asæte intermæ partis, singulorum æquas portiones permisce, & præbe drach. I. facit & ad anhelosos ac hydropicos. Aliud. Myricæ fructus drach. IIII. piperis drach. IIII. spicæ nardi drach. II. ammoniaci thymiamatis drachmas II. tere cum aceto scillitico, & præbe drachmam unam ex aceto mulso.

*Ad induratum splenem.*

Cyclamini drach. XX. bryoniæ drach. III. dictamni drach. II. scillæ asæte drach. VIII. herbarum lanariæ drach. VI. radicis capraris drach. VI. Dato de his pastillum trium obolorum cum aceto mulso. Quin & ex erica pastillus commodus est. Cibi horum sint attenuantes, acres, sicci, & parcissimus potus. Exercitia item ac frictions, & sinapismi assumantur. Quandoque etiam cucurbitæ cum scarificatione.

*Splen induratus*

*De morbo regio. Caput L.*

**M**orbus regius Icterus appellatus, diffusio est bilis in toto corpore contingens, quandoq; atræ, de qua in splenicis diximus, quandoq; flauæ. Differentiæ uero horum plures sunt, quorum causæ & dignotiones hæ sunt. Si enim ex febrili morbo acervatim obortus regius morbus sedauerit, sebre, iudicatorius est, materia ex profundo extrinsecus translata consistens, neq; medicamenti opus habens, sed ex balneis, ac moderata frictione cito decedens. Si uero cum febre fiat, & biliosis egestionibus, & grauitas sit circa dextrum præcordium, inflammatio feruens indicatur ipsius hepatis, ob quam bilefcens sanguis per totum corpus fertur. Si autem citra grauitatem feruor sit in ipso, ob solam calidam intemperiem hepatis, affectio cõsistat. Si uero citra febrem fiat, sintq; albæ alui egestionēs, uesicæ bilem suscipiētis affectio indicatur, aut meatibus ipsius obturatis, siquidem grauitas est circa dextrum præcordium: aut absq; hac, uiribus suis debilitatis, siue attractoria eius qui ex hepate trahit, siue expulsoia eius qui ad intestina expellit. Dum enim non purgatur sanguis biliosus, in totum corpus distribuitur, quemadmodum in nigro ictero diximus. Statim autem his etiam urinae biliosissimæ abunde coloratæ prodeunt. Fit etiam icterus ob intemperiem calidam solidorum corporum, dum in bilem mutantur ea quæ alimentī ratio, ne ad ipsa deferuntur: quemadmodum in hydropse subter cutem consistens, ita ad pituitosam humiditatem transmutatio fit. Talis autē morbus regius cognoscitur ex eo quod non acervatim, sed particulatim sit, nullo relatorū præsentē. Quin & ex uenenosi medicamenti potu, & propter uenenum extrinsecus ex aliquo uenenum elaculante allabēs, morbus regius consistat. Calidæ igitur hepatis intemperiet, & inflammationis ipsius, & facultatum debilitatis curationem, antea in tractatione de ipso recensuimus, quæ etiā citra permutationem huc transferenda est, ut ne eadem sæpe dicamus. Obturatis autem uesicæ bilem suscipiētis meatibus utrisq; aut altero solo, uena secetur in cubito dextero. Quidam uero & in his, & in illis qui ob inflammationem hepatis morbum regium contraxerunt, uenam propè paruū digittum dextræ manus secant. Cataplasmatibus autem inflammationem arcentibus utendum est, & ipsi per hieram purgandi sunt. Commodi sunt etiam clysteres. præbendum uero detur morbo affectus, apij, aut adiantij, aut rumicis, aut serpilli ad tertias decoctorū decoctum. Aut ablinthium potui inspergatur. Summè uero faciunt succi raphani cyath. II. cū uini cyath.

*Regius morbus*

*Icterus niger*

1. poti. Itemq; succi cichorii cyathi II. aut III. per se, & cum uino. Verū ob hepatis inflammationem ictericis uinum multum bibendum prebe, aut decoctum aristolochiae tenuis, aut hyperici, aut adiantis, aut herbae sanarig, aut rubiae tinctorum. Aut ramenti cornu ceruini drachmam unam cum uino. Aut pastinacae in uino ad tertias coctae decoctū. Aut sulphuris uiui drach. I. in ouis sorbeant. Haec etiam ob obturationē ictericis magnifice prosunt. Seminis autem atriplicis scrupuli VIIII. cum chrysatiico aut alio passo, in balnei folio poti, sufficientem euacuationem faciunt. Recte etiam picra datur, & arida, & ex aceto mulso constans, & Theodoretus antidotus, & ex amaris amygdalis pastillus. Dato etiam cinamomi quantum tribus digitis praehensibile est, in uini mulsi cyath. I. aut aqua temperata. Aut myrrhae magnitudinem fabae, cum pipere granis V. pariq; cinamomo. Qui uero ob calidam solidorum corporum intemperiem icterici sunt, simplicibus frictionibus, & exercitijs moderatis, & unctione, & balneis utantur, & humefaciant ac moderate frigefaciente uictu, ptisanæ succo, intybis, seride, cichorijs, pascibusq; ac uino tenui aquoso. Cæterum de his qui ex ueneni potu, aut ob uenenum eiaculantium morsum, ad hanc affectionem deuenerunt, libro V. dicitur. Porro bile circa oculos & faciem recepta, elaterij erui magnitudinem cum lacte muliebri instilla in nasum in balneo, & statim in solium demitte, ac præcipe ne caput mergat, & post balneum resectorio uictu dato, rursus in nares infunde in sole. Facit & cyclamini succus, & marrubij, & melanthij. Sed & acetum acerrimum naribus attrahat dum sedet in solio, & parumper nares comprimat, & mirifice euacuabitur.

De umbilici prolapsu. Cap. LI.

Umbilici prolapsus

**C**Ausam & chirurgicam curationem umbilici prominentis, in chirurgie tractatu dicemus. Quandoquidem uero & per medicamentorum usum quidam ad naturalem statum reuersi sunt, de hoc hic dicendum est. Aluminis scissi drach. V. fecis uini rhodij drach. X. gallarum omphacinarū drach. II. uino diluta, & ad mellis spissitudinē redacta impone, forinsecusq; spongiolam posca imbutam superadde, & fascia deliga. Aliud. Corticum fabae fressæ, gallarum, balaustij, singulorum æquales partes in aqua coquino. Vbi uero dissoluta fuerint, diligenter trita imposito, cum spongia quemadmodum dictum est. Aliud. Ramenti plumbi drach. XVI. cicuta, mannae thuris, cerussæ, succi hypocisthidis, singulorum drachmam unam, uino dissolutis utere quemadmodum dictum est.

Quomodo quis impubis ac imberbis diu permaneat, & de pudendorum ac testium curatione, & simul psilothra. Caput LII.

Imberbis ut quis maneat

**C**imoliae terræ & cerussæ æquales partes hyoscyami succo excipe, ut siliis gmentitiam spissitudinem habeant, deinde oleo lentiscino quantum satis est addito concute, ac utere. Aliud. Cicuta succum, & solani, hyoscyami, lupini foliorum tenerriorum, & psyllij, singulorum pares portiones terito ac utitor, ubi prius deierferis ac laueris. Oportet autem prius aliquot diebus aquam bibere.

Psilothron pilos disperdens.

Psilothron

**A**sellorum domesticorum qui in globulum se conuoluunt drach. II. sandarachæ drach. IIIII. calcis uiuæ drach. VIII. aceti ueteris cyath. I. lixiuii sicculnei cyath. I. coquito in olla, & utere in balneo. Aliud. Calcis uiuæ partes II. auripigmenti partes II. cimoliae partē unam. coctis in aqua utere uelut dictum est. Aliud simplex & sine odore. Calcis uiuæ sexar. I. sandarachæ unc. I. coquito uelut dictum est, ac utere. Cæterum depilatoria inter oculorum morbos relata habentur.

De Hernie speciebus. Caput LIII.

Hernie species

**Q**uæ experitonæ membræ ruptione fiunt intestinorum delapsiones, ualde graues sunt. Quæ uero ob rarefactionem, facilius curantur, pueris magis uelut humidioribus contingentes: & multi sanè ex his citra chirurgiam

Aurgiam, & per medicamenta quæ imponuntur, & per convenientem deli-  
gationem curati sunt. Utendum autem est subscriptis compositionibus, ubi  
hoc solum addiderimus, affectiones has solo loco differre. Quum enim ad  
huc superne circa inguen, intestinum manet, bubonocèle, hoc est inguinis  
rutex siue hernia appellatur. Vbi uero ad scortum iam delatum est, entero-  
cèle, hoc est intestinorum rutex nominatur. Proinde malicorij drach. x. gal-  
lae omphacis drach. v. in uini austeri cyath. iiii. coquito, tritaq; pressio ac  
retuso intestino imposito, ubi frigida aqua prius perfuderis. Et per dies  
decem soluto, ita ut in lecto maneat aget ad dies triginta, & cupressi deco-  
ctum cum uino bibat. Aut pilularum cupressi obol. iiii. in uino diluto. Hoc  
medicamentum in pueris efficax est.

Bubonocèle  
Enterocèle

Aliud agglutinatorium. Radicis symphyti, succi marrubij, amygdala-  
rum amararum, gummi, singulorum pares portiones. Aliud. Terebin-  
thinæ unc. i. s. ceræ, thuris, myrrhe, glutinis piscium, cochlearum unā cum te-  
stis, singulorum unc. i. gluten ad triduum aceto præmacerato. Aliud. Cu-  
pressi pilularum unc. i. gallarum unc. i. malicorij unc. s. glutinis quadran-  
tem, mannæ thuris unc. s. symphyti unc. s. cochlearum unā cum testis unc.  
i. pilulas & malicorium uino adstringente diu coquito ac terito, & reliquā  
ammisceto, & exceptis utitor. Aliud. Aloës, malicorij, thuris, succi hy-  
pocistidis, glutinis fabrilis, picis, bituminis, singulorum unc. i. s. uini dul-  
cis, quod satis est. Aliud uarietatis, facit & ad perfectiæ ætatis homines,  
malo non diuturno. Chrysolæ, glutinis, taurini, farco collæ, glutinis pi-  
scium, lapidis gagatæ, lapidis hæmatitæ, rhois syriacæ coriarij, acaciæ, lingu-  
lorum unc. i. s. lapidis pyritæ, sulphuris ignem nō experti, magnetis spiran-  
tis, aluminis scissi, mannæ, thuris, singulorum unc. i. picis brutiæ quincun-  
cem, cochlearum unā cum testis unc. i. recrementi argenti trientem, galla-  
rum unc. i. squamæ stomomatis ferri unc. i. æris unc. i. bituminis sexuncæ,  
olei myrti quod satis est. Vino adstringente sicca excipito, & manus non  
inquinante utitor. Quod si decumbere non sustineant, triangulari crassiore  
ligamento, quod intestinum adstringere potest, secure deligato. Abstinēat  
a flatuosis cibis, & uino largiore, & assiduis balneis, & intento motu, uelut  
est cursus, saltatio, uociferatio, & similia.

Magnetis spiran-  
tis

Ad hydrocelen, hoc est aquosum ramicem, ut humor euacuetur. Piperis  
grana c. baccas lauri lxxx. nitri drach. xx. ceræ drach. xl. olei heminā  
dimidiam, exceptis utere. Aliud optimum. Floris lapidis asij drach. vi.  
uinz passæ uinacæis exemptis sextantem, cumini æthiopici drach. viii. ni-  
tri rubri drach. viii. trita imposito, somnō mane ac uespere adhibito. Quis-  
dam etiam sulphuris drach. viii. addunt. Aliud. Calcem uiuam strig-  
mento exceptam, cum cerato impone, & parum nitri ad calcem ammiscet.

Rutex agnos-  
sus

Aliud. Brassicæ radices urito, & cinerem adipe porcino ueteri eliqua-  
to excipito. Soluto autem per tertium diem. Quod uero non rursus ualde  
multa fiat humoris collectio, hoc malagmate utere. Ceræ lib. i. s. picis trien-  
tem, ammoniaci thymiamatis trientem, aluminis liquidi unc. i. s. facit etiam  
emplastrum ex populo nigra, & reliqua attractoria.

De testium inflammatione, itemq; scorti, & de alijs ipsorum affectionibus.

bus. Caput LIII.

Scorti inflammatio cognoscitur ex eo quod circa primum mianus conta-  
ctum dolent, & quod feruor ac duricia intentia appareant. Teste uero in-  
flammato, neq; ad leuem contactum dolent, sed digitis innitentibus: & ru-  
bor, & duricia, circa superficiem minus apparet. Si uero quis digitis innitatur,  
duricia in profundo occurrit. & febris aliquando oboritur. Proprie igitur  
testibus inflammatis conuenit uenæ sectio circa malleolum. In commu-  
ni uero omnibus cataplasmata & cerata. Cataplasma itaq; imponendum est  
ex fabacea farina cocta in uino diluto, cum uuis passis pinguibus uinacæis  
exemptis. Aut cuminum, aut asphodeli radicem coctam ac tritam, ad parē

Scorti inflama-  
tio  
Testium in-  
flammatiō

polentæ pollinem ammisceto ac imposito. Aut lini semen in uino diluto. Aut foenum græcum in aqua mulsæ. Aut liliæ radicem in aqua mulsæ. Aut semen uini recentem cum polline polentæ. Aut senecionem & cortiandrum uiride, cum uitis passis uinaceis exemptis. Si uero multus sit seruo, folia hyoscyami cum triticea aut cicerum farina imposito, aut harundinis folia. Aut cucurbitam crudam. Si uero diuturna est affectio cum duricia, cucumeris syluestris radicem coctam in aqua mulsæ, & cum farina liliacea trita imposito. Sed & hoc bonum est auxilium. Vuarum passarum exemptis uinaceis quincuncem, cicerum feruifactorum unc. i. s. cumini unc. i. sulphuris dodrantem, nitri unc. i. resinæ quadrantem & semunciam, terito omnia cum melle, & pro cataplasmate utitor. Cerata uero hæc faciunt. Olei cyathi, colophonis sexuncem, plumbaginis, cumini, uuarum passarum, farinæ fabaceæ, singulorum trientem, ceræ sextantem, plumbaginem cum oleo coquito ad aliquam compagem, deinde ceram & resinam adijcito, & ablata ab igne semifrige facta, ad duas passas tritas, & ad farinas affundito. Aliud. Olei anethini & rosacei, ceræ, resinæ pinus, singulorum quincuncem, cumini sextantem & semunciam, stercoris asini unc. i. s. Cuminum cum stercore asini terito, & ceratum frige factum ammisceto ac conterito simul, deinde linteis exceptis utitor, lanam superimponens. Aut oleo omphacino, aut butyro & resina, æqualibus portionibus utitor. Si uero ex sudoribus ulcera in scorto fiant, gallam tritam aut alumen, pinguedini & felli hircino insperge, ac obline. Ar uero ad testes seruido ulcere infestato, subici moliam terram cum aqua prius illenisti, sicari permittito, & ablutione cili calida aqua facta, myrtum siccam, & smyrnii parum, terito ac imposito. Ceterum carniū in testibus excrecentias, cinis sarmentitius cum nitro & aqua subactus, impositus sanat. Si uero pruritus circa scrotum est, nitrum, staphidem silyestrem, alumen liquidum, aceto & rosaceo trita in balneo illine. post balneum uero, oui candidum cum melle illine.

De seminis profluvio, & eiusdem in somnis effusione. Cap. LV.

**S**eminis profluvium inuoluntaria est excretio assidue contingens, citra pudendi turgescen-  
tiam, propter retentricis facultatis debilitatē. In qua conuenit in quiete asservare, ita ut lumbos & pubem lana conuoluta integant, uino & melino oleo, aut cenanthino imbuta. Consequenter aut cataplasma imponatur ex palmulis, malis, cenanthe, acacia, hypocistide & rhoë, ac similibus. Infideant autem lentisci & rubi, ac similitum decoctis in uino, aut etiam aqua. Cibis uero utantur refecatorijs. Post prima uero tempora ad exercitium deducantur, per quod & totum corpus, & affectæ partes ad robur deducantur. Cæterum ad seminis redundantiam scientia, sufficienter relata sunt libro primo in tuendæ sanitatis tractatione. Vbi etiam de his qui coire non possunt scriptum est. Verum ad seminis in somno effusiones profuerit ipsis etiam lectus frigidior, & decubitus in dextrum aut sinistrum latus, & quæcunque medicamenta frigida lumbis subliniuntur, qualia sunt, coctandum, cicuta, cerusa, portulaca, omnia cum aceto.

De Satyriis. Caput LVI

**S**atyriasis est palpitatio pudendi, ad inflammatoriam quandam uasorum seminariarum affectionem consequens, cum turgescen-  
tia palpitatio, ad uasorum seminalium resolutionem, aut conuulsionem delabi solet, & pereunt cereliter conuulsi, morientes autem ementre inflantur, & frigidum sudorem excludunt. Contingit autē hic morbus, sed raro etiam mulieribus. Vena igitur statim secanda est, & uiscus tenuis ac sine uino consiliendus, & quotidie quidem aluus mollienda est, uehementer nunquam, sed placide ac leniter. Optima igitur est beta, & malua, & mercurialis parum, & concharum iusculum. Non malum est etiam simpliciter dysterem adhibere. Verum urinas cientes medicinæ uidentur. Lumbis autem frigida adhibeantur, uelut est solani succus, aut portulacæ, aut hyoscyami, aut

Scortis ex sudore  
re ulcera

Pruritus  
scroti

Semine pro-  
fluvium

Satyriasis

Aut ciوتا. Neceſſe eſt etiam colem, & ani ac ſcorti inter apedinem, ex ali quo mitigante frigefactorio illinere, uelut argenti ſpuma, terra cimolia, ce ruſſa, aceto dilutis, aut aqua, aut uino dulci, aut ſapa. Decubitus ſupinus no xius eſt. Bibat autem nymphæ radicem, & iridem, & adiantum. Ruta aut & ſeminis profluuo, & ſatyriaſi laboranti prodeſt. Cibis detur frumenta ceus modicus. & ſiti premanantur. Si uero perſeueret affectio, cucurbitæ affi ganantur cum ſcarificatione. Et ſi plenitudo adſit, etiam per hirudines euacuatio fiat. Venter autem cruda ordeacea farina integatur.

De priapiſmo.

Cap. LVII.

Priapiſmus eſt auſcio pudendi perſeuerans, in longum ac circulum intumefcentis, citra rei ueneræ appetentiam. Eſt autē ſtatuofus ſpiritus qui membrum tumefacit, ex humoribus uifcoſis ac craſſis præ moderata calidi tate generatus. Maniſteſtum igitur eſt quod partes caleſcere non oportet, ſed leniter frigefacere, cerato roſaceo cum aqua conquaſſato: & per chamg melinum ceratum pudendo ac lumbis impoſitum. Viſcus & medicamenta adhibeantur attenuantis facultatis, citra maniſteſtam calefactionem. Adhi beantur etiam quæ naturaliter efficacia ſunt, per experientiam comperta. Nymphæa igitur etiam his bibenda detur, & uitiſis ſemen, & rutæ uiridis, obſoniſ miſceatur. Ab inſiti uero hoc ne detur, multū enim calefacit, ſed poſtea poſt aliorum attenuantium uſum. Si euacuatione utendum ſit, per uomitus ea fiat. Nam per infernum uentrem contingentes, ſepe fluxionem concitant ad uicinas partes. Sed & exercitium, & friſtio aſſumatur, ad ſla nus diſcurtiendos. Nulli ex relatīs cōuenit coitus, præterquam in quibus ob huius abſtinentiam, ſemen redundare conſueſcit.

De membrorum genitalium impotentia.

Cap. LVIII.

Qui hanc affectionem habent, ad Venerem non ſtimulantur, & propte rea triſtes ſunt. Cauſa autem horum eſt, partium reſolutio, aut ſemi nis inopia. Quum igitur ſemen generantia libro primo in ſanitatis tuendæ tractatione relata ſint, itemque quæ ad coitum ſtimulent ſecundum ſimplicē facultatem, nunc fortiora apponenda ſunt. Communiter igitur acopis ad reſolutionem commodis, etiam hic utendum eſt. Priuatim uero ſtellionem uſum terito, deinde addito oleo dextri pedis magnum digitum illinito ac coito. Si uero ceſſare uoles, digitum abluito. Sed & ex ſtellionibus multæ mixturæ medicamentum efficax eſt. Præbibenda uero dentur tentiginem cientia, uelut eſt primum hoc. Piperis, nucleorum nucis pineæ, petroſelini, ramenti pudendi ceruini, terebinthinæ, ſingulorum æquales partes excipe melle. Aliud. Cicerum tridorum, nucleorum nucis pineæ, ſingulorū ſextantem, erucæ, piperis, ſingulorum unc. i. excipe melle. dato drach. ii. cum uino. Sed & ſatyriaca appellata multiplex compoſitio conueniet, & quæ his ſimilia ſunt. Conſiderare uero oportet etiam alias affectionis cau ſas, & correctionem ipsis conuenientem adhibere.

Pudendorum ac ſedis affectiones.

Cap. LIX.

Ulcera in pudendis & circa ſedem, ſi ſunt citra inflammationem, ualde ſiccantibus opus habent medicamentis, qualiſia ſunt id quod ex charta uſta conſtat, & anethum uſum ſiccum, & cucurbita uſta. Non humidis au tem & recentibus ulceribus, etiam aloë bonum pharmacū eſt, ſicca in pul uillum redacta inſperſa. præ omnibus uero dolorem eximit, & nullo minus efficax eſt pompholyx. Si uero humidiora fuerint ulcera, pinus cortex per ſe, & lapis hamatites. Si autem & profunditas aliqua ipsis affuerit, ad rela ta manna thuris ammiſcenda eſt. At ſi nomen depaſcendo proſerpat, lenticu la imponatur cum malcorio. Utendum etiam emplaſtro coraco ex aceto mulſo appellato, & paſtillo bithyno, & qui ex charta conſtat. Rimas autem in pudendis ac ſede iuuat reſina friſta cum roſaceo trita, ut ſtrigmentitia craſſitudo fiat, ammiſto etiam oui uitello, & opio. Aut ſolitorū hederæ ſic corum uſtorum cinis tritus cum roſaceo in plumbeo mortario adhibeatur.

Paſtillus

Priapiſmus

Genitaliū per tū impotentia

Stellionum me dicamentum Tentiginem cientia

Pudendorum affectiones

Rima pudenda

Pastillus quoque ex uino & oleo, & qui ex lapide phrygio paratur, ualde eorum, A  
moda sunt medicamenta, & ad rimas, & ad sordida circa coronam ulcera,  
& maxime quum detrahere præputium non possunt. Aliud simplex, quod  
etiam acrimonia obtundit. Cadmiæ ustæ ac lotæ sextantem, foliorum ro-  
sarum exunguium sexuncem, sicca insperge, ablens prius uino. Ad con-  
dylomata uero facit hoc. Chalcididis, celsypii cerati, medullæ ceruinæ, folio-  
rum rubi, singulorum pares portiones cum cerato. Et pastillus ex uino ac o-  
leo similiter. Si uero in cole, intra pudendi foramen, inconspicuus ulcus fiat,  
cognoscitur ex eo quod aut pus, aut sanguis euacuatur, citra mictionem. Cur-  
ratur autem primum quidem aqua multa aquosa collutum, deinde lacte, po-  
stea ammixto etiam ad lac Asiere collyrio. Aut pastillum album, aut eum  
qui ex loto fit, in plumbea pila tritum immittito, aut etiam pinna in eo tin-  
cta illinito. Deinde linamentum torum illius indito. Optimus est & quod  
gallam recipit & pompholygem, amyllumque & aloë, æquis portionibus  
trita cum rosaceo, & plantaginis succo.

*Ad dolores in pudendo.*

Butyrum & resinam pari modo liquata imposito. aut lini seminis succo  
pares partes myrrhæ & resinæ frictæ terito ac imposito.

*Ad tumidum pudendum.*

Vitis foliorum tenerorum drach. i. cerusæ drach. v. trita impone. Vite  
etiam aquæ marinæ frigida perfusione, & quiete, & colis deligatione.

Thymi in pu-  
dendis  
Verruce  
omnes

Verrucas in pudendis, Thymos appellatos curat, & augeri rursus non su-  
nit cinis sarmentorum uitis cum aceto impositus. Item coricis salicis uiti  
cinis. In summa uero, uerucarum genera omnia, & rhymus, & formicaria,  
& quæ quasi ex chorda pendet, per medicamenta quidem uehementer exul-  
cerantia auellentur, per putrefacientia uero ac erodentia mortificatur. Pro-  
priè uero facit elaterium cum sale impositum, grossi cum aceto, nitro, & fa-  
rina. sic succus illitus. smaridis caput saluum ustum. ergo cum sulphure ui-  
uo uita. Tithymalli succus illitus. ocymi folia cum aramento sutorio. Ho-  
liotropij magni semen cum uino impositum.

*Ad inflammationem ani.*

Ani inflam-  
matio

Cerusæ trientem, pompholygis aut cadmiæ teneræ unc. i. thuris unc. i.  
feridis succi heminam unam. Dilue paulatim succum instillans donec con-  
sumptus fuerit. Deinde cerato factio ex ceræ sextante, & rosacei lib. i. ubi  
eraseris ammisce, & fortiter emollito. Immittito autem per instrumentum  
puris tractorium, & supernè deligato. facit etiam ad rimas inflammatas, &  
ad ulcerationes sedis, cum seruore aut morfu.

*Ad ignem sacrum circa sedem.*

Ignis sacer cir-  
ca sedem

Emplastri ex succis lib. i. rosacei quod satis est, panis puri lib. i. croci un-  
ciam i. opij unc. i. Crocus & opium macerantur passo, panis aqua. Dein-  
de ad ipsa trita adijcitur emplastrum ex succis, & rosaceum, & emollitur. fa-  
cit etiam ad calidissimas podagras. Aliud faciens etiam ad inflammationem  
ani. Cerusam uino, & rosaceo, in plumbea pila, plumbeo pistillo tri-  
tam illine. Aut cerussam & oui candidum, & rosaceum in eadem pila, do-  
nec strigmentitiam crassitudinem habeant trita illinito.

*Ad sedis dolores.*

Hyoscyami foliorum tenerorum, porulacæ foliorum tenerorum, mica-  
rum panis uino maceratarum, uitellorum ouorum assatorum, singulorum pa-  
res portiones, rosacei quod satis est. postquam fomentum adhibueris ad lo-  
cum ex rosarum ac meliloti decocto, cataplasma imposito. Aliud optimus.  
Ad ani inflammationes, & extuberantias. Cerusæ, spumæ argenti, ammor-  
niaci thymifamatis, bdellij, singulorum sexuncem, terebinthinæ unc. i. ceræ  
uncie dimidium. Arida succo solani, hyoscyami, aut porulacæ terito, quæ  
liquari possunt liquefacta ammisceto & excipito, & rosaceo mollitis uti-  
tor. Sed & emplastrum Phicotiche appellatum, & quod ex plumbagine  
paratur.

paratur, & pastillus ex loto, & ex halicacabo, & ex rosīs, ad sedis inflammationes, inter clara sedis ac pudendorum medicamenta habentur.

*Ad extuberantias ani.*

Si inflammate sunt extuberantiæ, & relatis in communī utendum est, & peritum hoc pastillo. Cerusæ quadrantem, pompholygis unc. i. spumę argenti sextantem, mastiches sexuncem. excipe hyoscyami succo. Si uero nō sunt inflammata, uino prælotis pilularum cupressi uisitarum cinerem insperge. Aut corticis cucurbitæ siccæ usti, aut ossium palmularum cinerem similiter. Aut testarum ouorum & sceniculi cinerem. Aut mali punicæ foliorū succo, pari uino albo ammixto proleue ad dies septē. Verū ad callosas extuberantias, calcē & auripigmentū cū aceto acritrita, in sole illinere bonū est.

*Extuberantia ani*

*De hæmorrhoidibus.*

Si hæmorrhoides plus quam oportet euacuantur, corporis habitū aquosum fieri contingit, & ut prauē cibos auersentur. periculum est etiam lilarga sanguinis eruptio fiat: quemadmodum etiam si penitus supprimatur. unde operosa est curatio. Quare cum plures sint hæmorrhoides, unam relinquere oportet, purgationis gratia. Quædā uero sunt quæ in superiore parte non apparent, & propterea agere curantur. Cæcæ uero nihil quidem excernunt, uerum magis dolorosę sunt. Ad has igitur cyclamini succum illine, & aperiantur. Ad eas uero quæ immodicē euacuantur, spinæ Aegyptiæ, sambuci foliorum, artemisiæ, singulorum quincuncem, sideritidis tritientem, in aquæ heminis viii. ad dimidias coquito. Deinde herbas quidem reiecito, ad aquam autem siccam hoc ammisceto. Melantheriæ, aluminis rotundi, singulorum drach. viii. spumę argenti drach. iiii. gallæ quadrantem, misyos drach. ii. soreos drach. ii. Solutum hoc sicco in decocto, septies in die irrigationem facito. Sequenti uero die similiter alia facta eiusdem ponderis præparatione, similiter irrigationem facito. Et tertia die eodem modo. Si uero reliquæ aliquæ manserint, quarta die per acutū facta compunctione, si senserint, aut sanguinem fuderint, decoctum quidem similiter facito, de sicco uero dimidium ammisceto. Vbi autem irrigasti, cum sicco contingito, quo exade exurantur. Verū propter inflammationē panem imponito. Aliud. Panem purum in garo primario macerato, & in noua ollaustum ac tritum imponito, ablues antea uino. facit & ad extuberantias. Aliud. Soreos drach. ii. chalcitidis drach. i. misyos drach. i. atramenti sutorij drach. iiii. aluminis scissi drach. ix. aeris usti drach. i. melantheriæ drach. i. utere sicco. Cibi uero sint in his quæ nimium euacuantur, qui paucum sanguinem faciunt ac minimum superfluitatis, siccentesq; ac adstringentes, qualis est lotalica ex posca, & oryza & chondrus. Exoleribus intyba, cichorium, & portulaca. Et uina adstringentia. At in excæcatis hæmorrhoidibus conueniunt cibi his contrarij. Maxime autem lolliginum, & sepiarum, & polypodum, torpedinisq; ac cartilagineorum esus probe commodat. Hæc enim sanguinem turbant. Sed & quæ menses ducunt, his comoda existunt.

*Hæmorrhoides*

*Gargism priuatum*

*Ad procidentes anos.*

Eriæ fructus, gallarum, cerusæ, acaciæ, succi hypocistidis, corticis pinus, thuris, myrrhæ minnæ, singulorum æquales partes, sicca insperge prælati uino auctero. Aliud. Recrementi plumbi, rhois syriaci, singulorum drach. viii. floris rosarum drach. iiii. myrrhæ minnæ drach. ii. utere uel priore. Aliud. Corticis pinus, mannæ thuris, spumę argenti, singulorum drach. viii. pilularū cupressi siccatū, plumbaginis, singulorum drach. ii. utere uel ut dictum est. Et urina ipsius ægri adhuc calida affusa prodest.

*Anus procidens Myrrha minnæ*

De uteri affectionibus, et primū de mensuum purgatione. Cap. LX.  
Pleriq; purgatio mensuum contingit circa decimum quartum annū. Paucis citius circa decimum tertium, aut duodecimum. Non paucis autē tardius quatuordecim annis. Tempus uero unicuiq; purgationi statutum non est. Multæ enim ad duos aut tres, plurimæ ad quinque dies purgantur. Aliæ ad sex,

*Uteri affectiones Mensuum purgatio*

ad septimum usque diem. Paucae etiam ad duodecimum usque purgatae sunt. Desinunt autem purgari, aliquae circa quinquagesimum annum. Paucae usque ad sexagesimum. Quibusdam à trigésimo quinto anno, & maxime pueris, menses desinere coeperunt. Si igitur remoratur purgatio, circa praefinitum tempus lauato, & sesanum, aut porrum capitatum praebendum daretur, cum pipere, & ruta simul coctis. Edat autem lolligines, sepias, polypos, & quaecumque eius generis sunt. priuatim enim sanguinem turbant.

De mensium suppressione. Cap. LXL

Menses suppressi

**S**upprimuntur menstrua purgatio, aliquando toto corpore male affecto, a frigida tatem, aut plagam, aut intemperiem ex natiuitate, aut ob acquisitam uexationem. Plerumque uero ex abortibus, & ob partem aliquam principalem primario affectam, uelut est hepar, aut uentriculus, aut thorax, aut eiusmodi quaedam in diuturna affectione constituta. Suppressa uero multarum & diuturnarum affectionum causa fieri solet. Quum igitur ob aliquam uiscerum interaneorum affectionem primariam purgatio intercepta fuerit, aut moram traxerit, maxime operae premium est primario affectam partem curare, & post ipsam uteri meminisse. Notas autem illarum partium affectum in superioribus tradidimus. ubi uero nihil illorum affuerit, manifestum est ipsum uterum primario affectum esse. Si igitur non prohibet aetas, aut habitus corporis, aut aliud quiddam, uena secetur, non ante praefinitum mensium tempus, sed praeterito iam dies decem adijciantur. detrahatur autem non plus duabus libris & dimidia, neque minus una, si sanè uenam secuerimus: sin minus, hiera ex colocynthide purgetur; duabus drachmis datis in sex cyathis aquae mulsa. Febre uero praesente hiera uti non expedit. Commodum autem est uenam secare in primis febrilium diebus. post purgationem reficiantur ad paucos dies. In sequentibus autem exerceantur deambulationibus, frigidioribus infernarum partium, & lauentur. Cibi conueniunt qui facile concoqui ac distribui possunt, & olera humida ac dulcia omnia. Ex piscibus petrosi. Ex uolucribus teneriores. Lactis potus, dulcitaria ac mellita liba. Vinum tenue album, non ualde uetus. Ineptae sunt carnes, & legumina, excepta pisana. Vbi uero propinquum est praefinitum tempus, ex marinis dentur charitilaginea ac mollia, uelut dictum est, & resta intacta. Et porrum capitatum cum ruta & pipere coctum, & decoctum ipsorum bibant. Tunc quoque ligamentis infernas partes adstringant ad tres aut quatuor dies. Instante autem praefinito tempore, ligamenta quidem tollantur. Praebant autem myrrhae obolum, aut fabae magnitudinem. Aut castorium ex passo, aut aqua mulsa: aut artemisiae decoctum; aut saluiae, post balneum ex passo & uino absinthio. Absinthies autem uinum per totam curationem praebatur. Praeterito autem tempore praefinito, & nulla, aut non memorabilis purgatione facta, ad malleolum uena secetur, & repetita detractio fiat. post septimum uero aut octauum diem, purgatione ex hiera utatur. Et post quartum diem dropacè adhaereat ad pectinem, lumbos, ac foemora. Et ubi per triduum aquam bibitis, cataplasma ex sinapi ac pane madefacto, paribus portionibus imponatur, usque ad æquinoctij tempus. deinde lauet. Sequenti mense caricae pro pane amittantur in decoctum foenis graeci, maluae, pulegij, rutae & artemisiae. In sinum uero infundatur susinum, aut amaracinum, & pessus subdatur et neapharmacus, à nouem quas recipit rebus appellatus; aut libanius uocatur. Est autem pessus lana carpinata, & in rotunditatem ad digiti figuram redacta, in qua continentur medicamenta. Atque haec curatio plurimis sufficit ad purgationem. Si uero fortioribus opus habuerit medicamentis, sunt haec. Iris illyrica pota cum uino, cyperus, ari radix, casia, iunci rotundi odorati flos, nardus, radicis helenij decoctum, myrrhae fabae graecae magnitudo. Haec cum passo bibuntur, in aquae mulsa cyathio dimidio. Et disciant decocti cyathi. ii. & ammoniacum, & sagapenum. Quae uero stomachum minus

Pessus quid sit



noxæ expofitum habent, his & opopanax parum in pilulam coactum, & melle cocto tinctū dari poteft. Quin & familiaria nobis femina menses mouere folent, fed minus, uelut eft, feniculum, cuminum, apium, daucus creticus, fefeli, ammi, finon, cicer, cedri bacce, & omnia urinam cientia. Appofita autem & fubdita faciunt hec. Myrrha, abfinthij aut lupinorum decocto trita, aut etiam rutę fucco trita. Bdellium eodem modo. Styrax item & oleg sylueftris gummi, cum rutę fucco fimiliter. Aut ariftolochia longa ad collyrij formam excufpita. Similiter etiam magni centaury radix, aut ueratri, aut scammonie fuccis, & colocynthidis medulla per fe, & artemifia impofita cum ruta. Eegalbanum fuffitum. Eadem etiam foetus eijcere folent.

De nimia purgatione uteri, & fanguinis ex eo eruptione. Cap. LXII.

Nimia purgationes mulieribus fiunt, quandoq; dum menses augentur, & aceruatius feruntur: quandoq; in partu perfectio, quæ plerūq; etiam fua sponte ceffant. Frequenter autem & ex abortibus uehementer fanguis erumpit, ut fæpe periculum incurrant. Primū igitur constringendi funt artus, ab alis & ab inguinibus. In potu uero danda eft poſca nō frigida, & poſca quoq; affundenda. Imponendæq; locis laſiæ multæ ex uino & oleo aut roſaceo, aut melino, aut myrteo expreſſæ. Cibus detur chondrus lotus ex poſca, aut oryza, aut alica. hydromelum quoq; auſterum, aut omphacomeli, aut talium quiddam iſpis detur. Præſtant autem balaſtium in poſca, aut hypocifthidis aut acaciæ fuccum, aut lycium, aut ſanum aſterem; aut uiam acerbam ſiccā, aut rheon, aut ſuberis ex Italico uafe uſti cinerē. Aut ſeſamum edant in poſca maceratum donec molle fiat. Appoſita uero & in pudenda ſubdita ſanguinis eruptiones ſiſtunt, hypocifthidis ſuccus aut acaciæ, triti cum manna in aceto. Mirificè uero auxiliatur ſpongia uino aut pice liquida imbuta ac appoſita. Aut uſtæ ipſius cinis cum aceto aut poſca appoſitus. Similiter etiam ſuberis ex Italico uafe uſti cinis. Forinſecus autem impoſita proſunt epithemata adſtringentia, & cataplaſmata ex palmulis ac malis cydonijs, in quæ addita ſunt malicorium, ilicis glandes, rubi uirgulta, lenſci folia, balaſtium, acacia, hypocifthis, gallæ parum, alumen. Maxime autem hoc. Glutiſinum maceratur in poſca donec fuerit diſſolutū, deinde in robuſtum ſinteſi inducitur, & lumbis agglutinatur. Efficaciter quoque ad hoc faciunt emplaſtra glutinatoria, uelut eſt, Harmonia, Iceſium, Athena, Melinum, Indicum, & ſimilia. peſſis autem utendum eſt ad ſanguinis eruptionem hiſ. Gallæ internam partem tritam, & thus, aqua diſſue, ac appone. Aut flores mali punici dulcis ſimiliter. Aut polygonum tritū. Compoſito uero hoc. Aluminis ſciſſi, gallarum internæ partis, ſucci acaciæ, mannae, ſingulorum drach. II. ouorum aſſatorum uitellos quinq;. Siccæ trantur ſucco plantaginis, & miſcentur. Uſus autem tempore in peſſum lanceum excipiuntur, & in roſaceum tinguntur, ac apponuntur. Sed & curbite leues, magna, ſæpe ſub mammæ appoſite, abunde reuellunt. In ſeſſis autem hiſ quibus ſanguis erumpit conueniunt hi. lunci acuti capitulo, num, myrti, roſarum, rhamni foliorum, rubi uirgultorum, ſingulorum æqua les partes in aqua coquito, & inſidere iubeto. Aliud. Corticis radicis mali punici dulcis, myrti, corticis cupreſſi, ſingulorum partes III. gallæ partem I. coquito in aqua ſufficiente. Cæterum per clyſterem uterifuforium plantaginis ſuccum inſundito, aut ſeridis, aut polygoni, aut ſolani, aut perdicij, aut pſyllij, aut hypocifthidis, aut acaciæ. Indantur etiam hæc per lanam, aut digitum, aut ſpecillum; aut pennam in longitudinem formatam, uſq; ad uteri oſculum. Sed & Andronis paſtillus per uterifuforium clyſterem, cum aliquo ex prædictis ſuccis, aut cum uino adſtringente immiſſus, efficax eſt medicamentum.

De fluxu muliebri.

Caput LXIII.

Fluxus muliebriſ eſt fluxus uteri, per quam totū corpus expurgatur. Talis autem ſpecie præditū eſt id quod euacuatur, quale eſt id quod redun-

Fortus eijci-  
entia

Vteri nimia  
purgatio

Suberis ex Itali-  
lico uafe cinis

Sanguinis ex  
utero eruptio

Fluxus mu-  
liebris  
dat.

dat. Aliud enim est rubicundum, uelut serofus sanguinis humor: aliud al-  
 bum, à pituita: aliud pallidū, ab amara bile: aliud aquosum. Si uero aliquan-  
 do sanguis purus, uelut in penæ sectione feratur, diligenter animaduertere  
 oportet, an ne aliqua erosio facta est in utero. Notæ fluxus sumuntur, ex eo  
 quod assidue loci humectantur, humoribus colore diuersis: & ex eo quod  
 ægrota decolor est, alimentum nō sentit, cibum auerfatur, & in deambulan-  
 do difficulter spirat, & tumidos oculos habet: & ex eo quod aliquādo cum  
 dolore, aliquando sine dolore fit, & aut cum ulceratione, aut citra ulceratio-  
 nem, aut inflammata, aut sordidam, aut puram. Proinde toti corpori opi-  
 nulari oportet, quum humida sit affectio, per siccantia citra manifestam cal-  
 factionem, & per frictiones totius corporis, & per unctiones ex melle abun-  
 de cocto. Danda sunt etiam urinam cientia medicamenta, uelut est aqua, in  
 qua asarum & apium sunt incocta. Euacuandum quoq; totum corpus per  
 aluum. Ad hæc portula comesta, & succus eius potus prodest. Item balau-  
 stiū, rubi fructus & flos, quercus membrana illa quæ sub cortice trunci est,  
 & quæ sub cortice ipsius glandis. hippuris rubicundum maxime fluxum si-  
 sit pota ex aqua aut uino. Item hypocisthis, lenrisci fructus torrefactus est  
 uino potus, samius aster, lemnium sigillum, coagulū leporis, aut hoedi, aut  
 agni, aut uisuli, aut cerui. Vinacea trita, myrti baccæ, uua acerba sicca, pi-  
 nus cortex, & quæ in sanguinis ab utero eruptione dicta sunt, quæ non ual-  
 de efficacia existunt. Quum uero cum dolore fertur, per uterusorium aut  
 alium clysterem, succum alicæ, aut ptisanæ, aut tragi, aut oryzae infundito,  
 cum aliquo dolorem sedante medicamēto. Et in exacerbationibus quidem  
 mitigatoria adhibeantur. In interuallis autem per circuitus enim aliquan-  
 do affigit: ex alto euocare ac meatus transmutare oportet, per diuersas ge-  
 stationes, deambulationes, uociferationes, unctiones, cucurbitas, dropa-  
 ces partium superincumbentium, insolationes, frictiones, pilothra, me-  
 gmata, sinapismos, uomitus à raphanis, uicium refectorium, balnea, ul-  
 num, uarium cibum.

## De inflammatione uteri ac declinatione.

## Caput LXIII.

Uteri inflama-  
 tio

**I**nflammatiō uteri fit ex pluribus causis. Nam & ex plaga, & mensium sup-  
 pressionē, & frigidityte, & inflationē. Non minus etiam ex abortu, & par-  
 tu, propter malam partus editionem. Sequitur ad uteri inflammationem se-  
 bris acuta, dolorq; capitis ac tendinis, & basis oculorum, iuncturaq; ma-  
 nuum, ac digitorum: & colli detractio, & declinatio ad contraria, stomachi  
 per consensum affectio, osculi uteri conclusio, pulsus parui, densi. Et si obui-  
 sa fuerit inflammatiō, non uehementer uterum dolent. Si uero fortis, etiam  
 ipse totus pulsatorio modo dolet per totū, si rotus est inflammatus. Si pars  
 inflammata fuerit, circa hanc magis dolor de se significationem præbet. Si  
 enim posteriores ipsius partes solum inflammatae sunt, dolor circa lumbos  
 fit, & stercorea supprimuntur ex recti intestini compressione. Si anteriores,  
 dolor circa pectine fit, & urinæ stillitium ac emittendæ difficultas, ex uer-  
 sicæ compressionē. At lateribus inflammatis, & inguina tenduntur, & enu-  
 ra grauantur. Si uero fundum ipsius inflammatum fuerit, circa umbilicum  
 dolor maxime consistit cum tumore. Arsi circa osculū est inflammatiō, citra  
 supernum uentrem dolēt, & digito immisso durum ac resistens osculum  
 occurrit. In curatione igitur primum irrigatione ex uino & oleo, aut uino  
 & rosaceo utendum est, circa pectinem & lumbos, per haplos lanae purgæ,  
 tra deligationem. Cibi abstinentia indicitur usq; ad tertium diem. Post quā  
 uena secanda est in cubito, si nihil prohibuerit. Nutriantur autem alicæ ex  
 aqua mulla, aut pane, aut ouo forbili alternis diebus. Post quintum diem  
 cataplasma imponatur ex polline, semine lini, foenograceo, ex aqua mulla  
 in qua papaueris capita cocta reiecta sunt, & oleo. Si uero indignetur ad-  
 uersus caliditates inflammatiō, uirpote ignis sacri naturam habens, ad meli-  
 lotum in passo coctum ac tritum, adijce uitellos ouorum assatorum, cum  
 rosaceo.

Inflammatiō  
 ignis sacri na-  
 turam habens.

A rosaceo, aut melino, aut crocino, & impone. Aut palmulas uino diluto feruifas cum polenta polline terito, addito aliquo ex relatis ungentis, & imponito. Declinatione uero contingente, ceratum nardinum aut cyprinu adhibero. Per totam uero curationem etiam in seffibus utendum est, ex decocto foenigræci, aut seminis lini, malua, artemisæ, & ex oleo. In his autem quæ ferre nequeunt calore, ex aqua calida, affuso rosaceo. Pessii uero & infusa assumentur ex cefypo, butyro, medulla ceruina, adipe anserino, ungento susino, & cera Tynhenica. Verum quæ calorem sustinere possunt, in his etiam aureus appellatus pessus conueniet, & enneapharmacus. Quæ uero non sustinent, cum ouo, & rosaceo, & adipe anserino aut gallinaceo. Ad feruidiores autem inflammationes, emplastrum ex succis in duplici uase cum rosaceo liquefacito, & succi plantaginis, aut seridis, aut cichorii, aut iorybi misceto. Aut hoc utitor. Adipis anserini aut suilli recetis drach. iiii. cerati rosacei aut susini sextantem, uittellorum ouoru assatorum unc. i. croci drach. i. myrrhæ obol. iiii. opij obol. ii. aut pro opio, papaueris caputum decoctum. Si uero multus uexat dolor, succi papaueris magnitudinem fabæ, cum lacte mulsebræ, ac succo foenigræci, apponendam præbe. Cæterum ad inflammationes cum duricia, emplastrum tetrapharmacum rosaceo dilutum apponito, aut infundito. Quin & declinationes uteri circa exacerbationes quidem, similiter uelut inflammationes curêtur. Verum in remissionibus & mali declinatione, his quæ magis molliuit utendum est. In inueteratis autem, his quæ ex alto euocant, & meatus transmutant. Si uero extrinsecus duricia est, malagmati utendum, eo quod ex meliloto paratur, & Mnasæ inscripto: & Icesij, & Melino Serapionis, aut pyriño emplastris. Vicius ab initio quidem sit tenuis. Declinatione uero modica contingente, ad balneum ducantur, & pleniore cibo utantur.

De abscessu uteri. Caput LXXV.

**S**i inflammatio in abscessum mutatur, relata signa intenduntur, in superius inordinatæ exacerbationes cum horrore ipsis sunt, primis quidem temporibus intensæ, cum doloribus; perfecte uero suppuratione facta aliquantum remittit. Verum circa ruptionis tempus, & dolores acriores sæpe punctorio modo irruere putantur, & febriculæ uehementiores uexant, & aliquando urina supprimitur, aliquando sterqus, circa affectam uteri partem impedimento contingente: aliquando uero tumor circa pubem, & uelut fluctuationis sensus, ubi abscessus maior fuerit. Qui uero in expeditis locis est, etiam per dioptram instrumentum immissum, aut per digitorum contactu deprehenditur, supra hoc quod etiam dolores uehementiores habent, propter osculi neruositatem: quemadmodum sanè in fundo abscessus, & in sinu, minorem dolorem inducit: & digitis quidem tumor non occurrit, osculum autem gracilius comparat. proinde quo citius suppuretur, auxilium ferendum est, per cataplasmata ex foenogræco, semine lini, ordeacea aut triticea farina, ammixtis sicubus coctis, quandoque etiam columbino fimo: Sed & in seffibus inflammationi congruis assidue utendum est, & pessii ex terebinthina, myrrhæ, cefypo, & butyro. Rupto autè abscessu, si quidem ad uescam pus delatum fuerit, lactis potu utendum est, & cucumeris semen bibendum. Si uero ad intestinum rectum eruperit, lentis ac malicoris decocto coluatur per clysterem infuso. At si ad sinum ruptus fuerit abscessus, si quidem purum pus fuerit, rosaceum infundatur, aut oleum inalbatu, aut tetrapharmacum regium emplastrum, aut butyrum recens: si uero sanies tenuis graueolens feratur, uelut ab ulcere depascendo proserpente, adstringentius sit infusum, ex myrti baccis, palmulis, lentícula. Et post humorum excretionem si inflammatio permaneat, in cataplasmati ac in seffibus perseverandū est. Cæterum si circa uteri osculum abscessus fiat, & non rumpatur, postquam tenues factæ fuerint partes puri incubentes, ad puris excretionem per chirurgiam nos conuertemus, uelut in chirurgiæ tractatione dicitur.

Vteri declinationes

Vteri abscessus

Dioptra

Vteri exul-  
ceratio

**U**lceratur saepe uterus, ob partus difficultatem, aut foetus extractionem aut corruptionem, aut ab acerbis medicamentis, aut à fluxione, aut ex abscessibus ruptis. Si igitur exposita fuerit ulceratio, per dioptræ usum deprehenditur. Si uero in profundo, ex his quæ excernuntur. Humor enim diuersus excernitur, inflammato quidem ulcere, paucus cruentus aut feculentus cum dolore: si uero sordidum est ulcus, copiosior, & sanies cum minore dolore: si uero depascendo proserpit, graueolens niger, cum uehementioribus doloribus, & alijs inflammationis signis, & irritatio ad laxatoria medicamenta, ad contraria uero, alleuatio. purum uero si est ulcus, humor paucus, æqualis, sine odore, crassus, albus, cum sensus facilitate. Si igitur inflammatum est ulcus, his quæ ad inflammationem relata sunt utendum est. Si uero sordidum, ptisanæ succus cum melle infundatur, aut tetrapharmacum emplastrum cum susino, aut aqua mulsa cocto in ipsa scœnogræco, aut malua, aut surfuribus, aut lente decorticata, aut quo magis repurgetur, marubio, aut eruo. Aut ammixtam mellis erui farinam, aut iridem, aut alumen rotundum, aut simile quiddam immittito. Hæc ipsa etiam forinsecus cataplasmatis modo imponuntur aqua mulsa subacta, peculiarius autem prodest hoc medicamentum. Crocus optimus teritur cum lacte mulsebræ, deinde rosaceo cerato exceptus cum adipe anserino illinitur lanæ tomento. Præstantius hoc est quod etiam ad dolores conducit. Capita papaueris in passo diluto macerantur ad triduum, deinde coquuntur donec flaccescant, postea teruntur cum foliorum rosarum drachmis v. croci drach. iiii. ammixta capitum papaueris decocto. deinde ceræ drach. ii. cum rosaceo liquore affunduntur, & in pello apponuntur illito ex rosaceo. Faci retiam id quod ex ouis, croco, rosaceo, adipe anserino, & medulla ceruina paratur. Et emplastrum Aegyptium absque atugine mirifice ad ulcerationes facit. Si uero ulcus depascendo proserpit cum inflammatione, imponatur panis purus maceratus cum aqua mulsa, oleo, althæa, scœnogræco, & palmulis pinguis. Infundatur autem succus plantaginis, solani, polygoni, seridis, primum per se, postea cum uino austero aut aceto. Si autem sine inflammatione nomen depascitur, fortiora infundantur. uelut est decoctum malicorij, rosarum, oleæ uirgultorum, cupressi, malorum cydoniorum, subti, baccarum myrti, lentisci, rhamni, rhois coriatij, ex uino adstringente. postea uero etiam decoctum aluminis, acaciæ, lycij, hypocythidis. Ex iisdem uero decoctis sit etiam infusus. Si non succedit medicamentum aridum ex charta immittito, primum cum posca, deinde cum aceto. Aut puluillum Antherum hoc est floridum appellatum. Aut chalcitidem, aut atramentum sutorium, cum iisdem liquoribus. Item ea quæ dysentericis conueniunt. Dato autem cibum boni succi modicum, puro autem facto ulcere, & lauato, & nutrito uariiegatus, & uinum exhibeto, quo caro cito producat. Pessi uice apponatur confectio ex moris, dissoluta cum cadmia, aut ladano, aut plumbagine. Forinsecus autem emplastrum cicatricem inducens, superno uentri ac coxis imponatur. Quemadmodum enim cataplasmatum, ita etiam emplastrorum facultas, per occultos meatus penetrans transferetur.

Cancer uteri

**C**anceri in utero partim cum ulceratione, partim sine ulcere consistunt. In his igitur qui sine ulcere sunt, tumor reperitur circa uteri osculum durus, inæqualis, præminens, colore feculentus, rubicundus, quandoque etiam subliuidus: & dolent uehementer circa inguina, & supernum uentrem, & pectinem ac lumbos: ægreque ferunt contactum, & uariegiatorem medicationem. Si uero ulceratus est cancer, ad dolores, duricias, & tumorem, erosam etiam & inæqualia ulcera conspiciuntur, plerumque quidem sordida, oritur munda, albicantia, turpes crustas inductas habentia: quæ uero pura uidentur feculenta, luscida, rubicunda & cruenta apparent. Excernitur autem assidue ab ipso

**A** ab ipso sanies tenuis, aquosa, nigra, aut fulva graueolēs. Aliquando etiam sanguis fertur, & alia signa ad inflammatum uterum relata. Affectio igitur ipsa incurabilis est, uelut alicubi etiam Hippocrates dixit, mitigare tamen oportet per infusus ex sceno græco & malua, & per cataplasmata similia. Valde autem mitigant in exacerbationibus malua aut albæa, in aqua multa flaccida facta, & cum modico rosaceo contrita ac imposita. Itemq; cataplasma ex caricis, meliloto, ruta, thure, buniade herba cum oleo diligenter contusa. Et cataplasma ex palmulis coctis in passo, additis ouorum uittellis, & polenta. Aut cataplasma ex papauere cum coriandro, aut polygono, aut seride. Hæc quidem in doloris uexationibus. postea uero ceratum adhibeatur ex rosaceo, aut myrteo, aut œnanthino, aut melino, cum palmulis in passo coctis. Priuatim autem commodat id quod ex fece in æneis uasis, in quibus aqua coquitur, subsidente paratur. Hæc enim sex insuper affata minutissime teritur, & cerato rosaceo excipitur, ad emplastri compagem redacta. Et hæc quidem forinsecus. Intrinsicus autem mitigat locos etiam oleū. Si uero ulcerati fuerint, etiam lac muliebri infusum, & succus plantaginis tepidus. Si uero cruentati fuerint, succus polygoni cum modico thure mistigat, & pessi ex croco, & muliebri lacte, & succo papaueris, & cœsypo. Omnibus autem efficacius est, etiam ad sedis affectiones hoc. Spuma argenti Italice lotæ sexuncem, thuris masculi, cœsypi, adipis porcini recentis, butyri recentis, ceræ Tyrrhenicæ, singulorum sextantem, rosacei trientem. Spumam argenti seridis succo tritam liquatis adijce. Cibi dentur boni succi, qui facile concoqui ac distribui possint. Vinum sit modicum aquosum. Vitent acrium esum, & ciborum copiam. prompte enim in ipsis cibi corrumpuntur.

*De scirrho ex tumore duro. Cap. LXVIII.*

**I**n scirrhum induratur uterus, aliquando derepente nulla prægressa causa: plerumq; uero inflammatione prægressa, & neq; soluta, neq; in abscessum transmutata. Species scirrhī est etiam tumor durus, scleroma appellatus, in collo uteri maxime consistens, qui quidem tumor similis est, minus autem renitens, cum moderato dolore. Consequitur etiam in his declinatio ad opposita, estq; tumor pro ratione affectionis uehementer renitens, cum grauitate & ægro motu, non solum crurum, sed etiam totius corporis, adestq; ad actiones obeundas pigritia. Sequitur non probe curatus malus habitus aquosus. In principio itaq; uena secetur, aut purgatio assumatur, per hieram Archigenis. Deinde cataplasmata ex caricis, hyssopo, nitro, & ablinthio. Et cucurbitæ cum scarificatione. Malagmata uero polyarchium, & ex seminibus constans, & ex lauri baccis paratum. Infusus ex decocto caricarum, artemisæ, pulegij, althææ. Pessi ex terebinthina, galbano, myrrha, iride, cœsypo. Dropaces item, & aquarum naturalium nitrosarum usus, itemq; bituminosarum. Viribus autem tolerantibus, etiam ueratri usus.

*Pessis mollitorum.*

Ceræ ponticæ, ungenti nardini, singulorum quadrantem, irini, gleucini, cyprini, singulorum sextantē, adipis ursini, anserini, butyri, cœsypi, medullæ ceruinæ, terebinthinæ, singulorum unc. i. Alius. Polij drach. ii. myrrhæ drach. iiii. cum uino Mendelio trita, & irino subacta apponenda præbeo. Alius. Ceræ Tyrrhenicæ, adipis uitalini, terebinthinæ, medullæ ceruinæ, mellis Attici, olei ueteris, singulorum æquales portiones.

Medicamentum ex alto euocans, facit & ad inflationes. Vux passæ albe exemptis uinaceis quadrantem, rutæ uiridis foliorum sextantem, aquæ marinæ sesquiunciam, cumini drach. iiii. mellis quod satis est. Formatum autem inde pessum cyprino oleo intinge, ac appone. Sed & aureus pessus, & libanius, & encepharmacus affectioni cōmodant. Magis uero proprie

*Demola. Cap. LXX.*

(Titianus.

**M**ola quoq; in scirrhum induratus est tumor, aliquando circa osculum uteri, aliquando circa totum ipsum comparens, tactu lapidis duriciam referens,

*Canceri oculi incurabiles*

*Vteri scirrhus*

*Scleroma uteri*

*Mola*

referens, cum detractiōe partium superincumbentium, & gracilitate, de coloratione, ciborum inappetentia, mensium suppressiōe, mammarū tumore, ad eū ut conceptus suspiciō in aliquibus ab initio fiat. postea uero tempore discernuntur. Quaedam etiam aquae inter cutē suspiciōnem de se exhibent, & hoc discernendum est, tum tumoris duricia, tum quod non fiat sonitus digitis illis, quemadmodum in hydropicis. In quibusdam autem reuera in hydropem transitio fit. Quandoq; etiam incurabilis ut plurimū fit affectio. Quibusdam etiam sanguis fertur. In communi igitur decubitus in domo parua & umbrosa ac tenebricosa conducit, quae etiam moderate refrigeret, in lecto immobili, ita ut partes ad pedes habeant sublimiores, & in quiete. Nam motus omnem fluxionem prouocare potest. Et tumores quidem ac duricias, his quae ad scirrhus & scleromata relata sunt curabimus. Verum aquae inter cutem suffusiones, per ea quae dicta sunt in tractatione de hydropē. Sanguinis autē eruptiones, uelut sanguinis eruptiones, & fluxum muliebrem. Quidam tradunt molam esse carnem informem, ad ipsas uteri tunicas consistentem, & quae pariatur ueluti foetus. Sed & haec species laxatorio curationis ductu tractanda est, ut facilius excernatur.

De inflatiōe uteri. cap. LXX.

Uteri inflatio

Inflatur uterus ex frigiditate, aut foetus corruptione, aut partus difficultate, osculo ocluso, aut sanguinis grumo in ipso obturato, quandoq; in cauitate spatij ipsius flatibus coclusis, quandoq; in raritatibus corporis ipsius uteri. In his sequitur tumor pectinis, & imi uentris, cum duricia & dolore punctorio, usq; ad septum transuersum, & stomauchum, ac inguina perperam gentes: & ad digitorum illisionem sonitus instar tympani oboritur. Curare igitur oportet primum uenae sectione, si nihil impediat. Deinde circa exacerbationes, in edijs, & irrigationibus ex oleo rutaceo. In sessibusq; ex decocto rutae, pulegij, artemisiae, casiae, & similibus. Et cataplasmatibus ex semine apij, cumini, foeniculi, anisi, ammi, & farina loliae. Cucurbitis item leulibus, & cum scarificatione. Moram uero trahente affectione, purgatione utendum est ex picra, & hiera: & dropacismis ac sinapismis, & balneis naturalibus. Obstetrix autem digito prius pinguefacto immisso, incumbentem sanguinis grumum, si ita contingat ut adsit, educat leniter ipsum exoluens. Rursusq; cataplasma imponatur ex ficu, nitro, & absinthio. Epithemata uero sint mollitoria, polychisum, & quod ex seminibus paratur, & quod ex lauri baccis. Pessi conueniunt ex ruta, melle, nitro, maxime uero hic, sicui pinguium contusorū drach. I. cumini drach. II. aphronitri drach. I. Verum propter acrimoniam prius in lac tingatur. sed & mollitorij pessi comodi sunt.

De uteri strangulatione. Cap. LXXI.

Strangulatio uteri

Strangulatio uteri est recursus uteri, ad affectionem per consensum ducens principalissimas partes, uelut sunt arteriae carotides, cor, cerebri mēbranae. Sequitur in affectis accedente exacerbatione, mentis languor, pigritia, crurum debilitas, faciei pallor, aspectus tristis. Instante autem suffocatione, sopor grauis, mentis emotio, instrumentorum sensuum apprehensio, cum uocis interceptione, crurum contractio. Deinde incipiunt rubere mariae, & facies aliquantulum plena fit. Vbi uero remissura est, prodit humiditas quaedam ex locis muliebribus ad contactum, & murmur quoddam intestinorum praecedit, & ipse paulatim laxatur uterus, atq; sic & mentem, & sensum recipiunt. Mouetur autem morbus secundum circuitum, uelut comitialis, repleto uidelicet utero aut seminaria, aut alia materia, aut putrefacta in ipso materia. Et multae quidem restitutae sunt: quaedam uero in exacerbationibus derepente perierunt, pulsibus quidem densis euadentibus, & inordinate subtrementibus. deinde etiam ipsorum interceptione sequente, modica autem humiditate instar roris in cute consistente: Verū respiratiōe primū obscura coningente, deinde penitus intercidente. Abundat haec affectio hyeme & autumnō, in iuuenculis salacibus, sterilibus, & praeterea

A præsertim si per medicamēta steriles faciæ fuerint, & alijs perfrigeratis. Ita, que in exacerbationibus extremas partes deligare oportet, & tota crura, totumq; corpus confricare, & uelut eos qui in animi deliquium inciderūt reuocare, & odóramenta graueolentia naribus admouere, uelut sunt, funiculus lucernarius extinctus, castorium, pix líquida, cedria, lanæ & panniculi ustri. Quidam etiam matulam urinæ ueteris, aut egestionis alui naribus adhibuerunt. Cucurbitas quoq; affigere oportet ad inguina & imum uentris, cum multa flamma, & leues, & cum scarificatione. Si uero prolongetur exacerbatio, etiam ea quæ flatus ducunt commoda sunt, uelut collyria in anum subdita, quale est cuminum & nitrum cum mele. Sed & infuso per clysterem stercorea subducere oportet, ut ne sua appositione præmant. In ipsum uero uterum odoratissimâ ungenta infusâ, detrahare ipsum solent, uelut est amaracinum, mala bathrinum. Sed & sinapi partim naribus adhibeatur, partim pedibus cataplasmatim modo imponatur. Voce quoq; asperiore quis inclamet, excitet, ac uocet ipsam. Sternutatoria etiam adhibeantur ex castorio, herba lanaria, pipere. Vbi uero remisit exacerbatio, ad uomitum cogantur, & in cibi abstinentia, aut omnino modico cibo conseruentur. Post septimum diem hîera ex colocynthide purgentur. Post tertium uero diem, cucurbitas affigere oportet lumbis, & laterum mollitudini. Deinde castorij potu uti, aliquando cum artemisiâ decocto, aliquando cum aqua mulsâ. In quibusdam enim hoc etiam solum ad perfectam curationem satis fecit. Inessus autem, & pelli mollitorij assumantur. Atq; hæc quidem ad exacerbationes. Verum ad totius corporis reparationē, à uenæ sectione initio facta, ad purgationem per hieram transire oportet. Deinde picram ex aloë dare drachmæ pondere, cum cyathis III. a quæ mulsæ, in assiduo usui, aut ex interualis drach. II. cum aquæ mulsæ cyath. VI. Viendū etiam dropacismis, & cucurbitis, & sinapismis, & acopis ex euphorbio. Deinde exercitijs, fricatione, & uociferationibus. Postea etiam aquarum naturalium balneis.

*Collyria subdita*

*Hiera picra ex aloë usus*

De uteri prolapsu.

Cap. LXXII.

UTERUS procidit raro quidem, uerum ob plures causas. Aut enim mulier ex alto delapsa, & ad coxas delata, ruptis pelliculis quæ ipsum uetus continent: aut ob extractionem secundæ uterum simul attrahentis, & ipsi adnatæ, uelut in partus difficultate: aut ob inartificiosam fœtus extractionem: aut ob plagam: aut ob animæ affectiones, uelut liberorum amissionem nuntiata, aut hostium incursum: aut ob periculosa nauigationem, aut aliquā huiusmodi causam, tota corporis miscella exoluta, utero simul prolabente: aut ob resolutionem & debilitatem partium, uelut inclinata maxime ætate contingit. procidit autem os ipsius. Quidam uero totum ipsum procidere narrat, id quod probabile non est. Quomodo enim reductus fir mari posset? Oportet igitur euacuato primum per clysterem stercore, & excreta urina, quo undiqueq; à compressione liber sit uterus, ægrotam supinam collo care, altiores coxas habentem, & poplites incuruatos cum cruribus diductis. deinde accipere hapsum lanæ figura & crassitudine sinui muliebri respondentem, cumq; tenui linteolo circumdare, & in succum acacig intingere, aut in hypocisthidis succum uino dilutum, & ad uterum apponere, & citra uolentiam retrudere totum id quod procidit, donec tota moles ad sinum redigatur, & forinsecus contegere pectinem spongia expressâ in posca, & decumbere facere hominem extentis ac eoaptatis inter se cruribus, ita ut alterum alteri incumbat. Postea uero cucurbitæ affigantur cum plurima flamma, & ad umbilicum, & ad utraq; laterum mollitudinē. Odorata quoq; naribus adhibeantur olfacienda. Tertia uero die, incumbentē in sinu lanæ hapsō, insideat mulier in uinum nigrum austerum aliquantulum tepesactum, aut in myrti, lentisk, ac malicorij decoctum. postea incumbens lanæ hapsus tollatur, & alius eodem medicamento imbutus indatur. Cataplasmata extrinsecus imponentur ad imum uentrem, ex palmulis, polenta;

*Uteri prolapsum*

Vterus totius  
ablatus

aut lenticula & malicorio, cum aceto mulso: & per tertium diem rursus eadem fiant usque ad perfectam curationem. Si vero ubi per tempus maris, putrefactum fuerit id quod procidit, auferatur id citra omnis periculi formidinem. Nam totum ablatum esse uterum putrefactum narrant, & tamen mulierem uixisse.

De obturamento in utero.

Cap. LXXIII.

Obturamentum  
tutis uteri

Est obturamentum circa uteri osculum, aut ob ulcerationem progressam, aut ob inflammationem in scirrhum induratum. Curare uero oportet infessibus emolliendo, ex aqua & oleo, & foenigraci decocto: ita ut etiam similia cataplasmata imponamus, & pessos molitorios adhibeamus. Si uero diuturna fiat affectio, subuaporationibus & suffimentis ex aromatis utendum est. Soluit obturamentum etiam pessillus ex celsypo, nitro, & resina terebinthina: ut quod nihil aliud sit quam osculi uteri coarctatio.

Non concipientium curatio.

Cap. LXXIII.

Conceptione  
adiuvantia

In communi quidem utrisque, & uiro & mulieri conuenit, ut totum corpus in bono temperamento conseruetur, per laborum, ciborum, balnearum, & reliquorum omnium commodationem: & quod maximum est, ut ne negliamus habitum pinguescentem. Neque enim idonei sunt pingues ad liberorum generationem, tum quod pudendis non congruunt, tum quod modicum etiam semen emittunt: neque tamen etiam attenuati. Profuerint autem ipsis omnia calefacientia, & leniter infantia, uinum igitur calidum moderate accipere oportet, & ex oleribus erucam, & horminum, & erysimum, & similia. Rutam autem & calaminthen praeter omnibus uitare. Si uero ob uisum aliquem humorem conceptio non fiat, hunc expurgare, aut bono uictu contemperare. Priuatim uero mulieribus conuenit partium circa uterum quam maxime prouidentiam habere, & menstruam euacuationem citra impedimentum fieri. Vbi itaque prope adest purgatio, ciborum ac potuum moderationem quam maxime procurare oportet, ita ut etiam aliquid ex irritantibus ad purgationem accipiat, qualia sunt odorata ac acria olera, uelut est scandix, crithimum, foeniculum, apium, Smyrnium: uteri uero in tempore corrigere. Frigidiores itaque uteros indicat mensium suppressio, & uiscus frigidior, ac crassi succi, & torpor oboriens circa pectinem, lumbos ac crura. Si uero perfectae perfrigeratae fuerint, neque Venere appetunt. Oportet itaque ipsam tum alijs laboribus se exercere, tum omnibus fomentis, & his quae perfrigus sunt uti, & calorem reuocare. Neque absolum est castorium bibere, & semina odorata, cumini, anisum, pulegij comam, & sumperi fructum, pipere singulis ammixto. Ipsorum uero uterorum somenta partim uapore sint, insidentibus sellis perforatis, partim calida aqua affusa, in qua cocta sit salvia, artemisia, ruta, cyperus, pulegium, acorum, & odorata semina. Cataplasmata etiam ex his singulis pectini adhibeantur. Bonum est & polyarchium epithema. frictiones item pectinis & coxarum nullo minus conferunt. Utendum etiam pessis subdititijs, ex myrrha, ruta, galbano & castorio, ubi prius fomentum aquae mulsae aut marinae adhibuit. Bonus est adhuc pessus qui gone, id est genitura appellatur. At uero calidiores uteros conseruare oportet ex toto corpore calidiores, & mensibus paucis, & cum dolore, & quod exulcerant pudenda mulieris. Corrigere autem per moderate humectantia ac frige facientia, qualia sunt ex oleribus lactuca, ac malua, & blitum ac cucurbita, & cucumis, & pepo, & atriplex, & portulaca, & alij consimiles cibi. Vesicae uero & superno uentri, & lumbis adhibeantur frige factoria tum cataplasmata, tum succorum illitiones. Si uero ob humiditatem uteri non concipiant, signum est quod & humectantur circa coxas, & tenuiores ac multi deferuntur menses. Vicius autem his conuenit siccior, labores, frictiones partium superiorum, uomitus, siccitas & moderatio cibi. Commodum fuerit etiam acerbis medicamentis uterum corroborare, qualia sunt lentisci decoctum, & myrti baccarum, rosarum, rhois, floris mali punici, rubi tenerorum uirgultorum, & gallae. Quod si siccior sit uterus,

Venerem non ap  
petunt per  
frigerata



A per contraria curetur, balnea dico, & unctiones, & cibos humectantes ac oleraceos, uinumq; moderatum, & non ualde uetus. At si præhumoribus crassioribus conceptus impediatur, si quidem is mordax fuerit humor, purgare oportet mulierem, quemadmodum quisq; humor peculiariter id exigit, maxime uero per picram ex aloë. Deinde serum lactis per clysterë immittere, & uicium commodiorem excogitare. Pituitosi uero humores laboribus, & sudorificis, & uomitibus, aut etiam infernè euacuandi sunt. Oportet & medicamentum hoc bibendum dare. Epithymi, euphorbi, piperis, seminis dauci & petroselinii, omnia trita drachmarum duarum pondere exhibeto. Hoc & per uentrem probe ducit, & uterum calefacit, quemadmodi sæpe etiam menses his quæ non purgantur prodire fecit. postquam uero correctio se declarauerit, mensibus probe prodeuntibus, tunc coire oportet desinente purgatione. Quandoquidem uero etiam status in utero prohibent conceptionem, signa quidem ipsorum ex his quæ de uteri inflatione dicta sunt accipere oportet. Curare autem primum uicium parciore. deinde cumino, & anetho, & apij semine, & ruta, & aniso exhibitis. Aromata item pleraq; exhibeantur, partim ut bibantur, partim ut apponantur. Cæteri conclusos uteros aperire oportet, odoratis decoctis affusis, & fomentis adhibitis ex malua, semine lini, scenogræco, & oleo, quandoq; etiam melle. Fortioribus item, artemisia, conyza, calamintha, pulegio, & anthemide in pessis uero utantur terebinthina, niro, cucumere syluestri, elaterio, cassia, & picis sero. Quibus autem osculum uteri hiat, his uicis, & fomenta, & medicamenta sicciora ac adstringentia conueniunt, mali punici flores, lentiscus, rubi radices, myrti bacca, & quæ in humidiorē commodant. Distortiones autem uteri fomentis dirigere oportet, & mollientibus pessis subditis. Porro coitus cum muliere aversa, etiam ad conceptionem conferre uidetur.

Coitus tempus  
ad conceptionem

De fissuris, condylomatibus, ac hæmorrhoidibus uteri. Cap. LXXV.

Coitus cum  
aversa  
Fissura uteri

Circa uteri osculum fissuræ fiunt ex uolentis partibus, & primum quidem latent, dum recentes adhuc sunt ex partu dolores. postea uero paulatim percipiuntur, aliquando ad manuum contactus, aliquando etiam in coitu, quando etiam cruentæ fiunt propter confrictionem. depræhenduntur autem sine diductio. Nam ruptiones in ambitu osculi conspiciuntur. In quibus chiturgia & mordentibus medicamentis reiectis, simplicioribus insellibus & pessis uti oportet. Cōuenit etiam emplastrum tetrapharmacum dilutum. Si uero callosa fuerit fissura, medicamento ex charta usta utendū est, cum rosaceo. Quod si uim ipsius non ferant, fridem illyricam teretis in thina exceptam indito. Vlceribus autem ad cicatricem perductis, conuenit id quod ex cadmia constat, aut aliquod sedi destinatum, uelut est id quod ex spuma argenti paratur. Quandoquidem uero contingit fissuras diuturnas in condylomata mutari, per consimilia callus adimatur, & condylomatum eminentiæ ad cicatricem perducantur. Hæmorrhoides autem fiunt circa osculum aut collum uteri, & per dioptram instrumentum depræhenduntur, ex eo quod eminentia apparet circa exacerbationes dolorosa, cruenta, & rubicunda. In interuallis autem rugosa, doloris exors, subliuida, ac stilans. In his igitur si fieri potest, in interuallis excisionē utendum est in uollesella prehenlis. Sin minus, per medicamenta saltem ipsas constringere oportet, ita ut aliquando malicorio sicco cum galla, aut tali quopiam attingamus: aliquando his quæ in eruptione sanguinis ex utero relata sunt utamur, quæ etiam his quibus ob debilitatem sanguis erumpit, conueniunt, quæ cognoscuntur ex eo maxime quod uterus assiduè cruorem remittit ex interuallis, & non solum mensuræ purgationis tempore.

Condylomata uteri  
Hæmorrhoides uteri

De difficili partu. Cap. LXXVI.

Difficultas pariendi fit aut circa parientem, aut circa fœtum, aut circa secundam, aut propter externa. Circa parientem quidem, aut crassam, aut obesam, aut quæ totum uterum paruum habet, aut dolorum partus expers est,

Pariendi difficultas

est, aut tumida, aut inflammationem circa uterum habet, uel in alia parte, aut quomodoque alias aegrotat, aut naturaliter debilis est, & extrudere non potest, aut ante tempus parit. Circa foetum uero, qui aut nimis magnus est, aut paruus, & parui grauis, aut magni capitis, aut monstrosus, uelut biceps, aut mortuus, aut uiuus quidem, uerum debilis, & qui extra prodire non possit: Aut quod plures sint foetus: Quinq; enim uisos prodidit Herophilus: aut quoddam figuram habeat praeter naturam. Nam figura secundum naturam foetibus est, prima quidem in caput, manibus ad foemora extensis, ita ut et directio osculi uteri, caput nullatenus inclinatum habeat. Secunda ab hac in pedes citra inclinationem. Quae uero praeter has sunt figurae, omnes praeter naturam sunt. Circa secundam autem, quae aut non auellitur, propter crassitudinem, aut etiam antea quam oportet auellitur, propter tenuitatem. Euacuato enim humore, foetus praesiccatate aegre deuoluitur. propter externa uero, si aut frigiditas densauit, aut immoderata caliditas uires excoluit, aut etiam fortuita aliqua re allapsa. Si igitur ob coarctationem aut uelut obturationem foetus, difficultas pariendi fiat, primum coadiuuare oportet per laxationem, infundendo assidue olei calidum, cum decocto foenigraci, aut maluae, aut seminis lini, aut etiam cum ouis, mitigationis gratia. deinde cataplasma imponere pubi, superno uentri ac lumbis, ex semine lini cum aqua mulla, aut aqua & oleo: & infessibus similibus uti. Sed & ex balneis assumere laxationes, si non febris, aut alia aliqua causa impediatur, & parientem perfectam mouere in aere moderate calido. Quidam etiam concussionem fortes adhibuerunt, & sternutatoria admouerunt. Et quae quidem timida est, impellatur. Quae uero inexperta est dolorum partus, persuadeatur, ut maxime fortiter spiritum contineat, & ad laterum mollitudines compellat. Quae uero animi deliquium incidit, odoramentis non offendentibus refocilletur. Aleuata autem modiocriter, modico cibo nutriatur. At uero quae obesa est, in lecto prona figuretur, genibus ad foemora inclinatis, quo uterus ad abdomen delatus et directio osculi sit. per digitos autem ceratis aut pinguedine osculum illinatur, & leniter diducatur. Et si qua affectio fuerit circa partes, etiam huic prospiciatur: & stercores contentum per molle infulum per clysterem eiciatur: & secunda aperta dirimatur, aut digitis, aut scalpello inter ipsos occultato, praecedente sinistra manu: & aliquis pinguis humor per clysterem in uteri capacitatem immittatur. Si uero praeter naturam figuratus est foetus, naturalis figura restituatur, partim impellendo, partim deducendo, partim flectendo, partim dirigendo. Et si quidem manus aut pedem praemiserit, non hac parte apprehensus extrahatur. Magis enim obturatur, aut exarticulatur, aut etiam abruptitur uerum digitis humero iniectis, aut coxae ipsius foetus, pars praemissa ad convenientem locum retrudatur. At si una cum obturatione, totius foetus figura euariet, prius ipse ab utero osculo in sublime retrudatur. deinde apprehensus rursus ad osculum dirigatur. Si uero plures uno foetus deferantur, rursus sursum ac deorsum dirigantur, omniaque fiant sensim ac leniter circa compressionem oleo locis affuso. Tempus autem desessus in sellam est quum osculum uteri apertum digito occurrerit, & praeruptio promouerit. Quoddam si uero non prodierit, eo quod mortuus est foetus, aut ob aliam causam, ad foetus extractionem progrediendum est.

De coxendicū morbo. Cap. LXXXVII.

Articularis  
morbus  
Coxendicū  
morbus

Quum articularis morbi generis sit coxendicū morbus, in eo solo differt ab eo, quoddam causa ipsius circa coxam firmatur. Causa uero huius est crassus ac pituitosus humor coarticulationi circa coxam impactus. Dolor autem ipsius est à locis circa nates & inguina, usque ad genua. In plerisque uero usque ad summum pedem pertingit. Ab initio igitur agro oblato, post stercoreum per clysterem euacuationem, uenae sectionem à cubito assumimus cum repetita detractione. Si uero post tempus aeger nobis obtigerit, à malleolo circa crus affectum detractionem faciemus. Et circa excretionem

Abationes hac irrigatione utendū est. Cyprini cyath. viii. aceti cyath. iiii. nistri cyath. ii. seminis rosmarini cyath. i. per lanas succidas calida hec adhibentur. Post hanc cataplasma imponatur ex lupinorum amarorum farina, cum aceto mulso: aut ex liliacea farina cum resina, & cucumeris syluestris radice, & nitro, & calamintha, & rosmarini semine, & lauri bacis. Sed & sola calamintha utiliter imponitur est aceto mulso, aut aqua multa. Emplastro vero mitigatorio utendum est hoc. Ceræ drach. c. terebinthinæ drach. xxv. æruginis drach. vi. myrrhæ, galbanī, iridis, singulorum drach. vi. cedræ drach. v. præbibendus detur succus cyrenæicus eui magnitudine, aut castorei drach. i. cum opopanax oboli. iiii. Radicis autem capparis cortex potius, & cataplasmatibus ammixtus prodest. Si uero multus est dolor, etiam dolorem eximentia medicamenta locum habent. Velut est antidotus Philonis, & quæ ex duobus piperis generibus constat. Infusum uero hoc immittatur. Mellis sesquicyathus, olei sesquicyathus, aquæ cyath. ii. nistri drach. viii. terebinthinæ drach. iiii. His calidis infusis, insuper fomentū ano adhibeatur, quo longiore tempore retineatur. Euacuat mucosa, quandoque etiam sanguinem, quando etiam plus prodest. Si uero perseverauerit affectus, quod tamen raro contingit, rursus ipso utendum est frequentius, pro aqua centaurei decocto ammixto. Sanguinem euacuat etiam Thlaspeos semina infusum, & elaterii succus, & quod ex ipso, aut ex radicibus ipsius componitur oleum sicyonium: & salforum piscium muria, & oliuarum columbadum muria recte infundi potest. Cucurbitis etiam ad coxam, cum multa flamma & scarificatione utendum est. Aliquando etiam hirudinibus. per se uerante autem affectione, ad purgationē procedendum est, aut per hieram, aut per colocynthidem, ita ut medullæ ipsius probe tritæ drachmæ pondus detur, in aquæ mulsæ cyathis plus minus duobus, pro uiribus ægri, & pro ut alio bene affectus est. Sit autē ruta in aqua multa cocta. Probe etiam hos expurgat puls ex colocynthide. In quibusdam etiā uomitus à raphanis ab initio profuerunt. In interualis autem dropax adhibeatur, & acopa ex euphorbio, præsertim id quod uarium appellatur. Balnea uero naturalia his commoda sunt. Si uero nō adsint, in alijs saltem loti, relatis acopis utantur, & compositis his, tum Asclepio appellato, tum hoc, quod ex euphorbio, & darces, ueratri nigri, castorei, pyrethri, piperis, staphidis syluestris, singulorum æqualibus partibus paratur. Post balneum picis aridæ quadrans, sulphuris uiui sextans, calido adhuc corpori inspergatur, ipsumq; charta integatur. Si uero neq; hæc profuerint, aut reliquijs morbi restantibus, bonum est etiam sinapi cum caricis impositum, aut etiam per se. perfecte uero ipsos restituit Iberidis herbæ usus, quam sanè etiam lepidium, aliqui uero syluestre nasturtium appellant. Quæ uero apud nos nascitur fruticosa, folijs laurifolij similibus, & multo maioribus, multam de se experientiam dedit, non solum in coxendicum, sed etiam alijs diuturnis morbis. Aestate autem multo efficacior est. Si uero etiam folia tunc quum expetitur, non produxerint, radicis ipsius corticem contundere oportet cum adipe fusillo, ad emplastrum formam, deinde in linteum densum infarcita, dolentibus maxime locis imponere, aut circa totas nates & scemur, & sincere donec nigrescat, aut omnino liuida fiat summa cuticula: postea ipsum auferre, & loto hoc ceratum imponere. Opopanax trientē, in aceti cyathis duobus dissoluto, & ceratro cyprino excipito. Quod si recusent talium urentium usum, emplastris malum extirpantibus utendum est, quorum de numero & hoc est. Ceræ, resinæ, piperis, singulorum drach. xii. terebinthinæ, simi columbarum syluestrium, fecis uini usque recētis, singulorum drach. vi. galbanī sesquidrachmam. Est etiam de extirpantibus emplastrum leuena appellatum. cōmoda sunt quoq; ea quæ ex lixiuio ac nitro parantur. Quin & potionibus quæ ad annum bibuntur quidam usi sunt, ex quibus est & ea quæ ex quatuor rebus constat, chamædryos libra una, gentianæ dodrante, aristolochiæ rotundæ dodrante,

Sicyonium  
oleum

Iberidis herbæ  
usus

Anni usus  
medicamentis  
Medicamentum  
quatuor rebus  
constans

semitæ

seminis rutæ sicci sextario uno. Hæc contusa & cribrata quotidie darè oportet cochlearij mensura, seiuno & concoctione probe facta, cum aquæ frigida cyathis duobus, ad annum donec morbus sedetur. Medicamentū quoque ex septem rebus compositum, & quod pro clo adscriptum est, idem pōmittunt. Exercitia faciat per deambulationes, & per assiduos flexus, saltus ac cursus. Cibus sit attenuans moderatè & concoctu facilis. Si uero nulli ex relatis cedat coxendicum morbus, quandoq; ad suppurationem uertitur, quandoque laxatis neruis colligantibus, coxa ex articulo luxatur. Oportet itaque diuturna facta affectione, articulum urere tribus aut quatuor locis, uelut in chirurgiæ tractatione referetur, & ulcera ad plures dies consecrare, ut ne cicatrix inducatur.

De podagra, & morbo articulari, arthritide dicto. Cap. LXXVIII

**N**on sola partium debilitas podagricam & arthriticam affectionem efficit: alioqui exacerbationes indefinentes esse oporteret, in quantum etiam debilitas semper inest articulis debilibus: neq; humor solus: non enim in articulos solos intraret affectio: uerum ambo, & humor præter naturam, & partium debilitas, morbum efficiunt. Quum enim nutritoria partium facultas debilis fuerit ob ciborum repletionem, consequenter cruditates oboriuntur, & redundans humor in quamcumq; tandem coarticulationē sam antea debilem irruens, & neruos colligantes distendens, dolorem efficit. Neq; enim neruorum qui uoluntario motu mouentur, primariò affectionum est inflammatio: alioqui in locis inter coarticulationes medijs itidē ipsam fieri oporteret, uelut in tibijs medijs, aut scemoribus, aut cubitis, aut brachijs, per consensum igitur afficiuntur etiam uoluntarij motus nerui. Quando igitur pedum coarticulationes solum humor infestat, podagra affectio appellatur. Vbi uero causa omnes corporis articulos pertrahit, arthritidē appellare solent in qua & uerticula, & scapulæ, & maxillæ, & omnes articuli morbo feriuntur. Quibusdam etiam aures, & dentes, & fauces, & quandoq; etiam hepar & splen, articularibus doloribus participant. In quibus si non breui ad articulos translatio fiat, periculum in modico tempore agrotos corripit. Cæterum redundans humor, quandoq; biliosus, quandoque sanguineus, aliquando atrabiliarius, plerumq; uero pituitosus & crudus est, ex ciborum redundantia, cruditatibusq; ac ocio collectus. Moram autem trahens circa articulos crassescit ac uiscosior euadit, ut etiam tofos appellatos efficiat. Aliquando uero etiam humor ex pluribus mixtus est. Quare sit ut & cognitū & curatū difficilis, & ferè incurabilis sit morbus. Auspicatur autem & læssit affectionem plerumq; lassitudo immodica, & deambulationes concitata, & equitatio frequens, & rei Venereæ intempestiuus usus, frigida potus non consuetus, frigidorum aut multorum aut mialorum eduliorum esus, uinum multum: sed & ex offensionibus, aut impulsionibus, aut luxationibus, aut alijs huiusmodi, quidam primum affectionis experimentum fecerunt, præcedente quidem in corpore, & hæcenus quiescente materia, externa autem læssente causa ipsam commouente. Tristitia autem & cura, & uigilia, ac reliquæ affectiones, nō solum commouent, sed etiam ipsæ generant, siue primariò, siue per accidens, uitiosos humores. Variæ igitur sunt uelut dixi affectionis causæ. Facillime tamen quantum eius fieri potest, assilientium humorum differentia depræhenduntur, utpote quarum notæ ex coloribus ac symptomatis accidentibus sumuntur. Biliofa enim fluxio ad coloris pallorem ac ruborem, etiam caloris sensum, & dolorem acutior efficit, & cito per cutem distribuitur, citra magnum tumorem, & calefactionibus impolitis exacerbatur, quemadmodū uice uersa à frigefactionibus remittit. Atq; hoc quidem etiam in alijs omnibus plerumq; maxime tamen ex bilioso affectis humore contingit. Et febris ipsa accedit sepe in exacerbationum uigoribus, quando etiam siticulosi sunt. Sic autem & nigriorem in atrabiliarijs reperies colorem. Album autem & aquosum in pituitosa.

In quibus

Nerui colligantes  
Nerui motus  
uoluntarij

Podagra  
Arthritis

Tofi in articulis

Humorans  
note

In quibus autem sanguineus est redundans humor, in his & dolorem intus delitescentem, & tardius in tumorem se attollentem, uelut etiam sanguineum colorem deprehendes. Ad firmiorem uero dignotionem conferet tibi etiam praegressa uictus ratio, & reliqua.

*Curatio eorum qui ex bilioso humoris fluxione laborant.*

Principium curationis in his qui ex flaua bile, aut potius ex qualitate affecti sunt, affligentis humoris sit euacuatio, per purgantia medicamenta, quale est maxime quod ex rhodomelite paratur, & quod ex malis cydoniis & quod ex picra antidoto, & catapotia ex aloë. In exacerbationibus autem forinsecus rosaceo utemur, cum oui uitello, ac uino modico, conficta insuper leniter parte. Sed & frigescentes herbas adhibemus, uelut est solanum, portulaca, hyoscyamus, semperuium, lenticula palustris, feris, papauer, polygonum, rosarum folia, & similia: ita ut aliquando ipsa illinamus, aliquando cum micis panis posca maceratis, aut cum ordeacea farina, ac rosaceo cataplasmatim modo imponamus. At in inflammatione articulorum ignem facrum referente, manifeste mitigat cucurbitæ recentis cortex impositus, & peponis ac cucumeris caro, per se, & cum pane: & perdicij folia, itemque hederæ, cum pane aut polline polentæ. Sed & psyllium cum ordeacea farina coctum feruidas inflammationes mirifice mitigat. Similiter & rosaceum ceratum cum aliquo perfrigerante succo frigescentium: & quod ex sabacea farina paratur. Habet autem hoc modo. Cera quincuncem, chamæmelini sextantem & unc. s. rosacei sextantem & unc. s. farine sabaceæ unc. s. o. uorum v. uitellos.

Aliud cataplasma. Maluas uirides coctas terito, & psyllium priuatim uiscosum factum ammisceto. Deinde uitellis ouorum additis, cum oleo chamæmelino imposito. Si uero multus & ægrè tolerabilis est dolor, etiam ex croco, & glaucio, ac opio paratis utendum est, ita ut cum posca ipsa teramus, & aut illinamus, aut cum micis panis imponamus. Galenus autem huius meminit. Succus papaueris drach. iiii. croci drach. i. cum lacte bubulo aut caprino terito, aut panis internam partem adiecto, & ex contactu rosacei emollito, ac pro cataplasmate utitur. Aut opium & crocum cum lacte tritum, cerato rosaceo excipito. Sed & ex torpedine ceratum eiusdem facultatis est in exacerbationibus, & oleum ex ipsa. Quin & hoc consimile est. Micarum panis aqua aut posca maceratarum, semperuium, aut solanum, aut portulacæ, carniū palmularum, seminis papaueris, singulorum partes, uitellorum uorum assatorum, & rosacei quod satis est, pro cataplasmate imponitur. Verum stupefacientibus immorari non oportet, sed eo usque solum ut doloris uehementia moderatior fiat. Nam uberior ipsorum usus, & humorum compactiones, & tofos, & diuturnas motus difficultates efficit. Post usum igitur eorum quæ dolorem eximunt, aut emplastro ex succis cum chamæmelino dissoluto utendum est, aut eo quod ex althea paratur, aut aliquo huiusmodi medicamento. Postquam autem recalscua fuerint perfrigerata, partem corroborabimus emplastro phœnicino, aceto & rosaceo, aut uino ac rosaceo dissoluto. Si uero grauentur emplastris, acaciæ succus cum posca illinatur, aut lycium cum croco, & glaucio, & perdicidis succo in posca. At uero usum ipsorum perfrigerantem & humectantem esse conuenit, quales sunt ex priscana & alia forbitiones: & ex oleribus malua, lactuca, intybus: & gallinarum domesticarum pulli: & pisces petrosi, & erinacei, & perdicines, & similia. Vitent omnia calefacientia, & quæ pallidam ac flauam bilem generant, & uina uetera, fulua ac nigra, & repletionem. Utantur etiam balneis potabilium aquarum, & circa ipsas fluxiones, quantum ad causam attinet, & absque illis, si non aliud quid prohibeat. Vitent iracundiam, ciborum abstinentiā, acritur edulorum usum, ebrietatē, lassitudinē immodicā, Venerē.

*Curatio eorum qui ex sanguinei humoris fluxione laborant.*

In quibus sanguineus humor redundat, uenæ sectione utendum est citra

*Torpedinis  
ceratum.*

*Stupefacientium  
usus noxiū*

dilationem. Imò etiam in pituitosioribus aut atrabilarijs, quandoquidem & his humor in uenis quam maxime continetur, quantitate magis quam qualitate lædens. Venæ igitur sectione assumimus statim circa primam morbi tentationem. Nam quos saepe iam fluxio præoccupauit, illi læduntur magis ex sanguinis euacuatione, quam ut opem sentiant, & magis in quibus ex natura frigidius aut etiam debilius est corpus. Post sanguinis euacuationem, si non solum sanguis est qui redundat, modico tempore interposito, etiam purgatione ex hiera utemur. Sed & acetum mulsam Iulianum ex his est quæ hos conuenienter purgant. Qui uero talia purgatoria medicamenta recusant, his catapotijs utantur. Aloës, colocynthidis, uerratris nigri, scammoniae singulorum unc. i. euphorbij unc. s. nitri unc. s. excipe succo brassicæ, & præbe pro uiribus. Melius autem in malorum cydoniorum succo.

Catapotia  
uaria

Aliud catapotium. datur & in exacerbationibus, & in interuallis, & in omni humore in podagricis. Aloës sexuncem, agarici unc. s. croci unc. s. costi unc. i. spicæ nardi unc. i. floris iunci odorati unc. i. carpobalsami unc. i. cassiæ sextantem, scammoniae sextantem, epithymi quadrantē & unc. s. Dosis moderata est scrupulorum 11. perfecta 111. Quin & ex armeniaco lapide catapotia misce purgant, primum in arthriticis cōuenientia, tum in principijs, tum in declinationibus fluxionū, atq; etiam in interuallis data.

Scammonie  
fuga

Quandoquidem uero quidam scammoniam uelut stomacho incommo- dam iugunt, danda sunt ipsis, & præsertim si pituitosa materia redundat, hæc catapotia. Colocynthidis medullæ, uerratris nigri, bdellij, gummi, aloës, singulorum unc. i. nitri Alexandrini, euphorbij, singulorum unc. s. dantur scrupuli 111. Ego uero progummi, epithymū adieci. Quidam uero in ipsis

Hermody-  
lus stomacho  
incommodus

exacerbationibus, in omnibus arthriticis, purgatione ex hermodactylo utuntur. Verum attendendum est, quia stomacho incommodus est hermodactylus, & anxios ac ciborum inappetentes facit. In solis igitur his qui ne gocijs quæ differri non possunt urgentur, ipso utendum est. Compendio enim & post duos ut plurimum dies sedat fluxionē, ut quis ad consuetas functiones obeundas transire possit. Noui autem quendam qui non ipsam hermodactyli substantiam exhibet, neq; aliquod medicamentum ex ipso compositum, sed herbam ipsam coquit, cum aliquo ex consuetis pharmacis, uelut aniso, aut apio, & decoctum bibendum præbet. Et mirum est quomodo per uentrem euacuati à fluxione liberantur. Oportet autem propterea quod stomacho incommodus est, uelut dixi, postea stomacho gratis & corroborantibus, cum moderata caliditate, osculum uentris corrigere. Ceterū Ale-

Alexander  
medicus

xander purgationem ex coronopodio, melleorem esse dicit ea quæ sit ex hermodactylo, ut quæ eandem euacuationem & doloris sedationem efficiat, cum hoc quod neq; stomacho incommoda est. At uero localia pituitosis adhibeantur, si quidem moderatus est dolor, brassica uiridis imposita, & apium, & conyza, & uerbenaca recta: si uero uehementer dolent, farinæ scenigraci partes 111. farinæ lolij partem i. farinæ cicerum partem i. cataplasmatibus modo imposito cum aqua mulsâ, aut uino tenui, cum modico cyprino, aut nardino, & maxime hycine. Cinis item radicis & caulium brassicarū uiscerum, cum axungia impositus multis prodest. Verum ad mitigandum dolorem, recentem axungiam esse oportet: ad discutiendum uero uetere salisam. Facit & bubulum sterus cum farina ordeacea, in aqua mulsâ coctum: aut per se ipsum recens humidum impositum, cum brassicæ folijs. Similiter etiam caprinum sterus per se, aut cum farina ordeacea, ex polys coctum. Quandoquidem uero & ex his quæ contraria esse uidentur quidam opem senserunt: uariorum enim humorum mixtura dignotionem excindunt: materiam mixtam referemus. Prodest itaque syluestris & hortensis atriplex cum pane imposita. Aut uerbasci folia cum bulbis & pane trita, aut cum polenta. Aut ex cruda ordeacea farina cataplasma. In summa porro, in quibus est obscura causa, transitionē facere oportet, quandoq; ad ea quæ sunt eiusdem generis

Causa obscura  
quid sciendū.

A generis, aliquando etiam ad contraria, ita ut neq. iisdem immoremur, si nō mitigationem exhibeant. Hæc enim quotidie in ipsis artis operibus uidemus fieri, & idem auxilium huic quidem articulo prodest, alteri uero in eodem ægrotō similiter inflammato, non solum non prodest, eadem etiam hora, sed quandoq. etiam insuper lædit. Et quod sanè mirum est, unus & idem articulus sæpe ab eodem auxilio, nunc quidem utilitatem percepit, paulo post autem etiam insuper inflammatus est. Non igitur aliquando fortassis, ubi quidem uiscosa & crassa materia obtinet, ex calidioribus opem sentit, ubi uero acris ac feruida humoris qualitas obtinet, frigefacientibus mitigatur. Et nihil miri est etiam frigidiorē natura materiam, inflammationis tempore exardescere ac feruere, ut bilis si ita contingat, ammixtionē omittam. At uero toforum coactionem prohibet farina lupini cum aceto mulso aut posca. Aut silphij, aut bryoniæ radix cum pane. Sed & hoc ex his est quæ citationem mitigant, simulq. moderate discutunt. Lycij unc. i. ammoniaci thymiamatis unc. i. cum uino uetustissimo trita & oleo acerbo coquito, & farinæ fabacæ quod satis adijcto, & moderate cocta imposito. Post uiscores autem tumore relicto, imponantur bulbi per se, aut cum polentæ poline, usq. ad lincinationem. Ita enim operari solent. Si uero cataplasmatibus non mitigentur, irrigationibus & perfusionibus utantur ad locos, maxime si extremæ partes fuerint, ex chamæmeli & meliloti, aut etiam centaury decoctis. Quosdam etiam capparidis decoctum multum iuuat. Hoc autem omnium efficacissimum est. In aceto acerrimo Thymum, origanum, Thymbram & calamintham coquito, indeq. locos affectos perfundito, nō solum semel, sed sæpe in die confidenter, multis profuit non solum ex pituita, sed etiam bile affectis. Quidam & hoc obseruauit. Illicis glandes tundunt, & diu coquunt, & decocto hoc extremas articulorū partes in fluxionis principio, ad multum tempus irrigant, interiores autem partes spongijs perfundunt, & statim materiæ impetum repellunt. Hoc etiam ex bile affectis conuenit, quemadmodū etiam in aquam calidam absq. aliquo decocto demersio. Cæterum ad dolores, & impios articulis humores, ob intentam frigiditatem abortos, forte est hoc auxilium. Olei ueteris libram i s. nitri Alexandrini lib. i. terebinthini lib. i. euphorbij unc. i. iridis sextantem, farinæ feniculi sextar. i s. His uero etiam conueniunt quæ ad coxendicum morbum relata sunt. Multi enim ex ita perfrigeratis, in declinationibus & sinapi cum caricis usi sunt, & alijs rubefactorijs. Quidam etiam medicamento ex cantharide. Verū hæc lædunt in posterum, si non aliquo ex mollientibus usi fuerint, uelut est quod ex herba lanaria paratur, & quod pyxis, & quod Basilij appellatur. Et quod ex abiete fit, & quod ex populo nigra, & Bromij, & lyliponium appellatum, & ex acopis fortiora: In quibus etiam maxime neruorum per consensum affectiones & humorum impactiones fiunt. Emplastrum uero ex mulæ urina, etiam in uigoribus impositum, frigidioribus præsertim fluxionibus commodum est. Similiter & ex duobus ueratri generibus pastillus. Porro ad laxos tumores conuenit fomentum quidem ex sale frictio, aut etiam alio modo aquæ marinæ calidæ per spongas perfusio aut irrigatio, & emplastra ex sale parata, item ex lixiuio, & ex nitro emplastra, & conuulsiua his cataplasmata post uigores. Vicius autem escior, & nihil superfluitatum habens his conuenit, & ciborum abstinentia, aut parsimonia, & balneorum assiduorum abstinentia. Loti uero, nitris & alijs defrictorij utantur. In declinationibus autem exercitijs & frictionibus articulorū maxime utantur, & naturalibus balneis, aut etiam arenæ ingestione, uo mitibusq. à raphanis ac cibus. Qui uero ad hoc idonei sunt, etiam per ueratrum albi euacuentur per uomitus, aut etiam per infernam alui purgatur.

Tosis decrescere prohibetur

Tumores laxi

Curatio eorum qui ex mixti humoris fluxione laborant.

Qui ex mixto humore affecti sunt, post sanguinis in principio morbi euacuationem, relatis localibus auxilijs utantur, si quidem biliosior & acrior est

est redundans sanguis, his quæ in bilis fluxione relata sunt. Si uero frigidi, or & pituitosior, aut etiam magis atrabiliaris, his quæ post illa dicta sunt, exceptis ualde acris. Si uero diuturnum sit malum, etiam his. Sed & hoc cataplasma ab initio conuenit. Malicorium & rhus, & polenta, in uino trita imponuntur. Aliud. Ad folia brassicæ cocta ac probe trita secem acetæ adijcto, & ouorum crudorum uittellos duos, & rosacei parum, & trita imposito assidue permutando. Cibos autem attenuantes & parum nutrientes sumant, proinde à carnibus ac leguminibus abstineant, & à uino copiosior, re ac nigro. Quod si fieri possit, etiam in totum uini potum uitem. Multos enim noui qui à solo hoc penitus abstinerunt, & omnes opem senserunt. Quidam enim in principio morbi perfecte liberati sunt: quidam postea, & raro, & neque ualde dolorose exacerbati sunt. Si igitur nihil aduersi ex hoc contingat, aut in futurum timeatur, per totam uitam à uino abstineat. Qui uero propter debilitatem, aut perfrigerationem, aliquantulum succumbere apparuerint, ubi ad biennium à uino abstinerunt, hinc iam modicum & a quosum perpetuo bibant. Oportet autem eos qui à uino abstinent, pro uino anisi decoctum bibere, aut alicuius eiusmodi seminis, abstinendo quantum eius fieri potest à fructibus pomorū, & reliquis perfrigerantibus, idēq; à Veneris usu. Qui uero medicamentis quæ per annum bibuntur perfecte à morbo liberare uolunt, hi plerumq; pituitosiores ac superfluitatibus abundantes iuuerunt: calidioribus autem & siccioribus repentinæ mortis causa fuerunt, materia ad intestinum, aut rhenes, aut latus, aut pulmonem, aut aliquam principalem partem translata. Melius igitur est in biliosioribus, aut multo sanguine redundantibus, uini usum uitare, quum ex hoc nullus inrelata pericula incidat. Verum in frigidioribus & superfluitatibus repletis, theriaca ex uiperis utendum est, ita ut bona facta concoctione frequenter ipsam sumat hyeme, rarius autem æstate. Aut enim à morbo liberat, aut moderatiorem ipsum reddit, nullam relatarum partium lædens. Quandoquidē uero cogunt aliqui nos etiam ad relatarum antidotorum usum, eiusdem generis esse scito, & quod ex Damascio paratur, & quod Agapeti appellatur, & Inordinatum dictum, & Octaidon octo rebus constans, & quod prodo adscribitur, & quod ex scordio fit, & quod ex corallio, & alia complura. Verum securissimum omnium, insuperq; multi experimēti est, quod ex corallio paratur, ut quod etiam tofos in articulis iam coactos dissoluit. Horum autem omnium & facultates, & usus modum, & in his cautionem, in libro de medicamentis comperies. Similiter etiam psilothorum ad arthriticos, & compositiones, & usus modum, in iisdem habitibus, pituitosioribus dico, in usum uenientium. Alij ad totius morbi exclusionem, uulperulas totas in oleo coquentes arthriticos medentur, partim uiuas in maximilebetē mittentes, partim mortuas. Similiter etiam hyenas coquunt, disculforium oleum facientes. Deinde folia ex ipso complentes, & arthriticos in ipsa demittentes, & multo tēpore immorari iubentes. Ex hoc autem cōstat, gīt non solum timores circa articulos, sed etiam totum corpus euacuari.

## De tosi.

Tosi in articulis

Quandoquidē etiam tosi sepe in articulis coguntur, aliquando ob etasum ac terream humorem in ipsos irruentem, aliquando etiam ob medicamentorum discutientium ac immodice resiccantium, citra emolliitionem, usum, id nosse expedit, commodiora pharmaca esse quæ unā cum hoc quod molliunt, etiam discutere solent. Molliunt itaq; adipēs uetusti, & medullæ, & ammoniacum, & bdellium, oleumq; ualde uetus, & styrax. Discutunt autem & siccant, nitrū, sal, lxiuiū, adarce, cuphorbium, & similia. Verum ad tofos in articulis priuatim facit caseus uetustissimus & acerrimus, cum carnis suillæ pinguis ac ueteris decoctio trita ac imposita. Erumpente enim tofo sua sponte, quotidie euacuatio contingit. Compositum autem id quod ex perna fit, experimento cognitum est, & dupliciter paratur, & quod

Vini abstinentie utilitas  
ad doli...

Antidoti antidoti  
uius usus

Vulperula uiuas  
in oleo cocta

Caseus uetus  
pistatus



A quod à lixiuſo appellatur. Sed & hoc priuatim facit. Aphronitri, terebinthi  
 naſ, lixiuſij ex cinere calce addito parati, propolis, ſingulorum trientem, ce-  
 reſe dodrantem, colophoniam lib. i. olei unc. xvi. mixtis utere ad toſos & ab-  
 ſceſſus. Quod uero ex cinnabari paratur, admirandum quidem & ad toſos,  
 & ad plura alia, ſed diſcultius haberi poteſt. At quod ex nucibus auellaniſ  
 ſit, ad hoc quod felicem ſucceſſum habet, etiam facile parari poteſt, & non  
 ſolum in fortioribus, ſed etiam ſubtili ſenſu præditis corporibus conuenit,  
 ſi emplaſtri ex melle, aut quod ex anemona ſit, duræ partes ad unam ipliſ  
 aſſumantur. Si uero non adſint, etiam ex eo quod ex ceruſſa ſit, æqualis por-  
 tio ad iſpum ammiſcetur. Aliud ad toſos. Sandaracham tritam uiſco  
 quercino excipe ac utere. Aliud. Facit etiam ad fiſtulas & Aegilopas.  
 Olei ſextar. i. ſpumæ argenti beſſem, & uncia dimidiſ, auripigmenti unc.  
 i. ſpumam argenti & oleum coquito, donec non amplius inquinent. Dein  
 de auripigmentum ualde triſum inſpergito, & prius quàm adurantur, ab i-  
 gne ablatis uitior. Quæ uero ex lapidis Aſij flore in interuallis & exacerbatio-  
 num imponuntur, ad omnes circa articulos conſiſtentes collectiones con-  
 uenientia, ueterum teſtimonio quorundam, à toto morbo liberare credun-  
 tur. Sed & id quod ex ſalis flore paratur, in declinationibus ſimiliter im-  
 poſitum, relictos tumores diſcutere creditur.

Cinnabariſ  
 raritas

De præſeruatione podagricæ.

Podagramiam conſiſtentem, aut etiam arthritidem, corrigere operoſiſſi-  
 mum eſt, citra relatas methodos. Verum eam quæ nondum facta eſt, præca-  
 uere facile eſt, ita ut ciborū detractio fiat, & eis utatur quis, qui & facile con-  
 coquantur ac diſtribuantur, & nihil ſuperfluitarū habent, itemq; uiſco mo-  
 derato, & ut exercitijs addito fiat, quantum ſatis eſſe uisum fuerit. Auxilij  
 uero loco, ſal in oleo tritus, & articulis affrictus, omnibus qui præcauēt ne  
 in podagricam affectionem incidunt, magnificè prodeſt, ſi nō ualde ſiccā  
 habuerint intemperiem. Oportet autem eo uti manē & ueſperi per omnem  
 uitam. Sed & poſt inflammationum declinationes eodem utendum eſt.

Podagricæ præ-  
 ſeruatio

Ad perſiones in plantis ac pernio. Cap. LXXIX.

Perſiones ulcerofæ ſunt affectiones, circa manū ac pedum digitos conſi-  
 ſtentes hyemis tempore. Oportet itaq; ipſos aqua marina tepida perſun-  
 dere, aut betetiaut lenis, aut erui, aut radicis aſphodeli decocto, poſt perſu-  
 ſionem lentes coctas in uiſco tritas imponito. Aut ſiccas tritas cum oleo im-  
 ponito. Aut alumen, & ſarinam, æquis partibus in uiſco trita adhibito. aut  
 ſecem uini ſubaridam. Aut bulbum recentem uiſco triſum imponito. Aut  
 allium in oleo torreto, ac reiſcito, & moderata cera in oleo liquata imponi-  
 to. Aut malicorijum uiſco coctum ac tritum, cerato roſaceo excipito ac uti-  
 tor, irrigatione ex lupinorum decocto præmiſſa. Aut mannam, & ſulphur  
 uiſcum cum melle cocto imponito. At hyoſcyami ſpecus affiduè illitus, ab  
 inflammatione ac dolore conſeruat.

Perſiones

Marcellium ad perſiones.

Rapi radicem extauato, & in foſſulam extauatam cere ſextantem, & o-  
 lei lenitiſcini ſextantem indito, & in duplici uafe, in aqua marina, aut mu-  
 ria, aut lupinorum decocto coquito, & hoc quidem perſundito, ceratum ue-  
 ro in rapo liquatum, frigefactum imponito. Verum in ulceratis pernio-  
 nibus, thuris, plantiniſ ſciſſi, rubricæ, reſinæ, æquales partes, adipe ſui-  
 lo dilutas excipe ac utere. Cæterum ad ulceratos cum inflammatione, he-  
 xapharmaco à ſex rebus quas recipit appellato utere. Olei dodrantem, adi-  
 piſ tauriniſ, fellis item, ſingulorum libram i. ſpumæ argenti ſexuncem, co-  
 lophoniam trientem, mellis ſexuncem.

Hexaphar-  
 macum

Ad digitorum ex toto uero pedum rimas.

Picem liquidam illinito. Aut cancrum fluuiatilem aut marinum in pru-  
 nis exurito, & detracta teſta, cum oleo terito, & ad mellis ſpiſſitudinem re-  
 digito, & præterſis rimis inſiſſato. Facit & ſcillæ pars interna oleo ſerueſa

Rima pedum

sta, & cum terebinthina contrita: & cornu certinum ustum & adipe capri  
no exceptum. uerū digitos præmūdare oportet, & sic medicamēta adhibere.

*Ad fissuras pernarum ac plantarum floridum emplastrum.*

Calcis uiuæ drach. X. cerusæ drach. XX. ceræ drach. XX. aut XXX. adi-  
pis porcini recentis septuncem, colophoniz dodrantem, succi seminis lini  
cyath. I. olei dulcis uncias XL. teneram plantam facit uelut nullum aliud.  
Aliud. Adipis caprini, ceræ, olei, æquis portionibus utere. Aliud. Ma-  
licorium in aceto coctū per quinq; dies imposito. deinde circumcirca mun-  
datis calecēt oleo aut strigimēto imposito. Aliud. Scillā in oleo coquito,  
& ipsam quidē torrefactā reijcito, in oleo uero terebinthinā liquato, ac uti,

*Ad attritus pernarum ex longo decubitu.*

(tor.)

Ceræ, olei, spumæ argēti, mellis, singulorum æquales partes. facit etiam  
ad omniem ulcerationem plantarum ac calcaneorum, & uolarum, & inter-  
næ digitorum partis, & hoc magis si ulcus propinquum ungui fuerit.

*Ad fordida in planta ulcera medicamentum quod linamentū inditur.*

Facit etiam ad pudendū. Amurcæ cyath. I. aceti cyath. I. coquito in uase  
æneo ad mellis spissitudinem, & priuatim squamæ æris drach. II. mannæ  
drach. II. Lanarum succidarum mollium tedæ obuolutarum ac ustarū cine-  
ris, quantū manu præhendi potest terito, excipit oq; omnia, ac utitur, ad uul-  
nera quidē uino dilutis, ad pudenda uero ac plantas passo. Aliud. Amur-  
cæ, mellis despumati, singulorū pares portiones. Hoc etiā gingiuas purgat.

Ad attritus ex calceamentis, facit pulmo agninus, & porcinus, & capri-  
nus. coriā à ueteribus soleis uita, inflammationis quidem non profunt, uerum  
sedata inflammatione opitulatur. Aut cepam cum multo gallinaceo adipe  
imponere. Aut gallam ustam inspergere. Aut acaciam aceto dilutam illine.

*Ad clauos ac callos. Caput LXXX.*

AD clauos præmundatos unam aliquam ex corrodentibus compositio-  
nibus imponere oportet, aut æruginem rasam, aut sandaracham, aut si  
stulis dicatum puluillum siccum, aut fistulare collyrium, gummi uice, am-  
monia co exceptum. Est autem clauus rotundus, albus, clauī capiti affinis,  
circa omnes corporis partes consistens, maxime tamen in plantis ac di-  
gitis pedum. Aufertur autem longiore tempore, etiam si quis præminens  
clauī partem assidue deradat scalpello, aut pumice deterat. Similiter etiam  
callus. facit & lupinorum crudorum ustorum cinis cum melle. Misypticelli  
quida exceptum. Melanthium cum pueri impuberis urina. fabæ lomentū  
cum aceto coctum. Hoc autem sæpe experimento cognitum est. Canthari-  
dum, atramenti sutorij, castorij, singulorum æquales partes, excipiuntur to-  
rebinthina ad emplastri formam, & clauo præmundato imponuntur. A-  
liud. Fecis uini uitæ, calcis uiuæ, uisci, singulorum pares portiones cum li-  
xiuio aut urina pueri impuberis.

*De affectionibus circa ungues: et primum de paronychia. Cap. LXXXI.*

PARONYCHIA id est reduuia abscessus est circa radicem unguis consistens.  
Quum adhuc parua est paronychia & incipiens, galla cum melle cōpri-  
mit, ac consistere impedit. Aut Musti pastillus, aut Nere, cum aqua. Verū  
ubi iam caro præter naturam excreuit, scopum habemus ut ipsam per non  
erodentia consumamus ac rumpamus. Facit ad paronychias, autium for-  
des, & lycium. Suppuratam autem punigito, & emissio humore spongiā  
aqua imbutā imposito. Aut lentem cum aqua tritam adhibeto. Aut phœ-  
nicinum emplastrum cum uino. Aut rosas uirides siue siccas, aqua macerā-  
tas ac tritas. Aut polentā cum aqua. Facit etiam ad paronychias farina lu-  
pinorum melle, aut uino mulso subacta. Ad ulceratas autem, æruginis, spu-  
mæ argenti, singulorum drachmas quatuor. sarcocollæ drachmas quatuor,

quantum satis est inspergere, & supernè linamentū ex uino, item q;

spongiā impone. Oportet autem & carnem undi,

quaque ab unguē disparare.

De pte.

Attritus perna-  
rū ex decubitu

Calceamento =  
rū attritus

Clauus quid  
sit

Callus

Vnguitū affe-  
ctioes  
Paronychia  
Nere pastillus

De pterygijs.

**P**terygium est nimium carnis incrementum, quod partem unguis operit, ex paronychîa, aut aliâ huiusmodi causa ortum habens. Ad hoc igitur auripigmentum, & mannam, æquis portionibus insperge, & superne linamentum extuino, & spongiâ impone. Aliud. Chalcitidis, squamæ aris, malicorij, singulorum equales partes. Excipe sicu assata & melle, & locoprius ex spissamentorum decoctio rigato impone. Quod uero de pterygio exarscit depurga.

Spissamentorum decoctum

Ad digitorum pterygia putrescentia, &amp; ad pudendorum ulcera.

Thuris drach. i. squamæ aris drach. i. æruginis rasæ drach. iiii. mellis cyath. i. terito ad solem donec subflaua fiant, & utere cum splenio, loco extuino prærigato. Aliud, breuiter sicicans ac curans pterygia. Soreos uisti drach. ii. thuris drach. ii. æruginis rasæ drach. i. cum melle contrita pterygio ipsi impone. facit etiâ ad reliqua horum locorum ulcera maligna, & nigredines, & putrefacta. Aliud. Squamam aris palmularum aut ficu carne excipe, ac utere. Aliud. Columbinum finum cum polentæ poline in passo coctum ac tritum, calidum impone. Sed & aris squama per se insperfa pterygia reficcat. Oporteret autem angulum unguis assidue per scapellum eleuatum auferre, ut ne augescens, pterygium pungat.

Ad contusos ungues. Myrti &amp; mali punicæ solia tenera imponito.

Ad suberuentos ungues. Farinam picæ ammixta imponito.

Ut discedat affecti ungues. Sulphur tritum adipe susillo exceptum imponito.

Ut discedant scabri ungues. Visci quercini, sandarachæ, cœnigraci, singulorum sextantem, cantharidum, thapsiæ, singulorum unc. i. aceti quod satis est. Aliud. Propolis Atticæ, ceræ, bituminis, singulorum drach. ii. sulphuris uisui drach. i. Excipe line olco, ut ne inquinent. Vsu uero expetente calfactum medicamentum unguibus obducitur. Aliud. Picis liquide, ceræ, colophoniz, terebinthinæ, ammoniaci thymisatis, sulphuris uisui, aphronitri, singulorum æquales partes, ut ne inquinent. Aliud quod scabros ungues discedere facit absq; ulceratione. Bituminis, auripigmenti, sandarachæ, sulphuris uisui, singulorum drach. iiii. Excipe resina, & utere ex oleo uens per septimum diem. Aliud. Farina erui felle ouillo, aut urina ouilla subacta utere. Aut calce cum oleo. Aut mastiche chia cum opobalsamo. Aut uisco atramentum sutorium, & sulphur uiuam, quod satis est excipe, & pelliculæ inductum impone. Aut staphidem syluestrem cum aceto tritum adhibe. Aut resinæ terebinthinæ drach. i. sandarachæ duplum, ad radicem unguis simul impone, ac diligenter deliga. Quum uero exciderit unguis, cerâ cum myrteu impone, cui parû additû sit de medicamento ex resina parato.

## CAPITA QVARTI LIBRI.

In hoc libro, qui quartus est totius Operis, de affectionibus quæ incertis locis & sparsim, extra corpus maxime fiunt, tractatio habetur.

De elephante	Cap. I	De papulis siue bullis	Cap. X
De lepra & scabie	Cap. II	Ad ambusta	Cap. XI
De impetigine	Cap. III	Ad eos qui flagris cæsi sunt.	Cap. XII
De pruritu	Cap. IIII	Ut pilæ ambustis nascantur.	Cap. XIII
De leuce	Cap. V		
De utiligine alba ac nigra.	Cap. VI	Ad desquamata	Cap. XIII
Ad stigmata	Cap. VII	De uerrucarum speciebus.	Cap. XV
De pustulis	Cap. VIII	De ganglio	Cap. XVI
De pustulis nocturnis	Cap. IX	De inflammatione	Cap. XVII

De abscessibus corporis externis.

Cap. XVIII

De gangraena &amp; carie

Cap. XIX

De herpete

Cap. XX

De igne sacro

Cap. XXI

De tuberculo; bubone, &amp; pano.

Cap. XXII

De furunculo

Cap. XXIII

De terebinthio

Cap. XXIV

De carbunculo

Cap. XXV

De canero

Cap. XXVI

De tumore laxo

Cap. XXVII

De inflatione

Cap. XXVIII

De luxatis &amp; contusis. Cap. XXIX

De carne contusis &amp; sugillatis. Cap. XXX

De ruptione ac uulsiōne. Cap. XXXI

De scirrhis

Cap. XXXII

De strumis

Cap. XXXIII

De Scatomatibus, &amp; atheromatibus, ac meliceridib. Cap. XXXIV

De fauis

Cap. XXXV

De simplici ulcere

Cap. XXXVI

Quae glutinare possunt ulcera. Cap. XXXVII

Ad dolorosa ac inflammata ulcera.

Cap. XXXVIII

Ad cruda &amp; non suppurantia ulcera

Cap. XXXIX

De cavis ulceribus

Cap. XL

Repurgatoria sordidorum ulcerum

Cap. XLI

Ad vermes ulcerum

Cap. XLII

De carne ulcerum excrecente. Cap. XLIII

De nomis proserpendo depascentibus, &amp; putredinibus ac phagedena

Cap. XLIV

De ulceribus cicatrice indigentibus.

Cap. XLV

De malignis ulceribus, quae &amp; chronica, &amp; telephia appellantur. Cap. XLVI

Ad cicatrices nigras

Cap. XLVII

De sinibus

Cap. XLVIII

De fistulis

Cap. XLIX

De ulceribus quae refringuntur. Cap. L

De ulceribus in articulis

Cap. LI

Quae spicula, aculeos, &amp; spinas extrahant, &amp; consimilia

Cap. LII

De sanguinis tum ex uena, tum ex arteria eruptione

Cap. LIII

De nervis sauciatis

Cap. LIV

De articularum distortionibus

Cap. LV

De laxatis articulis

Cap. LVI

De lumbricis

Cap. LVII

De dracunculis

Cap. LVIII

## PAULI AEGINETAE REI MEDICI

CAE LIBER IIII. IANO CORNARIO

Medico Physico interprete.

De Elephant. Caput I.

Aretaeus Cap. paradox

Cancer est elephas unius partis

Elephas est cancer totius corporis



RETAEV M Cappadocē ita dicere arbitror, Auxiliōri facultatem morbis superiorē esse oportere, & propterea Elephantem curari non posse. Non enim reperiri medicum eo superiorem. Si enim cancer qui uelut telephas qui dam est in una parte, ex incurabilibus etiam ab ipso Hippocrate nominatus est: quomodo non magis elephas qui uelut cancer quidam in toto corpore est, omnino incurabilis erit? Quam enim atrabilis ex qua haec affectio conflat, duplicem generationem habet: Aut enim ex atrabiliario ac feculentiore humore, & uelut sanguinis liq: mor: aut ex flaua bile, utriusq: superaffatis generatur: subrubros quidem Elephantias minores quodammodo, aut ut uerius dicam, minus malignos, per ma atrabilis differentia efficit. Alios uero, qui etiam maligniores sunt, & totum corpus exulcerant, & extremarum partium elapsus faciunt, posterior differentia ex flaua bile nimium affata generata producit. Quapropter de his qui iam morbo detenti sunt desperandum est. Vbi uero in principio est affectio, ut neq: aliqua extremarum partium decidat, neq: ulcera sit cutis superflua, neq: etiam tumida & eminentia plurimum insurgant: Verū tunc, si solum

A pis solum sit facies, ita tamen ut non ualde indecorum aspectum praeferat,  
 curare tentabimus. Non pauci enim per solam capitis unctionem, plerosque  
 qui ita incoperunt, prohibuerunt ne ab affectione superarentur. Statim igitur  
 incipiente morbo, uenae sectione utemur, cum repetita sanguinis detrac-  
 ctione, atque hoc magis in uere, quando maxime & gignitur affectio, & exa-  
 cerbatur. Paucis autem interpositis diebus, nouem aut decem, purgamus  
 ipsos pulve ex colocynthide, non una uice, sed saepe, iuxta rationem medica-  
 menti quantitatem adaugentes. purgatio quoque ex hiera his commoda est.  
 Rursus autem diebus circiter decem interiectis, serum lactis scissi ipsi dan-  
 dum est, non infra trium heminarum mensuram, neque supra quinq. Sequen-  
 tibus uero diebus lacte non scisso, aut recens mulctio alantur. Ex his si qui-  
 dem remittit affectio, eodem alimēto utantur. Si uero perseuerat, à lacte ab-  
 stineant, & ab acrimo esu uomāt, itemque à raphanis & cibus. Comoda est  
 etiam postea ex ueratro albo purgatio, his si fieri potest in uere, semel in au-  
 tumno. Ceterum his qui à malo uicti sunt, neque uena secetur, neque ueratrū  
 detur. Neque enim translatio à cute ad profundum contingit, neque imminu-  
 tio materiae ex his amplius fit. Verum materiam ad uentrē ac intestina de-  
 ducere oportet, & ex alto euocantibus ac transferentibus humores uti, sic  
 careque ac adstringere cutem. Leues igitur cucurbitae ad os uentriculi, & ad  
 praecordia affigantur. Et iisdem quoque partibus dropaces adhibeantur. Pau-  
 co autem tempore interposito rursus reflectendum est, initio à purgatione  
 per hieram sumpto, omīssa uenae sectione, ex qua malus detrimentū, quā  
 utilitas ulla futura esset. Et hoc circuitu ter aut quater in anno utendum est,  
 maxime uere & autumnō. Potiones autē his conueniunt hae. Aceti cyath.  
 i. cum cedraē cyath. i. & succi brassicae crudae cyath. ii. Mixta haec dantur  
 mane & uesperī. Aut sideritidis herbae folia arida drachmā pondere, in ui-  
 ni cyathō uno. Aut cornu ceruini drach. i. & aceti scillini cyathi mensurā,  
 bibendam praebere quotidie post matutinā deambulationem. Sed & alia cir-  
 ca hoc tempus dentur. Aut scillae assatae drach. v. in aqua mulla, aut in mel-  
 le ad eclegmatis modum. Aut succi cyrenaeici erui magnitudinem, melle &  
 butyro dilutam. Aut ramenti eboris drach. s. cum uini cyath. ii. Aut cumi,  
 ni Aethiopici drach. iiii. cum melle uelut eclegma. His autem magis opor-  
 tet uilatur pastillorum theriacorum drach. i. in uini boni cyathō uno trita ac  
 pota. Similiter etiam pastillorum scilliticorum drach. i. bibatur. Sed & ca-  
 laminthae succum, uelut efficacissimum auxilium laudant, potum. Incipien-  
 dum autem esse aiunt à tribus cyathis usque ad sex. praeter omnibus autem effi-  
 cax est theriaca ex uiperis, & pota, & forinsecus illita. Si uero haberi pos-  
 sent ipsa animalcula, nihil adeo efficace est, uelut uiperarum carnes coctae  
 comestae ex albo iure, facta coctura per aquam copiosiorē, & salem, & por-  
 rum, & anethum, usque ad spinarum separationem, abscissis prius capitibus  
 ac caudis ipsarum, ad digitorum quatuor mensuram, exemptis etiam inte-  
 raneis ipsarum, pelledque detracta. Quin & theriaci sales idem cōpromittunt,  
 cum obsonijs sumpti. Sic enim si ipsis utantur, contingit aliquando squa-  
 mas, aut ueluti quendam corticem de cute ipsorum discedere. Ceterum  
 uictus ratio huiusmodi sit, post somnos praefrictus, & aluo exonerata, ge-  
 stetur, & uociferetur: deinde fricetur, & uarie exerceatur, partim saltu, par-  
 tim & quidem amplius Halteribus, & follis usu. Deteriso autem sudore, illi  
 natur adipe ursino, aut uulpino, aut hircino, aut uolucrino quopiam, aut bu-  
 tyro recenti. Modico uero tempore intercedente lauatur, illinens succū fœ-  
 nigræci, aut ptisanæ, aut modicum ammoniacum aceto dilutum. Post bal-  
 neum deterfus illinatur lentiscino, aut cœnanthino, aut myrtino, & uisio mo-  
 dico cum alumine, aut ammoniaco, ut strigenti sit spissitudo. Deterfus au-  
 tem rursus mollibus linteis, ad dimidiam horam quiescat, post quam pota  
 aqua immixtis digitis aut pinnis uomat. A uomitu uero uinum absinthites  
 aut organites bibat. Cibi sint panis ordeaceus, aut mazza ex polenta. Olera  
 uero;

Puls ex colocynthide

Vomitur ab acrimonia

Viperarum carnis esus

Halterium exercitium

uero beta, lactuca, raphanus, porrum, brassicae duabus aquis edulcaratæ, & capparis. Ex mati uero, ostrea, pelorides, erinacei, pectines, tellinae cum betis coctæ, balsamentum uetus medicamenti loco. A uino autem per totum morbum abstineant, itemq; a Venere, ita ut paucissimum solum, & tenue, & aquosum uinum, iuxta tempus refectionis ex putgationibus sumant. In quo etiam acris auferantur, condimentis exceptis. Danda autem sunt ipsa, priscana, oua, alica lota, lac, & mel cum pane, malua, rumex, sisatum, pilices teneræ tarmis, & ex uolucris bono succo præditæ. Ex fructibus, ficus, uua, & uua passæ. Ex dulciarijs ea quæ ex nucleis pineis, aut amygdalis confitis, & cnico parantur. Bis autem in die alantur, graue enim his est semel in die cibum capere. Cæterum post curationē intrinsecam, smegmatis in balneo utantur, ex decocto betæ aut foenigræci, cum aphronitro, aut sapone, aut myrobalano, & quandoq; etiam philothris. Deterget etiam portulaca cum aceto trita, & tenue semperuium, & rumicis radices aceto coctæ, & alumen cum sale & sandaracha æquis portionibus, in uino & oleo lentilino. Et id quod ad uirilgines descriptum est, ex alcyonio, nitro, sulphure, myrti folijs, & fici syluestris folijs aridis, cum aceto tritum ac illitum. Et quod ex sepiæ testa usta, & pumice, nitro, cimolia tosta, gummi, & galla omphacina, partibus partibus paratur, siccum inspersum, aut cum aceto affricum. Sed & hoc mirifice facit. Rumicis radicū fasciculum plenæ manus, nitri drach. x l. thuris drach. xxv. sulphuris drach. xxv. cum aceto Aegyptio illinitur. Efficax est & hoc, Auripigmenti drach. x. sulphuris uiui drach. viii. costi drach. xii. calcis uiuæ drach. iiii. ceræ drach. iiii. baccarū lauri aridarum drach. xii. Hæc populi foliorum succo, aut crasso decocto subiguntur, & mellis spissitudinem habentia illinuntur. Aliud. Rumicis radicū fasciculi duo in aceto coquuntur, & in pila tunduntur ac conteruntur, Deinde Alcyonij lib. i. sumis, aphronitri besslem, sulphuris uiui lib. i. testarum cochlearum uistarum trientem, chamæleonis nigri radices trientem. Conteruntur omnia ad strigementitiam crassitudinē, deinde illinuntur, ætate quidem in sole sepe. hyeme uero in balneo, usq; ad exsudationem. Quin & Aesculapij aridum smegma bene his congruit, & omnia quæ in communi referentur defrictoria, usq; ad ea quæ ad uirilgines describuntur, quemadmodum etiam nunc relata illis quoq; competunt. At uero tumidæ eminentiæ inflammatae aut exulceratae illinātur lycio Indico, aut glaucio, aut aloë, aut Andronio pastillo, aut polyidæ sphragide. Cataplasma imponatur ipsis ex alica, cum succo polygoni, aut plantaginis, aut helxinæ trita. Sed & Mellestæ herbæ uiridis folia cum axungia tusa ac imposita, mirifice opitulantur. Rubescunt enim inde partes, uerum facile sedantur pane imposito, aut corato ex oleo amygdalino facto, & ad naturalem colorem restituntur. Exulceratis autem partibus cōueniunt emplastra, id quod ex diphryge paratur, & Melinum ex uino, & coracium, & quod sit ex aceto mullo. Et pastillus Andronis, & pompholyx, & cadmia. Signum porro quoddam moderator fiat totus morbus, est quoddam prima ulcera ad cicatricem perueniunt. Ceterum ad spirandi difficultatē in elephanticis, asellos sub uasis aquarijs quatuor aut sex, ex aquæ mulsæ cyathis tribus bibendos præbe. In communi uero etiam aliqua ex his quæ ad difficulter spirantes scripta sunt, ipsis conueniunt. Aquarum uero naturalium usum, uelut maxime necessarium eligere oportet, aluminosarum præsertim & ferrosarum, & si fieri potest frigidarū. Conferunt autem ipsis eadem quoq; in potu. Eandem uim habet etiam arena marinae usus, & omnia exudatoria ac sudorifica. Quandoquidem uero affectio ex his est quæ facile per contagionem distribuuntur, non minus quam pestis, habitationes ipsorū quā longissime remouendæ sunt ab urbibus, & in mediterraneis ac frigidis locis statuendæ, & in quibus pauci homines, si ita fieri possit, uersentur, ita ut hinc in circumfisos locos digredi possint, tum sua ipsorum causa, tum etiam non minus ob eos qui ipsis

Acetum Aegyptium

Mellestæ herba

Contagio ex elephantiasis

A occurrere possint. Nam & ipsi aëre commodiore utentur, & alijs malum impetiri non poterint.

De lepra & scabie.

Caput II.

**V**Trag harum affectionum asperitas cutis est, cum pruritu, & eliquati-  
one, ex atrabiliario humore generationem habens. Verum lepra per Lepra  
Scabies  
profunditatem corporum cutem depascitur orbiculatiore modo, unà cum  
hoc quodd squamas piscium squamis similes dimittit. Scabies autem magis  
in superficie hæret, & uariè figurata est, & furfuracea corpuscula remittit.  
In his igitur uenæ sectionem assumere oportet, si corpus humorum copia  
redundare tibi uideatur. Sin minus, omnino tamen purgationē per ea quæ  
atram bilem euacuant. Forinsecus autem uteris in communi quidem uera-  
tro utroq; & calce lota in usum sicca seposita. Vñ uero expetente, aqua di-  
luens strigmenti spissitudine illine. Aliud. Saluiæ, olæ Aethiopiciæ la-  
chrimæ, singulorum drach. v. iiii. corticis radicis capparis, gummi, singulo-  
rum drach. x. iiii. illine cum aceto in sole. Lepras autem priuatim remouent  
anemonæ appositæ, radix uitis albæ. Composita uero hæc. farinæ liliacæ  
choenicæ, cardamomi albi drach. iiii. spumæ nitri drach. i. atramenti su-  
torij drach. viii. asphodeli radicis mediæ drach. iiii. terito in aceto, & ce-  
rati crassitudine illinito, loco ex nitro preparato: Scubi exolueris, quod per  
tertium diem faciendum est, & aqua frigida ablueris, rursus illine. Aliud.  
Succi radicis asphodeli sexuncæ, sulphuris uiui, mannæ, singulorū drach.  
x. nitri drach. viii. aceto diluta illine. Ad scabiem uero priuatim faciunt,  
simplicia quidem, staphis syluestris, lupini amari, cardamomum cum ace-  
to, lilij radix cum melle, resina terebinthina, sulphur, cicer, stercus caprinū.  
Composita uero hæc. Misij & chalcitidem, paribus partibus cum uino illi,  
ne scabies humidiori. Aliud. Rododaphnes folia tenera in olei sexta-  
rio coquito, donec torrefiant, ipsiq; abiectis ad oleum ceræ albæ quadran-  
tem adijce, & hac soluta frige facito, ac sulphuris uiui unciam unam insper-  
gito, & in sole, aut in balneo illinito. Quidam cum rododaphne etiam scil,  
lam coquant. Aliud. Emplastri ex succis sextantem, ceræ sextantē, ro-  
sacel unc. i. spumæ argenti quadrantem, cerusæ quadrantem, picis liquidæ  
sexuncem, recrementi argenti sextantem, syrici sextantem, aceti quod satis  
est ad arida terenda. Aliud. Cerusæ unc. s. amyli unc. s. plumbi unc. i.  
lotariorum rubrorum aut anchusæ sextantem, ceræ sexuncem, rosacel do-  
drantem. Anchusam cum rosaceo probe coquito. Deinde reliqua adijcito.  
Aliud. Oua decem, aut quot ad usum sufficiunt, in aceto acerrimo mace-  
rato, donec putamen ipsorum molle fiat, deinde in ipso aceto uitellos ipso-  
rum coquito, & cum rosaceo ac reliquo aceto etiam spumæ argenti parum  
conterito, & strigmenti spissitudine illinito. Aliud. Ouorum aceto ma-  
ceratorum uitellos iiii. rosacel sexuncem, sulphuris uiui quadrantem. Præ-  
teritis cum aceto uitellis & sulphuri, ceratum adijcito. Quin & argenti spu-  
ma cum aceto & rosaceo trita, ut emplastri formam accipiat, acriorem sca-  
biem depurgat. Sed & ex lapathio sinegmata, & pleraq; ad elephanticos de-  
scripta sinegmata, in communi etiam ad lepras & scabiem faciunt.

De impetigine.

Caput III.

**V**bi ferosi tenues & acres humores alijs crassis succis ammixti sunt, im-  
petigines lichenes dicti generantur, quæ breui in scabiem ac lepram Impetigines  
Lichenes  
transunt. Quapropter medicamentis uehementer siccantibus opus habet.  
Proinde post totius corporis, si opus habuerit, euacuationē, simplicia ipsis  
competent, cicer, ueratrum, erinaeus in petris degens, pix cerato ac resing  
ammixta, crocodili terrestris stercus, & sturnorum ubi solam oryzam ede-  
runt. Multi uero hoc solo impetigines in mento, aut etiam alibi curauerunt.  
Triticum multum incudi seruenti imponunt, & defluentem ex ipso liquo-  
rem adhuc calidum impetigini illinunt. At puerorū impetigines salua ho-  
minis assidue confricato. Ad hos facit & pruni gummi illitum. Inueteratæ  
uero

uero impetigini uiticis folia trita cum aceto imposito. Aut capparis folia eodem modo. Composita uero hæc, Sulphur cum thure, aut cum ammoniaco, aceto dilutum illinito.

*Passillus ad impetigines.*

Glutinis fabrilis drach. iiii. thuris drach. iii. aceti cyathi dimidiū, aceto dissolutos illinito. Alius. Chalcitidis, gummi, singulorū drach. viii. sulphuris uiui, misyos, singulorum drach. vi. squamæ aris, acaciæ, singulorum drach. i. cum aceto illine. Aliud. Sulphuris uiui, spumæ nitri, singulorum drach. iiii. canchryos grana lx. terito cum aceto, & solam affictam partem illinito, ita ut integram ne contingas. Resiccatum uero ablui, to frigida aqua. Aliud. Veratri albi drach. viii. farinæ lupinorū, buccinorum ustorum, nitri, singulorum choeniceem. Sicca affricato. Cæterum feras impetigines uocant eas quæ ex moderatè resiccantibus nihil opis sentiunt, ab acrioribus uero exacerbantur. In his igitur medicamenta adhibere oportet multum quidem efficaciam, ita tamen ut ne uehementer mordant, quale hoc est, Glauci, thuris, alcyoni, bituminis, sulphuris, gummi, singulorum unciam unam, illine cum aceto. Aliud. Picem aphricanam cum aceto coctam liquefactam illinito.

*Impetigines  
feræ*

*Pix Aphricana*

Aliud ad impetigines & pruritus. Atramenti futorij, sulphuris uiui, nitri, thuris, singulorum æquales partes, ad impetigines cum aceto, ad pruritus cum uino illinito. Aliud ad impetigines. Ammoniaci thymiamatis, farinæ crui, ac lupini, singulorum pares portiones, cum aceto.

*De pruritu.*

*Caput III.*

*Pruritus*

Pruritus in senectute contingentem, perfectè sanare non datur, uerum subscriptis mitigare potes. Qui uero ex uitiatas humoribus in alijs oboritur, eum sanare conuenit, humores uitiatos euacuando, qui sanè fuerint bilioli, aut pituitosi, putrefacti aut salsi. Cognoscuntur autem ab ætate, temperamento, uictu, tempore, regione, & reliquis eiusdem ordinis. Si igitur in uenis una cum sanguine redundare uideantur, à uenæ sectione incipiendum est. Si uero qualitate magis affligunt, facta per convenientia medicamenta ipsorum euacuatione, ad externam curationem nos conuertemus. Balneo itaq; utendum est omnino ieiuno, quandoq; etiam ubi parum cibi accepit, rursus repetenda lotio est. Difficulus enim humectari affectio potest. Defricatio uero fiat ex scenigraci, aut betæ, aut fursurum, aut malæ syluestris & satiuæ, aut ptisanæ decoctio. Insuperq; cum farina fabarum, aut lupini aut myrobalani, aut cum smegmate peponato appellato. Si uero moram trahat, similiter quidem lauandum est, fomentum autem adhibendum ex decoctio saluiæ, myricæ, mercurialis, organi, pulegij, baccharum lauri, radices cucumeris syluestris, capparis: stemq; ex lixiuio, & muria acida. Deinde inspergatur nitrum siccū, aut cum fece aceti. Aut medicamentū quod recipit spumæ nitri sextar. i. thuris, sulphuris uiui, singulorum lib. i. cimo: liæ libræ dimidiū. Aut hoc, Aphronitri, sulphuris uiui, alcyoni uisti, æquales singulorum partes adhibere aridas, aut cum aliquo ex relatis decoctis. Si uero uoles, etiam ueratrum siccum insperge, citra pinguitudinem. Illinendum autem est oleum & acetum, contrita in ipsis staphide syluestri, aut sulphure, aut sandaracha, aut omnibus simul. Aut sinapi cum myrobalani expressæ retrimento, & oleo ac aceto. Aut cochleæ uisæ ac tritæ cum melle. Aut rumicis radices, aut smegmata ex ipsis parata, uelut capite de Elephantē dictum est. Aut aliqua ex his quæ ad scabiem relata sunt. Quod si exulcerentur partes, utendum est parygro emplastro, aut ex pompholygo præparato. Aut ceræ unciam i. in olei cyprini cyath. i. liquato, & sulphuris uiui unc. i. adiecto. Aliud ad pruritus. Nucum magnarum caudicatum unc. i. sulphuris unc. i. cum apij succo tritis utere in balneo cum multa defricatione. Hoc solum multis scabiosis, & alijs pruriginosis sufficit. Sed & ipsum apium per se uiride tusum ac affricatum in balneo magnificè prodest.

*Similiter*



Similiter etiam perdicium, & resina aceris cum rosaceo soluta ac illita. Aliud. Oryza puræ & ualde albæ quadrantem, tundito, cribrato, & acetato acerrimo ad strigmentum spissitudinem terito, & sulphuris uiui priuatim tritunc, i. adjecto, & probe mixtis in balneo utitur cum multa defricatio. At in his qui superfluis humoribus magis abundant, si æquali pondere sulphur & oryzam miscueris, melius medicamentum effeceris.

Resina aceris

De Leuce. Cap. V.

Leuce transmutatio est cutis ad colorem albidiorē, à uiscosa ac glutinosa oriens pituita. Quandoquidem uero non omnis leuce curabilis est, diognosiones ipsius tales habet. Leuce in superficie non ultra cutē perungitur, & si quidem sanguis fluxerit, curam recipit. Si uero humor lactosus, incurabilis est. Aut panniculo laneo aspero ipsam confricatio, & si quidem rubicundior color euaserit, curationē recipit. Si uero in eodem colore permanet, non curabitur. Quin & quæ plures corporis locos occupauerint, & quæ uetustiores sunt, minus curationem recipiunt, quàm hæ quæ paucos locos tenent, & recentiores existunt. Quidam igitur uisionem per ferrum in leuce probauerunt, quæ per adustionis modum solum adhiberetur. Alij uero & ex uisione dolorem, & ex hac cicatricem ueriti, quæ nō minus quàm ipsa leuce decorem uitaret, crustam inducentibus medicamentis usi sunt, qualia etiam concolorem cicatricem efficere tradunt. Alij etiam horū uisum cultatem reprobantes, tincturas adhibuerunt, imposturæ magis quàm utilitatis studiosi, quos præ omnibus reprobare oportet, propter uelocem affectionis regenerationem. Utendum igitur est subiectis compositionibus. Adarces, canchryos, sulphuris uiui, singulorū æquales partes. Singula tusa ac cribrata seorsum, deinde cum aceto simul ad multos dies leuigata in sole illinito, non acruatim, ut ne cutis exulceretur. progressu uero temporis adijcitur parum quid de ueratro, & de galla similiter. Aliud. Fici nigre uirgula aceto macerata, & leuigatis aphronitri, sulphuris uiui, myrice fructus, singulorum æquales portiones ammisco, & nitro præfrictis illinito, ac insolato, cauendo ut ne exulcerentur. Archigenes autem calce uiua sufficiens, ad fici folia ammixta usus est, aut ubi defricaueris inquit, leucas uertat albō donec exudarint, quo reliquo corpori concoloris fiant, sinopide aut meliade terra illine. Aut acubus simul innitentibus perpunctione facta donec cruorem fundant, sinopide cum aceto illine. Aut præfrictas uelut dictum est, fici succo recenti illinito, & folia ipsius aliquantum confricatio.

Leuce

Leuce curabilis experientiam

De vitiligine alba ac nigra. Cap. VI.

Vitiliginū generatio eiusdem cum leucis speciei est. Verum illæ ad profundum usque corpus mutant, ut etiam pilī similes enascantur. Vitiliginæ uero in cutis superficie consistunt, præterquam quod etiam ipsæ morantur habentes ad profundum usque procedunt, ut etiam pilos albos producant, propter subiectum humorem. Nam ex pituitoso humore albæ fiunt, nigre uero ab atrabiliario. In communi igitur utrisque conuenit calx soluta aqua soluta. Aut draconij radix cum aceto imposita, Similiter ueratrum utrunque, lupinorum amarorum decoctum affusum, & farina ipsorum imposita cum aceto aut aceto mulsio. Capparis radice cortex cum aceto. lilij radix cum melle. cepa cum aceto illita in sole. crocodili terreftris sterus, similiter etiam sturnorum ubi solam oryzam ederint, sepiæ testæ ustæ. Compositum uero hoc. Alcyonij, nitri, singulorum sextantem, ueratri albi, sulphuris uiui, singulorū unciam unam. Quidam etiam fecis uini uisæ unciam unam addunt. Aliud. Sulphuris uiui, spumæ nitri, singulorū drach. IIII. canchryos grana LX. terito cum aceto, & solam vitiliginem illinito, ita ut integram partem ne contingas. Resiccatur uero abluto frigida aqua. Aliud. Farinæ lupinorum, buccinorum uisorum, nitri, singulorum chcenicem, ueratri albi drach. V. sicca affricato. Aliud. Farinæ erui lib. II. seminis crucæ, amygdalarum amararum, radicis cucumeris syluestris, singulorū lib. I. uino mulsio

Vitiligo alba &amp; nigra

no multo leuigata illinitis, & post horæ spatium spongia detergito, facit & ad maculas solares, & uaros, & alias cutis maculas.

*Ad uti ligines alba experimento confectus.*

Sulphuris uiui sextar. II. calcis uiuæ albæ trientem, candidum ouorum quinq; olei nardini & aceti parum. Sulphur primum teritur, deinde nardinum adijcitur, & rursus teritur, atq; ita acetum instillatur, ac rursus teritur. Calx aut priuatim lota semel, & iterum atque iterum sulphuri additur, una cum candido ouorum, & rursus teritur, & collectus humor diffunditur, ita ut modicum eius relinquamus, quo unguentum illini possit, atq; sic utimur.

Aliud Archigenis. Sulphur uiuum, fici folia arida, aphronitrum, alcyonium, cimoliam terram, myrtum, cum aceto adhibe.

Aliud Archigenis. Fici foliorum in umbra siccatorum, sulphuris, aluminis, æquales singulorum portiones, cum aceto illine. Aut fici foliorum drach. II. nitri drach. II. alcyonij usti drach. II. cum aceto illine in balneo. Priuatim uero uti ligines nigras ex acie tollit sandarachæ cum dimidia sulphuris parte. Verum nitro præparatis hæc in sole illinito. At uero albis, atramenti futorij, æruginis, æquales singulorum partes, nitri duplum, abiq; pinguitudine affricato. Aut canchryos, sulphuris uiui, adarces, æquales singulorum portiones, cum aceto affricato ac illinito. Quum autem relicta fuerint, fricando abluito. Idem etiam ad leucas facit.

*Ad stigmata, ex libris Archigenis.*

Cap. VII.

*Stigmata.  
Matulae quod  
inheret*

**S**Tigmata eximes si id quod matulae inhæret cum acerrimo aceto illinas. Aut calcis uiuæ partem I. nitri tosti fului partem dimidiam, cum aqua in sole illinito. Vbi uero exulcerata fuerint, uelut ulcus ad cicatricem perducito. At Crito ad stigmata inquit, locum nitro præfrictum terebinthina integito, deinde deligatum ad sex dies finito, septima uero die soluito, & stigma acu perungito, & detergo paulatim per spongiam sanguine, tenui sale, confricato. Deinde impositum medicamentum ad dies quinq; finito, est autem hoc: Thuris, nitri, calcis uiuæ, ceræ, singulorum drach. II. mellis drach. VIII. postquam enim exolueris, atramentum in medicamento reperies. Aliud unguentum. Piperis drach. II. rutæ drach. II. sandarachæ drach. II. auripigmenti drach. I. Mellis quod satis est, loco nitro præparato illinito, & reliqua similiter uelut in priore facito. Soluito autem per triduum, & atramento detergo, rursus illinito. Tollit enim inquit, in diebus ut ginti, citra ulcerationem ac cicatricem.

*Cauter frigidus*

Aliud ceticum appellatum. Thuris drach. II. nitri drach. II. atramenti futorij drach. III. ceræ drach. VI. piperis drach. III. calcis drach. III. thapsiæ drach. III. auripigmenti drach. I. sandarachæ drach. III. mellis quod satis est, utere uelut superiore. Oribasius autem ait, Ranunculus herba imposita, aut capparis folia, stigmata eximunt. Si uero in alto sint, ac tolli non possint, & non multa cutem occuparint, frigido caute crusta inducta tollito.

*Dr. pusula.*

Caput VIII.

*Pusula*

**P**ustulae sunt crassis humoribus in cute impactis, & magis adhuc si summa cuticula densa est. In quibus igitur etiam in profundo humorum copia subsistit, eos prius purgare oportet. Si quis enim non prius hoc facio, & scutere aggrediat, obturabit ipsos magis quam euacuabit per cutem. Si uero profunditas sine superfuitatibus fuerit, per cutem ipsos euacuare oportet, & non procul distrahere, quod contingat si per uentrem, aut per uentris euacuare uelis. Ceterum curationem humorum cuti infartorum, perimenta & calfactoria facere oportet, & praesertim ubi latae pustulae fuerint. Tales enim ex abunde frigido ac crasso humore generatae sunt. Lauri itaq; folia tenera itemq; rutæ, utraq; pari portione terito, & mannâ thuris cum oleo dilutam addito ac illinito. Aut betam teneram coctam tritam imponito. Aut ceræ drach. VIII. sulphuris tantundem, salis drach. VI. Arida terito, & olei cyathio dimidio affuso, omnia simul coquito, facioq; inde emplastro utitur.

Autor. Coctura uero affidere oportet, ualde bonum est medicamentum.

De pustulis nocturnis.

Cap. IX.

**P**ustulae nocturnae ulcuscula sunt sua sponte enascentia, bullarum instar, subrubicunda, ex quibus ruptis suberuenta sanies defluit. Atque haec quidem interdum non ualde infestant. Nocturnae enim dolorosa sunt magis quam pro ulceris ratione. Silphij itaque succum aqua dilutum imponito. Siccat enim et morsu. Aut cicutam leuigatam impone. Aut brassicam crudam cum aqua. Aut apium cum polenta tritum imponito. Aut hyoscyami folia cum melle trita. Aut solanum per se, & cum coriandro uiridi. Aut oleae folijs coctis cum aqua utere. Aut uuas passas reiectis uinaceis tritas splenio infartas impone. aut adiantum tritum cum melle. Vitare uero debent ne acrida, acida ac salsa ingerant. fomenta item uitent, & balnea, & solem.

De papulis siue bullis.

Cap. X.

**Q**uae non sua sponte rumpuntur papulae siue bullae, & tamen dolore infestant, eas acuta acu perforare conuenit ad commodum saniei defluxum. Deinde humorem leniter exprimere, ita ut cutis praeposita sinatur. Et si bulla repleta fuerit uulnuscule ocluso, rursus similiter perforare oportet, & exprimere, & cutem adstrictam seruare, donec ad cicatricem perductum fuerit id quod sub ipsa est exulceratum. prius quam igitur pustulae erumpant, lenem coctam tritam cum aqua imponito. Aut mali punicea uirgula calido cinere tepescita adhibeto, & locos torreto, Si uero eruperint, & ulcus fiat, adipem suillum liquatum, & argenti spumam tritam misceto, & linteo infarta imponito. aut lilij radice in aqua cocta ac trita, cum cerato imponito.

Ad pustulas nocturnas & bullas.

Spumam argenti, & sulphur uiuum aequis portionibus, cum aceto & oleo myrteo, ad strigementum spissitudinem trita, illines cum oleo & uino. Facit item & ad haec, & ad calidas eruptiones, & ad papulas efferuentes, & ad achoras manantia capitis ulcuscula, & ad furunculos incipientes, & ad ambusta, medicamentum ex plumbagine, & quod ex ouis paratur.

Ad ambusta.

Cap. XI.

**A**mbusta moderate detergentibus medicamentis opus habent, citra hoc aut manifeste calefaciant aut frigefaciant. Proinde terra chis, & cimolia, & cretica, & omnis leuis terra, cum aceto non ualde acra, aut aqua ammi-  
na, illita probe facit, & bullas excitari prohibet. Item ouum totum crudum effusio impositum, lana molli exceptum. Nam & moderate perfrigerat, & citra mordacitatem resicat. Sed & atramento scriptorio obliuato, aut thure aqua diluto, aut lenticula cocta trita, aut eruo integrito. Caeterum ad ambustiones ex aqua calida, prius quam bullae excrescant, oliuarum muria conditarum aquam affundito, & ipsas oliuas cum polenta tritas imponito. aut alumen scissum tritum cum aceto illinito. Aut sel taurinum cum aqua largi liquatum illinito. Aut lixiuum affundito. Aut garo, aut muri perfundito. aut bulbos liliorum, aut hyacinthi, aut nareissi, cum rosaceo tritos, & ad strigementi crassitudinem redactos illinito. At uero Marcellus compositum hoc tradit. Panniculum melle imbutum, & in ordeo obuolutum exurito, et confecto cineris eius drach. viii. cerusae drach. iiii. butyri drach. viii. cere drach. xvi. adipis caprini drach. xvi. rosacei drach. xvi. Quod si iam bullae excitatae fuerint, rhoem & polentam tritam cum aceto impone. Aut calcem uitam cerato amixtam, & linteo infartam impone. Quin & sphegion appellatum medicamentum ad haec commodum est. Quae uero ulcera sunt, porro trito intege. Aut portulacam tritam cum polenta impone. aut columbinum sterus linteo inuolutum exure, & cinere eius oleo diluto utere, admirandum est medicamentum. Pinus quoque aut piceae cortex, aut adiantum siccum tritum, aut myrti folia usta trita insperguntur. Faciunt singula haec etiam cum cerato composita. Sed & quod anchusae rubicundae radicis siccae, tuse, trita trientem recipit, & cera albe doderantem, rosacei un-

Pustulae nocturnae

Papulae Bullae

Ambusta

Marcellus medicus

cias XVIII. Itemque quod ex cerusa cum modica medulla ceruina paratur, bonum est medicamentum.

Ad eos qui flagris caesi sunt.

Cap. XII.

Flagris caesi

Cerussae & spumae argenti aequalibus portionibus, ceræ quadrupla, cum sulino aut rosaceo, uelut emplastro utere. Verum prima die sulino solo per se utere. Aut croci drach. i. tragacanthi drach. i. ouum integrum absque uestitis, unitis utere. pellis ouilla recens detracta, calida adhuc flagris caesis tuncundata, magis quam omnia alia in una die ac nocte curat.

Ut pilis ex ambustis nascantur.

Cap. XIII.

Pilos ex ambustis  
illis producat

Pili ex ambustis nascantur, si fici folia in olla torrefacta cum ceræo emplastro uice imposueris. Aut caricæ drach. vii. sampſuchi drach. i. tritis cum oleo cerati crassitudine utere. Aut lapidum præseminis drach. c. squamæ aris drach. x. cum aqua in pastillos efforma, & serua. Vſu uero expectante, partem unam ad octo cerati partes amisce ac dilue.

Ad desquamata.

Cap. XIII.

Desquamata

IN desquamatis ac superficialiis ulceribus, primis diebus adſtitutione uſus, aut uino, aut aceto, aut acida muria, in sequentibus ad cicatricem inducendam utere emplastris pinguibus, & ex albis his quæ sunt delicata. Egregie uero facit hoc. Cerussæ partem unam, ammoniaci dimidiam, myrtell quod satis est. Ammoniacum in aqua terito, & cerusam ammisceto, myrtell affundens, & utere pro pingui emplastro. Aut ad lapidum præseminis squamam aris ammisceto, & myrteo tritis utitor. aut cimoliam & argenti spumam, cum uino & oleo cicino & myrteo terito ac utitor.

Ad desquamata, intertrigines, & diuturna ulcera, & ſenilem ac teneram cutem.

Spumæ argenti chryſtidis drach. l. ceræ drach. xx. resina, picæ sicæ drach. xii. olei cyath. is. Spumam argenti & oleum coquito, ac reliqua adijcito, & spatula agitat, aut etiam in pila mollitis utitor. Ceteriam desquamatam cutem detrahare non conuenit, sed inducere & imponere medicamentum. Sic enim agglutinetur, etiam si denigrata fuerit. Si uero denudata fuerit caro, difficile est cicatricem inducere, dum mordetur & sordidus est ulcus. At sine inflammatione conseruat desquamata rhus ruber impositus tritus cum melle. aut lentisci coma uſta, & cum melle imposita.

Ad desquamata, & flagris caesos, & articularum contusiones, medicamentum dolorem eximens.

Spumæ argenti, cerussæ, singulorum dextantem, ceræ sexuncem, olei puri aut rosacei lib. is. aniyi sextantem facit ad eadem etiam pelarium ex cremo argenti, & emplastrum ex ouis similiter.

De verrucarum speciebus, formicaria, & ea quæ chordæ summe parti similis est.

Caput XV.

Verrucarum  
genera

Formicaria

uerruca

Acrochordon.

UTraq harum verrucarum cutis eminentia est parua, callosa, & ut plerumum rotunda. Verum formicaria latum fundum habet, & si quis conſcalpet, similem ſenſum inducit uelut à formicarum morſibus: altera uero acrochordon appellata, angustum fundum habet, ut si affimiles, summam chordæ partem dependere putes. Has igitur extuberantias tollit elaterium cum sale impositum: thus cum aceto: grossi ficus cum aceto, farina ac nitro: Fici liquor illitus, itemque tithymali: maridis caput salſum uſtum: arugo cum sulphure uiuo uſta: cymi folia cum atramento ſutorio: id quod deſillat à ſarmenti uitis uiridibus adhuc dum uruntur: ouillum ſtercus cum aceto: hirci ſel illitum: heliotropij magni ſemen cum uino impositum: ruta cum nitro & pipere: aſtrum cum urina pueri impubis: ſtercus bouis gregariæ cum aceto.

De Ganglio.

Caput XVI.

Ganglium

Ganglium nerui cõtortio est, ex plaga aut lassitudine ptoueniens, in pluriſibus quidem corporis partibus, maxime uero his quæ mouentur, uelut est ſumma manus, & pes. In hoc inquit Archigenes, calcem utuam cum adipe anſerino & terebinthina imponit. Polles autem medicamentum ex

Polles medicus

Acbate

**A** Achate lapide utitur. Oribasius uero hoc, Ceruse, resine pinus, olei ueteris, singulorum unc. i. ammoniaci thymiamatis, galbani, singulorum unc. i. cere trientem; aut discum inquit, plumbeum crassiores, ueluti sunt uerticillae, ganglio maiorem imposito ac deligato. Grauitate enim dissoluit ipsum per longius tempus. Sed & nos hoc utimur. facit etiam oxerum & masticherum emplastrum.

Plumbeus  
discus

De inflammatione lib. VII. Caput XVII.

**I**N communi quidem omnes calidos & dolorosos cum ardore tumores, inflammationes appellare solent. Verum prout diuersa est materia quae ipsos efficit, etiam horum differentiam euariare aiunt. Nam ubi sanguis bonus, & crassitie moderatus, ad aliquam partem acruatim influxit, & ob copiam impacius est, fieri eam quae priuatim inflammatio appellatur. Si uero bilis flaua in aliqua parte consistat, herpetem. Vbi uero sanguis & flaua bilis simul influxerunt, erysipelas siue ignem sacrum efficit. Quum autem influit sanguis calidus multum fuerit ac crassus, carbunculos producere solet. proinde ab ea quae priuatim inflammatio appellatur initium sumemus, quae in multis saepe contingit. Quae tumor est rubicundus, dolorosus, renitens, & calidus, ex sanguine uelut dixi, bono ortum habens, qui quandoque ex toto corpore affertur, quandoque in ipsa parte redundat, ut a uasis contine-  
re non possit, sed instat roris excidat in intermedios uacuus locos. Sed & ad uulnerationes saepe, & ad fracturas, ulcerasque ac plures alias extrinsecas causas, haec affectio concomitatur. Postquam igitur de repente pars aliqua, citra manifestam causam praegressam, inflammata fuerit, totum uero corpus ad partem demittit, totum euacuare oportet per uenae sectionem ipsam autem inflammatam partem irrigare, ac cataplasmatibus integere, non calefacientibus ac humectantibus, sed his quae id quod influit repellere possunt: id quod in affectu parte continetur euacuare. Cataplasma igitur adhibere oportet ex semperuino, & mali punici corticibus in uino coctis, rhoëque ac polenta compositum. Si igitur dolor uchemens non est, hoc ad dolorem utendum est. Si uero cum maiore dolore pars fluxione infestetur, neque sic calida aqua, aut oleum adhibeatur, aut ex farinis cataplasmata. Inimica enim sunt haec fluidis affectionibus. Verum mitigare oportet doloris uchementiam, eo quod ex passo, rosaceo, ac cera modica paratur, cum lanis succidis multum cespyi habentibus. Excipiuntur autem & adhibentur haec astate quidem frigida, hyeme uero tepida, ita ut etiam superiores partibus affectis locos spongia uino austero imbuta aut frigida posca, circumdemus. Admiscendae uero sunt etiam herbae in cataplasmata, quae ad hoc commode sunt. Helxinae igitur ad omnem inflammationem conuenit, tum in principio, tum in augmento. Similiter glauctum, atriplex, malua, lactuca & cucurbita, ad calidas impositae. Faciunt quoque tribuli ambo ad inflammationes ex fluxione. Brassica uero ad induratas. permutatone autem ex his contingente, & pure non subiacente, emplastro ex chalcitide curare oportet, aut simili aliquo ex his quae ad fluxiones faciunt. lanam uero puram uino imbutam aut fero extrinsecus medicamento superimponere. Atque hoc quidem modo inflammationes ex fluxione curabis. Eas uero quae ob aliquam externam causam consistunt, si humiles ac calefacias, non laedas. Et si quoque opus fuerit scarificare ipsas, comode hoc ipsum facies. Arsi ex fluxione obortas scarificatis, & praesertim in principijs, magni cuiusdam mali aegroti autor fueris.

De abscessibus corporis externi. Caput XVIII.

**S**I fieri non possit ut suppurationem prohibeas, panem aqua & oleo coctum imposito. Aut ordeaceam farinam similiter praeparatam. Pars autem perfundatur aqua in qua althaeae radix sit cocta. Vbi uero tumor aegre suppurari, aut difficulter discuti poterit, cataplasmate ex caricis uteris. Oportet autem dulces ac pingues caricis coquendo eliquare in aqua, & similem facere aquam tenui mellis, eiisque adijcere ordeaceam farinam. Et si quidem tumor discutias,

Abscessus  
externi

discutiatur, uerum defectuosius, cum caricis coquito hyssopum, aut origanum. Et si amplius intendere uoles, salem ad decoctum adijcito, diligenti tamen animaduersione habita, ne propter uehementiorem resiccationē, pars in scirrhum induretur. Et si quando tale quid uideris, in aqua concoques cum cumeris syluestris radicem, aut althææ, aut bryonię. Verum his fortior es, & maiore discussoria facultate prædita dracunculi radix. Sed & ipsam ex dracunculo medicamentum, talia fortiter discutit. Quandoq; igitur sola hæc decoques: quandoq; etiam caricas adijciēs, farina quoq; cū adipe ammixta. Quin & anethini oleum discutiendi uim habet, & crudos ac incoctos tumores concoquit. Pix quoq; duros ac crudos tumores omnes concoquit, si cataplasmatis adijciatur, & hoc amplius liquida facit.

Medicamentum compositum, quod concoctos iam abscessus exprimit, ut sæpe plus in splenio reperiatur: non concoctos uero penitus discutit. Lapidis pyritæ drach. XII. ammoniaci triti tantundem, farinæ fabaceę drach. VI. excipe resina liquida, & pelli infarta impone. Splenium autem ne auferas donec sua sponte decidat. Cæterum non longè antea præparare medicamentum oportet, cito enim siccat. Ex his uero tumor si non sit discussus, sed pus in ipso subsit, eo secto, & pure euacuo, de cætero oleum aut aquam adhibere uitabis. Imò etiam si abluui opus sit uulnus, aqua mulsæ, & poscæ, & uino uteris, itemq; uino mulso. Et si inflammatio adsit, lenticulæ cataplasmate: si non adsit, alio quopiam emplastro in talibus sectionibus utendum est, & nō minime eo quod ex chalcitide paratur. Super ipsa uero spongiam, aut lanam uino acerbo imbutam imposito. Vulnere uero nullum pingue medicamentum adhibeto, quale est id quod tetrapharmacū appellatur. Vehementer enim resiccare opus habet.

*Que rumpunt abscessus.*

*Abscessus que rumpunt* Quandoquidem uero aliqui non sustinent ferro abscessus secari, conandum est ut medicamentis attractorijs utamur. Narcissi itaq; radicem tritam in aqua mulsæ cum irino coctam impone. Aut arundinis teneram radicem tritam cum melle. si uero dura fuerit, aqua mulsæ prius coctam. Aut aristolochiam cum melle impone. Rumpit autem picis sicca, propolis cretica: & qualis portio, & cicatricem inducit.

*Dionysia emplastrum* Dionysia emplastrum ad abscessus admirandum, & ad mammas ac glandulas tumentes attractorium, per obscuros meatus discutiens. Olei ueteris, aquæ, singulorum lib. I. coquito parum, & aphronitri sexuncem adijcto, misyos unciam unam, aut sextantē, & coquito donec non inquinet. Deinde addito mannæ thuris, ceræ, terebinthinæ, singulorum sexuncem.

*Ad neruorum abscessus.*

*Neruorum abscessus* Ceræ, colophonix, butyri, singulorum lib. I. picis siccæ, mellis, singulorum lib. II. æruginis quadrantem, uisci quod satis est. Facit item oxerum & Masticherum emplastrum.

Aliud attractorium. Ammoniaci thymiamatis sexuncē, ceræ, terebinthinæ, singulorum trientem, sulphuris uisui quadrantem, nitri quadrantem. Quin & similem appellatum medicamentum, & quod ex alijs paratur, uehementer rumpunt abscessus iam transmutatos. Quod uero ex seminibus lini succo constat, discutit, transmutat, rumpit, iuxta aptitudinē. Verum ad meliores abscessus, etiam conueniunt ea quæ ad parotidas relata sunt. Atque hæc quidem de abscessu ex inflammatione transmutato. Galenus autem dixit, aliquando neq; inflammatione prægressa abscessum oriri, ea uidelicet quæ ex bono sanguine generatur. Statim enim ab initio inquit, ob aliū aliquem humorem quemcumq; tandem, excoriantur, & temporis progressu à subiectis abscedunt ea quæ illum cōtinent. Itaq; etiam secta omnigenas humorum ac solidorum corporum species intra se habere uidentur. Nam & coeno, & urinx, & sanguinis grumo, & succo melleo, ac mucoso, & ossibus, & unguibus, & capillis similia corpuscula, in abscessibus repetiuntur: imò etiam

*Abscessus absque prægressa inflammatione*

etiam animalia saepe reperta sunt, ferme omnibus ex putredine ortū habentibus similia. Sed & lapidibus, & arenis, & testis, & lignis, & carbonibus, & luto, & strigmento, & amurcā, & feci similia; in diuturnis maxime abscellibus, ex humorum de loco ad locum impetuoso decubitu obortis, conſistere dicunt. Quapropter abſceſſuum corporis externorum maxime, notae perfectiores tradendae sunt, & eorū qui per medicamenta discuti nequeunt. Abſceſſus itaq; eſt corruptio ac tranſmutatio carnis, aut carnoſarum partium, uelut muscutorum, uenarum, arteriarum. Horum aliqui in tunica cōtinentur, uelut sunt Atheromata, Steatomata, Melicerides: aliqui ſine tunica conſiſtunt, generis appellationē habentes, de quibus nunc agamus. Abſceſſuum generationem plerumq; inflammatio praecedat, de qua diximus. Quandoq; uero etiam ab initio ſtatim oritur, uelut paulo ante dictum eſt. Sequitur ad abſceſſum, ardor loci uehemens, & maior tumor, magisq; ante rubicundus & durus, cum punctorio dolore, & pulſu ac grauitate, ut quid ex parte pendere putetur. Quod ſi etiā locus nobilis fuerit, febris quoque accedit, & rigor inordinatus, & noctu maxime dolent ac febriliūt. quandoq; etiam inflammatio ipsis excitatur in glandulis uicinis. Vbi uero petfectus factus eſt abſceſſus, pleraq; minuantur, punctura autem pruriginose ſunt, & paulatim ſtupidā: & tumor ſaſtigiatur magis in apicem acutum, & ad tactum mollis eſt ac facile cedit: & ſuperficies de apice detrahitur. dico aut de his qui ſoras rumpuntur. Si igitur ex medicamentis, aut ſua ſponte rumpantur, linamentorū ductu curentur, pure particulatim euacuato: ſim minus, aperire oportet eo modo qui in chirurgiae tractatione referetur.

De gangraena &amp; carie.

Cap. XIX.

Quum inflammatio non diſcutitur, neq; in pus tranſmutatur, ſaepe in gangranam ac cariem tranſit, quare & de his dicemus. Gangranas equidem appellant mortificationes ob inflammationis magnitudinem, nō ſam ſaſas, ſed adhuc fieri pergentes. Et ſi quis non cito talem affectionem ſanet, affecta pars facile mortificatur, cuius pars uicinas corripit, & hominem occidit. Quum uero corpuscula ita affecta penitus ſenſum amiſerint, non amplius gangranam, ſed cariem ac corruptionē, graece ſphacelum appellant. Hic affectus etiam oſſibus accidit, quū circumſira ipsis caro uitiatos humores ſanioſos generans, his peririgauerit illa, ac putrefecerit. Perfecit itaque mortificatam partem celerrime reſecare oportet, quo loco ſanę parti appropinquat. Gangranam uero curare, ſanguinem quā plurimum ex affecta parte euacuando. Aut enim uena ſecta corruptum ſanguinē euacuare oportet, quum circa ipſam partē uena magna fuerit: aut tota cute multis ac profundis uulnufculis impactis diuiſa, ita ut ubi ſanguinem deſluere permiferimus, aliquod medicamentum ex his quae putreſcentibus commodum ſunt imponamus. Sunt autem haec, farina erui, aut lolij, aut ſabarum, cum aceto mulſo. Si uero uehementius adhibere uelis, ſalem adſiſcito, aut paſtillū Andronis, aut aliquem ſimilem. faciūt ad gangranas etiam ueteres nuceſ. Repurgat autem ipſas urtica, & tithymali ſuccus tempeſtiue & moderate adhibitus. prodeſt ipsis etiam lupinorum amarorum decoctum aſuſum. Quīdam uero poſt ſectionem, ſecuritatis ſectionis gratia, etiam cauterem adhibent, in quibus ſale cum porri ſucco utendum eſt. poſtea autē ad cruſtam remouēdam, cataplaſma ex pane, aut hordeacea aut triticea farina; in aqua & oleo coctum imponatur. Item capitalis ſiccus puluſſus cum melle tetrapharmaco etiam ac Macedonico appellato utendum eſt. probe uero ſeparat cruſtas, panis cum apio tritus, aut cum ocymo. Aut iris, aut panax, aut ariſtolochia, aut a corum cum melle, aut thus. Auſert etiam probe cruſtas Machaerionis medicamentum, & liſis, melle excepta in linamentis. Verū in mollibus corporibus farina erui ſufficit cum melle.

Ex Orbaſij ſcriptis, ad gangranas.

Acruſinis rafa, miniij, aluminis ſciſſi, ſingulorum aequales partes aqua tritas

Abſceſſus  
quid ſit  
Abſceſſus in tunica  
nica, ſine tunica

Gangrāna

Cariet  
SphacelusCruſtae reſa  
mouentia

tritas illine. Gangrænas circumſcificabit impoſita farina loliacea, cum ca-  
phano & ſale, quandoq; etiam aceto-uita paſſa exemptis uinaceis, cum cor-  
tice, addito ſale & aceto muſſo. Nucum regiarum nucleis. myrti folia in ui-  
no cocta trita cū melle. Raphanus cum aceto etiam cruſtas ad os uſq; rūpit.

De herpete.

Cap. XX.

Herpes

Herpes adedens

Herpes mi-

liaris

**F**laua bile citra alterius humoris ammiſtioneſ ſecreta, in parte aliqua  
conſiſtente, affectio Herpes nominatur. Et ſi quidem craſſior fuerit com-  
page, magisq; acris, totam cutem uſq; ad ſubiectam carnē exulcerat, & uo-  
catur Herpes adedens. Si uero tenuis, & minus acris, ac calida, bullas par-  
uas in ſumma cute excitat milio ſimiles, & Miliaris herpes ex ſimilitudine  
dicitur. Verum ex Oribaliſi ſententia, pituitæ cum ſua bile mixtio milia-  
rem herpetem facit. Euacuabimus igitur totum corpus per medicamentū  
bilem ducens. Affectis autem locis frigefacientia ac ſiccantiſa medicamen-  
ta adhibebimus, ab initio quidem pampinos uitis, & rubi, ac plantaginis,  
in cataplaſmate apponētes, poſtea uero lenticulam, hiſq; aliquando etiam  
mel ac polentam miſcebimus. Itemq; cataplaſma deſcriptum ad inflamma-  
tiones ex fluxione, citra ſemperuiui additionem. Vlcerata uero illinantur  
paſtillis paſſo ſolutis, aut uino tenui & aſtremo non ueteri, aut poſca aquo-  
ſa. Adhibeatur etiam glaucium, & huic ſimilia ex aqua, aut hoc nihil effi-  
ciente, acetum ammiſceatur. Sed & plantaginis ſucco, aut ſolani diſtillatū ma-  
gnopere prodeſt. Aut lini ſemen toſtum, ac uino oleoq; coctum & triſtū im-  
ponito. Aut cīmoliam ſolani ſucco dilutam illiniſto. Et ſpumæ argenti trien-  
tem, ſucci porri cyathi. VII. ſucci betæ tantundē, trita illiniſto. Vbi uero diu-  
turna iam ſunt talia ulcera, idoneus eſt Muſæ paſtillas & Andronis.

Aliud ad herpetem bulloſum. Recremento plumbi in uino aſtremo tri-  
to ac illito, betæ folia in uino cocta ſupernè imponito. Aut ceræ trientem,  
myrti ſexuncem, recrementi plumbi trientem. uino triſtum recrementum,  
reliquis liquatis cerato excipe, ac illine. Sedata autem nome deſcāſcēte, ce-  
rato ex recremento utere, aut lente cocta cum melle intege. Ad herpetē ue-  
ro qui ſub cute eſt, recrementum plumbi rutæ tritæ ſucco excipe, aut cera-  
to myrte pro ruta. Aliud. Lanæ mollis non lotæ, circum tedam obuol-  
uta ac uſtæ drach. XIII. ceræ drach. XXV. recrementi plumbi acetabuli  
dimidiū, adipis caprini curati & loi in aqua drach. XXV. olei myrti quin-  
cuncem. Aliud ad herpetas uehementer deſcāſcentes. Malicorij malipur-  
nici dulcis drach. VI. ſpumæ argenti drach. V. lanæ non lotę circum tedam  
obuolutæ ac uſtæ drach. III. ceræ drach. XII. ceruſæ drach. VIII. thuris, &  
luminis ſciſſi, ſingulorum drach. i. uino & myrteo excipe.

De igne ſacro.

Cap. XXI.

Eryſipelas  
igne ſacro

**T**Vmorem ex ſanguine ſeruente ac tenui cōſiſtenteſ Galenus priuatiu  
Eryſipelas, hoc eſt ignem ſacrum appellans, eum qui ex utriſq; ſangu-  
ine ac bile conſtaſt eſt, ex ſuperantis humoris nomine, ducta affectionis ap-  
pellatione nominauit. Quum enim ſanguis ſupcrat, inflammationem eryſi-  
pelatoſam: quum ſuaa bilis, eryſipelas inflammatum appellat. In comuni  
uero, tumorem ex ſanguine ac bile calidioribus factis productum, eryſipe-  
las nominat. Vtro autem modo appelles non multum refert, ad auxiliorum  
ſanè uſum. Verum illud noſſe expedit, operoſiora eſſe eryſipelata maxime  
circa caput. Quare ſi non efficax auxilium contingat, quandoq; etiam ſtri-  
gulant. Statim igitur ab initio ubi cōparuerit, uenam in cubito ſecato, ma-  
xime quidem humeralē: ſi minus, eam quæ inuenitur. Si uero ob aliquod  
impedimentum uenam nō ſecemus, purgatione utendum eſt per bilem da-  
cens medicamentum. Atq; hac quidem etiam in eryſipelatibus aliarum par-  
tium utendum eſt, aut inſuſis per clyſterem efficacioribus, illinendaq; eryſi-  
pelata partim ut id quod inſuit repellamus per frigefacientia, partim ut id  
quod ſam coaceruatum eſt diſcutiamus, per moderate calefacientia ac har-  
meſtantia, prius quàm liuida ac nigra pars fiat, ita ut ea quę illinuntur ſem-  
per har



per humida conferuemus, per hoc ut frequentius alterentur, atq; illud fieri potest, si per molles spongas prius illita abluantur. Multus enim partis feruor cito exhalare faciens, hæc resiccat. Opus autem habent erysipelata ab initio uelut dixi frigefacientibus cum humiditate, absq; adstrictione, uelut est semperuiuum, & portulaca, & psyllium, lenticula palustris, seris, cucurbita, solanum, hyoscyamus, lactuca, glaucium. Insuperq; apium, & rhamni folia per se, aut cum pane imposita, & cerata ex aqua ualde frigida. Miscetur & opij quid istis, & succi papaueris, & cicutæ, & mandragoræ, & sunt composita medicamenta. Fieri quoq; potest ceratum ex cera alba, rosaceo quadruplo ammixto, quod ex oleo crudo citra salem sit paratum, ita ut hæc in pila emolliantur, & aque frigide affundatur quantum suscipere possunt. Si uero etiam aceti tenuis ac pellucidi parū quid ammiscueris, melius medicamentum efficies. Sed & potentē cum aliqua ex relatis frigefacientibus herbis, multum frigefaciunt, & palmule pingues cum aliqua ex illis. Illini etiam potest pars cerusa, aut cimolia, aut sigulari terra, cum solano. Aut spuma argenti cum rosaceo. Aut chalcitide cum oleo & passo. Aut cerusa cum aceto & lycio. Aut acacia cum aceto. Remittente autem feruore, utendum simplicibus quidem, sulphure uiuo & menta, cum aceto & rosaceo. Aut ruta cum absinthio, & aceto ac oleo. Aut spuma argenti cum porri & betę succo. Compositis autem, priuatim quidem ad caput hoc passillo. Spuma argenti, cerusæ, croci, sulphuris uiui, opij, cum passo: In cōmuni uero ad omnes partes, minij sinopici, chalcitidis, misyos torrefacti, æruginis, atramenti futorij, aluminis scissi, singulorum æquales partes, utere ex aceto.

Aliud. Sulphuris uiui, cerusæ, opij, acacię, singulorum æquas portiones, cum aceto.

*Cataplasma ad erysipelata, berpetus, abscessus, parotidas, et ambusta.*

Foliorum recentis althææ tenerorum lib. i. in aceto coctam probe terito, & addito rosacei triente, spumæ argenti, cerusæ, singulorum sextante, & uncia dimidia, rursus terito cum coriandri, aut semperuiui, aut solani succo deinde adiectis micis panis ut emplastri formā accipiat imposito. Emplastro uero utere hoc. Olei cicini libram unam, myrtei libram unam, ceræ quincuncem, spumę argenti trientem, æruginis rasæ sextantem. Aerugo & argenti spuma, aceto teruntur.

*Ceratum ad erysipelata et ambusta.*

Ceræ albe trientem, rosacei quadrantem, oua sex, perdicidiadis trientem. Ambusta postquam uero cessauit inflammatio, aut diuturna sit, antea quàm liuida pars fiat, cataplasma ex cruda ordea cea farina imposito. Si uero iam liuida facta fuerit, scarificetur, & cataplasmata diutius imponatur, & perfundatur aqua calida dulci, aliquando etiam marina, aut tuiaria. Quandoq; etiam cataplasmati eadem ammiscetur. Postea uero relatis compositis utendum est cum animaduersione: Nam si diutius permaneant, in pus aut putredinem transmutatio contingit.

*De tuberculo, bubone, et pano.*

*Capit. XXII*

EX Galeni sententia bubo, & tuberculum, & panus, glandularum affectiones sunt. Bubo quidem inflammatio. Phygethlon autē id est panus, est glandulæ erysipelas inflammatum, aut inflammatio erysipelatoia. Tuberculum uero ad suppurationem citò tendens glandulæ inflammatio. Verum iuxta alios quosdam, in communi omnes qui præter naturam in quacunque parte enascuntur abscessorij tumores, tubercula appellantur. Dicit enim Hippocrates, Quibuscunq; tubercula in urinaria fistula enascuntur, his suppuratione ac eruptione facta, solutio contingit. Qui igitur ex offensio nibus, aut alijs ulceribus, aut doloribus proueniunt bubones, extra periculum sunt. Qui uero ex febribus, qui sanè maximè in peste coincidere solēt, pessimi exiunt, siue iuxta fœmūr, siue sub alis, aut ad collum enati fuerint. Verum priores in principio, uelut omnem inflammationē, per frigefacientia ag

*Bubo*

*Tuberculum*

*Panus*

*Phygethlon*

*Bubones in*

*peste*

*tia ag*

ria ac adstringentia auxilia repellere oportet, aut spongijs ex posca imposi-  
tis, aut lanis ex uino ac oleo crudo, aut rosaceo, aut melino, aut lentiscino,  
aut myrteo. Deinde disculforijs utendum est. Si uero etiam totum corpus hu-  
moribus redundet, antea euacuetur. At si nihil superflui habeat, ulceris qui  
dem ex quo bubo factus est, curam habebimus, uelut in tractatione de ulce-  
ribus dicitur: glandula autem inflammata mitigetur lanis in oleo quopiam  
laxatorio imbutis. Sed & totum membrum ex ipsis obuoluendum est. Sup-  
puratus autem tumor non prompte dissecetur, sed ceratiformibus medica-  
mentis discutere ipsum conemur: quale maxime est id quod ex apyrano pa-  
ratur, & quod ex herbis constans, botanicon appellatur. Quod si discussio  
non contingat, ad ruptionem procedendum est, similiter ut in alijs abscessi-  
bus, & curandum uelut illi. Ceterum in his qui ex febris, aut simplici,  
ter ex humorum copia fiunt, repellentia uitanda sunt, ut ne dum repellitur  
materia ad profundum recurat, statim uero a discutientibus incipiendum  
est. Quod si nihil prohibeat, uelut ætas, aut uires, uenæ sectio prius in cubi-  
to assumatur. In loco uero utendum est fomētis ex decocto chamæmeli aut  
anethi, aut alicuius consimilis. Reliqua uero medicamentorum materia ma-  
xime quidem ex his quæ libro tertio ad parotidas relata sunt transferatur,  
nec minus ex his quæ paulo ante ad inflammationes dicta sunt. Quædam  
dum etiam panorum curatio, tum ex his, tum ex relatis ad erysipelata, insti-  
tuenda est. At uero Aster Atticus herba, quam etiam bubonium ob hoc i-  
psum uocant, non solum imposita, sed etiam alligata, bubonibus auxiliari  
creditur. Tubercula uero priuatim discutiantur in cataplasmate imposita, a-  
diantia, atriplex, helxine, althææ radix in uino cocta, ammoniaci cum mel-  
le mollium, ac impositum, uiscum cum resina ac cera. Rumpantur propo-  
lis, lupini amari cum aceto impositi, cucumeris syluestris radix terebinthi-  
na excepta, capparis radix similiter, nitrum cum fermento aut ficibus.

De furunculo.

Cap. XXXIII.

FURUNCULUS

**E**T furunculus tumor est abscessorius, ex crassis humoribus in carnosissimis  
maxime locis conflatus, mitis quidem quum in ipsa sola cute consistit  
malignus autem quum ex ampliore profunditate emerferit. Discutiantur fu-  
runculos & concoquantur hæc. Triticum commansum ac impositum, masti-  
che Aegyptia, uuae passæ reiectis uinaceis cum sale tritæ ac impositæ, aut  
diffundunt, aut rumpunt. Aut caricas coctas in aqua mulla imposito. Aut  
ammixtam ad caricas resinam imposito. Aut ipsas caricas, si pingues fue-  
rint, fistas. Aut fermentum cum nitro. Aut lini semen cum melle. Aut hyo-  
scyami folia trita cum butyro. Composita uero, id quod ex fermento para-  
tur, & quod ex polline, & quod priuatim dothienicum a furunculis appella-  
tur, conueniunt. fomentum autem adhibe ex molliibus spongijs, assidue in  
calidam aquam tinctis, atque sic medicamenta imposito.

De terebintho.

Cap. XXXIII.

TEREBINTHUS

**O**Ribasius terebinthum tuberculi speciem esse dicit, & incumbere ipsi  
supernè bullam siue pustulam nigram, quæ rupta id quod subiacet de-  
squamatò simile uideri, hoc uero dissecto, pus reperiri. Verum Dioscorides  
Alexandrinus ait, terebinthi sunt eminentiæ in cute consistentes, rotundæ,  
cum pallido uisore nigricantes, terebinthi fructui similes. Hos igitur eor-  
dem modo uelut alios tuberculosos tumores curare oportet, auxilijs exter-  
natis huc translatis.

De carbunculo.

Capit. XXV.

CARBUNCULUS

**S**anguine magis atrabiliario euadente, ubi ebullit, & ad partem aliquam  
irruit, carbunculos appellatos oriri contingit: qui sunt ulcera crustosa,  
plerumque a pustula siue bulla ambullis simili initium sumentia, aliquando et-  
iam sine hac. Et exscalpunt sanè affectu omnino in principio ipsam partem.  
Deinde quandoque una, quandoque plures pustulae emergunt, milij speciem  
preferentes sua tenuitate, quibus erumpentibus similiter crustosum stul-  
cus, simi-

Acus, similiter uelut à ferro candente, crusta ipsa modò cinerei coloris, modò nigri apparense, unà cum hoc quòd fundo adhæret, & quodammodo affixa est, cum depastione proserpente. Reliqua uero caro, circumfusa ualdè flammea ac nigra colore fit, & splendicans ueluti pix & bitumen. Talis autem est exactè atra bilis. Verum carbunculi circa carnem oborti, breui circumscribuntur. Qui uero in membranis aut nervis fiunt, diutius permanēt, & affectionem per consensum subiectis locis distribuunt, ut etiam inflammationes erysipelatosæ ipsis fiant. Non pauci autem ad suppurationē conuersi sunt, plerisque etiam febres adsunt. Oriuntur etiam ex quibusdam popularibus causis carbunculi. Curare igitur ipsos oportet, nisi ualdè parui fuerint, per uenæ sectionem, sanguinis euacuatione ad animi deliquium usque facta. Scarificare etiam post uenæ sectionem non incommodum est, profundioribus uulnusculis impactis, ob humoris crassitudinem. Ad locum autē affectum moderate repellentibus ac discutientibus utemur. Tale autem est cataplasma ex plantagine ac lenticula cocta, cui panis cibanitæ neque ualdè puri, neque sordidi, micæ teneræ sint adiectæ. Super ipsum uero ulcus ex uementibus medicamentis aliquod imponemus, uelut est Andronis, & Polydæ, & Passonis pastillus. diluantur autem passo ad strigmentitiā compagem. Sed & Massaliotæ puluillus siccus, aut etiam ipse similiter dilutus facit. Radix quoque dracunculi, aut aristolochiæ, aut succus silphij aut cyrenaicus, singula cum aceto recte illini possunt. Quæ uero ignis sacri speciem præferunt, ad erysipelata relatis illinantur. At quæ partes de affectione per consensum suspectæ sunt, lanis succidis ex uino & oleo irrigentur. Postquæ uero quicquid ardor, cerata capitalia diluta, linamentis excepta, carbunculis immittantur. Maxime autem bonum est id quod ex herbis, & quod ex nitro paratur, & puluilli sicci nominis dicati, tum per se, tum cum rosaceo. Permanente uero duricia utendum est Melino Serapionis. Studendum tamen est ut quàm citissime carbunculi suppurentur, ita ut bis in die, semel noctu, cataplasmata ac medicamenta alterentur. Cæterum ut eradicentur carbunculi, & à coniunctione cum uicinis adiacentibus exoluantur, mala punica acida concisa in aceto coquito, & flaccida terito, ac linteo infaria imponito. Vbi uero resiccantur, aceto madefacito. Carbunculus suppurat ac rum pituitus regiae ueteris nucleus, aut etiam non ueteris: cupressi folia ac germina, & recetæ ac teneræ pilulæ cum polenta: uua passa uinaceis reiectis: caricæ in uino coctæ: papaueris cornuti flores: succus silphij cū ruta & modo melle: pix liquida cum uuis passis & suillo adipe.

Ad carbunculos ualdè bonum.

Spumæ argenti lib. i. olei ueteris lib. i. s. auripigmenti unc. i. Spumant argenti & oleum coquito donec non inquinent, & sublatis auripigmentum adjecto, ac rursus coquito donec nigrum medicamentum euadat, & in pila trito utere linamentis illito.

Ad gangrenas, ulcera uetera, chironia, charadas siue strumar, podagram, feliciter uero ad carbunculos, & præsertim in palpebris.

Opj, acaciæ, misyos torrefacti, squamæ aris, singulorum drach. ii. atramententi sutorij drach. i. seminis hyoscyami drach. i. tritis in aqua utere. facit etiam probe inquit, tetrapharmacum emplastrum, quintam thuris partem habens. Ad carbunculos autem in pudendis, chalcitidis, atramenti sutorij, singulorum drach. vii. aphronitri drach. ii. cum aqua tritis utere. Facit quoque sterco ouillum torrefactum cum melle. In Alexandria, Serapiades, quæ & orchis, & triorchis. nominatur, uiridi cum micis panis utuntur, uelut cataplasmate, ad carbunculos & omnia crustosa. Crusta uero elapsa, uelut commune ulcus curato.

De cancro.

Capit. XXXVI.

In omni corporis parte cancer nasci solet. Nam & in oculis, & in utero, uelut in tractione de ipsis dictum est, & in alijs pluribus partibus: Verum in mammis

Carbunculi  
cause popu  
lares

Chironia  
ulcera  
Strumar

Serapiades  
Orchis  
Triorchis

Cancer

Cancer ab ani-  
mante ap-  
pellatus

Epithymi  
dosis

mammis mulierum maxime abundat, eo quod laxae sunt, & materiam quae a crassissima est promptè suscipiunt. Ex atra enim bile effluente canceri pro-  
ducuntur. Et si anterior fuerit, cum exulceratione. Quapropter colore nigro-  
res sunt inflammationibus, citra tantam caliditatem. Venae uero replentur,  
& circumcirca tenduntur, ad similitudinem pedum canceri animantis. Vn-  
de etiam hanc appellationem morbus habet. Quidam uero propterea quod  
ita partibus adheret, ut aegre auelli possit, si quas apprehenderit, nomina,  
tum asunt, quemadmodum etiam animal ipse cancer. Verum ob humoris  
huius crassitudinem, etiam incurabilis est cancer, ut qui neque repellit, neque  
discuti possit, neque totius corporis purgationi cedat, quum sanie etiam mino-  
ra medicamenta imposita cōtemnat, & a fortioribus exasperetur. Fieri ta-  
men potest ut incipientes cancos augeri prohibeamus, atrabiliarium hu-  
morem euacuantes, prius quam in affecta parte confirmetur. Eua cuabimus  
autem primum, si nihil prohibeat, per uenae sectionem. deinde per purgati-  
onem, ab initio ex simplicioribus, quale est epithymum, quod quatuor dra-  
chmarum & dimidiae pondere, ex sero lactis aut aqua mulsā damus. postea  
uero ex hiera, quae nigrum ueratum recipit. Ad locum uero affectum ulce-  
ratum, absq; offensione adhibitus facit solani succus, linteo molli duplica-  
to in ipso tincto ac imposito. Oportet aut forinsecus supra illud lanam tene-  
ram circumdare, quae ipsa succo sit imbuta, & diligēter providere, ne illa re-  
siccetur, ita ut frequentius succum affundamus. Poterit autem in ulceratis  
canceris, diuturnius quis uti medicamēto ex pompholyge. Neq; inepta sunt  
ea auxilia, quae libro tertio de uteri eancris sunt relata.

Ad cancrofa & maligna, & ad rugosa sedis ulcera. Itemq; ad inflammationes in pa-  
dente, aut testibus, aut mammis.

In plumbea pila, plumbeo pistillo, terram lemniam sphragidem appella-  
tam, cum posca & aqua mulsā, aut lacte, terito donec nigrescat. Aut rosa,  
ceum, aut crudum oleum, aut semperuiui succum, aut coryledonis, aut la-  
ciuae, aut psyllii, aut uuae acerbae, similiter terito ac illinito. Victu uero uita-  
tur aeger, pitae succo abunde, & lactis sero: & ex oleribus malua, ani-  
plice, blito, & cucurbita. piscibus item petrosis, & uolucris omnibus,  
exceptis palustribus.

Archigenti ad cancrofa ac maligna ulcera.

Cancrorum fluuiatium ustorum, & cadumiae, utriusque aequales portio-  
nes tritas inspergito. Aut cancrorum cinerem cum cerato imposito. Aut  
erysimi semen tritum cum melle adhibeto.

De tumore laxo.

Caput XXVII

Tumor latus

Oedema

Quā de tumoribus ex calidioribus humoribus conflatīs tractaui-  
mus, rursus de contrariis agemus, initio à tumore laxo accepto. Quē  
admodum enim ex biliosa fluxione erysipelas, sic ex pituitosa oedema ori-  
tur, qui tumor latus est citra dolorem. Nouimus autem etiam aliter tumor  
res laxos fieri circa pedes, in affectionibus aquae inter cutem, & tabe, ac ma-  
lo corporis habitu. In illis igitur tumor is laxus symptoma accessorium est  
ad affectionem eam quae hominem detinet, nullam priuam curationē re-  
quirens. Sufficit enim si modo quid facere uelis, confricare crura, aliquan-  
do cum aceto & rosaceo, aliquando cum oleo ac sale, aut etiam ad ipsum a-  
cerum & rosaceum sale inieccio. Si uero ob pituitosi humoris influxum, la-  
xus tumor in parte aliqua cōsiterit, satis est aliquando spongiam aceto im-  
butam imponere, cum deligatione leniter adstringēte, ex internis partibus  
initium habente, & ad supernas desinente. Verum nouam spongiam esse co-  
poriet. Si uero talis nō sit, eam quae adest expurgare oportet cum nitro, aut  
potius cum lixiuo. Quod si ex his tumor non subsidat, parum quid de alu-  
mine ammiscatur. Cōmmodum est etiam tenerrimū ellychnium eiusmo-  
di humore imbutum ac impositum. Bonum est etiam glaucium. In ueteratū  
autem laxum tumorem curabis, si oleo parti praellito, deinde spongiam li-  
xiuo

Ellychnium

xiuio imbutam impoſueris, ac uiolentius adſtrinxeris. Diſcutit autē & adſtingit tumores laxos, omnis terra illicita, & magis Aegyptia, & ſtatis ſatiua.

De inflatione.

Caput XXVIII.

**S**piritus flatuoſo, quandoq; ſub cute, quandoq; ſub membranis oſſa circumdanribus; aut muſculos ambientibus, congregato, inflatio oritur. Colligitur etiam aliquando circa uentrem, & inteltina, & inter hæc, atq; peritonæum membranam, in hydrope tympanite appellato. Et differt ſane à tumoribus laxis, & quòd non in cauam ueluti foueam cedat, dum premitur, uelut illi, & quòd ſonitū edat, quemadmodum tympanū. Ad hoc uero quòd ſpiritus non diſſiletur, corporum denſitudo cooperatur, unà cum hoc quòd etiam ipſe ſpiritus ſit craſſus. Vnde etiam curationis ſcopus eſt, corporū rarefactio, & craſſi ſpiritus attenuatio, quæ per calida ac tenuium partiū medicamenta perficitur. In inflationibus igitur circa uetrem ac uiscera, oleum tenuium partiū hoc efficit, in quo ruta ſit incocta, aut cuminum, aut apij ſemen. Quandoq; etiam cu curbita magna citra ſcarificationem, iterum atque iterum circum umbilicū appoſita diſcutit. Si uero muſculi ob contuſionem, quemadmodum ex pulſationibus, inflati fuerint, partes ualde calida & acria ægre ferunt. Quare ab initio in mitigantibus perſeuerare oportet, declinatione uero contingente, in diſcutientibus. Vtendum itaq; eſt ſaſpa cum modico oleo, lanis ſuccidis excepta, aut etiam cerato ex ceſſo ammixto. Et cura adhibenda quo caliditas permaneat, nam frigiditas non conducit. Poſtquàm uero mitigatio facta eſt, acetum ammiſceatur, & nitrū aut aphronitrum. & poſtea etiam lixiuium. poſtremū autem emplaſtra diſcuſſoria adhibenda ſunt, uſq; ad perfectam malī depulſionem. quale eſt & ſubiectum. Strigmenta ſeruſe facta primum ut pura ſiant excolato, ac ruſus in oilam iniſcito, & tritam calcem uiuam inſtar farinæ inſperſam inſeruito, donec luti ſpiſſitudo fiat, ac utitor. Hoc uero efficacius eſt compoſitum ex ſycomoris medicamentum.

Inflatio

Tympanites

Tympanites

Ad luxata &amp; contuſa.

Caput XXIX.

**A**d luxatos ac contuſos articulos faciunt lanæ ſuccidæ, aut ſpongia acetosa & oleo imbuta ac impoſita. Bulborum coctorum teneræ partes cum melle, uitiſis folia, & ſal, & nitrū toſtum tritum cum cerato. Vtere item perſuſione aquæ dulcis, aut marinæ calidæ. poſt ſedatam autem inflammationem ac dolores, etiam deſricione luxatarum partiū utere.

Luxata

Contuſa

De carne contuſis &amp; ſugillatis.

Cap. XXX.

**C**arne ab aliqua graui re illapſa contuſa, & paruis in ipſa uenulis diſcretis, ſanguis profunditur iuxta perſultationis modū. Vnde ſub cute colledus, ſugillationem ſiue effuſi ſanguinis ſuſſuſionem appellatam efficit, & & cute non diuiſa, uelut tumor ad contactum mollis ac cedens ſequitur. liuidus ille & plerunq; ſine dolore. ſcopus igitur nobis eſt, ut cōtentum ſanguinem diſcutiamus, atq; hoc breui prius quàm nigreſcat. Ab initio uero eſtiam de adſtringentibus aliquid ad diſcuſſoria ammiſcere oportet, eo quòd tunicæ uenularū contuſiæ denſari expetant. Poſtea uero etiam citra adſtrigentia, ſolis diſcuſſorijs utemur. Sed & ſugillata ab initio ſcarificantes, hoc modo deinceps curationem adhibemus. Verū ad uetera ſugillata raphanus impoſitus facit. Tollere autem ipſum oportet, quum mordere incipit. Aut raphani ſuccus cū micis panis adhibitus. Species porrò ſugillationis ſunt ſuſſuſiones effuſi ſanguinis, ſub oculis contingentes, hypopia achypophagmata appellata. Itemq; ſanguinis ſub unguibus decuſus, ex plaga contingens. de quibus in proprijs locis dictum eſt tertio libro. Verū de his quæ in unguibus ſiunt, etiam in chirurgiæ tractatione dicetur.

Caro contuſa

Sugillatio

Sugillata

Hypopia

Hypophagmata

gnata

De ruptione ac uulſione.

Caput XXXI.

**R**uptiones omnino quidē cum ſanguinis ſuſſuſione ſiunt. Sanant autē ipſas medicamēta moderatē caleſcientia. Tale uero eſt acopon ex populo alba paratum, & quæ huic ſimilia exiſtunt. Verum in ruptionibus in

Ruptio

Vulſio

p

profun-

profunditate corporis, acriora & maiore secandi ut prædicta medicamenta adhibere oportet. Commodus est talibus etiam cucurbitæ usus. Si igitur statim discussus fuerit sanguis suffusus, facile concrevit caro disparata. Si uero diu durauerit, & sordes succreuerit, fieri non potest ut de cætero ruptio concrevat, sed labra solum inter se apponuntur, ita ut ex leui occasione facile rursus disparentur, & intermedius ipsorum locus humiditate quadam impleatur, & quodam modo assidue sanguinis suffusio fiat, similis ei quæ ab initio facta est, præterquam quod citius quam illa discutitur, ut quæ tenuem serosum humorem contineat, quum illa ab initio ex sanguine fuerit conflatæ. At uulso fit, fibris quibusdam diuulsis, & sola mitigatione opus habet, usque ad doloris sedationem. Non enim glutinari possunt. Aristolochia itaque rotunda, si quid aliud, ruptis ac uulsis comoda est. Similiter centaurei magni radix, & ipsius succus. Rheon item, & costus, & bdellium, cum aceto mulso

De scirrhis.

Cap. XXXII.

(pota,

Scirrhus

**S**cirrus exquisitus, tumor est præter naturam, sensus exors ac durus. Qui uero exquisitus non est, ægrum sensum habet. Et qui quidem sensus exors est, incurabilis est. Qui uero ægrum sensum habet, non quidem incurabilis est, non tamen facile curatur. Fit enim à uiscofo ac crasso humore, qui ita parit scirrhus affectus impactus est, ut ægre auelli possit. Aliquando igitur statim ab initio consistit ac augetur, plerumque uero à medicis efficitur, qui inflammationes & ignes sacros perfrigerarunt ac adstrinxerunt. Si igitur quis uehementer discutioria medicamenta corporibus in scirrhum induratis adhibeat, etiam si manifestam scirrhi imminutionem fecerit, tamen breui tempore affectionis reliquias incurabiles efficit, tenuiore quidem humiditate discussa, reliqua uero resiccata, & ueluti lapidea facta. Oportet itaque discutiorum medicamentum habere aliquid etiam mollitorium, absque hoc ut uehementer calefaciat ac resiccet. Tales autem sunt medullæ omnes, & præsertim ceruina ac uitulina. Ex adipibus uero leoninus, ex pardali item ac ursinus. Deinde taurinus. De uolueribus autem ansetinus, & gallinaceus ac phasianinus. Sticcior autem est caprinus ac hircinus. Et ad hæc, ammoniacum thymia, & bdellium maxime Scythicum, & styrax liquidior ac pinguis, & mastiche Aegyptia. Si quidem igitur aliae partes in scirrhum indurate fuerint, semper his per se utendum est, & medicamentis quoque ex ipsis compositis. Verum in tendinibus ac ligamentis, lapidem igne candefactum ac cerri aceto extingui oportet. Sit autem lapis pyrites, si haberi potest, sin minus, molaris. In hoc affectam partem commouere oportet, quod exhalantem uaporem suscipiat. Et postea rursus mollitorium imponere medicamentum. Oleo tamen tenui ab initio, non aqua, partem perfundere oportet perpetuo singulis diebus, ita ut aliquando etiam althææ, aut cucumeris syluestris radicem, in oleo incoquamus. A balneo uero in totis ipsis abstinendum est, aut saltem à frequenti. Vbi uero scirrhus moderate fuerit emollitus, ammoniacum pinguisimum ac cerri aceto dilutum parti illinimus ad multos dies, post quos rursus mollitorio utendum est, quod galbanum & opopanax pinguislima recepit. Talia autem maxime sunt, id quod ex pernafit, & Amythaoni inscriptum. Itemque medicamenta ad strumas describenda.

De strumis.

Caput XXXIII.

Struma

**S**trumæ sunt glandulæ in scirrhum indurate, circa collum, & alas, ac inguina maxime consistentes. In communi igitur ad relatum scirrhorum curationem referuntur. Priuatim uero lupinorum amarorum farina ex aceto mulso cocta imponitur, quæ etiam ad tubercula facit. Aut bubuli sterces discutit. Probe uero strumas discutit, calx melle aut strigmento, aut oleo, aut adipe porcino excepta. Aur calcis & niri aequales partes, nascuntur & fœni græci quadruplum, cum melle uelut malagma imposito. Hoc duras discutit, in pus transmutatas tumpit. Item liliacea farina cum columbino stercore,

Medici scirrhus inducentes

Pyrites candens  
salsus

Astercore, & lini femine, in uino cocta. Grossi syluestres ac domestici. aut na-  
sturtium album tritum cum pice liquida malagmatis forma imposito. Aut  
cucumeris syluestris radice sicca, & lauri foliorum siccorum uistorum cine-  
rem cum terebinthina imposito. Aut staphidis syluestris, nitri, utriusq; æ-  
quales partes, erucæ duplum, cum resina imposito. Aut steruus caprinum  
seu bubulum in aceto coctum. Aut erui farinam in urina pueri impuberis  
maceratam, & pice ac cera & oleo liquatis exceptam. Aut serpentem mor-  
tuum in ollam confectum gypso oblita, in fornacem mittito ut exuratur, Serpentis aspi-  
cinis  
& cinerem ipsius ad æqualem sceni græci partem ammisceto, & melle exce-  
ptis utitor. Sed & ex aspidibus medicamentum admirandum est, & quod ex  
herba lanaria paratur, & quod ex cucumere syluestri, & quod ex cedria.  
Serumas suppurat aut diffundit hoc. Myrrhæ drach. x. ammoniaci thymia-  
matis drach. ii. uisci quercini drach. viii. galbani drachmas iiii. propolis  
drach. i. in mortario contunduntur.

*Ad strumas ac duricias mammarum.*

Visci elaborati, resina sicca, ceræ, singulorum lib. i. galbani quadrante.

*Ad strumas ulceratas & non ulceratas.*

Ceræ, resina pini, adipis porcini insulsi, matrubij, æruginis rasæ, singu-  
lorum sex uncem. Aliud ad strumas. Olei ueteris lib. ii. ceræ lib. i. colo-  
phoniæ trientem, nitri trientem, alij capita x. ii. Alij nucleos decorticatos  
in oleo ad triduum macerato, deinde donec torrescant coquito, atque ipsos  
quidem abijctis, ubi uero ea quæ liquari possunt liquefeceris, postquam ab  
igne ablata sunt, nitrum tenuissimum inspergito. Hoc etiam abscessus rum-  
pit. Aliud: Cineris scilni sextantem, aluminis scissi unciam unam, a-  
phronitri unciam unam, picis liquidæ septuncem.

*Erosuum strumarum.*

Aluminis scissi, sandarachæ, utriusq; drach. iiii. squamæ aeris drach. i. au-  
ripigmenti drach. i. Siccum hoc strumis inspergito. Si uero cancriæ fue-  
rint, rosaceo subactis bis in die utitor.

*De steatomatibus & atheromatibus ac meliceridibus. Cap. XXXIIII.*

Quum abscessuum generis & hæc sint, uelut in illis diximus, appellatio-  
nem singula propriam adeptæ sunt, à similitudine contentarum in tumo-  
ribus essentiarum. Est enim quædam ipsarum uelut adeps, quædam ueluti  
mel, & quædam pulsi similis: Scopii uero curationis communes sunt, ut id  
quod continetur discutiamus; aut erodamus, aut in torum excindamus: Qui-  
dam igitur tumores tribus scopis subiacent, qui quidem tenuiorem humo-  
rem habent, uelut Meliceris. Aliqui duobus tantum, uelut Atheroma. Nam  
ut & excindamus, & erodamus hoc, fieri potest. Verum steatomata per so-  
lam chirurgiam curantur, quum neq; erodi, neq; discuti possint. Singulorum  
autem horum dignotionem in chirurgiæ tractatione reperies. Eorum uero  
quæ discutiunt, in strumarum tractatione materiam habes. Priuatim autem  
Meliceridas discutit hoc. Vnas passas yinaceis reiectis xx. squamæ aeris  
drach. iiii. fomento prius adhibito impone. Aliud. Ladani, bdellij, gal-  
bani, ammoniaci thymiamatis, propolis, terebinthina, singulorum æqua-  
les partes in mortario contunduntur. Facit & ad strumas, parotidas, furuncu-  
los, tubercula. Archigenes autem ad meliceridas inquit, aphronitru & uis-  
trati duplum, cum cerato duro imposito. At uero erosiuorum usus chirurgi-  
sita cute contingere non potest. Oportet igitur & meliceridas, & atheroma-  
ta, aut etiam strumas, prius cute nudare, atq; hoc per uistoria medicamenta.  
Ex quorum numero simpliciter est id quod recipit calcem uiuam, saponem,  
ac lixiuium. Variiegatius autem & quod repositum seruari potest, hoc est.  
Calcis drach. iiii. fecis uini ustæ, nitri rubri tosti, singulorum drach. ii. mi-  
ni drach. i. terito cum lixiuiis. & ad mellis liquidioris crassitudinē redacta,  
ter seruafacito, ut quodam modo compagem acquirant, & in plumbea py-  
xide reposito, lixiuium instillans, ut ne breui relisceatur. Facit & ad uerru-  
cas sum,

*Steatomata  
Atheromata  
Melicerides*

*Vistoria me-  
dicamenta*

cas summæ chordæ similes, & ad fornicarias appellatas, pterygia, clauos, callos, cicatrices præminentes. sex autem utini non sit duobus mensibus antiquior. Ex hoc cutem illinito, & ubi siccati inceperit, spongijs abluito, ac rursus illinito, & ubi cutis nigrescens fuerit, rursus abluito, ac crustam inducentibus illinito. Crusta uero elapsa, erodentia adhibeantur.

*Erosuum mordacitatis satis exors.*

*Erosuum non mordax*

Squamæ aeris drach. IIII. sandarachæ drach. II. ueratri nigri drach. II. utere cum rosaceo. Aliud. Squamæ ætis, sandarachæ, seminis urticæ totum, æqualibus partibus singulorum cum rosaceo utere. Aliud. Erinaceorum ustorum, testæ sepiæ, auripigmenti, æqualibus partibus cum rosaceo utere. Verum circumscilicet partes omnes cerusa cum oleo illine. Bonum est & hoc. Calcis non præparatæ partes duas, chalcitidis partem unam, auripigmenti partem unam.

*De facie.*

*Caput*

*XXXV.*

*Facies*

**F**acies tumor est in cute habens perforationes, per quas melli similis humor excernitur. Imponendæ igitur sunt ipsi uix passæ cum ruta, aut scitæ tenerrima folia cum melle. Aut nasturtium cum lini semine ac melle. Aut cucumeris sativi radix cum melle. Aut sulphur uiuum cum cerato uel terbinthina. Variatiorem uero curationem facies, si quæ libro tertio de a choribus relata sunt huc transferes.

*De simplici ulcere.*

*Caput*

*XXXVI.*

*Ulcus simplex*

**Q**uandoquidem simplex ulcus diuisio solum est, si quis diuisa contrahat ligamento circumdato, coalescent disparatæ partes, citra ullam aliam opem. Oportet autem ubi circa alterum solum labium ulcus fuerit in obliquo, quum euersum, illinc deligationis initium facere, & ad contraria conuerti. Si uero circa ambo labia euersum ulcus fuerit, deligationem ex duobus initijs adhibere oportet, atque ita labia adducere. Si enim nihil inter labia coinciderit, uelut est pilus, aut arena, aut oleum, aut sordes, aut eiusmodi quiddam, ulcus omnino coalescet. At si magnum fuerit ulcus, ut disparatæ omnino contrahi per deligationem non possint, futuris primò ipsa contrahere oportet. deinde ita deligare, & glutinatorijs appellatis auxilijs uti, quæ et collectam humiditatem resiccare ac consumere possunt, & ne alia influat prohibere.

*Quæ glutinare possunt ulcera.*

*Cap.*

*XXXVII.*

*(bete.*

*Glutinantia ulcera*

**Q**uercus folia imposita, salicis & brassicæ & chamelææ fructus, folia, & cortex. plantaginis austerioris succus. papyrus posca aut uino macerata, & circumcirca obuoluta. Recentia uero glutinant, pinus aut picæ folia, & cortex recens uel ut ligamentum obuolutus cum aqua, aut posca, aut uino. Caseus recens tritus. Forinsecus autem imponantur folia rumicis, aut uitis, aut betæ, aut lactuicæ. Caseus autem ex acido lacte etiam maiora uulnera glutinat. pira syluestriæ etiam fluxum reprimunt. Hippuris imposita confert etiam si nerui dissecti fuerint. Isatis sativa in duris corporibus, etiam si in musculorum capitibus fuerint. Cupressi folia, & germina, & recentes pilulæ ac molles, in duris corporibus. Verum ammiscere oportet tenuissimum farinæ puluillum de molæ uicino pariete acceptum, myrrha cum aqua illita, aut thus. terræ intestina etiam neruos dissectos glutinant. Quinquæfolij folia cum melle, allium uustum impositum. Ad uetera uero ulcera anagallis facit cum cerato. Itemque hordeum uustum. Sed & cerusa cum cerati myrti triplici pondere. Cæterum ad ulcera in capite myrrham siccam inspergito, & non madesacito. Cito enim ipsa contrahit. Aut aloë siccam, aut aristolochiam tritam, & cum melle in uino ad moderatam crassitudinem coctam linamento illita inde. At ex cõpositis glutinantibus sunt, emplastra barbara, & aureum, & Nicolao inscriptum, & quod ex salicibus paratur, & quod ex dictano, & reliqua his similia, quæ magna uulnera maxime glutinare possunt.

*Ulcera inflammata*

*Ad dolorosa ac inflammata ulcera.*

*Cap.*

*XXXVIII.*

**A**d dolorosa ac inflammata uulnera opus est siccantibus ac inflammationem



tionem arcentibus medicamentis. Ex liquidis igitur optimum est uinum. facit etiam posca. Si uero etiam cum sorde inflammata fuerint, etiam aqua multa aquosa. Ex siccis uero in communi quidem conueniunt ad inflammationes, data, exceptis acris ac oleosis. priuatim autem hoc. Mala punica, dulcia cocta in uino, ac trita imposito. Admirandum hoc est & multum uisus. Nam & ad capitis ulcera facit, & ad ea quae sunt in pudendis, & quae in toto corpore dolorosa, & ad oculorum inflammationes, Si uero etiam ignis facer, aut tale quid, ad ulcus accesserit, auxilijs ad illa descriptis utendum est.

Ad cruda & non suppurantia ulcera.

Cap. XXXIX.

Recentia, & eo quod adhuc inflammata sunt, non suppurantia ulcera, concoquunt & suppurant, ex simplicibus quidem aqua temperata, asfusa, farina triticea, aut alica, aut panis, aut glutinum librorum, cum terebinthina imposita, cera, crocus, thus, pix, rosaceum, adeps porcina, & uutilinus. Compositum uero tetrapharmacum linamentis exceptum ac rosaceo dilutum. Vetera autem & callosa concoquunt, ex simplicibus quidem uua passa, styrax, galbanum, myrrha, ladanum, pix, resina, butyrum, mastiche aegyptia, caryophyllus. Composita uero emplastrum siue cera Galeni ex oleo cicino, linamentis exceptum oleo ueteri aut cicino solutum. & quod geminum colorem praefert, similiter id quod regium appellatur, & similia.

De causis ulceribus.

Cap. XL.

Causum ulcus deficientis carnis expletionem postulat. Huius autem materia est sanguis moderatus ac bonus. Moderatione itaque ipsius per sufficiens alimentum acquiramus. Bonum uero temperamentum per bonam ipsorum alimentorum succulentiam, & per bonum temperamentum partis in qua est ulcus. Quandoquidem uero superflusta quae euacuatur, quae quidem tenuis est, humidius ulcus facit: quae uero crassior, dum ipsi accrescit, sordes efficitur, ea de causa medicamentis opus habet quae moderate siccant ac extergunt. Tale autem est thus, & farina triticea, fabacea, & erui, iris, aristolochia, carduus, panax, & pompholyx. Quum uero nihil profuerit adhibuit in incarnans medicamentum, sic quodam modo ad aliud transeundum est. Si enim copiosior sordes apparuerit, & humidius ulcus, hinc cognoscendum datur, quod defeciuosius siccauit medicamentum, & intendere ipsum oportet mellis amixtione. Si uero purum, & magis siccum repertum fuerit, plus quam oportuit resiccauit, & oportet oleo copiosiore dilutum ceratum adhibere. Contingit autem aliquando dum pharmacum fortius est, colligari quid de carne, ut sordidum ac humidum appareat ulcus, consimiliter ut illa quae defeciuosius sunt resicata. Verum hoc quod sic colligatur ea, uisus sit, & labris tumidum, insuperque rubicundum, & inflammationis pariter. Saepius uero etiam manifeste ager morderetur. Illud autem alterum ex minus resiccantibus nihil horum consequens habet. Putredo itaque lignorum, & maxime eorum quae moderatam adstringendi ac extergendi uim habent, uelut est etiam uulnus, purgat & replet pura ulcera. Aut anemone apollinae. Aut pinus corticem derafum ac tritum cum cerato linamentis illitum, cauis ulceribus & maxime recentibus indito. Replet enim ipsa. Composita uero ubi pura sunt ulcera, id quod ex oistreis constat, & Manethonis ex uini fece uisita, & quod ex aloë paratur, & siccus puluillus meliteria appellatus, & id quod recipit amyli, mannae, thuris, alicae, erui, & aequales singulorum partes. Similiter & quod ex thure fit, & Aphroditarium appellatum. Si uero quodam modo sunt sordidiora, capitales appellati puluilli sicci conueiunt. Quae uero linamentis illita induntur, haec sunt, id quod appellatur trophos, & isis, & athena, & quod ex atracylidibus paratur. Insuperque id quod italicum appellatur, & quae experimento constant.

Repurgatoria sordidorum ulcerum.

Cap. XLI.

Sordida ulcera siue caua sint, siue plana, probe repurgat Aristolochia cum melle, terebinthina cum pari rosaceo ac melle. Aut butyro pro rosaceo accepto.

Vlcera cruda

Causa ulcera

Lignorum  
putredo

Sordida ulcera  
purgantia

accepto. Iris Illyrica cum melle. oliuæ muria seruatur imposita. Ad neruosa uero, terebinthina cum butyro eliquata. Verum ad ualde fordida ac depa- scendo proserpentia facit marrubium cum melle. Hoc etiam crustas eicit. Composita uero hæc. Amuræ coctæ, mellis despumati, aluminis phorinæ, singulorum æquas portiones. Aliud. Serapiadis triorcheos, hoc est tri- testicularis sicca, tridis Illyricæ, marrubij sicci, aristolochiæ, singulorū dra- chmas VII. farinæ erui drach. X. urere licco, & cum melle. Insuper autem ad fordida ulcera facit Aegyptium, & cerata ex sale eliquata, & Indici, & Ashena, & emplastra uiridia diluta, & sicci puluilli ex pumice, itaq; qui ex eruo parantur. Et pastillus Melanchlorus appellatus. Similiterque is qui Criogcnes dicitur.

Ad uermes ulcerum.

Caput XLII.

Vermes ul-  
cerum

**A**D uermes in ulceribus nascentes primum remedium est, ut humiditas & putredo, quæ illos generat, tollatur. Necant autem uermes, omnia in communi quæ ad uermes in auribus descripta sunt. Verum ad eos qui in ulceribus sunt, inquit Archigenes, cerusam & polium æquis partibus cum pice liquida illine.

De carne ulcerum excrecente.

Cap. XLIII.

Caro excre-  
scens  
in ulceribus

**C**ARO in ulceribus excrecens per resiccantia uehementer medicamenta tollitur, quale est diphryges inspersum, & æris squama, & testacea om- nia usta, & erinacei usti ambo cum toto corpore. Verum hæc quidem mo- derate tollunt ac compescunt excrecentem carnem. petreæ uero Alia flos ue- hementius. Et hoc adhuc magis fori, & chrysocolia, & chalcitis, & Misy. Vsta uero minus mordent. Et æris flos similiter. Aerugo autem omniū ue- hementissime. Sal ustus flaccidas carnes consumit. Similiter & linamenta uulsa ex linteo facta, muria acriore macerata ac resiccata, indita moderatè carnem excrecentem consumunt. Aerugo autem cum squama æris, ex his sunt quæ uehementer compescunt. Compositum uero rhodium siccum, & psaron, & flauum appellatum, citra mordacitatem compescunt. At maxi- mas carnis excrecentias ad profundum usq; crustis obducunt, pastilli Fau- stiani triti inspersi, & siccum soleustum dictum. Quod uero recipit calcis uisæ, squamæ æris, & mannæ æquales portiones, & ad excrecentia facit, & fungis similia repurgat cum melle, & replet cum cerato.

Fungis similia  
in ulceribus  
excrecentia

Siccum inspersile compescunt.

Spumæ argenti, chalcitidis, æruginis, plumbaginis, æquales singulorum partes. Aliud fortiter compescens citra mordacitatem. facit etiam ad ri- mas, & maxime excrecentem in gingiuis ab inflammatione carnem. deal- bat etiam dentes. Calcis uisæ lib. i. auripigmenti sex uncem, Auripigmen- tum aridum terito cum aqua, & calcem lotam uelut cadmiam adjecto, & trita secat, ac utitur. Et ex pastillis pantolmii appellatus, & qui ad poly- pos descripti sunt. Probe ulcera compescunt. Ex emplastris autem uiridia, & maxime id quod ex cappadoceo sale paratur, similiterq; illis carne ex- crescere summe prohibent ulcera.

De uonit proserpendo depascentibus, &amp; putredinibus, ac phagedenis.

Caput XLIII.

Nona ulcerū  
depascentes.  
Phagedena

**P**ERfusionibus utendū est in ulceribus depascentibus ac putrescentibus, ex aceto, & posca, aut uino adstringente, aut aqua frigida, aut marina, aut lenticulæ decocto, itemq; malicorij, balaustij, lentisci, baccharum myrtis spinæ Aegyptiæ, aut alicuius de adstringentibus ac resiccantibus. Catapla- smata uero adhibeantur ex iisdem, & ex erui farina, & alumine liquido, & panis similaginei micis. Aut gobij ueteris, aut alius salsamenti ueteris car- nis illotæ, terebinthinæ liquidæ, æquales pondere partes tritas imponito. Aut aristolochiam, & ricini foliorum succum æquis partibus, æruginis di- midium, cum aqua mellis spissitudine illinito. Si uero crassa non decedat, elaterij parem portionem ad æruginem ammisceto. Verum ad putredinosa facit

Gobij salsæ  
mentum

facit fori tritum inspersum, & linamentum uisum siccum superimpositū.  
 Aut aristolochiam rotundam, & gallas pari portione, cum oleo obline. aut  
 cucumeris syluestris radicem, aut brassicæ, aut betæ, aut rumicis folia, lin-  
 teo illigata calido cinere obrue. Vbi uero mollia facta fuerint, cum sale trita  
 impone. ualde repurgant. Aut oleæ germina in uino cocta cum melle impo-  
 nito. Aut chalcitidem imponito. Aut apij semen tritum, aut lini semen tri-  
 tum cum atramento sutorio adhibeto. Aut thymum, & uuam passam, & fi-  
 cus coctas imponito. Aut fici folia trita cum melle. Aut nitrum, & cumi-  
 num, & farinam cum melle. Aut cucumeris syluestris radicem, aut scillam  
 coctam cū melle. Aut soreos drach. XII. chalcitidis drach. X. misyos drach.  
 IIII. cum acerrimi a ceti hemina dimidia terito donec resiccentur, & exco-  
 pris utitor specillum intingens, & in ulcere obuoluens, supernè uero duplū  
 lintecolum ex uino, & oleo imponito. Si uero inflammata fuerint, hyoscy-  
 mum cum polenta, aut brassicam cum melle adhibeto.

Ad putredines in omni loco, & nomas. Calcis utux, chalcitidis, utrius-  
 que drach. II. auripigmenti drach. I. hoc etiam ad pterygia in digitis, & ad  
 phagedænas, & ad carbunculos utendū est, in pudendis cum melle, in reli-  
 quis sicco, supernè splenio resinato imposito.

Ad nomas omnes, & eas quæ in ore sunt, & ad sanguinis eruptiones, &  
 ad carnem super excresecem, siccum panchrestum ab omnimoda utilitate  
 appellatum, compescendo efficax. Chalcitidis, misyos, amborum crudorū  
 drach. XX. squamæ ferri drach. VI. gallæ omphacitidis drach. V III.

Ad nomas ex putredines.

Salis drach. XII. aluminis cuiuscunque tandem usti drach. I. squamæ aris,  
 pumicis usti utriusque aequalē partem. facit & ærugora cum misy usto, p-  
 celiquida excepta, & squama ferri cum oleo.

Ad nomas pudendi faciunt tum hæc, tum Meliterium appellatum siccū,  
 & quod ex myrto acuta sit, & quod ex charta, itemque ad omnes nomas. &  
 coracion ex aceto mulso, & Andronis pastillus, & consimiles. Eadem et-  
 iam ad phagedænas conueniunt. Nam & phagedæna ulcus est proserpen-  
 do depascens ac erosum.

Ad humecta ac græuolentia ulcera, Lemnia terra signata ex aceto, aut  
 aceto mulso, aut posca, aut uino diluta ad luti compagē, illita facit. Aut cu-  
 pressi folia, & germina, & pilulæ teneræ, aut cucurbitæ siccæ usq; cinis. aut  
 corticis platani usti, aut anethi usti, aut lanarum sordidarum ustarum cinis.  
 Aut plantago, aut isatis per se, aut cum polenta. Aut peucedani radix sicca.

De ulceribus cicatrice indigentibus.

Cap. XLV.

Resiccantes & adstringentes carnem ulcerum cicatrice indigentium in-  
 tantum, ut non solum id quod præter naturam superfluum est discutia-  
 mus, sed etiam id quod secundum naturam habet attingamus, superficiē ul-  
 ceris cuti similem efficiemus, & ulcus ad cicatricem perducemus. Commo-  
 da uero ad hoc est galla omphacitis, & mali punici cortices moderate resic-  
 cantes. Sed & quęcunque citra adstrictionem sine mordacitate siccant, ea ite-  
 dem ad cicatricem ducunt. uelut est myrrha, spuma argenti, & ostrea si usta  
 fuerint. Nam & hæc si sicca inspergantur, sæpe cicatricem inducunt. pinus  
 item cortex cum cerato myrteo, hederæ flos cum cerato, lilij radix cum ro-  
 faceo. Item resina pinus sicca, pumex tostus, squama aris, æquis portioni-  
 bus siccis utere. Hoc etiam comprimit. Aut pumici trito, mannæ ac diphy-  
 gis, utriusque parum quid ammisceto ac utitor. Aut spumæ argenti partem  
 I. diphygis dimidiam, cum cerato uelut splenium imponito. Vetera uero  
 cicatrice includit uiscū cum thure, ærugo cū pari diphyrge ac cerato myr-  
 teo. Aut centaurium paruum recens cataplasmatīs modo impositū. Humi-  
 dioribus autem cyperi radicem imponito. Cæterum ad ea quę circa sedem  
 ac pudenda sunt, maxime si inflammata fuerint, aloë utere trita sicca, aut cū  
 aqua. Aut squamā aris, aut chrysocolam, in sole cū cera mollitā imponito.

Panchrestum  
siccum

Ulceris cicatri-  
ce indigentia

*Siccum cicatricem inducens.*

Ostreorum drach. XII. mannæ drach. VI. cadmiæ drach. IIII. facit etiam ad nomas. Aliud. Aristolochiæ drach. VI. corticis pini drach. VI. mannæ drach. VI. pumicis drach. IIII. colophonie drach. IIII. iridis drach. IIII.

Aliud. Cornu ceruini usti drach. IIII. corticis pinus drach. VI. cerusæ drach. IIII. æruginis rase drach. II. cadmiæ drach. XVIII. Aliud. Florum mali punici, atramenti futorij, singulorum drach. XVI. squamæ æris, aluminis scissi, singulorum drach. VIII. gallæ drachmam unam. Aliud. Cerusæ, spumæ argenti, singulorum drach. VIII. rëcrementi plumbi, gallæ, myrti siccæ, singulorum drach. IIII.

*Aliud cicatricem inducens.*

Aluminis scissi unc. I. terito & in aquæ sextario uno macerato. dissoluto uero illo, linamenta in aqua madefacito, & siccatis ipsis utitor.

*Emplastrum simplicioribus cicatricem inducens.*

Ceræ drach. XL. spumæ argenti drach. XXXV. diphrygis drach. VIII. olei myrti dimidiam heminam. Facit ad hæc etiam emplastrum phoenicium, & ex cadmiâ constans, & myrsinatum ac similia. Verum ad ægre recipientia cicatricem, ceræ, olei, myrti, singulorum drach. VI. cadmiæ drach. VI. plumbi, thuris, singulorum drach. II. aluminis scissi, æris usti, singulorum drach. I. æruginis rase drach. II. exoluito alternis diebus.

*Diaturnis & ægre cicatricem recipientibus.*

Cadmiæ drach. VIII. chryso collæ drach. VIII. aluminis scissi drach. VIII. æruginis, squamæ æris, singulorum drach. I. resinæ pinus drach. XL. ceræ drach. C. olei myrti quod satis est. Aliud. Ceræ, resinæ pinus, singulorum sexuncem, cadmiæ sexuncem, chalcitidis crudæ quadrantem, myrti quod satis est. Cadmiâ & chalcitis uino teritur in aestu caniculari. Vtere cum ipse nio latiore, & supernè linamento, ac spongia ex uino. Aliud. Aeris usti sextantem, aluminis scissi sextantem, salis ammoniaci drach. II. ceræ sexuncem, colophonie sexuncem, olei myrti sextantem, arida in sole teritur ad dies XX. Quum autem mellis spissitudinem habuerint, diquatam ac etiam sam ceram cum reliquis ammisceto ac emollito. Facit ad hæc etiam medicamentum ex pumice, & lîis appellatum, & consimilia.

*De malignis ulceribus, quæ ex chironia, & telephis appellantur.*

Caput

XLVI.

Chironia  
ulcera.  
Telephia  
ulcera

**V**etera & ægre cicatricem recipientia ulcera, aliqui chironia appellant, ueluti quæ chironi ipso opus habeant ad sanationem; quidam telephia, eo quod Telephus ex eiusmodi ulcere diu laborauit. Considerandi itaque nunquid & totum corpus prauis humoribus uisitatum, tales influxiones ad ulcus demittat, & redundans humor per conuenientia medicamenta euacuandus. Si uero etiam uarix sit, qui tales humores ad crura demittat, si in his ulcus existat, etiam hic intercipiendus est, uelut in chirurgiæ tractatione dicetur. Aut etiam per uenæ sectionem ipsos euacuare oportet, sanguine frequenter detracto, & deinde localibus auxilijs uti, quæ citra mordacitatem, extirpandi mali uim habent. Simplicia igitur sunt ex pumice, & diphryge, & squama æris, erugineq; ac calce moderate lota. Aut alumen scissum tritum insperge. Aut celsi drach. IIII. uuæ passæ drachmas IIII. nîtri drach. II. prælatis melle impone. Aut squamæ æris drach. X. aluminis drach. II. cum ceræ drach. X. in sole molliato ac imposito. Composita uero hæc.

*Emplastrum ad chironia.*

Cerusæ bessum, aluminis scissi sextantem, squamæ æris sextantem, salis ammoniaci, thuris, æruginis rase, malicorij, singulorum sextantem, calcis uiuæ unciam unam. ceræ libram unam. olei myrti sesquilibram, arida cum uino terito. In principio hoc callos excindit, & repositum seruatur. In fine uero usus oleo myrteo emollitum cicatricem inducit. Aliud. Spumæ argenti lib. I. olei lib. II. radice chamæleonis nigri, aristolochiæ gallæ omphacitidis

Aphacitidis, singulorum unc. i. galbani, ammoniaci thymiamatis, thuris, singulorum sextantē, preparato ita ut utridū arundinū radicibus cōmoueas.

Archigenis ad chironia, tum in tibijs, tum in māmīs, malefica, strumas, parotidas. Adipis bubuli libras III. terebīnthina quincuncem, mannæ se, pūncem, terræ Sardæ appellatæ, qua pīctores utuntur quincuncem. Li, gratis ad sicca adieciis ac commissis utere.

Aliud Archigenis. Cera tridentem, olei omphacini sexuncem, mannæ, aut thuris, diphrygis, squamæ aris, singulorum drach. IIII. Arida cum aceto trita, & ad mellis spissitudinem adacta, ad ceratum ammisceto, & diluto, linamento excepto utitor. Aliud. Ad mulierum maligna ulcera, & aliorum qui tenerum corpus habent. Cera tyrrhenicæ, drach. VIII. adipis turini, terebīnthina, plumbi usti ac loti, singulorum drach. i. utere per linamenta cum rosaceo aut myrteo diluto.

Ad cicatrices nigra.

Cap. XLVII.

Cicatrices nigras tollit oleum impositum, in quo bryonia albæ ac nigræ radix sit incocta, donec fuerit exsuccata. calamintha in uino cocta. Spuma argenti lota, cum rosaceo albo. Verū ex impetiginibus cicatrices, itemq; alias, concolores facit adeps asininus illitus, erucæ semen tritū, & cum felle caprino, bubulo ac ouillo illitū addita argenti spuma. talis ouillus ustus tritus cum uino austro, ammoniacum thymiamata cum felle fusillo illitum. Composita uero, spumæ argenti, mentæ, thuris, æquales partes cum melle.

Aliud. Nitri, ammoniaci thymiamatis, sulphuris uiui, myrrhæ, æquas portiones cū aceto albo, aut uino, aut aqua tritas illinito modice, ut ne fiat exulceratio. Aliud. Cimolix, stercoreis columbini, saponis, thuris, æquales partes cum aceto.

Smegma ad cicatrices nigra.

Cimolix drach. VIII. aphronitri drach. v. ueratri albi drach. v. recrementum amyrobano expressa reliqui drach. IIII. in balneo affricato.

De sinib.

Caput XLVIII.

Quum adiacens ulceribus cutis diutius inglutinata fuerit ad subiecta corpuscula, affectionem hanc Sinum appellant. Siquidem igitur ad supernam regionem extensus fuerit sinus, facile per osculum sanies effluit, & glutinatio facilis existit. Si uero ex inferna sursum speculari, sanies intus manens aliquid ex coherentibus erodit, & si non prius ad effluxionem feceris aliquam sectionem, nihil efficiēs, neq; incarnando, neq; glutinando. At si circa artus fuerit sinus, cubitum uidelicet aut femur, poterit etiam sine sectione ex aduersa parte, glutinari, si decliuem figuram artus facias. Et enim si in cubito circa cubiti flexuram osculum fuerit, summam manum in alium extendens, sinum ad subeffluxionem cōuertes. Si uero in femore ad genu, sinus finem quis habeat, decliuem figuram facies, puluino molli popliti subiecto, ita ut inguen humiliorem positionem quàm genu habeat. Si quidem igitur Sinus incarnatione non opus habeat, statim per fistulam aliquam in directum perforatam, & uesticam alligatam habentem, aquam multam aquosam ita ut bibi possit, in ipsum infundes, atq; hoc ad abstergendā saniem in sinu harentem. Verū ad futuram glutinationem, uinum aut uinum mulsū. Et deinde ad glutinatorium medicamentū procedendum est. Si uero cauus sit sinus, & incarnari expetat, primum siccum ex charta medicamentum cum multo rosaceo immittito. deinde linamēto uulso osculum obturato. postea uero Isidem, aut Macharionis, aut consimile aliquod emplastrum, cum rosaceo cerato liquidiore dilutū similiter immittes. Vbi uero moderate subincarnatus fuerit sinus, ex agglutinantibus medicamentis aliquid impones, ueluti si recens cruentum uulnus cures. Talia autem sunt barbara, & gemini coloris, & fulua appellata. maxime uero omniū id quod ex oleo cicino, & metallicis, sine cera paratur fuluum Galeni appellatū conueniet. Verū post medicamentū impositionē, spongia noua ex uino mulsū

Terra Sarda

Cicatrices nigrae

Sinus

aut

aut uino quàm maxime molliter circumdetur. Et deligatio à fundo sinus initium sumat, & ad osculum desinat. Linteolorū uero circumdationes adstinguantur quidem circa fundum sinus citra dolorem, paulatim autem laxentur usq; ad osculum, ita ut emplastrum quod forinsecus sinū ambit, iuxta osculum sit recisum, quo sanies excerni possit, & aliud quoddam paruum emplastrum ipsi osculo impositum sit laxum, ex eodem medicamento, propter eandem effluxionem. Hoc autem fines usq; ad solutionem, quam ubi tertio quoq; die feceris, hoc ipsum auferes & alterabis, eo quod tōti sinui circumdatum est relicto. Signum uero dignōtionis, an sinus profunditas glutinata sit, hoc tibi erit, si bene effluxit sanies, modicaq; ac concocta, aut si etiam omnino non effluxit. Insuperq; si iuxta ipsum sinum neq; dolor sensibilis, neq; tumor sit, sed locus totus contractus est, & siccus, & doloris exors. Si uero etiam pus probè coctum modicum in osculo uideris, adhuc magis bonam spem habebis. Si uero etiam prima aut secunda die aliqua sanies excernatur tenuis ex sinu, neq; sic de glutinatione desperato. Sæpe enim medicamentū uis humiditatem ex subiectis partibus uehementer exprimit, qua expressa, loci moderate sicci redditi glutinantur. Tertia uero aut quarta die ab initio, si crudus saniei humor per os appareat, sinum non glutinatum esse cognosce, & in eodem medicamento perseueres. Si uero uelut uerisimile est, propter humiditatem aliquam discedat, non absurdum uidetur etiam aliquid ex ipso medicamento alterare.

*De sinibus attritis.*

*Sinus attriti*

Quum tardè sectio abscessu, aut propter medici imperitiā, aut propter affectū timiditatem, cutis sinui incumbens tenuis & attrita fuerit, & fieri nō potest ut ipsa adimatur, post relatas infusas elutiones, glutinatorio utendū est medicamento, compage quidem liquido, facultate uero siccō. Tale autē est ex chalcitide constans phoenicinum appellatum, oleo antiquo dilutum, ut neq; durum ualdē sit, neq; manus inquinare desicrit, & postea cum uino ueteri subactum, & circumcirca impositum, cum cōuenienti deligatione. Conuenit etiam ita attrita, uelut dictum est cuti, uel præcipuē mel ad emplastri compagem coctum ac impositum. Melius autem est post impositio, nem ipsius linteō excepti, inspergere super ipsum, per cribrum eleuatū, myrrham in puluerem redactā, aut aloē, aut thus, aut omnia simul. Expertus etiam sum centaurium tenue admirandum ad eundem usum medicamentum. Ab hoc proximum est symphyrum, & postea iridis illyricę radix, postquam etiam erui farina. Aliquando uero etiam circa cocturam hæc mellis inspergimus, ubi olla ab igne est tollenda. Præstat tamen postquam ablata est inspergere, & deinde cōmouere donec mel tepidum fiat, atq; sic ipsum sinui imponere, & uelut dictum est deligare.

*De fistula.*

*Caput XLIX.*

*Fistula*

Fistula sinus est callosus factus, ex abscessibus plerūq; constans, ex translatione ab arundinum fistulis appellatus. Si quidem igitur ad os desierit, fieri non potest ut curetur absq; chirurgia, nisi temporis progressu squama aut os sua sponte discedat. Si uero ad os non desinat, per medicamenta quæ callos excindunt ac glutinant sanabitur. Callos excindunt hæc. Sphondylii radix derafa & indita, fistularum callos aufert. Veratrum nigrum inditū in duobus aut tribus diebus callum tollit. Amurca cocta & infusa. Sori crudum autustum cum modico uino diluto infusum. Sori & crocomagma cū aqua mulsā. Aut elatium terebinthina exceptum, in collyria efformato ac indito. Aut silphij radice succum infundito. Consumit etiam hoc. Acupernis drach. XII. ammoniaci drach. II. aceto excipe & collyria oblonga efforma. Collyrium quo ad callos excindendos utor. Ammoniaci thymianatis, atramenti sutorij, æruginis, misyos, chalcitidis, gummi, æquales singulorum partes excipe aceto. Aliud ex Heliodori chirurgia. Cadmia, misyos, atramenti sutorij, æris uisti, gummi, singulorum drach. IIII. chalcitidis crudæ drach.

*chirurgia  
Heliodori*

drach. iiii. excipe pueri impuberis urina, & collyria efforma. Vbi uero collyrium fistulę indidisti, forinsecus panis micæ aqua imbutas imposito, alterando illas donec inflammatio sedetur, & crusta excidat.

Aliud quod in Alexandria accepi. Anchusę radicę, misyos tosti, chalcididę, æruginis, aluminis scissi, atramenti futuri, aloës, singulorum unc. i. cantharidas quinq;, aceto trita in collyria efforma. Aliud. Atramenti futuri drach. ii. chalcididę, æruginis, singulorum drach. i. excipe gummi ac utere in collyria efformatis. Postquàm uero callus excisus fuerit, æruginę cocta cum melle purissimo octuplo repurga. sed & incarnantibus post callum excisum uti oportet.

Collyrium incarnans. Aloës, myrrhæ, ammoniaci, cineris putaminum crocorum ustorum, singulorum æquales partes aqua tritas in collyria efformato ac indito. Aliud. Myrrhæ, aloës, thuris, malicori, singulorum æquales partes excipe aqua. Quidam felle taurino excipiunt. Incarnat etiam uiræ acerbæ succus Noui etiam quendam qui cedriam fistulis infudit, atq; hoc admirando successu. Post incarnationē glutinatorio utendum est medicamento, iuxta eum modum qui de alijs sinibus relatus est. Si uero angusta sit simulq; longa fistula, inquit Galenus, & nondum uideatur mihi intus in se callū habere, sed sordem solum, prius lixiuissimum immisi, atq; hoc tandiū in fistula manere sinēs, donec sordes perfectē elapsas esse speraui, postea medicamentū imposui. erat aut id quod ex ricinino oleo cōstitans superius retuli.

De ulceribus quę resfringuntur. Cap. L.

Quædam ulcera ubi cicatricem receperunt, sæpe post non ita multum tempus rursus inflammantur & resfringuntur. Affectio enim ossis aliquo, aliquando caro incumbens facile cicatricem recipit, & perfectē sana esse uidentur. Verum sanioso humore, paulatim ex ossē in profundo corruptionem perferente, ad illam rursus influente, inflammatio & pus accedit, quę cicatricem resfricant. Quę igitur est talium ulcerum curatio? ressecratio tanta ut os affectum discedat. Facile igitur insidentia ossa emergēt, si papaueris syluestris & fici folia, cum polentæ polline ac uino trita, pro cataplasmate impones. Aut hyoscyami semen, & atramentū futuri paribus portio nibus trita adhibebis. peucedani quoq; radix squamas ossiū breui disparat.

Ulcera quę resfringuntur

De ulceribus in articulis. Cap. LII.

Articulificciores sunt quàm carnosę partes, quapropter ulceratifficioribus opus habent medicamentis. Probe igitur Polyidæ pastillus facit, cum uino tritus ad strigmentitiā spissitudinem. itemq; alia similiter ut hic ressecantia medicamēta. Sed & aqua marina, & muria sæpe ipsos perfusos, melius affici uidimus. utendum itaq; est ad articulos his quę magis siccant.

Ulcera in articulis

Quę spicula, aculeos, & spinas extrahunt, & consimilia. Cap. LIII.

Aculeos & arundines, insuperq; spicula ac spinas extrahūt Anagallides ambæ, aristolochia rotunda, ammoniacum cum melle, hyoscyami semē tritum inspersum. Arundinis radicem contusam, & ammixto melle linteo insertam, larga copia imposito. breui educit.

Spicula & aculeos extrahunt

De sanguinis tum ex uena, tum ex arteria eruptione. Cap. LIIII.

In partibus ex quibus sanguis erumpit, contraria sinibus figura cōducit, hæc autem est ea quę sursum spectat. Sed neq; hæc immodicæ existat. Periculum est enim ne dolor oboriatur, & uas rursus sanguinē fundat. Nihil enim magis sanguinis eruptiones mouet, & inflammationes auget, quàm dolor. Verum in partibus sanguinem fundentibus, statim digitum ad osculum ulceris circa uasculum obde, ita ut leniter innitaris, citraq; dolorē premas. Nam & sanguinem simul cohibebis, & grumum in uulnere congelabis. Quin & an multum in profundo situm sit uas, unde sanguis erumpit, diligentiùs considerare oportet, & positionem ipsius ac magnitudinem, & an uena sit aut arteria. postea uero siquidē paruum est uas, aliquo sanguinem sistente utendū est. Optima ex his sunt obstruendi ui prædita, quę compo-

Sanguinis erup-  
tio ex uena  
& arteria

Doloris nō

Sanguinem  
systentia

Arteriarii et  
uenerum dis-  
sectio

Aneurysma

Incarnans me-  
dicamentum

Crustas in-  
ducentia

Sanguinem fla-  
uentia sim-  
plicia

nuntur ex resina stricta, & farina triticeae polline, & gypso, & alijs eius mo-  
di, cum oui candido subactis, & cum pilis leporinis impositis. Si uero ma-  
gnum uas est, hamo ipsum distendere conare, & moderate obtorque. Sup-  
presso autem sanguine, si quidem uena fuerit, citra laqueum, ipsam medicamen-  
tis sanguinem sistere conare. Si uero arteria, ex duob. altero adhibito, aut la-  
queo circumdato, aut toto uase dissecto, sanguinem continebis. Laqueum ue-  
ro aliquando etiam magnis uenis circumdare cogimur: quemadmodum et  
etiam ipsas dissecare aliquando totas, per transuersum uidelicet. Verum ad  
hanc necessitatem deuenimus circa uenas, quae erectae ex magna profundita-  
te sursum feruntur, & maxime per angustiam aliquam, aut principales par-  
tes. Sic enim utraq; pars utrinque reuellitur, & uulnus ab incumben-  
tibus corporibus occultatur ac tegitur. Tutius autem est utrumque facere, & laqueum  
radici uasis circumdare, & inde iam secare. His autem factis, quam citissime  
incarnare uulnus, prius quam decidat laqueus de uase. Si enim non cito in-  
carnetur, sed locus alicubi uacuus comperiatur, uasis dilatatio, quam aneu-  
rysmata uocant, contingit. Cognosces autem an uena sit, aut arteria, quae san-  
guinem fundit, ex eo quod arteriae sanguis flauior est ac tenuior, & pulsato  
modo euacuatur. Venae uero sanguis nigrior est, & crassior, & sine pul-  
su prodit. Optimum igitur ex omnibus incarnantibus medicamentis, quae  
sanè nos nouimus, hoc est, quo etiam ad cerebri membranarum sanguinis  
eruptiones tutissime uti possumus. & ad colli uulnera usque ad iugulares ue-  
nas inficere: nam & harum sanguinem cohibet citra laqueum: recipit autem  
haec thuris pinguis-  
simam partem i. aloes in mollioribus corporibus partem  
dimidiam, in durioribus tantundem: & pro thure, mannae tantundem. Ex-  
cipe oui candido ita subacta ut mellis spissitudinem habeant, & deinde cum  
pilis leporinis quam mollissimis, uasi ac toti ulceri plurimum impone, & ex-  
trinsecus linteo deliga, ita ut primas quatuor aut quinque lintei obuolutio-  
nes super ipsum uas, unde sanguis profluit, facias, & hinc ad radicem ipsum  
procedas. Deinde solutione per tertium diem facta, si medicamentum tuto  
adhuc adhaereat, aliud rursus circumdabis, & uelut insuper humectans rur-  
sus deligabis. Si uero sua sponte respuatur linamentum, radice uasis per di-  
gitum leniter compressa, quo nihil influat, hoc quidem placide tolles, alter-  
um uero appones, atque sic curabis donec uas fuerit incarnatum, ita ut figu-  
ra sursum spectans semper circa molestiam seruetur. At uero quae crustas in-  
ducunt, nudiores partem efficiunt, quam pro natura habebat, crusta dila-  
ta, & plerisque sanguinis eruptio quae listi non potuit, ad crustarum dilap-  
sionem consequuta est. Utendum tamen etiam his, ubi necessitas magna co-  
git. Maxima autem necessitas est uti crustificis medicamentis, aut cauterijs  
ignitis, quum ex putredinosa erosione sanguinis eruptio contingit. Et sanè  
in talibus affectionibus, ubi quicquid putredinosum est rescuerimus, tutius  
est aut urere ipsam ueluti radicem, aut crustificis medicamentis uti. Hoc  
autem maxime in pudendis ac sede fieri solet. Scopus autem in crustam in-  
ducentibus sit caliditas cum adstrictione, uelut in misy, chalcitide, atramentis  
sutorio. Quae uero ex calce uiua fiunt, uehementiora quidem sunt, sed  
quia calx non adstringit, crustae ex ipsis inductae citius decidunt: melius autem  
est ipsas manere. Contingit enim ut caro ad fundum ipsarum succrescat,  
& uelut operculum uasis fiat. Ceterum in his unde sic sanguis erumpit, illa  
tis satius inspersa probe supprimit, aut gallae ustae. Oportet autem ipsas igne  
candefactas, aceto aut uino extinguere. In summa, sanguinis eruptionem si-  
stunt simplicia quidem, aloes, thus, manna, samia terra alter dicta, ferrugo,  
lanarum asstarum cinis tenuissime tritus, sterminus asinum ac equinum, bitu-  
men modicum, malicorium, diphryges, galla, myrtus sicca, alumen om-  
nie, erudum & ustum, resina torrefacta, utris cortex, aut folia sicca, pilularum  
platani lanugo, maxime ubi crustam abiecerint. Priuatim uero sanguinis  
narium eruptionem sistit, iunci acuti semen, urticae foliorum succus, chalcitis,



citis, anthyllis usta, pili leporis, ferculae mediumustum cum aceto, stercus  
 asinum siccatum aut humidum, porri succus cum thure ellychnio exceptus.  
 Composita uero medicamenta omnis sanguinis eruptionis sunt & haec.  
 Spongiam nouam liquida pice imbutam, & bitumine oblitam, in noua ol-  
 li exurito, & ad cineris partes II. plumbi partem I. & stibij partem I. ammi  
 secto. Aliud. Mannae thuris, sulphuris uiui, aequales singulorum par-  
 tes inspergito. Aliud. Chalcitidis drach. VIII. thuris aut mannae eius  
 drach. XVI. resinae frictae drach. VIII. gypsi usti drach. VIII. Aliud crusta  
 inducens & sanguinem sistens. Chalcitidis, aeris usti, atramenti futorii, misyos  
 cocti, singulorum aequales partes. Sed & Rhodium appellatum medicamen-  
 tum, & flauum dictum, ex eorum numero sunt quae probe sanguinem sistunt.

De nervis fauciatis. Cap. LIII.

Nervi fauciati aut puncti inflammationem ac dolorem excellentem ha-  
 bent, propter sensus subtilitatem. Quare etiam febres & conuulsiones  
 his accedunt. Quibusdam etiam delirium, propter neruorum cum cerebro  
 coherentiam. Quandoque uero etiam circa alios locos fauciatae parti uicinos,  
 inflammationes ac abscessus fieri solent, ex ipso nervo fauciato, propter i-  
 plius continuitatem. Oportet igitur cutis uulnus inglutinatum seruare, quo  
 per ipsum sanies effluat. At in punctiionibus si caeca uideantur, etiam dua-  
 bus dissectionibus se mutuo secantibus insuper concidere oportet. Verum  
 in adhibendis auxilijs, si humoribus omnibus ex aequo redundarit corpus,  
 & inflammatio magna sit, primum a uenae sectione incipendum est. Si ue-  
 ro uiciati fuerint in corpore humores, etiam purgatione utendum est. Ad i-  
 plum autem uulnus medicamenta adhibeantur dolorem mitigantia, & ef-  
 fluxionem aperientia, praesertim si non insuper concilio facta sit. proinde a-  
 qua calida, quae alijs inflammationibus conuenientissima est, his inimica  
 existit, & praestat oleo tenui perfundere, quod nullam adstringendi uim ha-  
 beat, & ad sensum calidum sit. Neque enim frigidum, neque tepidum ualde, si-  
 nenoxa adhibetur. Ex medicamentis autem comoda est resina terebinthi-  
 na, per se in pueris, mulieribus, & tenera carne praeditis, cum euphorbio au-  
 tem emollita, in his qui duram carnem habent. Et si quandoque durior sit resi-  
 na, cum aliquo oleo tenuiore. Cataplasmatibus uero in inflammatis ac putre-  
 scentibus nervis uti quis poterit, farina ordeacea, aut sabacea, aut erui, in li-  
 quido cum aceto mulso cocta. Verum citra cocturam, ad punctiones etiam  
 cerato huiusmodi quis utatur. Ceræ quadrantem, euphorbij unc. I. aut ster-  
 coris columbini, in durioribus corporibus, olei sextantem. Quandoque etiam  
 terebinthinae unc. I. Quod si emplastro simile medicamentum facere uoles,  
 ad euphorbij unc. I. ceræ, & resinae frictae, & olei, & picis pinguis, singulo-  
 rum sextuncem adicies. Si uero pro resina, propolim pinguissem addes,  
 melius efficies. Quin & hoc ad punctos neruos commodum est medicamen-  
 tum. Idem etiam ad rabiosi canis morsum facit. Aceti sextar. I. picis pinguis  
 lib. I. opopanacis quadrantem. Opopanaca aceto dilutum amplius conte-  
 nito, & ammixta pice coquito. Hoc medicamentum punctis nervis commo-  
 dum est, non permittens puncturae osculum conuiuere, quemadmodum neque  
 in his qui a rabido cane morsi sunt, ulcus ad cicatricem peruenire. Verum  
 ad sola dura corpora facit. Si uero ad pueros punctos aut tenera carne praedi-  
 tos eo uti uoles, per aliquod discussoria ui praeditum liquare ipsum potes,  
 amaracinum uidelicet, aut opobalsamum, aut oleum uetus. Conuenit etiam  
 regium medicamentum, quod recipit nitrum, aut calcem uiuam, aut euphor-  
 bium, aut sulphur uiuum, aut columbae syluestris stercus, aut opopanaca,  
 aut sagapenum, aut succum cyrenaicum, aut castorium. Ad libram autem  
 medicamenti, uncia una alioquius ex relatis medicamentis inijcienda est. pro-  
 be facit ad neruos fauciatis, & maxime punctos. Possit autem quis ruri de-  
 gens in reliquorum inopia, propolim recentem ac pinguem uulnere inde-  
 re. Aut fetmentum maxime uetus solum, & propoli ammixta, aut cum ti-

Nervi sangui-  
 nis eruptione  
 sistencia

Nervi fauciati  
 aut puncti

Aqua calida  
 nervis fauciat  
 tis inimica

thymalli succo. Cæterum cataplasmatibus ex aceto mulso, aut lixiatio, cum A  
 farina fabarum, aut erui, aut cicerum, aut lupinorum amarorum, aut ordei,  
 aut polentæ polline, non solum in inflammatis, sed etiam ab initio statim u-  
 tendum est. At laxantia cataplasmata, in sauciatis nervis semper reprobare  
 oportet. Si uero non punctus sit nervus, sed manifesta sectione uulneratus,  
 præposita etiam cute dissecta, ut nudus appareat nervus, & rectus non trans-  
 uersus dissectus, relatis ex euphorbio, & ita acris, nullis uteris. Quum ex  
 nim nudus sit nervus, uim illorum uchementem non feret. Calcem igitur assu-  
 mes sæpe lotam æstatis tempore, uberiore oleo subactam. Bonum est & quod  
 ex pompholyge paratur, & quod ex melle, rosaceo uberiore eliquat. O-  
 portet autem nullum ex his uulnus contingere, subtili enim sensu præditus  
 est nervus, & temperamento frigidus, & principalissimæ parti coherens.  
 Imò neq; oleo perfundere tale ulcus oportet. Sordes enim inde contrahit.  
 Detergere igitur solum sanæ satis est per molles lanas specillo obuolutas.  
 Quod si ex sententia omnia procedant, periculo uacat passio madefacere. In  
 fortioribus autem etiam polyidæ pastillo, cum sapa calida, in linameto uti.  
 Postquam uero intestus est denudatus nervus, linamenta extrinsecus cir-  
 cundare oportet aliquo ad angusta uulnera faciente, uelut est id quod ex eu-  
 phorbio paratur, aut quod ex stercore columbino, ita ut etiam de sanis par-  
 tibus multum apprehendamus. Si uero per transversum uulnus factum est,  
 periculum conuulsionis maius est, curatio uero etiam hic similis, præter  
 quod dum recens adhuc est uulnus, quidam futuris uti sunt, & aliquo glut-  
 natorio medicamento. Verum futuras non ualde in superficie facere oportet,  
 ut ne profunditas inglutinata permaneat, & rursus non ita profundas,  
 ut iterum ab acu nervus pungatur. Porro in summa id nosse opere precium  
 est, quod punctiones curans medicamentum, si calidius est, nervi dissec-  
 tionem curare non potest, ut qui non sustineat ipsum mordacitatem ac ardor-  
 em. Neq; uero id quod dissectiones curat, punctioibus convenit. Nam si  
 cultas ipsius ad profunditatem non penetrat, quum cutis dissec-  
 tio sit angu-  
 sta. Victus autem assumatur tenuior, & stratum molle, & olei calidi perfu-  
 sione utendum est ad alas, & caput, ac collum. Si uero uulnus in crure sit,  
 circa inguinâ, ac pedinem, & eius regionis locos, oleum adhibebimus. A  
 balneo in totum usq; ad inflammationum declinationem abstinendum est,  
 quum nullatenus ipsis aquæ cõueniat, uelut diximus, contactus. Quando  
 uero quidam propter consuetudinem, abstinere à balneo non possunt,  
 si uulnerata pars manus sit, conandum est quantum fieri potest, ut ea non  
 rigetur calida aqua, & minus adhuc frigida. Si uero in pede sit uulnus, quia  
 fieri non potest ut non humectetur, ubi lauare uolent, super sauciatam par-  
 tem emplastro aliquo imposito meatus obturante, extrinsecus rursus super  
 ipsum inijcelinteola plura multiplicata oleo madefacta, & rursus ligamen-  
 tum ex linteo forinsecus circundabis. & postea rursus in ipso balneo, olei  
 ligamento superfundito, ubi nervus sauciatus solus incendere uolet. postq;  
 uero lauit, omnia incumbetia reijcito, & relato totius curationis ductu uti-  
 tor. Quod si contusio sola nervi facta sit, si quidem cum contrusa cute, etiam  
 ulceratio fiat, cataplasma ex fabacea farina & aceto mulso commodum est.  
 Adijcies autem aliquando etiam erui farinam & iridem. Si uero dolor con-  
 tusioni adest, picem liquidam ammisceto. Si uero citra contusionem cutis  
 fiat, magis discussorio oleo calido assidue perfundito, anethino uidelicet,  
 aut rutaceo, aut irino, aut amaracino. At si totus nervus dissectus est, peris-  
 culum quidem nullum sequetur, pars autem mutila sit. Curatio uero similis  
 uelut ad alia viscera assumetur. Atq; hæc quidem per simpliciora auxilia  
 in nervis sauciatis, medela, sufficiens est ad totam curationem. Quidam uero  
 etiam multipliciter compositis medicamentis ad ipsos uti solent, qualia  
 sunt, id quod ex metallicis paratur, & barbara appellata emplastra, & cissi-  
 num, & quod ex senecione fit, & melanchlorum, & Indicum, & harmonia,  
 & Ather

Nervus nudus

Balneum ner-  
vis sauciatis  
noxiumNervus con-  
tususNervus totus  
dissectus

& Athena, quorum & compositiones, & utendi modum, in septimo libro reperies. Quandoquidem uero aliqui diuites preciosis medicamentis ad faciendos nervos uti expetunt, Galenus ad punctiones quidem neruorum hec descripsit. Cinamomi unc. i. dictamni unc. i. mari unc. i. amaraci drach. ii. ceræ beſſem, opobalsami dextantem, terebinthinæ unc. i. Aliud. Succ cyrenaici unc. i. ceræ quadrantem, opobalsami unc. xii. Verū ad nudandos nervos hoc. Ceræ ungenteræ quadrantē, ungenti spicati, aut foliati, aut nardini unc. xii. pompholygis lotæ unc. i. spicæ nardi unc. i. amomi unc. i. folij unc. i. Atq; hæc supra spem præstantia esse Galenus dixit.

De articuloꝝ distoꝛtione.

Caput LV.

Articulorum distoꝛtiones, ancyas & ancyloses appellare solent, hoc est articulorum coꝛtractiones, ob impios humores, aut neruoruꝝ aliquam distentionem obortas. In quibus molliendi ac laxandi facultate præditare, queruntur. In cõmuni igitur ea quæ ad induratas in scirrhum partes, & adhuc magis ea quæ ad resolutas relata sunt, his cõpetunt. Priuatim uero per fusio ex aqua & oleo, in quibus cocta sint, lini semen, fenum græcū, althæa, laurus, cucumeris syluestris radix. Et ipsum aded oleum Sicyonium. Post perusionem autem adhibeantur his primum acopa simpliciora, uelut est id quod ex populo nigra paratur, & quod ex abiete. Bromium item, & Basilio inscriptum, & pyxis appellatum. Postea etiam Aristophancum, & Azani, & inscriptum. fortissima uero sunt, & quod Lysiponium, & quod Varium appellatur. Ex emplastris autem Amythaoni inscriptum & Anicetum appellatum. Optimum uero hoc est. Bdelli, adipis uitulini, ammoniaci thymiamatis, tridis Illyricæ, singulorum drach. xvi. opopaneis, galbani, canchrysos, styracis, thuris, singulorum drach. viii. piperis grana CLx. ceræ lib. s. resinæ terebinthinæ lib. s. olei irini fecis quod satis est, uini quod sufficit. Contunditur hoc medicamentum. Est & Acopon bonum, irino aut cypeino, aut laurino dilutum. Medium uero inter acopa & emplastra locū obtinet, medicamentum e perna multæ mixturæ. Acoporum autem usus per mollem ac perseverantem fiat affricciónem, unā cum hoc ut etiam affecti articuli flexionem ac extensionem experiantur.

De laxatis articulis.

Cap. LVI.

Laxantur articuli sæpe, & in diuturnis febrilibus morbis, & in colicis, & resolutis, calidiorē maxime ac humidiorē intemperie ipsos occupante. Atq; hinc motus impeditur. In quibus acaciæ succus aqua dilutus ac affusus, aut rubi, aut myrti, aut lentisci, aut ulmi radicum corticis decoctum coarctat. Aut malicorium in cataplasmate adhibitum, aut myrti folia ceratomyrteo excepta imposita. Corroboratione enim opus habent nerui colligantes, per adstringentem ac resiccantem facultatem. Talia igitur medicamenta articulis imponenda sunt, uelut est id quod ex salicibus paratur, & oxerum appellatum, & phœnicinum, quod uinum adstringens, aut acetū insuper assumptis. Pleriq; uero præ frigiditytate talem impotentiam fieri putantes, atq; ita calidioribus auxilijs uti, maiorem noxam induxerunt.

De lumbricis.

Caput LVII.

Tres sunt in uniuersum lumbricorum species. una eius qui rotundus est crassitudine, altera lati. Tertia eius quem Ascarida appellant. Omnibus autem erigo est ex cruda ac crassa pituitosa materia, & putrefactioni apta, qualis sero congregari solet in pueris, & alijs erapulosi: sed non ex calida & acri, aut atrabilaria materia. Hæ enim quæ etiam nutrimenti naturam transgressæ sint, ad lumbricorum generationem ineptæ existunt. Imò uice uersa etiam corrumpendi ipsos uis habent biliosæ maxime superfluitates. Si uero aliquando unā cum lumbricis excreta fuerit flaua bilis deorsum, aut per uomitus, illos quidem in intestinis esse scito, biliosum autem humorē, aut circa os uentris, aut in alia quadam parte constitisse. Vniuscuiusque igitur differentia ipsorum, & speciem, & ortum, & locum, & dignotionem dicemus,

dicemus, itemq; curationem, à rotundo initio accepto.

De lumbricis rotundis.

Lumbrici  
rotundi

Lumbrici igitur rotundi speciem omnibus notam habent, eo quod etiam hi magis quam alij redundant. Consistunt autem maxime circa tenuia intestina, appropinquantes quoque uentri, ut ea de causa saepe per os efferantur. Quibusdam etiam per nares exceteti sunt. Abundant autem magis quam alij in infantibus, & ut plurimum cum febre. Verum circa principia febrium orientes, ex subiecta corruptione substantiam habent. Circa uigores autem, ex morbi malignitate, circa declinationes uero, ex mutatione uiuentium in melius, nam Hippocrates ait, Bonum est etiam lumbricos rotundos pertransire, morbo ad sudicationem tendente. Hi uero etiam citius perimuntur. Sequitur in his qui lumbricos rotundos habent, intestinorum ac uentris motus, & tussis parua, irritantes, siccae. In quibusdam etiam singultus, & somni cum palpitationibus, & surrectionibus præter rationem. Quidam etiam cum clamore exurgunt, & rursus in somnum delabuntur. Pulsus inæquales sunt, & febres augescunt inordinatè inuadentes, cum extremarum partium perfictione, & ter, aliquando etiam quater in die aut nocte, citra rationem, significationem accessionis præbent. Pueris autem manducatio, cum exerta frustra lingua, & dentium stridor contingit, & oculos claudunt, & tacere cupiunt, & excitantibus indignantur, & oculi suberuenti apparent, & malæ rubicundæ fiunt, & rursus liuescunt. Verum hæc ad modicum tempus, & ex interuallis fiunt. Quibusdam uero ad stomachum accurrentes nauæarum ac morsuum causæ fiunt, & ægroti cibum non appetunt, adsumendum uero cibum coacti, nauseantes uix deglutiunt, aut etiam ingestum reuomunt. Multis etiam uenter defertur cum comestorum corruptione, & instat tympani inflatur. Reliquum uero corpus præter rationem eliquatur, quæ neque fames, neque euacuatio immodica facta sit. Non tamen in omnibus omnia relata signa quærere oportet, sed quædam iuxta id quod exupet, aliquando etiam plurima. Hæc autem contingunt, dum animalia circa intestina obuoluntur ac mordent, & dum febrilis caliditas uapores prauos ad cerebrum affert, ex collecta in uentre putredinosa humiditate. In quibus alii cubi amboobus similiter prospicere oportet, febri, & lumbricis: alii cubi modica febris ratione habita, lumbricos strenuè e corpore expellere oportet. Multi enim neglecti ab ipsis corrofi sunt, & conuulsi perierunt. Alij seuidisse affirmant ipsos per inguina ægri egressos. Expelles autem ipsos prius occisos. occides autem per amarorum maxime auxiliorum usum. Quum igitur communis est febris & lumbricorum curatio, auxilia simpliciora conuenient. Præbibendum itaque ipsis dandum est chamæmeli & myxariorum decoctum: aut etiam ipsa myxaria cocta edenda danda, dandus etiam seridis succus, aut coriandri semen cum aqua calida tritum, aut cum posca. Aut auriculæ muris herba decoctum. Aut cornu ceruini ramentum. Aut rubricæ nopsis leuissime trita. Aut olei crudi amari cochlearia duo paulatim absorbent. Nam amaritudine sua lumbricos occidit, lubricitate uero ipsos detrahens unà cum stercore egerit. Quod si inflammatio ac distensio uiscerum sit, cataplasmate utendum est ex semine lini, & farina lupini, & absinthio, ac bryoniæ radice, cum aceto mulso. Aut etiam perfusionem ex oleo chamæmelino, uino, absinthij semine, & aloë, circa præcordia adhibita. Si uero febres non uehementer uexent, menta ad myxaria ammiscetur ac exhibetur. At ubi febris desistit, aut non est, etiam efficaciora, uelut est decoctum seriphii, aut calaminthæ, aut filicis. Aut cardamomi semen. Aut radicis malæ punice acidæ decoctum ad tertias redactum. Aut cumini tostis, & nitri suluris, singulorum scrup. iij. Aut santonicum, aut abrotonum, aut ambo simul, cum melle in cataplasma redacta. Aut lupinorum amarorum scrup. iij. Aut brassicæ, aut erucæ semen tritum. Aut absinthium, quod etiam solum saepe satis fuit. Dandi etiam aloës lotæ scrupuli iij. Atque hoc inter laudatissima habetur.

Mors ex lum-  
bricis per con-  
uulsionem

Myxaria

habetur. fortioribus etiam illota datur. Quandoquidem uero pueri aloē non admittunt, supinis ipsis detentis, & ore per cochlearium disparato, per clysterem aliquem fistulam ualidam alligatam habētem, inuitis ipsis aloē quam penitissime transmissam iniicimus. Atq; hæc miranda methodus est in pueris aegrè admittentibus: in quibus etiam alimenta forbilis sæpe hoc modo immisimus, ubi alioqui illa non appetentes auerfantur. Sed & Cyperi, & Mafuaphium recte dari possunt, & cornu ceruinum ustum cum pipere, ex melle aut aceto mulso. Sed & reliqua ut ex aceto mulso ipsis dētur conandum est. præstat autem si scilliticum fuerit acetum, & maxime in persicioribus. Aut sinapi cum oleo & aceto. Qui uero cū alui fluxione alumbicis infestantur, eis plantaginis succus præbendus dandus est, aut ipsa plantago sicca. Ex æquo enim ad utrunq; efficax est, tum fluxionē, tum lumbricos. cataplasma uero his imponatur ex cruda ordeacea farina, filice, absinthio, farina lupini, fantonico, & abrotono. Quin & malicorium, & acacia, & galli, aut balastium ammiscere conuenit. Quandoquidem uero quidam amaras potiones auerfantur, ex iam relatis danda sunt quæ non passim amara existunt. Danda præterea etiam chamæpitys, marrubium, helenium, bacce lauri, casia, thymus, pulegium, carpesia, cyperus, polypodium, iris, enicis, erythrodanum, ipina Aegyptia cum pipere pari, sex scrupulorum pondere, in decocto mentæ, aut mori radicis succo, aut decocto petroselini, ac reliquorum odoratorum seminum. Forinsecus autem utendum est aloē cum melino oleo & uino. Hoc etiam appetentiam excitat, cuius magna cura habenda est. Sæpe uero ammiscendum est ad aloē absinthii, aut selle taurino implendus umbilicus, cum aliquo ex relatis amaris. Aut oleū ex rododaphne frequenter illinendū. Aut cedria tum sola imponenda, tum addito cerato, super totum uentrem. Aut pix arida trita inspergenda. Aut menta, aut nigella cum rosaceo illinenda, aut etiam scriphi decoctū his ammiscendum. Aut mali persicæ folia contrita imponimus. Utendum etiam ceruina medulla ungenti modo, in umbilico, pectine ac lumbis. Sed & ceratū hoc adhibebimus si opus fuerit. Aloēs, absinthii, farinæ lupini, scriphi, melanti, singulorum scrup. vi. ceræ unc. iij. olei chamæmelini quod satis est. Arida cum bubulo felle terito. Sæpe uero ipsis per sedem infundenda est aqua mulsa, quo ad dulcedinem mellis, lumbrici deorsum proleſcunt. Si autem putrefacti in profundo, non excernantur, sed magis euaporationes efficiant, subducere ipsos oportet ad aloes, aut amari ex ipsa medicamenti portione, quandoquidem etiam alias non inutillis est ipsi modo/rata per inferna euacuatio.

## De lumbrico lato.

Lumbricus latus transmutatio, ut ita dicam, est membranæ intrinsecus intestinis agnatæ, in corpus quoddam animatum, atq; hic excernitur sæpe totus, ita ut incredibilem magnitudinem aspicientibus exhibeat, aut etiam per partes secedit, ita tamen ut exolutus, non amplius generetur. Abundat autem quandoq; etiam in non febrilentibus. Sed & in febrilentibus nascitur in morbis longis, mordacitatem stomachi assiduam inducens, & appetentiam ciborum incontinentem. Nam id quod animatum factum est in intestinis, adiacens alimentum abripit, ut alio statim opus sit, & si id non contingat, mordentur intestina. Consequitur in ipsis, graciliras corporis, & impotentia cum inæqualitate. Verū signum minime omnium mendax est, quod una cum excrementis quædam cucurbitæ semini similia excernuntur. Cæterum curatio superiori consona est. Conueniunt enim præpotationes ex acris, & alij esus, & filicis aut centaurij decoctum potum, & per clysterē infusum. Itemq; calamintha, aut dictamnii, aut pulegij decoctum. Infundatur etiam ipsis muria. præbiant etiam hoc, quod neq; his qui ab alijs lumbricis infestantur inutile est, præsertim si febre careant. Nitri rubri, piperis, cardamomi, singulorum æquales partes. Dantur ex hoc scrupuli iiii. cum

Lumbricus latus

uino aut aqua calida. Aliud eclegma. Piperis, baccarum lauri purarū, cumini Aethiopici, mastiches, singulorum pares portiones, mellis quod satis est. Datur cochlearij mensura, mane & ad noctem dormituro. Si uero efficacius ipsum facere uoles, etiam nitri rubri tantundem addito. Aliud. Helenij, ammoniaci thymiamatis, piperis, in alio exemplari, filicis, singulorū drach. v. cum aceto mulso calido. Et interposito tempore, euphorbij drach. i. aut duas perfectae aetatis hominibus bibendas praebe. Aliud. Filicis acetabulum, nitri drach. ii. dato in aquae hemina praeuacuato. Melius autem efficitur, si parum scammoniae additum fuerit. Aliud. Corticis radicis mali punicae summa parte decorticata drach. iiii. piperis drach. iiii. cardamomi drach. vi. marrubij drach. ii. Ex melle praebeto a praegresso alij esu. Verum ad perfectam affectionis depulsionem, etiam theriacen exhibebis, uehementi febre non prohibente.

## De Ascaridibus.

Quin & ascarides, ueluti iam antea diximus, species lumbricorum sunt, uermibus similes, circa intestini recti extremas partes, & musculi adstrictio, rij partes primas consistentes, & horum locorum pruritus uehementē inducentes. Generant hanc speciem, uitiosa alimenta. frigiditas, & ciborum corruptio. Euacuare itaq; ipsas oportet, in infantibus per glandulas subditas, ex melle, modico sale, aut nitro. In perfectioribus, muria acris, aut centaurij decoctio cum nitro, & melle. Aut decoctio colocynthidis, aut abanthij, aut chamaeleonis, aut anchusae, aut cnici, aut hyssopi, aut pulegij, aut calami minthae, aut lupinorum. Post infusa per clystres, rectum intestinum sublinatur ex simplicibus, acacia, aut hypocisthidae cum nitro, aut thoe syriaco cum alumine liquido. In his qui adstricti sunt, lemnia terra sphragide appellata cum uino. Ex compositis, pastillo Andronis, & similibus. Sed & cedria ipsi infundatur per clysterem multipliciter perforatum, quales sunt utriusq; forij appellati. Aut carne salsa quae ad hoc apta sit, indita, deligatione uimur, quamdiu id sustinere possint, ita ut ea frequenter alteretur. In communis uero omnes a uermibus infestatos iuuant pilis ichneumonis suffiti. Alimenta ipsis sint boni succi, & quae facile distribui possunt, & neq; efficiens lumbricorum causam augent, neq; uires imminui permittunt, quarum gratia etiam uinum dabimus aquosum. Et tum ea de causa frequēius ipsos nutriemus, tum ut ne alimento carentes lumbrici, morsus inducant. Tempus autem alimentis dandi tum maxime est, quum aliquantū adhuc lumbrici sunt habitiores. Si uero etiam fluxio uentris affuerit, nosse oportet magis augeri lumbricos, eo quod alimenta non distribuuntur. Et sobiles cibos ipsis exhibere oportet, aliquibus etiam adstringentibus ammixtis, uelut sunt pira, mala, mala punica praesertim acida. Foris secus autem ad uentrē utendum est auxilijs adstringentibus, uelut supra dictum est.

## De dracunculis.

## Caput LVIII.

Dracunculi

In India & regionibus supra Aegypti dracunculi generantur, uelut lumbrici similia animalcula quaedam, in musculosis partibus, brachijs uidelicet, coemoris, tibijs. In pueris uero etiam in lateribus sub cute consistunt, & manifeste mouentur. Deinde temporis progressu diuturniore, iuxta dracunculi aliquam extremitatem, locus suppuratur, & aperta cute, principij dracunculi foras procedit. Verum dum attrahitur, dolores inducit, & praesertim ubi abruptus fuerit. Quapropter aliqui plumbeam molem ex dracunculo suspendendam esse dicunt, ut ne aceruatim, sed particulatim ex plumbi mole delapsio ipsius fiat. Alij hos damnantes, eo quod nihilo minus ex pondere plumbi dracunculus abruptatur, & uehementes dolores inducat, iubent partem demittere in aquam calidam, quo dracunculus ex calidis fomento foras procedat, atq; ita digitis ipsum particulatim extrahere. Ceterum Soranus neq; omnino animal, sed nerui alicuius concretionem, dracunculum esse putat, qui opinionem solum inducat, quod moueatur. Siue autem

Nerui concretionē esse dracunculum

Autem hoc sit, siue prius illud, & Sorano, & Leonidæ, & alijs usum est, affusione calidæ & cataplasmatibus cōcoctorijs in his utendum esse, quæ ex aqua mullâ, & farina triticea, aut ordeacea parentur. Sed & emplastri eiusdem facultatis usum quandoq; probant. Commodum autem fuerit & id quod ex bacis lauri, & quod ex melle constat. Nam ex horum usu, dracunculus, siue corpusculum illud contentum mortificatur, & excidit. Suppuratione uero cōtingente, si nō exciderit, dissecetur cutis, & denudatum id quod cōtinet, auferatur, & linamēta indantur, & deinceps suppuratoria curatio adhibeatur.

## CAPITA QVINTI LIBRI.

In hoc quinto totius Operis libro habetur tractatio de ferarum uenentiarum moribus, & de plagis earum quæ uenenum eiiculantur, & de auxiliaribus aduersus uenena medicamentis.

Quæ præseruent in cōmuni ab omnibus uenenum eiiculantibus.	Curatio communis eorū qui quodcunque uenenum sumpserunt.
Cap. I	put xxxviii
Curatio communis omnium ab aliquo uenenum eiiculante iclorum aut morforum	Enumeratio simplicium uenenorū.
Cap. II	Cap. xxxix
De moris à cane rabido, & affectio, ne formidinis aquæ	De cantharide
Cap. III	Cap. xxxxi
Ad non rabiosorum canum moriūs.	De salamandra
Cap. IIII	Cap. xxxxi
De uespis & apibus	De eruca pinus
Cap. V	Cap. xxxxi
De phalangijs	De lepore marino
Cap. VI	Ca. xxxxi
De araneæ morfu	De rana rubeta, aut palustris.
Cap. VII	put xxxv
De scorpij plaga	De hirudinibus
Cap. VIII	Cap. xxxvi
De scolopendra terrestri ac marina.	De chamaeleone
Cap. IX	Cap. xxxviii
Ad helleionis morsum	De hyoscyamo
Cap. X	Cap. xxxix
De mure araneo	De coriandro
Cap. XI	De psyllio
De uisera mare ac fœmina.	Cap. XL
Cap. XII	De cicuta
De amphibia ac scytala.	Cap. xli
Cap. XIII	De papaueris succo
De hamorho, pretere siue diptade	Cap. xlii
Cap. xiv	De carpali succo
De hydro	Cap. xliii
Cap. xvi	De mandragora
De cenchrino	Cap. xlv
Cap. xvii	De aconito
De ceraste & aspidē	Cap. xli
Cap. xviii	De ixiā
De basilisco	Cap. xlii
Cap. xix	De ephemetō
De marinis, & primū de pastinaca, & murena	Cap. xliiii
Cap. xx	De smilace
De dracone marino	Cap. xlviii
Cap. xxi	De solano furioso, à quibusdam doctis rycnio appellato
De scorpio marino	Cap. xlix
Cap. xxii	De sardonis herba
Preparatio sanguinis testudinis marinae	Cap. l
Cap. xxiii	De papauere corniculato
De moris à crocodilo.	Cap. li
Cap. xxiiii	De pharico
De moris ab homine	Cap. lii
Cap. xxv	De toxico
De uenenis	Cap. liii
Cap. xxvi	De fungis
De præseruatione à uenenis.	Cap. lvi
Cap. xxvii	De sanguine taurino
put xxxvii	De lacte coagulato
	Cap. lvii
	De melle in Heraclea nascente.
	Cap. lviii
	put lviii
	De gypso
	Cap. lxi
	De cerusa
	Cap. lxix

De calce, sandaracha & auripigmen to	Cap. LX	agarico nigro, ruta syluestri, me- lanthio, recentibus caeti spinæ	Cap. LXIII
De spuma argenti	Cap. LXI	pappis	Cap. LXIII
De plumbo	Cap. LXII	De his quæ nobis familiaria sunt, ue- lut est uinum, & frigida aqua.	
De hydrargyro	Cap. LXIII		
De ueratro albo, thapsia, elaterio,	Cap. LXV.		

## PAVLI AEGINETAE REI MEDI-

CAE LIBER V. IANO CORNARIO

*Medico Physico interprete.**Quæ præseruent in communi ab omnibus uenenum eiacular,  
ribus. Caput I.*

E uenenum eiaculantibus animantibus dicturi, ab his  
quæ in communi omnibus talibus commodant initium  
sumemus, ea quæ præseruant prius tractaturi. Si igitur  
quis in locis eiusmodi feris refertis, ex aliqua necessitate  
dormire cogatur, in quibus maxime salamandræ, aut pha-  
langia, aut reptilia quædam abundant, horum quidē sub  
terreaneas latebras, alio cum aqua trito, aut aliqua ex re,

ferendis herbis, obturare conuenit. Suffire uero cornua ceruina, ungulas  
caprinae, aut pilos, gagaten lapidem, bitumen, bdellium, galbanū, cupressi  
aut cedri framenta, melanthium, peucedanum, uiticis folia, calaminthen, sa-  
gapenum, castorium, canchryos radicem, conyzam, aut aliquid ex reliquis  
grauolentibus. Culices uero priuatim fugant suffitu, atramenti sutorij,

Culices su-  
gantia

melanthij syluestris seminis, cumini, singulorum æquales partes cum ster-  
core bubulo. Ad hæc etiam ignem frequentius accendere conuenit. Nam  
feræ splendorem plerumq; fugiunt. Stratum substernendum est ex asphode-  
lis, calamintha, uiticæ, pollegio, polio, conyza, abrotono. Si uero fieri non  
possit, ut toto quis strato huiusmodi utatur, strato saltem hæc circumcirca  
indantur. Animaduersionem etiam habere oportet in his quæ coquantur,  
& in aquis, & uasis uinarijs, & diligenter obturando. Nec uero focos sub  
quibusdam arboribus facere oportet, præsertim picea & pinu. In his enim  
salamandræ & erucæ letales abundant, quæ præ ignis calore calefcentes,  
obsonijs incidunt, aut etiam alijs uasis, si non fuerint contexta. Qui uero  
securiores esse expetūt, hi cerato liquidiore illinantur, ex cera, rosacco, gal-  
bano modico, & cornu ceruini ramento modico, aut etiam cumino Aethi-  
opico. Priuatim uero ut ne quis ab apibus & uespis feriat, prohibent  
maluæ folia cum oleo trita illita.

Apes & uespe  
ne feriant*Curatio communis omnium ab aliquo uenenum eiaculante ictorum aut  
morforum. Caput II.*

SI contingat ut aliquis ictus sit aut commorsus ab aliquo uenenum eiacu-  
lante, statim exuctione utendum est. Oportet autem cum qui exucturus  
est non esse ieiunum, sed uino os colluisse, & oleum in ipso continere. De-  
inde si pars admittit, cucurbitulam commorsis affigere, cum multa flamma  
scarificatione facta, itemq; uticinis locis. Reuellitur enim unā cum sangui-  
nis & flatus attractione, etiam ipsum uenenum. Adurare quoq; oportet &  
crustis obducere ulcerata. Sed & extremarum partium præsectiones adhi-  
bere commodum fuerit, si animal quod momordit letale fuerit, uelut est a-  
pis, cerastes, uisera, & similia: quemadmodum sanè narrat Galenus, uini-  
torem quendam à uisera commorsum, quem feram illam cognouisset, sta-  
tim digitum commorsum falce sibi amputasse, & penitus à periculo libera-  
tum esse. Si uero uenenum prius per corpus distribui contigerit, statim ue-

Præsectio paro-  
tium extre-  
marum

nā se



anæfectione utendum est, & maxime si ictus humoribus repletus tibi uideatur. Dandum autem est cum cibis edendum piper, aut allium. Vinum bibendum est forte, ut ex eo recentibus uapōtibz & familiari caliditate, corporis miscella repleatur. Postea uero cataplasmata adhibeantur, quæ morbum calefacere ac lancinare possunt, uelut est brassicæ aut fici cinis, aceto amixto, aut lixiuio, aut garo. Item cepe cum polenta aut pane, & porrum cum sale. Aut pix liquida calida cum sale, aut cedriæ, aut caprinum stercore. Conuenit ipsi etiam perfusio ex aceto calido, in quo cocta est calamintha: aut ex aceto & aqua marina, aut ex aceto & muria. Imponendæ sunt locis gallsinæ, & magis galli, aut alia animalia resecta calentia. nam & uenenum transiunt, & dolores mitigant. Sed & emplastris utendum est ex sale, & eo quod ex canchry & adarce constat, & in summa his quæ acriorem faculratem habent. In communi uero omnibus à quocunq; tandem ueneno eiuculante commorlis aut ictis, præterquam si omnino non sunt læsæ partes in profundo, in potu detur seris, aut erica, aut astragalitis cum aceto. Aut bitumen, aut paliurus eodem modo. Aut paliuri decoctum. Aut mustela assiccata drach. ii. cum uino. Hoc celebre est. Aut testudinis marine sanguis. Aut castorij drac. i. cum uino diluto. Aut libanotidis drach. i. Aut scyoniæ radix. Aut porri succus. Aut chamæpitys, aut smyrnium, aut cinamomum, aut aristolochia, aut uiticis semen, aut cupressi pilulæ, aut seseli, aut piper, aut trifolij semen, aut bacce lauri, aut caneri fluuiales tosti aut cocti. Vt re etiam composita huiusmodi theriaca.

*Theriace ad uenenum eiuculantiæ, & uenena à uiperis morsos;*

*& scorpio istos.*

Bryoniæ, opopanax, iridis Illyricæ, radicis libanotidis, myrrhæ, singulorum drach. iiii. aristolochiæ drach. v. thuris, rutæ syluestris, singulorum drach. iiii. farinæ erui drach. ii. cum uino pastillos formato, & obolos iiii. cum uino dato. Quin & purgatio omnibus conuenit, & exudationes facientia medicamenta, & theriacæ ex uiperis assumptio.

*De morsu à canerabido, & affectione formidinis aque.*

Cap. iiii.

Sermo de morsu à rabido cane reliquis proposuimus, eo quod animal id multum est, & familiare, & frequenter rabie corripitur, & ægre cauere potest, quod periculum ex ipso uitari non potest, nisi multis & cōmodis auxilijs quis utatur. Rabiunt canes plerumq; in uehementioribus æstibus. Verum ut Lycus ait, quandoq; etiam in interitissimis frigoribus. Rabiosi uero faciunt canes & cibum, & potum auerfantur. Et sitiunt quidem uehementer, potum autem non admittunt, & plerumq; anhelant, & aures demittunt, & saliuam largam ac spumofam emittunt, & muti in totum sunt, adeoq; uelut desipientes, ut neq; familiares cognoscant. Inuadunt itaq; omnes sine latratu, similiter & feras, & homines, & mordent. Mordentes autem statim quidem nihil molesti inferunt, præterquam ex uulnere dolorem. Postea uero affectionem inducunt, quæ uocatur Aquæ formido, & contingit cum conuulsionibus, & totius corporis rubore, maxime autem faciei, & cum exudatione ac anxietate: & aquam fugiunt, siue uideant, siue admoueantur; quidam etiam omnem humorem. Quidam etiam latrant, uelut canes, & aggressi alios mordent, & morsu suo eiusdem affectionis causa sunt. Porro symptomatum aliorum causa manifesta est, quum apprehenderit uenenum omnes partes. Quod uero timeant aquam, aliqui ob immodicam siccitatem fieri dixerunt, nimirum humida ipsorum essentia penitus immutata. Verum Rufus melancholiæ talem ipsi speciem oboriri pronunciauit, ueneno illum atræ bilis humorem imitante, quemadmodum alios melancholicos nouimus alia atq; alia timere. Quæ sanè causa concurret etiam his qui dicunt ipsos putare, quod canis qui ipsos momordit imago in aquis obuerfetur. Cæterum eorum qui hanc affectionem inciderunt, nullum sanatum esse nouimus, præterquam unum atq; alterum ex historia nobis cognitos, & hos ipsos non à rabioso

*Canis rabidi morsus*

*Lycus medicus*

*Aquæ formido*

*Rufus medicus*

rabioso cane morfos, sed ex aliquo commorso affectione transsumpta. An-  
te uero huius affectionis rentationem, multi etiam ex his qui à cane morfi  
fuerunt, seruati sunt. Hinc igitur curationis initium faciamus. Quando ue-  
ro saepe id contigit, ut ex eo quod aquae formidinis affectio hactenus non ac-  
cessit (plerumque enim circa quadragesimum diem irruere solet. In quibusdam  
post sex menses. narratur quibusdam etiam post septimum annum accidisse)  
quidam canem qui momordit non rabiosum esse opinati, ulcus ad cicatri-  
cem perducere festinarunt, atque sic ipsi affectionis autores fuerunt: hac pro-  
batione usus, utrum rabiosi canis sit morsus, aut non, comperies. Noces re-  
gias probe tritas ulceri imponito, & postridie acceptas gallo edendas obij-  
cito, aut etiam gallinae: & primum quidem ipsas non continget, si uero sa-  
me urgente ederit, attendito. Si enim non rabiosus fuerit canis qui momor-  
dit, uiuet animal quod edit. Sin rabiosus, postridie morietur: & tunc ad ul-  
ceris apertionem festinabis, & post paucos dies rursus eadem probatione  
uteris. Et ubi animal non morietur, ulcus ad cicatricem perduces, nimirum  
uelut aegro iam à periculo liberato. Hanc itaque probationem Oribasius tra-  
didit. At si ex relatis signis canem rabiosum esse exacte cognouerimus, ape-  
rientibus statim utemur. Primum igitur ex aperientibus est id quod ex pi-  
ce, aceto acerrimo, & opopanace paratur, ad fauciatos neruos relatum. Si ue-  
ro tenera cute praeditus fuerit is qui commorsus est, irino aut balsamo, aut  
aliquo huiusmodi diluatur. Aut fomento prius adhibito, ulcera alio inter-  
gito. Hoc etiam crustam inducit.

Canis rabidi  
morsus co-  
gnatio

*Siccum crustificum in rabiosi canis morsu.*

Salis fossilis drach. viiij. chalcitidis drach. xvi. scillae drach. xvi. rutae  
uiridis drach. iiii. aeruginis rase drach. iiii. seminis marrubij drach. i. Vie-  
re primum sicco, ut crustam inducat deinde cum rosaceo ut crustae excidat.  
Seruentur autem partes non indurctae cicatrice ad dies quadraginta duos.

*Cataplasma in rabiosi canis morsu oscula ampla conseruant.*

Cepas cum sale & ruta imponito. Aur silphium cum sale. Aut fassamen-  
tum uetus. Aut cinerem sarmentitium cum oleo. Aut allium, aut sambuci  
folia, aut mentam, aut melissophyllon, singula cum sale. Aut nuces regias  
cum cepa, & sale, ac melle. Aut cinerem ficulnum cerato exceptum. Ablu-  
to autem ulcus chamæmelo in aqua cocto, & rumicis syluestris radice. Qui-  
dam etiam ferramenti ignitis ulcus urunt. Praebenda uero ipsis danda  
sunt simplicia, lycium, absinthium, silphij succus, chamædrys, scordium, po-  
lium. composita haec. Cancrorum fluuiatilium ad sarmenta uitis albae, in cy-  
prio aut aereo uase ustorum cochlearia ii. radicis gentianae trite cochlea. i.  
cum uini meraci ueteris cyath. ii. ad dies quadraginta bibenda praebe. Qui-  
dam etiam sanguinis perdicis cochlearia ii. addunt. Cancros autem auger-  
scente luna capere oportet, ante solis exortum. In his uero qui eodem die  
non biberunt, duplam mensuram dato, aliquando etiam triplam. Quin & ex  
uisperis theriaca recte dari potest. Purgare uero oportet medicamentum ex cu-  
cubita syluestri quotidie dato, cum decocto saluie, aut sideritidis heracleae,  
quam sane etiam alysson uocant, quidam etiam hepar canis qui momordit  
edendum dederunt. Victus talis assumatur qui simul obtundat ac extinguat  
ueneni facultatem, simulque impediat in profundum delationem. Vtrunque  
autem facere potest uini dulcis meraci ueteris, & lactis porus. Similiter al-  
liorum, ceparum, & porri esus. Si uero non à principio assumpta fuerint ta-  
xilia relata, propter aliquod impedimentum, carnis resectionem, aut cucur-  
bitarum admotionem, aut ulceris utionem non assumere oportet, quum  
iam ulcus ad profundum processerit. Verum relato ex alto euocandi ductu  
utendum est, non oborta uidelicet aquae formidinis affectione, purgatio ite ex  
Hierae, & ex scillo lacte assumatur. Sudorem elicientia exhibeanrur. & dro-  
pacissimi & sinapissimi fiant particulatim per totum corpus. efficacissimus au-  
tem omnium cognitus est ueratri usus saepe assumptus.

Cyprium uas

Alysson, sive  
uitis heracleae.  
Hepar canis

Ad non

Ad non rabiosorum canum morsus.

Cap. IIII.

**C**ANUM non rabiosorum morsus, qui & ipsi uenenoſa aliqua eſſentia ac natura participant, ſtatim aſperſio aceto, expaſſa manu percutere, inſuper perſum nitrum cum aceto tritū ex alto ſupra morſum deſtilla, & deinde ſpongiā nouam aceto imbutam, aut etiam aceto cum nitro mixto tinctā, ad tridū impoſue, & deligatam ſæpe madefacito, perſecte enim perſanat. Aut erui farinā oleo ſubactā impoſuito. Aut ſpongiā nouam. Aut laſā ſuccidam aceto & oleo imbutam adhibeto. Aut rubi folia contuſa cum aceto impoſuito. Aut cepam tritam cum melle. Aut origani comæ, & ſalis, & cepe ſingulorum æquales portiones cum melle. Aut marrubium nigrū, quod etiam balloten uocant, cum ſale. Cæterum ad morſus iam ſuppuratos facit, Ballote etiam erui melle ſubactā impoſuito, priuatim enim ad hos facit. Inſtamma, nos autem ſpuma argenti trita cum aqua illinito.

De aſpis &amp; apibus.

Cap. V.

**Q**UI ab apibus icſi ſunt, eos conſequitur plagæ dolor, rubor, tumor, partium circumsitarū eleuatio, & a culeus in plaga manet. Qui uero à uesperrum & apum icſus

De phalangis.

Cap. VI.

**C**OMMORſUS à phalangis ipſe quidem locus rubicundus apparet, & puncturis ſimilis, neque tumidus, neque calidus, ſed moderatè ſubrubicundus, uerum perfrigeratus & puriginolus. Sequitur percuſſos perfrigeratio, tremor, corporis grauitas, ſudor frigidus, dolor intentus, pallor, urinarum aſſidua ad excretionem irritatio. In quibusdam urinæ difficultas, & colicæ arreſtio, oculi humidi, diſtentione circa inguina & poplites conuulſoria, morſus ſtomachi uehementis, linguæ obſcuritas, uomitus aquarum, aut aranei telis ſimilitudo: quibusdam etiam per urinas & uentrem eadem feruntur. Et ſi in calidam aquam demittantur, dolore liberantur, & rursus uehementer dolent. Auxilium uero ſentiunt, ſi extrinſecus ipſis imponas cinerem ficulnum, cum ſale trito uino ſubactum. Aut mali punice ſylueſtris radicem tritam. Aut ariſtolochiam cum farina ordeacea aceto ſubactam. Perfundenda ſunt ulcera aqua marina calidiore, & meliſſophylli decoctio, huius etiam ſolia impoſuenda ſunt. Oportet etiam balnea frequentiora adhibere, & præparationibus uri his, abrotoni ſemine, aniſo, ariſtolochia, cicere ſylueſtri, cum melle Aethiopico, cedri baccis tritis, platani cortice, triſolij herbæ ſemine, myricæ fructu, ſingulorum horum drach. II. bibendas præbe, cum uini hemina una. facit & uiridium cupreſſi pilularum aut foliorum decoctum, uel non temperatum. Quidam etiam cancrum fluuiatilem in ſuccum redactum, cum lacte & apij ſemine exhibitum, liberare tradunt.

De araneæ morſu.

Cap. VII.

**E**ST etiam quoddam araneæ genus, quod ubi percuſſit intentos dolores circa medium præcordium gignit, ruborem item & urinæ difficultatem: quandoque etiam ſuffocationem. Alleuantur autem icſi ab his, ſi cum melle ſylueſtre thebaicum, aut uiticis ſemen, aut populi albæ folia in potu ſumant, aut allium ſolum ingerant, & uinum meracum inſuper ſorbeant.

De ſcorpionis plaga.

Cap. VIII.

**A**SCORPIO icſus locus ſtatim inflammari incipit, ut qui durus & rubicundus, & cum dolore circumtentus fiat, & uiciſſim nunc ſeruorem, nunc frigiditatem percipiat. Et quum dolor ſequitur, quandoque leuiter affligit, quandoque augetur. Concomitatur ſudor, horroſus ſenſus, tremor, extremarum partium frigiditas, inguinum tumor, & membri arreſtio. Sepe uero etiam ſtatuum cum ſtrepitu per ſedem eruptio, pilorum erectio, color ſordidus doloroſus circa ſummam cutē, quum ſenſus ita afficiatur, uelut ab acupunctura

clura fiat. Sed & his confestim auxiliatur fici succus uulnusculis instillatus, & ipse scorpius qui percussit tritus ac plagæ impositus. Postea uero sal tritus imponatur, cum lini & althææ herbæ semine. Auxiliatur etiam sulphur uisum resina exceptum, aut terebinthina. Similiter & galbanum ad splenij formam dilatatum ac impositum, calamintha trita imposita, & cruda farina ordeacea præparata cum uino & rutæ decocto. Sic etiam auxiliatur semen trifolij herbæ tritum ac impositum præbiant etiam aristolochiæ drach. ii. maxime corticis cum uino. Gentianam item contusam, & pulegium satis decoctum, & baccas lauri decem tritas, & calaminthen diutius coctam cum posca, & cyperum cum uino. Rutam eodem modo, & fici succo, & sulphuri si adsit: sin minus, succo parthico utendum est. Facit & trifolij semen postum, & ocymi semen. præter opinionem quoque facit argentum statim plagæ appositum. His uero omnibus conferri potest balnei usus assiduus cum multa exudatione, & uini potus meracior, itemque uinum aqua dilutum. Composita præbiantur hæc: Sulphuris uisui fabæ Aegyptiæ magnitudo, cum piperis granis viii. in uini hemina dimidia. Aut silphij succus cum cancro tritus in uino. Aut melanthij, cumini Aethiopici, uiticis seminis, singulorum æquas portiones cum uino.

*Ad graves scorpionum ac phalangiorum plagas.*

Fecis uini drach. xvi. pyrethri drach. iiii. seminis rutæ syluestris drach. iiii. castorij, erucæ seminis, singulorum drach. ii. excipiantur testudinis marinx sanguine. Dantur oboli iiii. cum uini meraci aut aceti cyathis iiii. Aliud. Pyrethri, aristolochiæ, singulorum drach. iiii. piperis drach. ii. fici silphij drach. i. datur fabæ Aegyptiæ magnitudo.

*De scolopendra terrestri ac marina.*

*Cap. ix.*

*Scolopendra  
terrestri; mor-  
fus*

Mors à scolopendra, in communi locus circumcirca morsum liuescit, & attollitur, & aliquando foeculentus, raro uero etiam rubicundus apparet. Vlceratur etiam ab ipso morsu initio facto, ulceratione quadam dolorosa ac ægrè curabili. Ad hæc etiam pruriginosus sensus per totum corpus contingit. Priuatim autem his qui à marina scolopendra morsu sunt, & quosus & pellucidus quandoque tumor fit: qui uero à terrestri rubicundus. Ipsi igitur plagæ sale tritum imponere oportet, aut rutam tritam, aut cinerem aceto subactum, aut scissam. Perfundere uero muria acida oportet, aut uelut Archigenes iubet, oleo multo calido, atque sic relata imponere. In potu exhibeantur Aristolochia cum uino, aut serpillum, aut calamintha, aut rutæ syluestris, aut trifolium, aut succus radicis asphodeli heminx dimidiæ mensura cum uino.

*De stellione.*

*Caput x.*

*Stellionis  
morsus*

Qui à stellione morsu sunt, intentè dolent, & morsum liuidum habent. Opem autem statim sentiunt, si plaga cepis & allijs integatur. Quin & si eadem edant, insuperque uinum meracum absorbeant, curantur. Sciant etiam tritum ipsis imponitur.

*De mure araneo.*

*Caput xi.*

*Muris aranei  
morsus*

Ad muris aranei morsum sequuntur dolores pulsatiles, rubotes circa singulas dentium puncturas, pustulæ circum morsum sanioso humore plene, & in propinquo omnia liuescunt. Et si pustulæ cutis subexcorietur, album apparet ulcus, dilaniatis membranis nervosis. Ad hæc excidunt partes putrescentes, nomen oriente similiter ut in eis quæ pascendo proserpunt. Insuper etiam tormen sequitur circa intestina, & urinæ difficultas, & frigida humiditatis circum effusio. Auxiliatur ipsis ex galbano splenium, per se impositum, aut cum aceto tritum. Aut farina ordeacea cum aceto multo imposita. Et ipse mus araneus qui momordit dilaniatus ac impositus, & pyrethrum impositum. Aut malicorium mali punice dulcis coctum. Aut malua syluestris. Aut allium tritum, aut sinapi tritum cum aceto. Et muris calidæ perfusio, deinde ordeis uisti cum aceto cataplasma. Præbiant abrotonum coctum

¶ Cum cum uino, aut silybrium, aut serpyllum, aut erucam, aut galbanum, aut salicam, aut cupressi pilulas teneras cum aceto mulso. Aut pyrethrum cum uino. Aut chamaeleonis radicē, aut hœdi coagulum siue agni. Aut gentianæ radicem, aut uerbénacam. Hæc etiam cataplasmatibus uicem præbet. Sed & ipsum murem araneum qui momordit, tritum cum uino bibendum exhibent. Facit & hoc. Myrrhæ drach. vi. aristolochiæ corticis drach. iiii.

Cæterum ad muris aranei & scolopendræ morsum, salem cum pice liquida imponito. Aut cedriam cum melle, aut allium cum fici folijs & cumino. aut calaminthæ folia, aut ordeum cum aceto.

De uipera mare ac femina.

Cap. XII.

IN his qui à uipera tum mare, tum femina cômorsi sunt, aut etiam à simili bus uenenum ei aculantibus, sequitur in principio quidē dolor cômorsi loci, postea uero etiam totius corporis. apparent autem in morfu duo foramina parum inter se distantia, & fluxio ex his sanguinis & humoris sanio, si postea uero etiam oleosi, postremum etiam æruginosi ac ueneni, quem sanie quidam ferarum illarum uenenum esse dicunt. Sequitur quoque tumor, res circa morsum subrubicundi ac liuidi, coloris circa corpus uisatio, uerigo, stomachi exolutio, animi deliquium. In quibusdam etiam uomitus biliosus, urinæ difficultas: & circum morsum pustulæ emergunt uelut in ambullis: & nome circum circa depascens corripit ad circumfusas partes prorepans, & gingiuæ ipsis eruantur. Accedit ipsis etiam tremor, & sopor, & frigida exudatio. Minore uero periculo liberari uidentur qui à uipera femina morfi sunt, quam qui à mare. Et ex his ipsis minus periclitantur qui cibum præsumperunt. At in curationibus præsentissimum auxilium est alijesus, & meri potus, ad eò ut si quis hæc sustineat, alio auxilio opus nō habeat. Edant etiam porrum, & cepas, & salsamentum acerrimum. Quidam etiam ranas cum iusculo præparatas edendas dederunt. faciunt quoque hæc singula cum uino pota, testudinis marinæ sanguis siccus cum cumino syluestri, coagulum leporis, aut hinuli trium obolorum pondere, ceruini pudendi sicci drach. i. anchusa tenuifolia tota. Hanc etiam quidam appendunt, suc ei porri hemina dimidia ex aqua mulsâ, melissophylli foliorum succus, ruta syluestris, gallinarum domesticarum cerebrum, panacis radix cocta cum uino, agarij drach. i. baccæ iuniperi, asphodeli radix, pistacta trita, uiticis semen, mustelæ assiccatae drach. ii. echij radix & succus, cancri fluuiales, aut marini per se, & cum staphide syluestri, & sale, ac polio, aristolochiæ radix cū myrrhâ, & gentiana, & baccis lauri, singula æquis portionibus melle excepta. Sed & hoc admirandum est, ab Oribasio traditū ad uiperæ morsum. Anisi acetabulum, piperis drach. iiii. aristolochiæ corticis, opij, castorij, myrrhæ, singulorum drach. i. passo trita in pastillos fabæ græcæ magnitudinis efforma, & pro uiribus præbe, cum uini diluti cyath. iiii.

Aliud ex libris Lyci, pharmacum ad uiperæ morsum accommodatum, Myrrhæ, castorij, piperis, portulacæ, singulorum drachmam i. seminis anethi acetabulum, passo trita dato.

Aliud ex libris Archigenis. Cancros xx. cum sufficienti farina triticea in pila diligenter tundito, & calaminthes ac salis modicum ammisceto, & in pastillos efformato ac siccato. Utere uero in cataplasmate cum lacte. & cum aqua mulsâ unum bibendum præbeto. Si uero caneros fluuiales non habeas, marinis inquit, utere. forinsecus autem plagæ impositū caprinum sterces cum uino egregiè auxiliatur. Aut lauri folia cocta cum oleo. Aut lauri bæcæ, aut calamintha, erica, ruta, apium, abrotonum, galbanum in splenio, organum uiride tritum, pulli gallinacii dissecti, & calidi impositi, ac frequenter permutati, erui farina uino subacta, raphani cortex tritus, scilla cocta, cruda ordeacea farina cum aceto mulso, cucumeris syluestris folia cum polenæ polline, sex uini similiter cum polente polline, ruta cum sale & melle, surfur in aceto coctum, cinis cum aceto, cedria cum sale, pix

viperæ mor-  
sus

Lyci libri

Cancrorū me-  
dicamentum

liquida cum sale. Verum perfusio fiat cum trifolij decocto, aut pulegij, aut muria acida. Quum uero subcruenta facie fuerint pustulae, findito ipsas ita ut ne excoories, deinde multa aqua perfundito, & lenticula cocta cum melle integito, donec persanatae fuerint. Caeterum antidotus ex uiperis priuatim in his efficax est, & pota, & morsui imposita.

*De amphibia ac scytala.*

Cap. XIII.

*Amphibia  
Scytale  
morsus  
Dryinus*

Consimilia eueniunt etiam ex horum moribus, & eadem auxilia opitulantur. Quapropter priuatam aliquam descriptionem non requirunt.

*De dryino.*

Cap. XIII.

Dryinus uelut Galenus ait, in quercuum radicibus uitam degens, adeo maleficus est ad male perdendum, ut si quis ipsum calcet, pedes ipsius excoientur, & multus tumor per tota crura fiat: & quod adhuc magis admirandum est, aiunt quod si quis etiam curare ipsos uelit, huius manus excoriari. Si uero quis defendendi se studio ipsam feram occidere uelit, hunc pessime olere dicunt, & nihil aliud olfacere. Percussis autem a dryino tumor eleuatur circa locum, cum rubore, & pustularum eruptione in circumstantibus partibus. Sequitur etiam quandoque aquosae saniei excretio. Concomitatur autem oris uentriculi morsus, & tormen. Conueniunt ipsis aristolochia in uino pota, & trifolium herba, & asphodeli radix similiter accepta, & omnis quercus fructus tritus potus. Similiter etiam ilicis radices contusae ac impositae locale auxilium praebent.

*De haemorrhoo, prestere siue dipsade.*

Cap. XV.

*Haemorrhoo*

Ab haemorrhoo commorsis uehementes circumcirca incidunt dolores, qui breues penitus ac angustas reddunt corporis raritates, praeflictio num continuitate. Ex morsu autem sanguis excernitur multus, & si ulla corporis parte cicatrix fuerit, erumpit ac sanguinem fundit. Alui egestionem crucientem excernuntur, & qui defluit ab ipsis sanguis, in grumos concretus est. Dum autem tussunt, sanguinem e pulmone educunt, & euomentes citra auxilium pereunt. At a dipsade morsos, ardor insedabilis corripit, & sitis uehementer intenta, ut neque expleri possit, neque desinat, & aegri potum abundanter trahant, & ita tamen affectu sine uelut qui omnino potum non acciperent, consimilisque corporis totius habitus consequitur, uelut in hydropicis propter assiduam potus ingestionem. Vnde & *απυσία*, & *απύση*, ab ardore, aut dipsa a siti appellatur. Caeterum apud plurimos ueterum, ab haemorrhoo & dipsade commorsi, pro desperatis, & quibus auxilium ferri non possit, habiti sunt. Verum si his quae proprietate quadam aduersus hanc belitam profunt, destituti fuerimus, communia auxilia experiri oportet, & statim scarificationes adhibere, & unctiones, & si locus permiserit, extremarum partium praesectionem. Consequenter uero acrium cataplasmatum impositiones. Commodat & omnis acrium ciborum esus, maxime salsamentorum. Meraci item uini potus. & balneum. Haec uero assidue, & ex paruis intervalis saepe adhibere oportet, priusquam irruant morbi. Nam ubi illi comparuerint, nulla penitus utilitas auxiliorum ex medicis contingit. At localia ad morsus ipsos imponenda, in dipsadis quidem morfu descripta reperimus, portulacae folia trita cum aceto, polentam & rubi folia trita cum melle, plantaginem, hyssopum, allium album, porrum, rutam, urticam. In haemorrhoi uero morfu tum haec, tum ad haec, uitae folia cocta cum melle trita. Petros uero ipsius bestiae caputustum bibatur, aut allium cum oleo irino. Edant etiam uuas passas.

*De hydro siue natrice.*

Cap. XVI.

*Hydros  
Natrix*

Ab hydro commorsis ulcus dilatatur, & luescens magnum fit, saniesque ex ipso nigra, multa, graueolens, uelut ab ulcere depasciente excernitur. curatio mali temporis progressu, & uix perficitur. His igitur Origanum tritum cum aqua subactum, super morsum imponatur. Aut lixivium quercinum oleo mixto. Aut farina ordeacea cum melle eliquato. Bibuntur & aristolochiae

Achia drachmæ duæ in uino diluto, aut poscæ cyathis duobus. Deinde marubij succus, aut decoctum cum uino. Aut nasturtium syluestre. Authastus regie semen, aut flos. aut sceniculi semen cum uino. Recens etiam fauis mellis facit, si edatur cum aceto.

De cenchrina siue miliari.

Cap. XVII.

His qui à cenchrina mors sunt, morsus similis est uiperæ morsui. cōsequitur putredo, & desfluunt carnes, quæ prius uelut in hydropo intumuerunt. Lethargo corpiuntur, & in somnum profundorem delabuntur. Erasistratus dicit ipsis affectum esse hepar, & uelicam, & intestinū crassum. Rectis enim ipsis, partes hæ corruptæ inueniuntur. His igitur lacuæ semen cum lini semine impositum auxiliatur. Et satureia trita, & ruta syluestris, & serpillum cum hastula regia tritum. In potu uero euestigio dantur, centaureæ radicis drach. 11. cum uini cyath. 111. Aut aristolochiæ radix eodē modo. Similiter item nasturtium & gentiana.

De cerastæ & aspidæ.

Cap. XVIII.

Tres aspidis species Galenus esse dicit. Vnam quæ terrestris appellatur. Alteram quæ chelidonia. Tertiam quæ Ptyas, quæ etiam perniciosissima omnium existit. Nam hæc ubi collum extendit, & spacij longitudinem mensa est, collimate uenenum corporibus inspuat. Hanc reginam Cleopatra peremisse dicit, quæ ubi Augustus Antonio deuicta ipsam captiuam abducere uellet, ipsa bestia huic sinistram mammā admoxit, & ab hac commorsus perijt, nam ita celerimam mortem inducit. Commorsus iraq; à cerastelocus attollitur, cum duricia & pustulis. Fluit ex morsu sanies, quando quæ nigra, quandoq; subpallida, & prasini coloris. Et uaricum speciem præferunt morsu, per totum corpus. Et pudendum quidem intenditur. Mens autem emouetur. Oculorum uero obscuratio succedit. Tandem autem perreunt in anteriorem ac posteriorem partem conuulsi, uelut in terano solent. At ab aspidæ morsu, paruus omnino apparet morsus, similis puncturis acutis, citra tumorem. Sanguis non multus, sed paucus niger destillat. Velox autem oculorum obscuratio apprehendit. Dolorq; corporis multiformis omnino leuis, & non sine uoluptate consequitur. Quapropter bene exclamauit Nicander:

Perimitq; uirum absq; dolore.

Color permutatur & uiridis ac herbaceus fit. oris uentriculi morsus modicus est. frons assidue reuellitur. palpebræ absq; sensu mouentur, uelut in somni accessione. Et in his mors corripit, ne tertia quidē diei parte dilatio nefacta. Vtriusq; igitur compendio auxilium affert extremarū partium refectio. Quapropter citra dilationem refecanda est commorsa pars, si id fieri potest. Aut caro circumcirca euestigio concidatur, & per profundum ad os usq; excindatur, quo commorsas partes & his uiscinas uenenum non excurrat. deinde reliqua cauterijs resiccantur. Horum enim uenenū, uelut etiam Basilisci, instar taurini sanguinis, celerrime & sanguinem, & spiritum in arterijs congelat.

De Basilisco.

Caput XIX.

Et hæc bestia raro in hominum conspectum uenit. Erasistratus autē dicit. Quum basiliscus momorderit, plaga subaurea fit. Et conferre ipsis dicit castoreij drach. 111. in potu. Eodem modo etiam papaueris succum. Nos autem nihil horum experti sumus.

De marina pastinaca, & muræna.

Cap. XX.

In marinis, uelut est pastinaca & muræna, dignotio conspicua est. Sunt enim noti pisces. Morsus ab ipsis opitulatur succi fici guttæ 1111. aut paulo plures, cū serpylli ramulis 111. aut 1111. potæ. Itē quæ ad uiperas descripta sunt.

De dracone marino.

Cap. XXI.

Marini draconis plagam plumbo confricato. Aut serpyllo trito integrit. Aut lente cocta, aut sulphure cum aceto. Aut ipso dracone discerit. Vrina uero humana irrigato. Absinthium uero aut saluam cum uino diluto

Cenchrinus

Aspidis 111.

species

Chelidonia

Ptyas

Cleopatra

interitus

Cerastes

Nicander

poeta

Basiliscus

Pastinaca

marina.

Muræna

(sunt.

Draconis

rinus

diluto bibendum dato. Aut cremorem uini dulcis in quo fici ramuli cōmauerunt. aut piscis cerebrum.

De scorpio marino.

Cap. XXII.

Scorpio marinus

**S**Corpij marini plagam sanat nullus dissectus & impositus. Sulphur uiuum cum aceto affricum. baccæ lauri tres tritæ ac potæ.

Preparatio sanguinis testudinis marine.

Cap. XXIII.

Testudinis marine sanguinis preparatio

**T**estudinis marine sanguis ad repositionem preparandus est hoc modo. Testudini super ligneum aut fictile uas reclinatæ supinæ caput cito amputato. Ipsum uero congelatum sanguinem, in multa frustra per harundinē diuidito, impositoq; uali operculi uice cribrato, ad solem exponito, & refectum reponito, ac utitor ad uiperæ morsum, uelut dictum est, drachmis II. cum aceti cyatho I. secūda die drach. IIII. cum aceti cyath. II. tertia drach. VIII. cum aceti cyath. III.

De morsu à crocodilo.

Cap. XXIII.

Crocodilus

**I**N morsu à crocodilo, nitrum tritum cum melle, donec repurgetur ulcus imposito. deinde melle, butyro, medulla ceruina, adipe anserino morsum impleto. Galenus se cognouisse dicit, eos qui à crocodilo morfi essent, ex acie auxilium sensisse, adipe ipsorum crocodilorum uulneribus imposito.

De morsu ab homine.

Cap. XXV.

Hominis morsus

**N**on extra propositū opus fuerit, inter uirus eiaculantia animalia, etiam hominis morsum scribere, si quidem multò maligniora alijs ulceribus apparēt ea quæ hominum morsus sunt, & maxime si ieiunus fuerit qui mordit, & legumina, & maxime lenticulam antea comederit. In communi igitur ea quæ de alijs uenenum eiaculantibus dicta sunt, etiam in his cōuenient, ab initio morui forinsecus adhibita, exceptis his quæ ualdè acra sunt, & urentia. propriè uero moru ex oleo prælito, sceniculi radicem cum melle imposito. Aut fabaceam farinam cum posca & oxyrhodino imposito, & frequenter permutato. Emplastro uero utere hoc. Squamæ aris, galbani, æruginis, singulorum unc. I. ceræ lib. I. plumbaginis lib. II. olei sextario I. plumbago cum oleo præcocta, ærugine & squamam aris assumit, & ubi spissara fuerint, liquecibilia liquefacta adiiciuntur. Sedata uero inflammatione, uelut commune ulcus, etiam hæc curato.

De uenenis.

Cap. XXVI.

Venena simplicia

**Q**uum de animantibus uenenū eiaculantibus compendiò docuerimus, consequenter ad tractationem de uenenis progrediemur, simplicia quidem exposituri, & horum notas, ac auxiliaria medicamenta, tum in cōmuni, tum singulis peculiaria producturi. composita uero tractanda si quis uolet sinemus. Nam uariorum medicamentorū occidendi uim habentium compositiones quidam exposuerunt, quæ lædere magis, quàm prodesse legentibus possunt. Neq; enim exacta signa horum in his qui ea sumperunt comperiuntur, quo etiam conueniens auxilium quis ipsis adaptare possit. Quum uero uaria hæc appareant ex prædominante in ipsis facultate, fortassis etiam id quod aduersus illa accepta exhibetur, uariū quis efficere poterit, ita ut quandoq; ex æquo, quandoq; ex prædominante facultate, iuxta coniecturæ usum id concinnet. Rursus igitur & hic à præseruantibus initium faciendum est.

De præseruatione à uenenis.

Cap. XXVII.

À uenenis præseruantia

**I**n doctrina de medicamentis uenenosis, ea species quæ præseruationē doliantur, ut etiam peritissimos fallant. Nam letaliū amaritudines medicamentorum, ammixtis dulcedinibus tollunt: graueolentias uero, aromati ammixtionibus. Aliquando uero in morbis, dum in utilitatem exhibere potant talia, uelut est absinthium, abrotonum, opopanax, castorium, ipsi uenena ammiscunt. Quin & in cibis, uelut sunt duriora, aut uaria obsonia, illa ammixta uenena offerunt. Quare si quis suspicionem habet, is condita edulcia

uicet,



Auitet, & omnem intentam qualitatem, dulcem uidelicet, salſam, & acidam. Maxime uero aqua quod ſatis eſt præſumere oportet. Expleta enim appetentia, de cætero facile deprehenduntur qualitates. Sed alia quedam adhuc eſt præſeruationis ratio ualidior. Nam eos qui tale quid ſuſpectum habent, præſumere oportet ea quæ medicamenta hebetare ac deſtruere poſſunt, uelut ſunt caricæ, cum nucibus regijs, & ruta, ac ſalis grano: & mala medica, cedromela appellata. Bibant etiam napi ſemen drachmæ pondere cum uiſco: aut calaminthæ folia, aut lemniam terram ſigillatam, aut rutæ folia ꝛꝛ: & à nullo medicamento lædentur. Sed & antidoti quotidie præſumptæ cū uino, ſabæ Aegyptiacæ magnitudine, ualde ſecurè præſeruant. Tales ſunt, Antidotus ex ſcincō, & quæ ex ſanguinibus conſtat, & Mithridatica. Hac quondam etiam ipſe rex Mithridates uſus eſt, præſeruandi à letali medicamento gratia, quotidie ipſam ſumens. Quum igitur à Romanis captus eſſet, his poteſt letali medicamento, ubi inde uitam finire non poſſet, gladio ſe ipſum peremit. Quando quidem uero etiam citra inſidias, ex caſu quando, que in deſertis locis, homines in noxias res incidunt, uelut ſi ita contingat, ut ſub arbore aliqua, pinu puta aut picea, cibum capiant, attendant ad ea leſtalia animalia, quæ ex his arboribus, aut etiam ex laquearibus decidunt. Vaſa item uini, & aquæ, & in quibus obſonia coquunt, operculis tegant, quemadmodum etiam in animantium uenenum efaculantium præſeruatione dictum eſt.

*Curatio communis eorum qui quodecunque uenenum ſumpſerunt.*

*Cepit XXVIII.*

SI qui ultro letale medicamentum ſumpſerint, quo ſeipſos uita priuent, qualia multa in uita contingunt: aut etiam per inſidias aliquorum illud datum fuerit, ſi quidem manifeſtum nobis eſt id quod aſſumptum eſt, ſtatim ad auxilium conueniens deueniemus, uelut in tractatione horum dicitur. Si uero datum medicamentum nobis incognitum fuerit, ſtatim ad ea quæ in comuni omnibus qui medicamentum biſerunt, competunt, progrediemur. Nam expectare conſequentia ſigna, omnino incurabile malum facit, quum ob auxilij tarditatem agere opem ſentiant. Statim igitur nulla diſtatione facta, oleum calidum per ſe, aut cum aqua aſſumant, & ad uomitum cogantur. Si uero oleum non adſit, butyrum cum aqua calida exhibeatur, aut malua, uel ſeminis lini, uel tragi, uel ſceni græci, uel ſeminis urticæ decoctum. Non enim per uomitus ſolum hæc euacuabunt, ſed etiam aluum ſubducent, & medicamentorum malignitati ſe opponent, ut quæ acrimoniaſ ipſorum obſtundant, & præſertim oleum. Hoc autem euidenter inde cognosces. Si enim cutem ulcerare uolueris per cantharidem, aut calcem uiſcam, aut euſmo di ære quiddam, & oleo corpus prius illeueris, hoc non exulcerabitur. Imò nec adſtringere corpus potueris oleo præſillitum. Et alioqui uomitus non ob id ſolum quod noxiū euacuat, utilis eſt, ſed quod etiam acceptum medicamentum offendit, ex odore, aut grumis, aut eolore. Ex odore quidem & amaritudine, papaueris ſuccum: ex colore uero, ceruſſam, aut gypſum: Ex grumis, lac, aut recens maſtati tauri animalis ſanguinem: ex uiſcoſitate, & qualitate ac odore, leporem marinum, & ranam rubetam, ut per hæc ad remedia uniſcuſque congrua iter pareat. Ammiſcendum porro eſt oleo, malua decoctum, aut anſeris adeps, aut pinguium carniū, aut galbanum iuſcuſum, aut lixiuium è cinere lignorum. facit etiam nitrum tritum cum aqua muſſa, & uinum uetus multum, & potiones ex adipe, aut butyro. Cæterum his quæ in uentre heſerunt per uomitus eduſtis, etiam id quod ad inſteſtina delapſum eſt, acriori inſuſo euacuabimus. Poſtea uero lac bibendum denur. Moleſtia enim & uis medicata ab hoc facile alterabitur. Dantur etiam medicamenta in comuni omnibus competentia, ex quorum numero eſt rubrica lemnia, abrotonum, agaricum, irio, eryngij radix, paſtina, cæ ſemen uel calaminthæ, nardus celtica, caſtorium, ſerula uitidis medulla, nerij

*Mithridates  
contra uenenū  
numitū*

*Oleū uenenū  
aduerſatur*

Ia, nerij quod & rhododendron & rododaphne appellatur, flores, mar rubij succus, silphium aut succus eius, sagapenon, opopanax, peucedani succus & radix, atistolochia longa, ruta sylvestris semen, cestri quæ betonica appellatur, folia: singulorum drachmæ pondus cum uino. facit & polij decoctum, & pix liquida delincta. Præclare auxiliantur etiam antidoti prædictæ, & magis theriaca ex uiperis. Nō autem eandem uim habent, si ante & post letalia medicamenta sumantur. Nam quæ magnitudo præsumpta satis est ad hoc ut nihil perpetiatur, ea in quadruplum aut quintuplum aucta: si post accepta letalia pharmaca detur, prodest: & nō semel in die, sed bis. Ita enim etiam admirando illi Galeno uidetur.

Enumeratio simplicium uenenorum.

Cap. XXIX.

Venenorum simplicium numerus

**E**X uenenis animalia mortifera sunt hæc, cantharis, buprestis, salamandra, cruce pinus, lepus marinus, rana rubeta, & rana palustris muta, hirudines deglutitæ. Semina uero, hyoscyamus, coriandrum, psyllium, cicuta, melanthium. Succia autem, papaueris succus, opocarpasos, thapsia, elaterium, mandragoras. Radices, chamaeleon, aconitum, thapsia, ixias, uetrum, agaricū nigrum, ephemeron, quod aliqui colchicum uocant, eo quod in colchide nascitur. Ramosa & olera, smilax, quam aliqui Thymion, Romanij Taxum uocant, solanum furiosum, quod & dorycnion uocant, Sardonias herba, quæ ranunculi species est, papauer cornutum, pharicum, toxicum, ruta sylvestris, fungi. Ab animalibus sumpta, sanguis tauri recens, lac coagulatum, mel quod in Heraclea generatur. Metallica, gypsum, cetussa, calx, auripigmentum, sandaracha, spuma argenti, adarce, plumbum, & argentum uiuum hydrargyros appellatum. Ex familiaribus autem, uinum multum acerrimum a balneo potum, aut passum. similiter etiam frigida aqua.

De cantharide.

Cap. XXX.

Cantharides

**H**is qui cantharidem hauserunt signa grauissima adsunt. Nam ab ore ferre uisq; ad uescicam, omnia ipsis morderi uidetur. In gustu uero pici aut cedriæ simile quid percipiunt. dextrumq; præcordium inflammatum habent, & urinam ægre reddunt. Sæpe uero etiam sanguinem per urinam emittunt. progrediuntur autem ipsis per aluum, qualia in dysentericis solent. Et in animi deliquia, anxietatesq; ac uertigines incidunt. Tandem uero mentem ouentur. Auxiliatur autem ipsis uomitus ex oleo & aqua, & potus lactis, & cimoliz drach. iiii. cum aqua mulla, nuclei pinei, cucumeris semen, iusculum bubulum pingue, aut anserinum, aut ouillum. carnes gallinaceæ, aut agnina, aut ouilla, aut porcellorum, flaccidæ ac pingues coctæ cum lini semine. uinum dulce multum, corticis thuris drach. iiii. post uomitiones autem infundere oportet per clysterem, succum oryzae, aut alicæ, aut tragi, aut psisanæ, aut maluz, aut seminis lini, aut althææ, aut fœni græci. Quandoq; uero etiam aqua mulla cum nitro, intestinum detergere oportet, & illa rursus infundere. Postea autem inflammatas partes, cataplasmatibus ex lini semine & ordeo mitigare. Nam ab initio hæc lædunt. Deinde etiam balneis aquarum dulcium utendum est. In potu danda sunt etiam ungenta, itinum & rosaceum.

De buprestis.

Caput XXXI.

Buprestis

**Q**ui buprestim hauserunt, uiroso nitro simile quid in gustu percipiunt. consequitur stomachi ac uentriculi dolor uehemens. Tumor item uentris, uelut in hydropicis. circumtenditur ipsis totius corporis cutis. & urinae supprimuntur. Auxiliantur ipsis eadem quæ aduersus cantharides dantur. priuatim uero opem sentiunt, post euacuationes per uomitus, & infusa per clysteres, si ficus aridas sumant, & decoctum ipsarum bibant cum uino. Declinante uero acuminis periculo, melius habent ex palmularum Thebaicarum esu, aut earundem tritarum potu cum lacte, aut uino mulso. Itemq; ex pituitum omnis generis esu, & ex muliebris lactis potu.

De salamandra.

Caput XXXII.

Salamandra

**A** Salamandra accepta consequitur linguæ inflammatio, & mentis impedimentum.

*Apedimentum, & tremor cum torpore quodam ac exolutione. Quædam corporis partes liuescunt in orbem, ita ut sæpe ubi istus manserit pharmacum, putrescentes decidant. In hac accepta, omnia faciemus quæ aduersus cantharides. priuatim uero ipsis exhibemus resinam pinus aut piceæ, aut galbanum cum melle, aut nucleos pini cum decocto chamæpityos. Aut urticæ folia cum lilij cocta, cum oleo. Testudinis marinæ aut terrestris oua cocta. Ranarum fuscum, cum quibus cocta est eryngij radix.*

De eruca pinus.

Caput XXXIII.

**E**ruca pini hausta, statim dolor circa os & palatum consequitur, inflam-

Eruca pinus

De lepore marino.

Caput XXXIII.

**L**epore marino potu consequitur sapor similis piscibus uirosis, progressu uero temporis uentriculus doler, & urinæ supprimuntur. Si uero quandoque excretæ fuerint, purpurei coloris uidentur. Auersantur & odio habent omnes pisces. sudorem excludit graueolentem. comitatur etiam uomitus biliosus, aliquando sanguine mixtus. Dandum autem est ipsis lac asinini, aut passum assidue. Aut maluæ radicis & foliorum decoctum. Danda etiam cyclamini radix trita, cum uino. Et ueratri nigri, aut scammonia succi drach. i. cum aqua mulsâ. Erant feris recens mactati sanguis adhuc calidus. Sed & cancos fluuiales solum in cibo admittunt. Signum porro salutis est, piscem edere posse.

Lepus marinus

De rana rubeta, &amp; palustri.

Cap. XXXV.

**R**ana rubeta, aut etiam palustris rana accepta, tumorem corporis inducit, cum pallorë buxo intentio. Accedit spirandi difficultas, & oris grauelentia, & singultus. Quandoque etiam seminis emissio inuitis. facile tamē auxilium sentiunt, post uomitum, ex multo uini meraci potu. Item radicis harundinis drach. ii. aut cyperi totidem acceptis. Verum cogere ipsos oportet, ut contentē ambulent ac currant, propter eum torporem quem in se habent. Lauent autem quotidie.

Rana rubeta

De hirudinibus.

Cap. XXXVI.

**H**irudines cum aqua deuoratas, & deglutioni adherētes, cognosces quidem ex eo quoddam osculum uentriculi uelut exugitur & mordetur, quod sanè signum est hirudinem deuoratam esse. Quandoque uero etiam sanguinem floridum spuunt dum excreant, hirudinibus gutturi affixis. Eijcit autem ipsas mirra si sorbeatur, & succus cyrenæicus, aut folia sulphij, aut betæ, cum aceto. Aut nix cum posca pota. Gargassent autem nitrum cum aqua, aut atamentum sutorium cum aceto. Eas uero quæ gutturi affixæ sunt extrahes, si in solium calidum ad collum usque desidere iubeas, & aquam frigidam ore detinendam præbeas. Egre dientur enim frigidiorē aquam expectantes. Quidā cimices dederunt his qui hirudines deuorauerunt. Ego uero inquit Galenus, alijs semper in his utens, cimicibus non opus habui.

Hirudines

De chameleone.

Cap. XXXVII.

**Q**uichameleonem nigrum sumpserunt, his uehementem uentriculi morbum ac dolor adest, & cum euerione totius corporis tremor. Deinde etiam cômulsio incidit. Et uomitus pituitosus ac spumosi. Quibusdam etiam singultus cum uocis interceptione, & faciei distortio. His conuenit succus triticus pinguis, calidus potus: & uinum dulce aquosum calidum. & uomitus, & lactis potus, & molle per clysterem infusum. & ex cataplasma, tis fomenta. Ad eum uero qui strangulationem & liuorem inducit, absinthij potus factis, aut niri cum aceto mulsos, aut raphanorum. Conueniunt etiam præcordiorum fomenta.

Chameleo

De hyoscyamo.

Cap. XXXVIII.

Hyoscyamus

**H**Yoscyamus potus aut comestus, mentis percussione velut in ebrijs inducit, facile uero curatur, ut qui opem sentiat aqua mulla multa pota, & lacte, maxime asinino, sin minus, caprino, aut bubulo: & ficum aridarum decocto, faciunt etiam nuclei pinci, & cucumeris semen cum passio acceptum, & uinum falsum cum adipe suillo recenti ac passio, & urticae semen eodem modo. Aut nitrum cum aqua. Conueniunt etiam intyba, & sinapi, & nasturtium, & raphanus, & cepae, & allia, singula haec cum uino accepta. Verum cogere ipsos oportet ut quiescant, quo uelut hi qui uinum bibunt concoquant.

De coriandro.

Caput XXXIX.

Coriandrum

**C**oriandrum propter odorem latere non potest. Potum uero uocem exasperat, & insaniam inducit, uelut ex ebrietate. Loquuntur itaque qui id hauserunt turpia dicta, & per totum corpus ipsorum coriandri odor transpirat. Auxiliatur ipsis post educationem cum oleo, aut irino, uelut dictum est factam, uinum meracum mulium cum absinthio, & per se potum. Oua etiam in unum uasculum euacuata, trita, & cum muria absorpta. Sed & muria per se pota, & iusculum falsum ex gallina & anser. Et uinum dulce cum lixiuo acceptum.

De psyllio.

Caput XL.

Psyllium

**P**syllium potum frigiditatem totius corporis inducit, & torporem cum exolutioe ac moerore. Aduersant huic omnia quae etiam coriandro hausto.

De cicuta.

Cap. XLI.

Cicuta

**C**icuta pota uertigines & caligines oculorum inducit, ut eminus ne parum quidem uideant, lingulum insuper ac mentis emotione, & extremitatum partium frigiditatem. Tandem uero conuulsi suffocantur, spiritus qui in arteria est suppresso. Ab initio igitur uelut etiam in alijs, per uomitus, educationem ipsius facimus, postea infusi euacuatorij usu, id quod ad intestina delapsum est excernimus. Et tunc uelut ad maximum auxilium, uini meraci potum deuenimus, interuallis interpositis, in quibus dandum est lac bubulum, aut asininum. Aut absinthium cum pipere & uino, castorium item, & ruta, & menta cum uino. Et cardamomi aut styracis drach. i. aut pipetis, cum urticae semine, ex uino. Aut lauri folia tenera. Similiter & silphij, & succus ipsius, cum uino & passio. Vinum quoque dulce per se potum abunde competit.

De papaueris succo.

Cap. XLII.

Papaueris

succus

**A**d papaueris succi potum consequitur delatio in profundiores somnia cum perfrigeratione, ac pruritu intento, ita ut saepe praualente pharmaco, tantus accedat pruritus, ut ab ipso excitentur. Odor quoque medicamenti per totum corpus distribuitur. His auxiliatur post educationem uomitus per oleum, & post infusa per clysterem acria, acetum mulsum cum sale potum. Aut mel cum rosaceo calido. Et meracum uinum multum cum absinthio & cinamomo. Et acetum calidum per se. Et nitrum cum aqua. Et origanum cum lixiuo. Et ruta semen cum pipere & castorio ex aceto mulso. Aut satueis, aut origani decoctum cum uino. Oportet autem & hos odoramentis excutere, & in calidum solum immittere, & propter accedentem pruriginem formentis mitigare. Et post balneum pinguis iusculis uti cum uino, aut passio. Sed & medulla, cum oleo pota ipsis opitulatur.

De carpassi succo.

Cap. XLIII.

Carpasi

succus

**C**arpasi succus potus, soporem grauiorem inducit, & repentinam suffocationem. Qui hunc hauserunt, auxilium ex illis ferunt, quae ad cicutam sunt descripta.

De mandragora.

Caput XLIII.

Mandragoras

**S**ed & mandragora pota, statim grauis sopor consequitur, & exolutio, adeoque uehemens in somnum delatio, ut affectio nihil differat ab appellato lethargo. Conuenit his antea quam horum quid accidat, & uomitus, & post

post hanc aqua malsa. & nitrum, & absinthium cum passo aut uino dulci sumptum. Et capitis irrigatio, cum rosaceo & aceto. Excitatio item per corporis commotionem, & per odoramenta, uelut est piper, sinapi, castorium, ruta cum aceto trita, pix liquida, & lucernarum funiculi (incensi ac extincti). Quod si agrè excitari possint, etiam sternutatoria ipsis admoveantur. Sed & alij communibus auxilij, etiam in his utendum est.

De aconito.

Cap.

XLV.

Aconitum statim dum bibitur linguam cum quadam adstrictione educat, uertiginemque maxime in exurgendo efficit, & oculorum humiditatem inducit. Gravitatem item thoracis & præcordiorum, una cum hoc quod multi status redduntur. In his per uomitus medicamentum educere oportet, & aluum per clysterem subducere. Propinabimus autem origanum, & rutam, aut marrubium cum uino. Aut absinthium, aut erucam, aut abroto, aut chamæleam, aut chamæpityn. Conueniet ipsis etiam opobalsami drachmæ unius pondus cum uino. Et coagulum hædi, aut leporis, aut hini cum aceto. Et ferri recementum, aut ipsum ferrum, aut aurum, aut argentum, in uino extinctum, ita ut uinum hoc bibatur. Et lixiuſum cum uino. Et gallinæ coctæ, aut carniū pinguium iusculum sumptum cum uino. Appellatur autem chamæpitys, quæ priuatim in his competit, in Heraclea quidem pontica ubi etiam Aconitum nascitur, holocleron, Athenis autem Ionia, in Eubœa uero Sideritis.

De Ixia.

Caput

XLVI.

Ixia quæ & ulophonon appellatur, in bibendo ocymi & odorem, & saporem aliquem refert: inducit autem linguæ inflammationem uehementem, & mentis percussionem, & omnes excretiones suppressit, murmura si mulque strepitus inducens, cum animi deliquo, citra hoc ut aliquid progrediantur. Auxiliatur autem ipsis post largiorem per uomitus educationem, & alui solutionem, absinthij cremor potus cum uino multo, aut aceto, aut aceto mulo. Et rutæ syluestris semen, & silphij radix. Similiterque Tragorigani decoctum cum aliquo ex prædictis, aut cum lacte. Aut resinæ terebinthinæ, aut nardi, aut castorei, aut silphij, singulorum obolus cum uino. Conueniunt etiam nucis regie fructus triti cum uino. Aut resina, & castorei, & rutæ, singulorum drach. i. Similiter chamæleæ drach. ii. Aut succi thapsiæ drach. i. cum aqua malsa. Et acetum calidum per se potum.

De ephemeris.

Cap.

XLVII.

Quæ ephemerum acceperunt, quod aliqui Colchicum, eo quod in Colchide nascitur, appellant, aliqui bulbum syluestrem, hos pruritus per totum corpus concomitatur, uelut ab urtica aut scilla excitatus. Et circa internas partes morum percipiunt, stomachoque uruntur cum multa grauitate, inualeſcente uero affectione, per aluum fertur cruentum quiddam ramentis ammixtis. His auxilium ferendum est uelut his qui salamandram hauserunt, & per uomitus, & per infusa per clysterem. At uero antea quam inualeſcat uenum, dandum est ipsis quercus foliorum, aut glandium, aut malicorij, aut serpylli decoctum, cum lacte bibendum. Aut polygoni succus, aut uirgultorum uitæ, aut rubi, aut ferulæ teneræ medulla, aut baccharum myrti succus cum uino. Sed & ipsæ myrti bacca uilæ, tritæ, & in aqua macerata opitulatur, cremore ex ipsis accepto. Similiter facit & castanearum, quæ glandes Sardianæ appellantur, media illa pellicula, cum prædictis succis accepta. Et origanum cum lixiuſo potum. Exactum uero ad eod auxilium sentiunt, ex lactis bubuli potu, aut eodem in ore detento, ut hi quibus eius copia est, alio nullo auxilio opus habeant.

De ſmilla.

Caput

XLVIII.

Smilla, quæ à quibusdam thymion, à Romanis autem taxus appellatur, pota frigiditytate totius corporis inducit, suffocationemque ac celerem mortem. Auxiliantur autem his omnia quæ ad cicutam haustam relata sunt.

De

Aconitum

Metalla uino  
extinctaChamæpitys  
species quedam  
Holocleron

Ionia

Sideritis

Ixia

Ulophonon

Ephemerum  
Colchicum  
Bulbus syl  
uestrisSardianæ  
glandesSmilla  
Thymion  
Taxus

De Solano furiōso, à quibusdam dorycnio appellato. Cap. XLIX.

Solano furiōso  
Dorycnium

**D**Orycnio siue solano, ut quidam appellauerunt, furioso poto, in gustu uelut lactis qualitas quaedā percipitur. Singultus adest astiduus, & linguæ humiditas, & sanguis aceruatim rejicitur, mucosæq; ipsi per aluuta feruntur, uelut in dysentericis solet. Verum antea quàm horum aliquid consequatur, opem ferre oportet per ea quæ ad ephemetum acceptum redacta sunt, per uomitum dico, & infusum per clysterem, & quæ potum medicamentum educere possunt. propriè uero ipsis auxiliatur aqua mulsa, aut lac asininum, uel caprinum. Et uinum dulce tepidum cum modico aniso potum. & amygdalæ amaræ. & pectuscula gallinarum cocta, & omne conchyliorum genus crudum & assatum in cibo acceptum. Et locustæ, & gammarî, & iuscula ex ipsis pota.

De Sardonis herba.

Cap. L.

Sardonis  
herba  
Risus Sardonius

**S**ardonis appellata herba, ramunculi species est, quæ pota aut comesta, mentis emotionem inducit, & conuulsiones cum labiorum contractio, ne, ut risus imaginem præ se ferat qui ipsam hausit. A qua affectione etiam Sardonius risus, non admodum boni nominis adagio, uulgo circumfertur. In his priuatim post uomitum conuenit aqua mulsa multa data, & lac, irrigatioq; ac pinguefactio totius corporis per calefactoria medicamenta. & solium ex aqua & oleo calido, ita ut post egressum ex folio abunde illinatur ac confricentur. In summa uelut ad conuulsionem, totam curationem facere oportet.

De papauer cornuto.

Caput LI.

Papauer cornutum

**P**apauer cornutum quod potum aut comestum, eadem symptomata quæ succus papaueris inducit, iisdem auxilijs subiacet.

De pharico.

Cap. LII.

Pharicum

**P**haricum sapore in totum nardo simile est. potum uero resolutionē inducit, cum mentis percussione ac contrusione. Oportet autē post educationem ipsius, cum uino absinthite bibendum ipsis exhibere cinamomū, aut myrrham, aut nardum celticam, quam aliqui Saliuncam uocauerunt. Aut spice nardi drach. II. & myrrhæ obolos II. ammixto passo. Aut iridem, & croci florem, cum uino. Cataplasmata uero capiti praraso adhibenda sunt ex farina ordeacea, cum ruta trita, & aceto.

De toxico.

Caput LIII.

Toxicum

**T**oxicum ex eo nominatum esse uidetur, quod Barbari sagittas infusa re dicta, cum ipso illinerent. Consequitur eo poto, labiorum ac linguæ inflammatio, & infania quæ detineri non potest, cum uarijs imaginationibus irruens, ut etiam ob id difficulter curentur, & raro seruentur aliqui qui id biberunt. Oportet tamen uinculis continenter deligatos cogere, & per uim dulce uinum cum rosaceo ipsis bibendum exhibere, & ad reuocandū impellere. Priuatim uero rapî semē cum uino potū ipsis concludit, & quinque folij radix, sanguisq; hircinus aut caprinus, & quercus, aut phagi, aut ilicis cortex, cum lacte tritus. Et mala cydonia comesta, aut cum pulegio trita ex aqua pota. Amomum item, & balsami semen cum uino. Quod si periculū ex eo aliqui effugerint, longo tamen tempore & in lectis decumbunt, & ubi surrexerint, uelut mente consternati reliquū uitæ tempus transigunt.

De fungis.

Cap. LIIII.

Fungi

**F**ungi partim genere, partim copia ledunt. Inducunt autem omnino accepi suffocationes, strangulationibus per laqueos similes. His statim commune auxilium exhibere oportet, per oleum ad uomitum cogendo. Mirifice uero opem sentiuit, lixiuium ex cinere farmentorum uitis, aut lignorum pirastri, cum posca, & sale, aut nitro bibentes. Sed & ipsa pira syluetria, aut pirastri folia, si cum fungis coquatur, suffocandi uim ab ipsis auferunt. Ipsa quoq; pira edisse prodest. Commodat ipsis & gallinarum sterus in posca potum. Aristolochiæ drach. I. aut absinthij, cum uino. Mel item si delingatur &

Aur & bibatur cum aqua. Et apiastrum cum nitro. Aut panacis radix & scemen cum uino. Et fex uini usta cum aqua. Et atramentum futorium cum aceto. Raphanus etiam, aut sinapi, aut nasturtium in cibo. Quandoquidem uero quidam fungi à uenenatis bestijs arrosi, non solum suffocant, sed etiam ulcerant intestina, dandum est absinthium largum, & ficuū & origani decoctum, & aqua mulsa. Conducet etiam uomitus, & solium calidum, & cruda ordeacea farina præcordijs imposita.

De sanguine taurino.

Cap. LV.

Sanguis tauri recens mactati potus, spirandi difficultatē inducit, & suffocationem, & meatus circa tonsillas & deglutitionem obturans, cum uementi conuulsione. Inueniturq; in ipsis lingua rubescunda, & dentes colore infecti, & grumi inter ipsos. In his uomitum recusamus, eo quod grumi magis in stomacho compinguntur, dum per attractionem eleuantur. Verum danda sunt ipsis quæ congelationē sanguinis dissoluere possunt, & alium subducere. Dandi sunt grossi ficus succo pleni, cum posca & nitro. Facit etiam coagulum omne cum aceto. Et silphij radix cum succo similiter, & brassicæ semen, & lixiuium ficulneum, & conyzæ folia cum pipere, & rubi succus cum aceto, oportet autem alium subducere. Cæterum his qui seruantur, fluida ac grauolentia per sedem reddi solent. Sed & stomachus & uenterculus ipsorum, farina ordeacea cum aqua mulsa cataplasma- nismo modo integendus est.

De lacte coagulato.

Caput LVI.

Quilac coagulatum sumpserunt, his acuatim ingens suffocatio intinet, eo quod in grumos cogatur. His in auxilium exhibere oportet, uelut antidotum ipsum coagulum cum aceto, ita ut saepe hoc bibere cogantur. Calaminthæ etiam folia arida, aut succum similiter. Aut silphij radices, aut succum cum posca. & thymum cum uino. & lixiuium pileatorum, saluero nihil ingerant. Inde enim lac magis congelatur, & in caseum abit. Sed neq; his uomere expedit. In stomacho enim inhaerens in grumos coagulatum strangulat.

De melle in Heraclæa.

Cap. LVII.

Quimel in Heraclæa ponti nascentis ederunt aut biberunt, his eadem accidunt quæ ab aconito sumpto ingruunt. Conueniunt ipsis etiam ea quæ de illo relata sunt. Facile autem opem sentiūt, ex uini mulsi assiduo potu, tuta folijs ipsi ammixtis.

De gypso.

Caput LVIII.

Gypsius pota suffocationem inducit lapidescens. unde auxilia ad fungos congrua transferre huc oportet, & in his malux decoctū dare pro oleo. Quum enim id pingue sit, in reuomendo lubricitatem inducēs, corpōra deradi non sinit. Gypsum enim lapidescens hoc facit. Conuenit etiam oleum in aqua mulsa, & ficuum decoctū, & lixiuium ficulneum, aut ex sarmentis uitis, cum uino multo. Et origanus, aut thymus cum lixiuiō aut aceto, aut passo. Oportet autem & his malux decoctum per clysterem infundere.

De cerissa.

Caput LIX.

Cerissa propter colorem latere non potest. Vitro uero accepta palatum inatbat, & linguam, & intermediam dentium partem. Inducit autē singulus & tussim, & linguæ siccitatem, & extremarum partium frigiditatē, cum mentis percussione, ac motus difficultate. His conuenit dare aquam mulsam, aut ficuum aut malux decoctum, aut lac calidum, aut sesamum tritum cum uino, aut lixiuium ē sarmentis uitis, aut oleum amaracinum, aut irinum. Persicorum etiam ossa cum ordeī decoctio. Aut thus, aut prunotum gummi, aut ulmi liquorem illum qui in folliculis continetur, cum aqua repida. Vomant autem ab unoquoque. Conuenit ipsis & thapliæ succus, aut scammonie succi oboli III: cum aqua mulsa poti:

De

De calce, sandaracha, &amp; asripigmento.

Cap. LX.

*Calx*  
*Sandaracha*  
*Asripigmenta*  
*tem*  
*Arfenicum*

**C**Alx & sandaracha & arsenicum siue auripigmentum pota,alui & in te-  
stinorum dolores inducunt, cum morfu uehementi. Quare exhibere ei-  
psis oportet omnia quæ temperare & soluere possunt, & uomendi facili-  
tem, & ad aluum lubricitatem exhibere: qualis est hibisci & malug succus,  
& seminis lini decoctum, aut tragi, aut oryza. Lac item multum, & aqua  
mulsæ, & iuscula pinguis & boni succi.

De spuma argenti.

Cap. LXI.

*Argenti*  
*spuma*

**S**puma argenti pota, stomachi & uentris, & intestinorum grauitatem in-  
ducit, cum torminibus intentis. Quandoq; etiam intestina fauciat graui-  
tate, & urinas supprimit. Intumescit autem ipsorum corpus, & plumbi co-  
lorem induit, indecorumq; efficitur. In his conuenit post uomitum, hormi-  
ni syluestris semen cum uino potum. myrrhæ oboli III. Absinthium, hyssop-  
us, aut apij semen. Aut piper, aut ligustri flos cum uino. Columbarij item  
syluestrium simus aridus, cum nardo & uino.

De plumbo.

Cap. LXII.

*Plumbi res*  
*menta*

**E**T qui plumbi ramenta, aut loturâ hauserunt, similia symptomata habet,  
& similia auxilia requirunt, cum his qui spumam argenti biberunt.

De argento uiuo.

Cap. LXIII.

*Argentum*  
*uiuum*  
*Hydrargyros.*

**E**T argentum uiuum hydrargyros appellatum, eadem quæ spuma argen-  
ti inducit. Et in his, auxilijs iisdem uti oportet. Videtur autem ipsis pro-  
desse multi lactis potus. uerum & hi uomant.

De ueratro albo, thapsia, elaterio, agerico nigro, ruta syluestri, melanthio, recentibus

Casti spinæ pappi.

Caput LXIII.

*Thapsia.*  
*Veratru albu.*  
*Elaterium.*  
*Agericum*  
*nigrum*  
*Ruta sylue*  
*stria.*  
*Melanthium*  
*Pappi quid*  
*sint*  
*Castos spina.*

**P**rouidentia utendum & in his quæ ob utilitatem exhibentur, pericula  
uero non minora sæpe inducunt quàm alia medicamenta, qualia sunt  
proposita, dico autem, ueratrum album, thapsia, elaterium, agericum nigrum.  
Hæc enim suffocationem aut nimiam purgationem inducunt. In quibus  
suffocationes quidem, uelut de fungis & similibus dictum est, curabimus:  
nimias autem purgationes, his quæ excretiones cohibere possunt, suppri-  
memus. Quin & ea quæ parum quidem lædere uidentur, aliquando autem  
pericula inducunt, non negligenda sunt. Ex quorum numero est & sylue-  
stria ruta, & melanthium, & recentes pappi. Sunt aut flores spinæ, quæ ca-  
stos appellant. In his solus uomitus adhibitus restituit eos qui illa acceperunt.

De his quæ nobis familiaria sunt. uelut est uinum, &amp; frigida aqua.

Caput

LXV.

*Venenæ esse et*  
*tiam nobis fa*  
*miliaria*

**E**T frigida aqua aceruata pota, & meracum multum, & dulce uinum, ma-  
xime a balneo, aut cursu, & ualidis exercitationibus, suffocationes & do-  
lores inducunt. In his autem uenæ sectio, & infusi per clysterem euacuatio  
assumpta, imminens periculum exoluunt.

## CAPITA SEXTI LIBRI.

In hoc sexto totius Operis libro, de his quæ per chirurgiam admini-  
strantur. tractatur, tum his quæ in carne, tum quæ in ossibus considerantur,  
quæ sanè in tractatu de fracturis & luxationibus absoluuntur.

Proemium de his quæ per chirurgiâ	De arteriarum sectione	Cap. III
administrantur	De uasorum exsectione ac uisione.	Cap. I
De capitis uisione, in lippientibus,		Cap. V
agré respirantibus, & elephantæ.	De hypopthiismo	Cap. VI
Cap. II	De periscyphismo	Cap. VII
De hydrocephalis	De palpebræ superne sutura, & alijs	modis
Cap. III		



- modis, in his quibus pili in palpebris successerunt. Cap. V. III.
- De palpebrarum uestione per medicamentum. Cap. IX.
- De lagophthalmis. Cap. X.
- De palpebre infernae futura & uestione per medicamentum. Cap. XI.
- De palpebrae internae eversione. Caput XII.
- De straqueatione, & uestione per ferulum. Cap. XIII.
- De deficiis siue aquulis palpebrarum. Cap. XIII.
- De coherentibus palpebris. Cap. XV.
- De grandinibus. Cap. XVI.
- De verrucis, & carnis in magno oculi angulo incrementum. Cap. XVII.
- De pterygibus. Cap. XVIII.
- De graphyomatibus. Cap. XIX.
- De suppuratis oculis. Cap. XX.
- De suffusionibus. Cap. XXI.
- De Aegilope. Cap. XXII.
- De auditorijs meatibus non perforatis. Cap. XXIII.
- De his quae illabuntur in auditorij meatum. Cap. XXIII.
- De polypis. Cap. XXV.
- De curtis. Cap. XXVI.
- De epulide et parulide. Cap. XXVII.
- De dentis extractione. Cap. XXVIII.
- De incurvatione linguae. Cap. XXIX.
- De tonsillis. Cap. XXX.
- De una. Cap. XXXI.
- De spinis faucibus infixis. Caput XXXII.
- De summi gutturis sectione. Caput XXXIII.
- De abscessibus. Cap. XXXIII.
- De strumis. Cap. XXXV.
- De sciatomatibus atheromatibus, et meliceridibus. Cap. XXXVI.
- De arteriae dilatatione. Caput XXXVII.
- De gutturis ramice. Cap. XXXVIII.
- De ganglio. Cap. XXXIX.
- De uena sectione. Cap. XL.
- De cucurbitulis. Cap. XLI.
- De alae uestione. Cap. XLII.
- De agnascenibus digitis, & de sedigitis. Cap. XLIII.
- De chirurgia, et uestione suppuratorum. Cap. XLIII.
- De cancro. Cap. XLV.
- De turgentibus mammis in uiris. Caput XLVI.
- De hepatis uestione. Cap. XLVII.
- De splenis uestione. Cap. XLVIII.
- De stomachi uestione. Cap. XLIX.
- De hydropse. Cap. L.
- De umbilici prolapsu. Cap. LI.
- De abdominis siue peritonaei membranae uulnere, & de intestini aut omenti prolapsu. In quo etiam modus suendi uentrem. Ex Galeno. Caput LII.
- De praeputio curto. Cap. LIII.
- De hypospadias. Cap. LIII.
- De phimo siue praeputio circa glandem constricto. Cap. LV.
- De coherente glandis praeputio. Caput LVI.
- De circumcisis. Cap. LVII.
- De thymis in pudendis. Cap. LVIII.
- De catheteris, & infusi in misione, in uelica. Cap. LIX.
- De calculis. Cap. LX.
- De corporibus circa testes. Cap. LXI.
- De hernia aquosa. Cap. LXII.
- De carnosae et tosaee herniae. Caput LXIII.
- De uaricosa et flauosa hernia. Caput LXIII.
- De intestini hernia. Cap. LXV.
- De inguinis hernia. Cap. LXVI.
- De scroti laxatione. Cap. LXVII.
- De castratione. Cap. LXVIII.
- De Hermaphroditis. Cap. LXIX.
- De nymphae ac caudae praesectione. Caput LXX.
- De thymis, condylomatibus, & haemorrhoidibus in locis muliebribus. Cap. LXXI.
- De non perforatis & de phimo. Caput LXXII.
- De abscessibus uteri. Cap. LXXIII.
- De foetus extractione ac exsectione. Caput LXXIII.
- De secunda relicta. Cap. LXXV.
- De coxæ dicui uestione. Cap. LXXVI.
- De fistulis & fauis. Cap. LXXVII.
- De fistulis in ano. Cap. LXXVIII.
- De haemorrhoidibus ani. Caput LXXIX.
- De condylomatibus, extuberantibus, & rimis in ano. Cap. LXXX.
- De ano non perforato. Cap. LXXXI.
- De uoricii sectione. Cap. LXXXII.
- De dracunculis. Cap. LXXXIII.
- De extremarum partium praesectione. Cap. LXXXIII.

De pterygijs circa ungues.	Cap. LXXXV.	De patella genu.	Cap. CIII.
pur	LXXXV.	De tibia.	Cap. CIII.
De ungue cōtuso.	Cap. LXXXVI.	De summo pede.	Cap. CV.
De clavis, uerrucis, & his quæ formi		De depositione cruris.	Cap. CVI.
cariae uerrucæ appellantur.	Cap. LXXXVII.	De fracturis cum uulnere.	Cap. CVII.
put	LXXXVII.	De callo in fracturis superinacrescen	Cap. CVIII.
De telorum extractione.	Cap. LXXXVIII.	te	Cap. CVIII.
put	LXXXVIII.	De callo in distortionem.	Cap. CX.
De fracturis, et ipsarum differentijs.	Cap. LXXXIX.	De fracturis non callosis.	Cap. CX.
Caput	LXXXIX.	De luxationibus.	Cap. CXI.
De fracturis in capite.	Cap. XC.	De infirma maxilla.	Cap. CXII.
De naso fracto, & cōtuso.	Cap. XCI.	De clavicula, et summo humero.	Cap. CXIII.
De infirma maxilla fracta, et de aure		put	CXIII.
contusa.	Cap. XCII.	De humero luxato.	Cap. CXIII.
De clavicula fracta.	Cap. XCIII.	De cubiti gibbo.	Cap. CXV.
De scapula.	Cap. XCIII.	De luxatione iuncturæ ad manum,	Cap. CXVI.
De pectore.	Cap. XCV.	& digitorum.	Cap. CXVI.
De costis.	Cap. XCVI.	De uerticulis spinæ.	Cap. CXVII.
De coxis, et pubis ossibus.	Cap. XCVII.	De coxæ luxatione.	Cap. CXVIII.
put	XCVII.	De genu luxatione.	Cap. CXIX.
De uerticulis, et spina dorsii, et de os		De malleoli luxatione, ubi etiam de	Cap. CXX.
se sacro.	Cap. XCVIII.	digitis pedum.	Cap. CXX.
De brachio.	Cap. CXIX.	De luxationibus cum exulceratio,	Cap. CXXI.
De cubito & radio.	Cap. C.	ne	Cap. CXXI.
De summa manu, eiusq; digitis.	Cap. CI.	De luxatione unâ cum fractura scap	Cap. CXXII.
put	CI.	te	
De femore.	Cap. CII.		

## PAVLI AEGINETAE REI MEDI-

CAE LIBER VI. IANO CORNARIO

*Medico Physico interprete.**Proœmium de his quæ per Chirurgiam administrantur.*

Caput I.



VVM totam tractationem de his quæ per Chirurgiam administrantur, bifariam diuisimus, tum in ea quæ in carne aggredimur, tum in ea quæ in ossibus, quorum consideratio & in fracturis, & in luxationibus consistit. Nunc ab his quæ in carne administrantur ordimur, consueto nobis compendio etiam hic usi. Rursus igitur ex superioribus partibus initium facientes, uisionem quæ in capite, et eam maxime quæ in uertice sit exponemus.

*De capitis uisione in lippientibus, ægrè respirantibus, et in Elephantæ*

Caput II.

IN oculis humore ex supernis influente, & in difficulter spirantibus, obflu perflua humiditatis redundantiam, quæ ex capite deorsum ad thoracem demittitur, & partes quæ isthic sunt, sua assiduitate affligit, uisionem circa medium capitis faciunt, hoc modo. Præterea circa uerticem partibus, caute res oliuæ nucleos referentes immittunt, ad os usq; cutem adurentes, & post crustam elapsam os deradentes. Quidam uero etiam ipso osse usito, squamâ paruat excidere faciunt, quo illinc humorum in capite perspiratio ac euacuatio facilis contingat, seruantq; aliquandiu ulcus, deinde licet ipsum ad caricem perducunt. At uero in his qui ad Elephantiasim inclinationem habent,

Uisio circa medium caput.

bent, quidam quinque crustas in capite inurunt. Vnam ab anterioribus, par-  
tibus paululum supra sinu caput. Alteram hac inferiorem, paululum supra fron-  
tem, ad finem pilorum. Et aliam ad occipitium. Et reliquas duas, iuxta squa-  
miformia dicta agglutinamēta, paululum supra aures, ita ut altera à dextra  
parte, altera à sinistra fiat. Atque hoc modo per plurimum squamarum derra-  
tionem, & multitudinem, & crassitudinem humorum exhalare faciunt, &  
ex capitis profunditate uelut per canales educunt, & per hoc ne oculi leqda-  
tur prohibent. Sed & alium cauterem spleni adhibent, quo primariæ atrabís-  
liarij humoris parti, per crustam in cutem factam, curatio contingat.

De Hydrocephalo.

Cap. III.

**H**ydrocephalus affectus nomen habet ab humoris, qui essentia aquosus  
est, proprietate. Contingit hic pueris circa ipsum partum, capite ab ob-  
stetricibus inepte compresso, aut ex causa obscura, aut ex ruptura uasis siue  
uasorum, effuso sanguine in lentam substantiam commutato: aut per rare-  
factionem, materia persudante, et inter cutem, ac membranam caluariam  
ambientem delata. Nam aut inter caluariæ membranam, et cutem, humor  
consistit. Aut inter caluariæ membranam, et os: aut inter os, & cerebri mem-  
branam. Quibus igitur inter cutem, & caluariæ membranam est humor, his  
adeest tumor ad tactum mollis, concolor, doloris exors, in altum incuruatus,  
per exiguum corpusculum ad digitorum innixum occurrens, facile cedens  
ac contra renitēs. Quibus uero inter caluariæ membranam, et os consistit,  
reliqua quidem similiter habet, tumor autem solum durior est, & tarde ce-  
dens, ut qui etiam per plura corpuscula occurrat. Magis etiam dolent. Qui-  
bus autem inter cerebri membranam et os, his tumor quidem erit, sed non  
cedens, necque similiter ad tactum mollis, & tamen uiolenta compressione im-  
pulsus cedit. Nam os infantium quum adhuc recens compactum sit, facile  
cedit, et maxime futuris rarefactis si humoris transitus foras contingat. Hoc  
uero facile cognoscitur, ex eo quod humor in compressione retrò redactus,  
in profundum decurrit. Dolor etiam his maior est, & caput totum dispa-  
tur, et frons ipsis extrà proiecta est, & intentis oculis uident, & frequentius  
lachrymantur. In his igitur chirurgiam reprobamus, etiam si aliqui chirurgi  
trecello circumforatum os eduxerint, uelut in loco de fracturis in capite  
dicitur. At si inter cutem & caluariæ membranam humor consistit, & par-  
tus sit tumor, unam dissectionem per medium transversam faciemus. Si ue-  
ro inter caluariæ membranam et os, & maior fuerit tumor, duabus dissec-  
tionibus uti sumus per medium sese mutuo secantibus. Si uero adhuc aliquā-  
to maior tumor sit, etiam tribus literam .x. imitantibus. Cæterum post chi-  
rurgiam excreto humore, & linamentis inditis, commode deligabimus, &  
usque ad tertium diem uino & oleo rigabimus. Post quem diem solutione fa-  
cta, per linamenta mendendi ductu curabimus. Et si moram trahat os car-  
ne non obductum, leuiter ipsum rademus.

De arteriarum sectione.

Cap. IIII.

**I**n fluxionibus oculorum diuturnis, et in uertiginis affectione, arterias retro  
laures dissecare consueuimus. Præradenda igitur est posterior capitis pars  
& per digitos tentanda. Nam ex pulsū eius loci, arteriæ situs facillime depre-  
hendetur. Et postea ad os usque secare ipsam oportet, duorum digitorum lon-  
gitudinem sectione habente, et atramento scriptorio antea notata. Hac ue-  
ro non occurrente, trium digitorum spacium ab auribus metiri oportet, &  
tunc chirurgiam adhibere, & arterias per transversum dissecare, donec &  
fluxus sanguinis apparuerit pulsatorius & organum contigerit os ipsum.  
Cæterum post moderatū sanguinis fluxum, diuisa caluariæ mēbrana, ne ob-  
dilationem inflammetur, & osse derafo, cuneolum ex linteo iniciemus  
vulneribus, & linamentario ductu curabimus. Si uero etiā his nu-  
dum os permanferit, similiter huius ra-  
tura utemur.

Squamiformis agglutina-  
mentum.

Hydrocephalus affectus.

Rasura ossis.

Arteriarum se-  
ctione.

Rasura ossis.

Vasorum ex-  
sectione

**I**N limidatæ capitis partis affectione, & in his qui diuturna, aut etiam in a-  
cuta fluxione, calida & acris, oculos dolent, ut etiam calor circa tempora  
musculos cum tumore oboritur, uasorum exsectionem omnes approba-  
runt. Præfatis igitur circa tempora pilis per digitos tentabimus, tomen-  
to præmisso, aut etiam colli constrictione usi. Vbi uero uasa sub aspectum  
uenerint, ipsaq; atramento notauimus, utem ex lateribus, & nostræ sini-  
stræ manus, & ipsius ministri digitis leuabimus, & in ipsum uas superficia-  
riam sectionem faciemus. Deinde penitus insecum, hamulisq; distentum  
uas, et per instrumenta membranæ detrahendis apta denudatum, undi-  
quaque exolutum attollemus: et siquidem tenue fuerit, hamulo excoide ex-  
tentum & obtortum per totum penitus excidemus ita ut etiam pars ipsius  
apprehendatur. Si uero magnum sit, duplo filo, aut lino crudo, aut alio quo-  
piam ualido, per acum subiecto, & primum uase in directum perueni-  
eandæ instrumentum diuiso, & moderato sanguine euacuato, iuxta duas  
extremitates nudatum filo deligabimus, & intermediam pariem aut statim  
aut solutionis tempore excisam auferemus. Quidam uero etiam circa se-  
ctionem, per cautes oliuæ nucleos referentes uasa percurrunt, ad multam  
profunditatem. At uero post chirurgiam linamentis siccis conuulsis inditis,  
& splenio superimposito deligabimus. Post solutionem uero, puluillis incar-  
nantibus, & his quæ linamentis excepta induntur, & medicamentis ad cic-  
atricem perducantibus, curationem transigemus, nimirum ubi iam compu-  
truerint ac excederint fila ac uincula deligationis.

Veneræ affio

Hypospa-  
thismus

**I**Nstrumenti species huic chirurgiæ nomen fecit. Vtimur autem hypospa-  
thismo in his quib. multa pituita ad oculos deferitur. Sed et facies ipsius  
bitunda existit, et circa frontem discursum quendam uelut uermium aut  
formicarum percipiunt. Præfatis itaq; circa frontem pilis, infernam maxillam  
mouere subebimus et usitato musculorum temporaliū motu tres sectiones  
in fronte rectas conuales faciemus, ita ut unaquæq; duorum digitorum  
longitudinem habeat, et ad os usq; profunditatem, et inter se trium digito-  
rum spatio distent. Post sectionem, hypospathisterem instrumentum adhi-  
bentes, à sectione ad sinistram tempus, usq; ad mediam deueniemus, totum  
id quod interfacet una cum caluariæ membrana excortantes. Deinde rursus  
spathulam à media sectione usq; ad reliquam immitemus. Et postea cultelli  
acuti acie ad primam sectionem immissa, ita ut acutum ipsius latus internæ cu-  
tis carni adaptatum sit, obtusum uero ossi, usq; ad mediam sectionem ipsum  
impellemus, omnia quidem à capite ad oculos descendentiâ uasa, non ta-  
men ad summam usq; eutem dissecantes. Et rursus à media sectione, ad ulti-  
mam ipsum adigentes similiter uasa dissecabimus. Cæterum post modera-  
tam sanguinis euacuationem expressis grumulis, linamenta intorta tria, sin-  
gula in singulas sectiones immitemus, & linteam complicatum aqua ma-  
defactum super imponemus, ac deligabimus. Postera die non solum ulcera,  
sed etiam temporum musculos, & aures ob inflammationem, uino & oleo  
irrigabimus. Et tertia die solutione facta, multa perfusione utemur, & em-  
plastro Basilico cum rosaceo soluto linamentis illitis ac inditis consequen-  
ter curationem absoluemus.

Formicarum  
discursum  
sensus

Hypospathi-  
ster, id est quod  
spatha

Periscyphis-  
mus

**I**N quibus multa & profunda uasa fluxionis copiam oculis immittunt, in  
his periscyphismum, id est incisionem circum scyphium, id est caluariam  
adhibemus. Signa uero ad sunt his talia. Primum inuenies agrotorum ocu-  
los macilentos ac paruos, et ad uisum debiles, angulos autem erosos, & pal-  
pebras exulceratas, et pilos ab ipsis descentes. Et lachryma tenuis ualde et  
acris cum caliditate deferitur. Et dolor est in capitis profunditate acutus &  
ueliemens, et assidua sternutatio. Præfatis igitur capite, et temporum muscu-  
lis,

his, uelut dictum est uitatis, sectionem transuersam à sinistro tempore ad dextrum usque ducemus. Habeat autem sectio terminos in partibus motus extrinsecus, paulo supra frontem inducta, coronaria futura à nobis uitata. Leonides in mediam frontem sectionem facit. Denudato uero osse, cuneolis aut linamentis pluribus disparabimus, extremitates autem sectionis deligabimus, & uino ac oleo uelut antea dictum est irrigabimus. Post solutionem uero, inflammatione iam declinante, os rademus, donec carnem producere incipiat, & ductu concarnationis curabimus puluillus incarnantibus utentes. Ex quorum numero est & is qui recipit farinae triticeae partes duas, colophoniam partem unam, & qui priuatim puluillus capitalis appellatur. Item incarnantia ex pumice composita. Cuius n. per crassiorem cicatricem densata, etiam uasorum oscula conclusa, priorē fluxionē ad oculos deferri prohibet.

De palpebrae superne futura, & alijs modis, in his quibus pili in

palpebris succrescunt.

Cap. VIII.

Concarnatio  
nis ductus

Pilorum ordo geminatus qui distichiasis dicitur, est exortus pilorum praeter naturam ad naturalem pilorum palpebrae ordinem accedens, ex fluida affectione originem trahens, quum multus quidem, lenis tamen et non acris fuerit influens humor. Nam qui acrior est, aut saluginosior, aut alioquin mordax, is sua diuturnitate etiam naturales palpebrarum pilos corrumpit. Quandoque igitur in hac affectione futura utimur. Quandoque in phalangosi, ubi palpebrae margo intro nutat et cum ipso phalanx & acies pilorum intro uertitur. Quandoque uero etiam in laxatis palpebris, quum naturales pili oculi bulbum compungunt. Proinde aegroto in sella collocato, aut ante nos, aut à sinistris, supernam palpebram euertemus, & si quidem longos habuerit pilos, eos indice ac pollice sinistae manus apprehendemus: sin breues, acum trahentem filum per mediam marginem ab interius foras transmittimus. Deinde extenta per filum, cum sinistra manu, palpebra, cum dextra per specilli cuspidem, retro filum, ipsam sinuatam euertemus, & paulo interiorius quam siti sunt pungentes pili, subsectionem in marginem à magno angulo ad paruum usque pertingentem faciemus. Filo uero post subsectionem extractio, sinistae manus pollicis paruum quoddam duplicatum linteolum subicientes supercilium extendimus. Sed & alijs paruis complicatis linteolis in summos angulos iniectis, per ipsa ministram retro stantem, palpebram distendere subebimus. Et tunc per scalpellum suturis destinatum, primum sectionem uerutam appellatam faciemus, paulo supra naturales pilos, ab angulo ad angulum pertingentem, ea profunditate ut sola cutis diuidatur. Post ipsam uero, etiam lunarem adhibemus, inde initio summo, unde etiam ueruta incipiebat, in tantam autem altitudinem progressu facio, ut tota superflua cutis circumscribatur, ita ut similiter desinamus, ubi etiam illa delinebat. Postea quum circumscripta per duas sectiones cutis myrti solum referat, angulum illum ad dextram nostram hamulo transigimus, & totam hanc cuticulam excoriamus. Deinde uibicibus per spongas detergis, tribus aut quatuor suturis, uulneris labia contrahimus à media sectione initio sumpto, & acu in ipsam subsectionem transmissa. Sit autem filum ex lana, cuius superfluum non prope suturas reseceatur, sed ut trium digitorum longitudo ab ipsis supersit, quam ad frontem extentam emplastro aliquo glutinatorio agglutinabimus. At palpebrae pilos per acus aciem à futuris liberabimus. Hic igitur chirurgiae modus communis et tutus est. Quidam uero fugiunt excoriationem. Quapropter post factam subsectionem, palpebrae tenendae apta uolsella, hoc est ad circumferentiam palpebrae formata, distentam superfluum cutem, per scalpellum rescindunt, & suturas uelut diximus adhibent. Quod si in parte quadam palpebrae solum fixata pilis punctura, in illa etiam solum facere chirurgiam conuenit. Postea linteis complicatis posca madefactis & impositis deligabimus, ita ut ad tertiam usque diem posca aquosa irrigemus, qua soluemus, & recisis superfluis

Veruta sectio  
Lunaris sectio

Collyrium  
croceum ex  
rosis

filis, aut croco aut glaucio, aut aliquo inflammationem arcente collyrio, ueluti quodam ex rosis crocero, palpebras oblinemus. Si uero futura inflama-  
tae fuerint, etiā emplastrum quoddam molle ipsis imponemus, & ouis la-  
tis ammixtis oculo iniulis mitigabimus. Laxatas autem futuras rectas de-  
trahemus. Noui porro quendam, excoriationem quidem palpebrae facien-  
tem: uelut dictum est, futuris autem non utentem, sed per medicamentum  
cicatricem inducens curationem perficientem. Coalescente. n. uulnere, pal-  
pebra ex parte extenta, pilos foras nutare cogebat. Quemadmodum alius  
quidam neq; palpebrae excoriatione, neq; duabus extrinsecus sectionibus  
utens, sed subsectionōe solū faciens, per digitos aut etiam per hamulum, laxā  
palpebrae rugam extendebat, & duabus arundinibus, aut folijs siue bracteis  
quibusdam aequalem palpebrae longitudinem habentibus, latitudinem autē  
angusti ueng in cisorij scalpelli, totam intermediam superfluam cutem inter-  
cipiebat, & uinculo ipsa iuxta utroq; fines confiringebat. Atq; ita tota re-  
tro cutis non nutriebatur, & propterea mortificabatur, intraq; decimum  
aut decimum quintum ad summum diem, unā cum arundinibus, aut folijs  
siue bracteis excidebat, ut ferē neq; cicatrix apparetet.

De palpebrarum uisione per medicamentum.

Cap. IX.

Uisio per me-  
dicamentum  
Lagophthal-  
mica affectio

**P**alpebrarum equidem uisionem per ustorium medicamentum, omnes  
ut uno uerbo dicam, ueteres reprobarūt, tum propter medicamenti acri-  
montiam oculis infestam, tum quod uisione modum excedēte, lagophthal-  
mica oboritur affectio, in qua hiantibus palpebris, uisus a quauis occurren-  
te causa oblaeditur. At quum multi qui semper a pilis punguntur, & neq; no-  
mē futurę saepe audire possunt, inuitos nos sepe cogāt, uelut in rebus despe-  
ratis uisionē per medicamentū adhibemus. Et compositio quidem medica-  
menti eiusmodi est. Calcis uiuę partes. II. saponis gallici aut cōmunis par-  
tes. II. Quidam etiā aphronitri partes. IIII. Hęc trita lixiuiū excolato, aut  
saponarico, aut alio ex ficulneo aut querneō cinere, urina pueri nōdum cor-  
rupti excepta, per specilli caput palpebrae iniicimus, myrtei folij figura tan-  
tum spacij adurentes, quantum etiam in futura detraxissemus. Adusta uero  
in prima aggressionē cute, tantum illud per spongiā detrahimus, & rursus  
iniicimus, tandiū medicamentum manere sinentes donec locus nigrescat.  
Si uero non fuerit denigratus, etiam tertio iniiciendum est. Denigrata uero  
iam cute, et crusta de cætero facta, abluto medicamento, balneis & perfusio-  
nibus, usque ad crustę casum utemur. Post quem linamentis rasis, & colly-  
rijs teneris cicatricem inducere conuenit.

De Lagophthalmis. Cap. X.

Lagophthal-  
mi

**L**agophthalmos appellāt eos qui supernam palpebram reuulsam habēt.  
Hęc autem affectio fit uel ex natura, uel ex uulneris cicatrice, & hoc aut  
sponte, aut ex futura, aut uisione, uelut paulo ante dicebamus, inepte admi-  
nistrata, inducta: In qua etiam solum moderata correctio fieri potest, si suffi-  
cientem crassitudinem palpebra habeat. Ipsam. n. cicatricem diuidere oportet,  
& disparatis per linamentum labris, uinculo ad absolutam usq; curationem  
uti, ita ut non ualde siccantibus utamur sed magis laxantibus pingui-  
bus, qualis est sceni græci succus affusus, & regium tetrapharmaca cum solu-  
tum, ac linamentis exceptum indurum.

De futura palpebrae inferna, et uisione per medicamentum.

Cap. XI.

Pthalangosis  
dichichia

**Q**uot pilorum affectionibus superna palpebra obnoxia est, totidem eti-  
am inferna. Nam si & maior seipsa fiet, eueritur, & phalangosim, & di-  
stichian, hoc est multiplicem pilorum aciem, et geminatum eorundem ordi-  
nem sustinet. Eodem igitur etiam hęc futura modo utendum est, immutato  
saltem ordine, ita ut primum Lunarem sectionem faciamus, propter im-  
pedi mētum quod ex sanguine contingit. Deinde uerutam. Subsectio uero  
reprobanda est, eo quod insita grauitate inferna palpebra promptē eueriti-  
tur. Sed & reliquam curationem, uelut in supernę palpebrae futura adhibe-  
re

re oportet, hoc excepto, ut filorum eminentia in fronte non agglutinetur. Si uero etiam hic chirurgiam fugientes, uisionem per medicamentum magis expectant, etiam hanc iam traditam habes.

*De palpebrae infernae euerfione.*

Cap. XII.

**Q**uemadmodum in superna palpebra affectio lagophthalmica, ita in inferna euerfio contingit, uerum non ex natura, sed aliquando propter laxationem ex medicamentis, quae hanc inflammatione progressa efficere possunt: aliquando uero propter futuram aut uisionem inepte administratam, palpebra euerfitur. Ac ut itaq; accepta duplicatum filum trahente, carnis uiam palpebrae partem transfigimus, à sinistro angulo, ad dextrum ipsam tranfientes. Deinde annexo extremitatibus ipsius utriusq; filo, carnem per acum extendimus, atq; sic ipsam scalpello excindimus, unà cum ipsa auferentes etiam acum. Et si quidem receperit figuram suam palpebra, & intro conuersa fuerit, contenti sumus hac Chirurgia. Si uero adhuc euerfatur post carnis ablationem, auersum specillum iuxta externam partem sectae palpebrae subijcimus, et iuxta internam palpebrae partem duabus factis sectionibus, à duobus angulis sectionis prius factae initium fumentibus, has ipsas in acutum ducimus, & his in unum iam adductis corpusculum. *Α*. literae graecae simile auferimus, ita ut sit quidem acuta ipsius pars inferne ad oculum, lata uero supernè ad palpebrae marginem. Et postea disparatas partes acutaneum filum, ducente contrahimus, duabus futuris contenti. Si uero propter futuram, aut uisionem palpebrae euerfio fuerit facta, sub palpebrae pilis in ipsam primam cicatricem, simplicem sectionem faciemus, & disparatis labijs linamenta indemus, & reliquis uelut in lagophthalmis utemur, fomentis saltem exceptis, donec futura conglutinetur.

*De illaqueatione, & uisione per ferram.*

Cap. XIII.

**I**n quibus non sunt multi in palpebra pili oculum pungentes, sed unus, aut duo, aut tres ad summum, prope inter se siti, in his illaqueationem probamus. Ac ut igitur tenuissima accepta, per auriculam ipsius, muliebris pili, aut simplicissimi fili byssini, duas extremitates simul coniunctas transmittimus, ita ut id quod transmissum est duplicem sinum siue ansam habeat: & alterum eiusmodi filum aut pilum, per ansam immittimus, transmissaq; in marginem acu, ubi pili illi superflui enati apparent, & per auricularium specillum pilo siue pilis illis in ansam inditis, attrahemus. Et si quidem palpebrae pilus inclusus ducatur, ansam sursum trahimus. Si uero unus aut plures pili exeat, per principium filii inditum, rursus ansam detrahimus, & rursus pilos, uel pilis illis inditis attrahimus. Si uero unus saltem fuerit pilus oculum pungens, isq; tenuis, alterum cum ipso ex iustis palpebrae pilis simul attrahimus, ita ut ipsos gummi, aut alio quopiam glutinoso illitos deligemus, donec simul coalescant. Quidam uisionem illaqueationi praeferebant, euerfunt palpebram, et exte acio per pilorum euulsoria uolsellam pilo, siue unus is sit, siue duo aut tres, specilli bicipitis caput, aut auricularium specillum, aut tale quoddam tenue instrumentum igne calefactum adigunt loco, unde pilus aut pili fuerunt euulsi. Sic. n. densata cute, neq; alius pilus enascitur.

*De uescis siue Aquulis palpebrarum.*

Cap. XIII.

**V**esica siue Aquila, quae hydatidis graecis dicitur, substantia quaedam est pinguis palpebrae cuti praeter naturam substrata. In quibusdam uero, & maxime in pueris uelut humidioribus auferens, multorum symptomatum causa fit, grauens oculum, & ob id fluxiones inducens. Palpebrae itaq; ipsae sub supercilijs aquosae apparent, & uelut decet sursum attolli non possunt. Et si digitis disparatis eas compresserimus, id quod in medio ipsorum est indatur. Qui uero ita affecti sunt, diluculo maxime fluxione infestatur, neque solis splendorem intueri possunt, nisi lachrymantes. Sed & assiduas incidunt lippitudines. Aegroti itaq; commode collocato, duobus digitis, indice & medio paululum disparatis palpebram comprimemus, ita ut col-

*Vesica palpebrae  
Aquila  
Hydatidis*

lectio quædam aquulæ in medio digitorum fiat. Deinde retro stantem & caput fulciētem ministram, iuxta medium supercilium, moderate extendere palpebram iubebimus, & uenę incisorio instrumēto accepto, ipsam per medium transuersim dissecabimus, non maiorē quàm in uenę sectionibus diuisionem facientes, ea uero profunditate, ut totam cuem diuidat, aut etiā ipsam uesicā cōtingat, diligētī in hoc habita animaduersione. Multi enim profundius adactio scalpello, aut corniformē tunicam diuiserūt, aut omnino musculum palpebræ sauciunt. Et sanè si statim cōparuerit uesica, hanc extra hemus. Sin minus, etiā rursus leniter diuidemus. Hanc autem confecta, per molle linteolum digiti apprensam, hac illac & quęq; circū circumo extrahemus. Et post extractionem duplicatum linteum posca imbutum imponemus ac deligabimus. Quidam uero etiā salem tritum per specilli caput in sectionē indunt, ut si quid de uesica relictum sit, id ipsum consumat. Post solutionē uero, si absit inflammatio, collirijs quæ oblini solent, aut lycio, aut glaucio, aut croco, curationem absoluemus. Si uero inflammatio affuerit, cataplasmatibus & alijs auxilijs ad hoc commodis, medebimur.

De coherentibus palpebris.

Cap. XV.

Palpebræ coherentes

**C**oncretionem sustinet superna palpebra, quādoq; ad inferę marginē, quādoq; ad tunicā oculi agnatā, quęq; etiā ad ipsam corniformē tunicam. Et hic morbus oculū ad functionē suam impeditū efficit. Oportet igitur aut auriculario specillo palpebræ amplitudini subiecto, aut ipsa per hamulum distenta, concretionem per pterygijs secandis destinatum scalpellū dissoluere, cauendo ut corniformis tunica ne sauciatur, ut ne proidentiar oculi occasio ex hoc detur. Post sectionem uero, liquoribus oculo infusis, palpebras per linamenta disparabimus, ut ne iterum concretio fiat, & sana ouo imbuta imposita, post tertiam diem attenuantibus & cicatricem inducentibus collirijs utemur.

De grandinibus.

Cap. XVI.

Grando palpebræ

**G**rando lēti humoris circa palpebrā collectio est, quæ si ante externā palpebræ superficiem occurrit, diuisa extrinsecus transuersim per scalpellum palpebra, postea specillo auriculario aut eiusmodi quodam, grandinem eximemus. Et si magna aut hians fuerit sectio, futura contrahimus labia, & emplastro utimur: Sin parua, omissa futura, similiter curationem perficiemus. At si intus fuerit grando, ut per chartilaginē transpareat, euerfa palpebra, & intrinsecus transuersim diuisa, ipsam extrahemus, & muria infusione utemur.

De verrucis, &amp; carnis in magno oculi angulo incremento.

Caput XVII.

Verrucæ palpebræ  
Encanthis

**V**errucas circa palpebram, & carnis iuxta magnum oculi angulum incrementum, quod encanthida, id est, carnem angularem uocant, uoluntella præhensam, scalpello excidimus, & chalcitidem tritam imponimus.

De pterygijs.

Cap. XVIII.

Pterygia oculi

**M**embrana neuosa à magno oculi angulo omnino exorsa, & paulatim intrò repente, hæc affectio contingit. Lædit autem oculum, tum quod contractione bulbi motum impedit, tum quod procedendo totam pupillā cōtegit. Quum igitur curatu faciliora sint tenuia & albicantia pterygia, ad hunc modum chirurgiam aggredimur. Ductis palpebris pterygium hamulo modicè incuruò exceptum distendimus, & accepta acu setam equinam, & ualidum filum in auricula sua trahente, modicèque in summa parte incurua, ipsam in medium pterygium traicimus, & filo quidem deligatum pterygium, in sublime extendimus, seta uero partem ipsius ad pupillam, uelut serrando, ad finem usque subexcoriamus. Reliquam uero ipsius ad magnum oculi angulum partem, scalpello fururis destinato ex fundo excidimus, naturalem anguli carnem relinquentes, ne ipsa ablata Rheoas ex decremento fluida consequatur. Quidam filo, uelut dictum est, exten-

Rheoas

um.



rum, scalpello totum pterygium excoriant, cauentes ne corniformem tuni-  
cam contingant. At post chirurgiam, modico sale trito in locum immisso,  
lanam ouo imbutam superimponimus ac deligamus. Verum post exolu-  
tionem, diu murtam instillamus. Si uero inflammatio consequatur, descri-  
ptis ad hanc auxilijs utemur.

De staphylomatibus.

Cap. XIX.

Staphyloma tunicæ corniformis incuruatio est, debilitatæ una cū acino,  
formi, quandoq; ob fluxionem, quandoq; ob ulcerationem. Chirurgiam  
autem adhibemus, non ut uisum deperditum reuocemus: Hoc enim fieri nō  
potest: sed ut moderatum decorem ægro reparemus. Acum igitur ex infer-  
nis sursum, per staphylomatis fundum transire oportet, & alteram acum du-  
plex filiū ducentem, ab angulo qui ad manū est, ad alterū per staphylomatis  
fundū transigere, & manente priore acu, filiū ansem secare, & alterā staphy-  
lomatis partem ad superna, alteram ad inferna, per fila deligare, & tūc ab-  
lata acu, lanam ouo imbutam imponere. Post solutionem uero, oculum le-  
uibus infusionibus mitigare, donec fila unā cum staphylomate excidant.

Staphyloma

De suppuratis oculis.

Cap. XX.

De suppuratis oculis Galeni uerba apponere satis fuerit, quæ hoc modo  
se habent. Ex nostri temporis medicis ocularijs quidā nomine Iustus,  
etiam per capitis concussionem multos ab oculorum suppuratione libera-  
uit. Erecos enim ipsos in sella collocabat, & apprehenso utriusq; capite à la-  
teribus, ita ipsos concutiebat, ut nos palmis pus deorsum procedere uiderē-  
mus. Manebat autem infernè, ob substantiæ grauitatem, etiā si suffusiones  
non maneant, si non ualde accurate ipsas quis constringat. Et idem rursus  
in progressu, Saepe, inquit, pus ac eruatim euacuauimus, disseca cornifor-  
mi tunica paululum supra illum locum, iuxta quem omnes tunicæ inter se  
concreuerunt. Appellant autem eum locum irin aliqui, alij uero coronam.  
Hæc habemus in libro curatiōis methodi dicti. Cæterum post puris excre-  
tionem, ulcere per infusiones aquæ mulsæ, aut succi sceni graci addito mel-  
le, repurgato, consequenter reliquam curationem adaptabimus.

Oculi suppu-  
ratiInfusio medicis  
ocularijsIris quæ et Co-  
rona

De suffusionibus.

Cap. XXI.

Suffusio est lenti humoris in corniformem tunicam iuxta pupillam colle-  
ctio, quæ aut uisum impedit, aut ne clare uideamus efficit. Fit autem ma-  
xime ob frigiditatem, & debilitatem spiritus uisori, & propterea senibus  
magis, & qui ex longo morbo ægrotarunt accidit. Contingit etiam ex uisio-  
lento uomitu, & ex plaga, & propter plures alias causas. At uero de suffu-  
sionibus quæ adhuc sunt, & ad chirurgiam nihil pertinent, in tertio dictū  
est libro. Nunc autem de his quæ perfectam collectionem ac concretionem  
acceperunt tractabimus. Omnes igitur suffusi splendorem aut multum, aut  
modicum uident, atq; hac ratione etiam suffusiones ab obscuratone ac glau-  
cedine separamus, quum obscuratone ac glaucedine affecti, splendorem  
omnino non uideant. Rursus igitur docebit te Galenus & concretionem,  
& differentiam suffusionum, & quæ ex his chirurgiam admittunt. Conclu-  
so oculo suffuso, palpebrā per magnum digitum ad oculū comprimimus,  
ipsamq; cum compressione hac illac impellimus. Deinde aperto oculo, in-  
speciam suffusionem consideramus. Nam in his quæ nondū sunt cōcretæ, fu-  
sio quædā ex digiti cōpressionē accedit, & primū quidē latior apparet, uerū  
rarius ad propriam figuram ac magnitudinē redit. In his uero quæ concre-  
tæ sunt, nulla mutatio neq; secundum latitudinem, neq; secundum figuram,  
ex compressione occurrit. Quandoquidem uero commune hoc est indicij  
um, & earum quæ moderate, & quæ supra modum concreuerunt, ex colore  
has discernimus. Quæ enim ferri colorem, aut cæruleum aut plumbeū re-  
ferunt, hæ moderate concretæ sunt, & commode deduci possunt. Quæ ue-  
ro gypsum aut grandinē colore referunt, supra modū concreuerunt. Postq;  
igitur hæc didicimus ex Galeno, locatō hominē ad splendorem absq; sole,

Suffusiones oc-  
ularum

oculum illaefum diligēter deligabimus, & diductis alterius oculi palpebris, ab appellata iride iuxta parvū angulū, ad capitis specilli mēsuram ipfas deligamus, & tunc specilli cuspidē locū perpungendū notamus, ita ut in sinistro oculo, dextra manu operemur, in dextro uero, sinistra. Et cōversa specilli acie circa finē rotunda fortiter innitimur et per notatā prius partē usq; ad inanem locum transigimus. Modus aut̄ progressus in profundū ea fiat mensura, quanta est à pupilla ad iridem distantia. Ex superius igitur iuxta suffusionis apicem specillum demittentes (Nam ob corniformis tunice peluciditatē res conspicuē uidetur) per ipsum in subiectos locos suffusionē deducimus. Et si quidē statim deducta fuerit, paululū quiescentes expectamus. Si uero redundarit, rursus ipsam deducimus. At post suffusionis deductionē, specillū punctioris educimus, sensim ipsum obtorquentes, & solutū in aqua modicum sale m capado cū oculo infundimus, & imposita extrinsecus lana ouis candido cum roseo imbuta deligamus, simul etiam sanum oculū deligantes, ut ne cum altero commoueatur, & reclinatū in domuncula subterranea penitus quiescere iubemus, tenuē exhibentes uictum ad septimū usq; diem deligato, si non quid impediat. Post septimum diem deligatione soluta, uisum ipsius experimur, rebus utilisibilibus obiectis, id quod in Chirurgia, aut statim post chirurgiam facere improbamus, eo quod ex uolenta intentione suffusio promptē rursus redundet. Si uero inflammatio aliqua urgeat, etiam ante septimum diem facta solutione, huic nos opponemus.

De Aegilope.

Cap. XXII.

Aegilops

**A**Egylops tumor est abscessus similis, inter magnū oculi angulum, & nasum. Aegre uero curatur affectio, tum propter corporum tenuitatem, nō propter consensus ad oculum timorem. Si igitur ad summam cutem eruperit abscessus, quicquid extruberauit ad os uique auferemus, & si ad malam subierit fistulā, rotam ipsam expandemus, & si adhuc incorruptum os est, rademus. Eo uero corrupto, per cauteria oliuaria peruremus, spongia frigida aqua imbuta oculo imposita. Quidam post carniū resectionē terebra uisum, humorem aut pus in nasum traduxerunt. Verum nos uestione sola contenti fuimus, per aegilopica cauteria rantum adurentes, ut squama decedat. Et post uestionem lenticula cum melle, aut malicorio cum melle, & reliquis resiccantibus auxilijs utemur. Si uero ad angulū repit Aegilops, & omnino non ad summam cutem, tunc scalpello pterygijs destinata, aut uenae incisio, corpus id quod inter angulum usq; ad abscessum est exoluimus, & carnes ex profundo educimus, & tunc moderatē resiccamus. Et uitrum sane in puluillum detritum, his inspersum mirificē siccāt. Et aloe cum manna similiter. Reliquam uero aegilopum curationem libro tertio tradidimus.

De auditorijs meatibus non perforatis.

Cap. XXIII.

Auditorij meatus non perforati

**H**Aec affectio ex nariuitate consistit, membrana quadam auditorij meatum obturante, quandoq; in superficie, quandoq; in profundo. Sed & postea superuenit, praegressa circa meatū ulceratione. Nam superenascens caro ipsum obturat. Si igitur in profundo fuerit impediens membrana, aggressio difficilis est. Conandum ramen est, ut tenui quodam instrumento illam dissecemus. Si uero in superficie, acuto cultello illam disseciam, si opus fuerit, etiam eximemus. Si uero caro superenata fuerit, etiā hanc pterygijs destinato, aut polypis excidendis apto scalpello auferemus. Deinde linamentum ex linco obrortum, factum ad amplitudinem meatus, in aqua mar defaciemus, & hoc in chalcitide trita aut eiusmodi quodam puluillo obvoluimus, in meatum indemus, ut ne rursus caro enascatur. Si uero inflammatio adsit, cito ipsum extrahimus. At si sanguis ex meatu erumpat, spongiā frigida aqua imbutam imponemus, & alijs ad hoc commodis utemur.

De his quae illabuntur in auditorium meatum.

Cap. XXIII.

Illabentia in aures

**I**ncidunt in aures nō solum calculi, sed etiam uitrum, & fabae, & siliquarum ossicula. Vitrum igitur & calculi in propria magnitudine perseverant, fabae uero

uero & filiquarum officula, & alia huiusmodi, ex naturali corporis humidi-  
tate intumescencia, maximos dolores inducunt. Auriculario igitur specil-  
lo, aut hamulo, aut uossella, hæc exinere oportet. Aut uolenta capitis di-  
stentione ac concussione, aure circulo alicuius imposita. Quin & per stipulam  
sepe hæc exigentes extraximus, quemadmodum etiam aquam in aurem il-  
lapsum, cera similiter circumcirca ei stipulæ parti oblita, quæ ad aurem est,  
ut nulla parte spiritui transitus pateat. At calculos & eiusmodi moles, lana  
specillo obuoluta extraximus, ita ut resina terebinthina, aut glutinoso ali-  
quo resina, leniter in auditorium meatu infereretur. Si uero non successerit,  
seris, Bernutatoris naris indito; os & nares obturato: At si neque sic se-  
quantur illa, priusquam inflammationes, & conuulsiones, & simpliciter per-  
neculum accedat; per chirurgiam ipsa educemus. Locato igitur ægro aure  
aurea, sectione parua lunari ad fundum auris retro fibræ utemur, & auri-  
cularis specilli concavo, insitam molem eximemus. Post extractionem uul-  
nus conseruatur, & eruentorum uulnorum ductu curetur.

De polypis. Cap. XXV.

Polypus moles est corpusculi præter naturam in naribus consistens, à ma-  
rini polypi similitudine nominata. Nam & illius carni assimilis est, & ue-  
lut ille cirrhis suis uenantes ulciscitur, manus ipsorum apprehendens. Ita  
& hæc affectio ægrorum nares obturans, medellæ adhibendæ difficultatem,  
& circa respirationem, & circa loquelam inducit. Duros igitur & reniten-  
tes, & subuideos, ac malignos polypos, uelut ad cancerum tendentes uitare  
oportet. friabiliore autem & laxos, & torpidos, & non malignos, chirur-  
gia subijcere. Proinde ad solis radios homine collocato, & nali meatu perfi-  
ni stram manum expanso, cum dextra manu per scalpellum acutum, myrtili fo-  
liam referens, polypis excidendis aptum, polypum aut carneam illam mo-  
lem circum circa uel secemus, qua parte nari adhæret ferri acie immissa. Por-  
ro si uero conuerso instrumento, per concavum ipsius resectam carunculam  
educamus. Et si quidem nali meatum purum factum uiderimus, ad curatio-  
nem deuenimus. Si uero aliquid de corpore polypi restet, accepto alio poly-  
pis eradendis apto instrumento, per aciem ipsius relictum corpusculum, cū  
tensione & obtortione & rasure, strenue educemus. At uero malignos cau-  
terij oliuariis perurimus, & post uisionem curationem ad perusta com-  
moda utemur. Cæterum post chirurgiam locis per spongiam exacte deter-  
sis, poscam, aut uinum, in nares infundimus. Et si pertransierit liquor per pa-  
latum ad fauces, recte administrata est chirurgia. Si uero non pertransierit,  
manifestum est quod circa ossa coliformia, aut in supernis naris partibus ca-  
runculae sunt, quæ polypticis instrumentis non fuerunt comprehensæ. filum  
igitur medio crassum, uelut funiculus, est ut in ipso duorum aut trium  
digitorum distantia, nodi ligari possint, specilli bicipitis foramini inseri-  
mus, & alteram bicipitis specilli extremitatem per nares sursum ad colifor-  
mes meatus immittimus, ipsamque per palatum & os transmittentes amba-  
bus manibus attrahimus, quo uelut per ferram, nodis illis carunculae dete-  
ratur. Et post chirurgiam, meatu per lucernario funiculo simile linamentū,  
disparato conseruato, tertia die postea, Musæ pastillo & consimilibus, in-  
tus relicta consumemus, simulque locum resicabimus. Postea uero etiam pa-  
stillis cicatricem inducentibus utemur, plumbeis canalibus si opus fuerit,  
per totam curationem naribus inditis.

De curis. Cap. XXVI.

Curta circa aures, aut labia hac ratione tractatur, ut primum quidem cu-  
tem ex inferna parte excoiemus; postea uero uulnere labia inter se  
contrahamus, & callis ablatis deinde suamus, & conglutinemus.

De epulide & parulide. Cap. XXVII.

Epulis carnis supereminentia est in gingiuis, iuxta aliquem dentem obor-  
ta. Parulis uero abscessus paruus est circa gingiwas. Epulidem igitur uol-  
iella

Polypus nari

Ossa colifor-  
mia

Coliformes  
meatus

Curta.

Epulis  
Parulis  
iella

fella aut hamulo extentam refecamus. Parulidem uero iuxta circumscripti-  
ptionem excisam linamentis explemus ac disperamus. Scio autem saepe ip-  
sam scalpello uenae incisorio solum punctum, pure euacuato cessasse. Post  
chirurgiam uero uino colluere iubemus, postera die aqua multa, & post haec  
puluillum floridum uulnere inspergemus, donec perfecte curetur. Si uero  
putredo gingiuis accedat, & per commoda medicamenta non curetur, ali-  
uarijs cauterijs hanc peruremus.

De dentium extractione.

Cap. XXVIII.

Dentium ex-  
tractio

**D**Entem ad locellos usque circumscarisificatum, & forcipe paulatim concus-  
sum extrahemus. Si uero corrosus fuerit, tenui linamento primum ca-  
uernam explere oportet, ut ne frangatur dum ab instrumento cōstringitur.  
Post extractionem, sale tenuissimo carunculas relictas conspersas consume-  
mus. Postea uero uino aut posca colluantur usque ad absolutam curationem.  
Quandoquidem autem & superuacui quidam dentes agnascuntur, eos qui-  
dem qui locellis insiti sunt, per scalpella excidimus. Qui uero locellis insiti nō  
sunt, eos per forcipem extrahemus. Si uero dens aliquis supra modum au-  
ctus sit, aut etiam defractus, praeminentem aut superuacuam partem ipsius  
lima deterimus. At uero adhaerentes ipsis dentibus squamas, uelut sane fieri  
potest, uel specilli cōcauo, uel rasorio instrumento, uel limula repurgamus.

De incuruatione linguae.

Cap. XXIX.

Linguae incur-  
uatio

**I**ncuruatae linguae affectio aliquando ex natura fit, si detinentes linguam  
membranæ duriores & curtiores sint ab initio: aliquando uero ex aduen-  
titia causa, propter cicatricem aliquam duriores, ex ulceratione, sub ipsa lin-  
gua inductam. Qui igitur ex natura hanc affectionem habent, ex eo cogno-  
scuntur, quod & tarde loqui incipiunt, & quod nulla praegressa ulceratio-  
ne, uinculum sub lingua moderato amplius apparet. Qui uero ex aduen-  
titia causa, cicatricem palam apparentem habent. Aegrotus igitur in sella col-  
locetur, & linguam ad palatum eleuet, & neruosum illud uinculum trans-  
uersim secetur. Si uero ex cicatrice, ea linguae incuruatio facta fuerit, hamu-  
lo transfixum callum sursum attrahemus, & sectione obliqua facta curuita-  
tem exoluimus, ita ut corporum in profundo incisionem uitemus. Nam san-  
guinis eruptionem, quæ agrestis potest, saepe induxit. Post chirurgiam a-  
qua frigida, aut posca colluant. Et postea laxatorio & concarnante medica-  
tionis ductu curatio perficiatur.

De tonsillis.

Cap. XXX.

Strumæ  
TonsillæAntiaides uo-  
catur

**Q**uemadmodum glandulae induratae appellantur Strumæ, Sic tonsillæ  
inflammatae, & ultra modum auctæ, & uelut induratae, deglutionis  
& spiritui, difficultatem functionis inducētes, quum ex aduerso inter se po-  
sitæ sint, antiaides græcis uocatae sunt, latinis & pars, & affectio eodem ton-  
sillarum nomine censentur. Inflammatas igitur has chirurgia non aggredi-  
mur. Sedata moderatè inflammatione, manus admovebimus, & maxime si  
albæ fuerint, & contractæ, & fundum angustum habuerint. Nam laxæ &  
rubicundæ, & fundum latius habentes, ad sanguinis eruptionem proclives  
sunt. Collocato itaque ad solis splendorem homine, & hiare iussu, ministro ca-  
put continente, & altero linguam per instrumentum ad hoc aptum, ad in-  
fernam maxillam deprimente, nos ipsi acceptum hamulum in tonsillam de-  
figimus, ipsamque quantum eius fieri potest attrahimus, absque hoc ut membra-  
næ simul attrahantur, & postea ipsam totam ex fundo, per scalpellum lin-  
guæ incuruatae aptum, & ad manum commodè, refecamus. Duo enim sunt  
eiusmodi instrumenta, flexuras inter se aduersas habentia. Quare post uni-  
us excisionem, in altera eodem modo, manu & instrumento uice uersa mu-  
tatis operabimur. Post chirurgiam, aquam frigidam aut poscam æger col-  
luat. Ac si sanguinis eruptio aliqua accedat, etiam rubi, & rosarum, & myrti  
decocctio tepida utantur. Si uero copia sanguinis feratur, etiam plantaginis  
& symphyti succum, & pastillum ex succino, & lemnium sigillum, ex pos-  
sea

seca colluendum exhibebimus. Sedata uero sanguinis eruptione, postera die rosarum flore & croco, & amylo, cum lacte illinantur, aut cum aqua, aut ovi candido, aut hydrosorato. Quod si sordes ulceribus accedat, etiā ex melle collutionibus, ac illitionibus utantur.

De uua

Cap. XXXI.

Hydrosorati.

**G**urgulio qui uelut plectrum quoddam uocis est: scepe fluxionem à capite suscipit, & præter naturam auctus, ubi longus & tenuis factus est, columella appellatur: ubi uero crassus inferne ac rotundus, uua, utroque nomine à similitudine ducto. Si igitur uniuersalibus auxilijs cedere noluerit, dico autem uenæ sectionibus, & euactionibus per purgationem subducen- tibus, item localibus adstringentibus ac repellentibus, aut etiā discutere potentibus: ad chirurgiam deuenimus: ut ne ex assidujs irritationibus tussiles & uisgilæ, aliquando etiā suffocatio consequatur. Contractas igitur & rotundas uuas, & non oblongas, & sanguinolentas aut subnigras, chirur- gia non aggredimur. Tenues uero & oblongas, & summa parte immi- nutas ac resolutas, & non ualde sanguinolentas, sed subalbicantes manu trac- tamus. Statim. n. hæc etiā inflammatione carent. Tantum uero de uua sal- tem auferendum est, quantum naturalem excedit modum. Nam resectiones ipsius in totum, omnes circa thóracem regiones extremè lædunt, & uocem interceptiunt. Collocato itaq; ad solarem splendorem agro, multumq; hiare iusso, uaria forcipe aut uossella superua cum eius præhensum, & ad inser- nam partem tractum, per scalpellum uiuatum, aut iuturis destinatum rese- cabimus. Quæ uero post chirurgiam requiritur, eâ uelut in uasorum exse- cione dictum est, adhibeantur. Scepe uero aut ob ægri timiditatem, aut ob sanguinis eruptionis formidinem, aut ob medicamenti præstantiam, ferris recusantes, ustorio potius medicamento uuam consumimus. Oportet igitur medicamentum ustorium illud quod in palpebrarum uestione relatum est, aut aliud eiusmodi accipere, et ex hoc ustorii uuarum instrumenti ca- uitates implere, & agro multum hiare iusso, linguaq; per ministrum cum instrumento ad id apro depressa, tantam uuæ partem instrumeto quantum satis est aperto comprehendimus, quantum alioqui excideremus. Habeat aut medicamentum compagem neq; liquidam, ut ne dissuens ab uua aberret, & subiectas partes comburat: quapropter monemus hominem, ut per totum uestionis tempus non deglutiat: neq; omnino duram, quo facile uuæ adha- reat. Et si quidem ex una admotione summa uue pars fuerit denigrata, conti- nent sumus. Sin minus etiā his utemur, per totum operationis tempus ho- mine inclinato, quo salua eliquescens, una cum medicamenti particulis, ex- tra os effluere possit. Mortificatur enim in una hora, excidit aut circa terti- am aut quartâ diem. Post uestionem uero, indice dígito molli lana aut stupa obuoluto, partes circa gurgulionem extergimus, aut etiâ aqua colluere so- bemus. Ac uero partes circa collum frigationibus ex oleo chamæmelino, tam in his, tñ in quibus tonsille ablatae sunt, propter affectionem per consen- sum, consouebimus. Gargari smis item & illitionibus similiter utemur.

De spinis faucibus infixis.

Cap. XXXII.

Medicamentum  
ustorii præ-  
stantiaSpinæ faucibus  
infixæ.

**D**e uorantur scepe inter edendum spinæ aut piscium, aut aliarum rerum, in diuersas partes. Quæ igitur sub conspectum ueniunt, eas instrumen- tis spinis eximendis destinatis extrahimus. Quæ uero inferius hærent ad tñ- plam gulam siue deglutitionem, alio modo. Quidam. n. maiora frustra ipsis deuoranda censent, uelut sunt caules lactuearum, aut buccellæ panis. Alij spongiæ puræ ac mollis non magnâ ad eam molem filo alligatâ deuorare iu- bent, eaq; filo præhensam rursus reuellete, atq; hoc scepe facite, quo spina spō- giolæ infixa simul educatur. Leonides cataplasmatibus concoctorijs extrinse- cus uti iubet, qualia sunt quæ ex eruda ordeacea farina constant, quo sup- purata spina sua sponte excidat. At si circa ipsum deglutitionis tempus, aut etiā ante concoctionem in uentre, ad affectum hominem accesserimus, & quod

Leonides

quod infixum est nō compareat, uomere iubebimus, aut digitorum aut pen-  
narum demissione facia. Nam aliquando unā cum his quæ per uomitum re-  
ijciuntur, etiam id quod infixum est educitur.

*Antylus.*

*De summi gutturis sectione.*

*Cap. XXXIII.*

*Gutturis sum-  
mi sectio.*

**O**ptimi chirurgi etiam hæc chirurgiam descripserunt. Antylus igitur ita  
dicit. In anginis, uelut circa uicūs modum trademus, reprobamus chi-  
rurgiam, quum inutilis fiat dissectio, ubi omnes arteriæ & pulmo affectus  
est. At in his qui circa os & mentum inflammationem habent, aut etiam in  
tonsillis, quæ gutturis osculum operiunt, arteria ab affectione immuni, ra-  
tioni consentaneum est uti summi gutturis sectione, ad suffocationis peri-  
culum euitandum. Proinde opus aggressi, infra gutturis caput, sub tertiam  
aut quartam ipsius circulum, partem quandam arteriæ dissecabimus. To-  
tum. n. diuidere periculosum est: Idoneus autem est hic locus, tum quia car-  
ne caret, tum quia uasa procul à diuiso loco sita sunt. Reflexo itaq; retror-  
sum agroti capite, ut magis conspicuum fiat guttur, transuersa sectione in-  
ter duos circulos utemur, ita ut non cartilago, sed membrana cartilaginea  
continens dissecetur. Si uero quis circa actionem timidior fuerit, hamulo  
prius extensam cutem diuidat. Deinde ita ipsum guttur aggressus, & uasis  
li quæ occurrant disparatis, sectionem faciat. Hæc Antylus. Constat autem  
tem gutturis dissectionem, tum ex spiritu per ipsam exeunte cum impetu  
quodam, tum ex uocis interruptione. At post prætergressum suffocationis  
periculum, labijs uuln eris renouatis, suturis utemur, cutem solum abq; car-  
tilagine consuentes, & medicamentum cruentis uulneribus aptum adhibe-  
bimus. Si uero hoc nō glutinabitur, in carnate ductu utendū est. Porro si quis  
nobis offeratur, qui uitæ finiedæ causa sub ipsi guttur incidisset, similiter cu-  
rabimus.

*De abscessibus*

*Cap. XXXIIII.*

*Abscessuum  
Chirurgia*

**Q**uod abscessus corruptio sit & mutatio carniū aut carnosarum parti-  
um, & qui sint generationis ipsius modi, & quot abscessuum differen-  
tiæ, in quarto libro sufficienter dictum est. Nunc uero quæ ad chirurgi-  
am ipsius attinent persequemur. Postquam perfecta mutatio in pus facta  
fuerit (Hanc autem cognoscimus, ex eo quod & dolores, & febris, quæ an-  
tea fuerūt, et rubor, & pulsus, & reliqua inflammationis signa minuantur, et  
tumoris moles in acutū fastigiatur, & ad digitorū innixū pus subsidit, ma-  
xime si in summa cute sit abscessus) tunc ad chirurgiā nos conuertimus. At  
si neq; ad tactū subsidat ac occurrat, neq; fastigietur, eo quod in profundo  
cōsistit, alijs mutationis signis intēti chirurgiā adhibebimus. Sciendū tamē  
q; etiā ante perfectā in pus mutationē aliquādo crudos adhuc abscessus seca-  
mus, ubi uel articulis, uel principalib; partib; fuerint uicini, ut ne perseverā-  
te putrefactione simul corūpatur ligamētū, aut pars aliqua necessaria. Sed  
& prope sedē abscessus, ante perfectā concoctionē, crudos secare iubet Hip-  
pocrates, timēs ne in perforationē procedāt. Secamus itaq; nō in omnibus  
similiter sectionē facientes, sed lineas naturales, uelut in facie, & pilorū ex-  
ortus, uelut in capite sequētes, decoris, quātū fieri potest, curā habebimus.  
In artubus aut in directum secantes, uelut in musculis & tendinibus, & ner-  
uos et arterias, et principales partes uitātes, securitatis rationē habebimus,  
ita ut modo in directum secemus, modo transuersim abscessum diuidamus,  
prout res singularim postularit. In minoribus itaq; abscessibus, unā sectio-  
nem faciemus. In magnis, plures, pro magnitudinis ratione ubiq; tenuiora  
& ad subeffluxionē commoda uulnūcula secātes. Et qui quidē plurimum  
fastigiati sunt abscessus, & crudi, & tennes, ac mortificati, eos amputamus,  
iuxta triangulū, aut myrti folij formā, aut aliam angulārē figurā, ablationē  
facientes, quum circularis figura inepta sit ad cicatricem inducendam. Qui  
uero fastigiati non sunt, eos solum simpliciter secabimus. At si magnum si-  
num repperimus, si quidem carnosus fuerit, & glutinari potuerit incumbē  
cutis, ad defluxionem solum utemur loci sectionibus. Si uero tenuis & uale-  
de

*Figura circula-  
ris inepta  
cicatrici*

de excarnis sit cutis, totum secundum longitudinem simplici sectione diuidemus. Et post simplicem sectionem, si tenuia valde, & non carnosa appa-  
uerint utrinque corpuscula, ipsa amputamus. Post chirurgiā, facta per spon-  
giā deterfione, si parvus est abscessus, & sectio una, simplici linamento ute-  
mur. Sin magnus & plures sectiones, etiam lemniscum qui pertrahi possit,  
per ipsas ducemus. Eos uero qui amputari sunt, similiter linamentis implebi  
mus. At si sanguis erumpat, aqua frigida aut posea utendum est. Verum eru-  
ptione sanguinis perseverante, chalcitidis puluillum inspergemus, quo eti-  
am ob flaccidam putredinem sepe utemur. Caterum splenia hyeme, & in  
neruosis corporibus, uino & oleo imbuta imponemus. Aestate uero & in  
corporibus carnosis, aqua & oleo, aut etiam uino & oleo frigidis, & facta  
deligatione, posttridie his ipsis liquoribus irrigabimus. Tercio uero, die fa-  
cta solutione, & per spongiam deterfione, tetrapharmaco linamentis ilito  
utemur. Et si inflammatio absit, eandem irrigationem ad linamenti conser-  
uationem imponemus. Si uero adsit inflammatio, cataplasma concoctoriū  
superdamus, perfusionibus prius usi. Sedata autē inflammatione, luppuran-  
te & incarnante medicationis ductu curabimus. Sed & sinus glutinatorijs  
medicamentis sanabimus, uelut in quarto de sinibus dictum est.

## De strumis Cap. XXXV.

Struma est tumor induratus circa collum, & alas, ac inguina maxime co-  
sistens. choeras græcis appellatur, aut à choeradibus petris, aut à suisibus,  
eo quod multiplici foetu fecundum est animal, aut quia lues eiusmodi colla  
habent. Nascuntur autem strumæ aut circa anteriores colli partes, aut circa  
alteram ipsius partem, aut circa utraq; & aut una, aut duæ, aut plures. Om-  
nes autem in proprijs pelliculis continentur, quemadmodum steatomata,  
& atheromata, & melicerides. Dolorose itaque, et quæ ad contractum, ac  
impositionem medicamenti, deteriores fiunt, malignæ sunt, quas sanè eti-  
am canceratas quidam appellarunt & manifestum est ipsas non ita ualde  
chirurgijs cedere. Benignas igitur & ad tactum, & ad tempestiū medica-  
mentorum usum, hoc modo aggredi oportet. Quæ in summa cute con-  
sistunt, & ad cutem repunt, simplici sectionis usu, ab incumben-  
tibus corporibus exoluemus, et disticta hamulis cute, labia à pelliculis liberabimus,  
uelut in uasorum exsectione docebamur, & paulatim auferemus. Maiores  
uero hamilis transfixas leuabimus, & similiter excoriantes undiq; à conti-  
nentibus ipsas corporibus absoluemus, ita ut ubiq; carotidas appellatas, so-  
porarias arterias, & recurrentes nervos uitemus. Si uero uas aliquod diui-  
sum operi impedimento sit, laqueo ipsum constringimus, aut penitus per to-  
tum recidimus, si non ita magnum existat. Et quæ strumæ fundum ad angu-  
stiam deuenerint, induratiè ipsam resecamus: Et demisso indice digito scru-  
tabimur, an etiam aliæ strumæ adsint, ipsasq; eodem modo auferemus. At si  
magnum aliquod uas, aut etiam plura circū strumæ fundum suspectum ha-  
buerimus, non ex fundo ipsam recidemus, sed laqueo cōstringemus, ut par-  
ticularim citra periculum sua sponte excidat. Et tunc sanè curationis per li-  
namenta ductum adhibebimus. Si uero illico resecetur, labia contrahemus.  
Omnino uerò sectiones in directum facere oportet, & si nihil superflui ha-  
buerint, statim consuemus. Si uero ex strumæ mole, aliquid de cute redun-  
dat, parte ipsius ad myrti folij figuram recisa, suturis utemur, & medica-  
mentum cruentis uulneribus accommodatum super imponemus.

## De Steatomatibus, atheromatibus &amp; meliceridibus. Cap. XXXVI.

Quum abscessuum generis & hæc sint, in hoc differunt, quod qui pro-  
prie abscessus uocatur, inflammari sunt ac dolorosi, ac rēq; & erodentē  
humorem continent, & non in propria pellicula aut tunica continentur.  
Differunt autem hæc inter se, quia hoc quod in steatmate continetur: iu-  
sta nominis rationē, seu simile est: quod in atheromate, pulti ex frumen-  
to: quod in meliceride, mellis. Dinoscens autem ipsa hoc modo. Steatoma alijs

Lemniscus

Struma  
Choeras undeCarotides ara-  
teriae  
Nervi recurre-  
ntesSteatoma  
Atheromata  
Melicerides

durius est, & ad tactum remittitur, fundumq; solidius habet. Medicis autem tangētib; uelut corpus quoddam laxum cedit, & tardē quidem diffunditur, cito autem rursus colligitur. A quo chirurgiam his similiter uelut strigis adhibemus, in sectione, & excoaratione, & suturis, ac reliqua curatione, id modo ut uitemus, ne & pelliculam sauciemus, eo quod contentus humor effusus impediatur chirurgiam: & ne partem ipsius relinquamus, quae regenerationis plerumq; causa sit, circa manuum iuncturas, & malleolos, & partes quae secundum articulum mouentur: quemadmodum etiam struma si aut tota, aut pars ipsius relinquantur. Quod si tale quid reliquum fuerit, melius est non fuisse, sed erodentibus medicamentis relicta consumere.

De Arteriae dilatatione.

Cap. XXXVII.

Arteriae dilatatio

Aneurysma

**D**ilatatio arteriae, tumor est ad tactum mollis, & digitis cedens, ex sanguine & spiritu generationem habens. Et Galenus de ipsa dicit, Arteriae osculo aperta, affectio appellatur aneurysma id est dilatatio. fit etiam arteria sauciata, ubi quidem incumbens ipsi cutis ad cicatricem deuenerit, manifestum autem uulnus arteriae neq; conglutinatae, neq; cicatrice obductae, neq; carne obcuratae. Cognoscuntur autem huiusmodi affectiones, ex pulsu arteriarum. Imo etiam ubi comprimuntur arteriae, tumor omnis disparerit, substantia ipsam efficiēte ad arterias recurrente. Haec Galenus. Nos autem ipsas inter se distinguimus hoc modo. Quae ex osculi arteriae apertione sunt, oblongiores apparent, & in profundo consistunt, & ad digitum impressio, nem, uelut strepitus quidam auditur, quum in affectionibus ex ruptione nullus sonitus audiatur, & sint quoq; magis haec rotundae, & in summo occurrant. Quae igitur in alis, & inguinibus ac collo sunt, itemq; in alijs locis, si magnitudine excedunt, eas chirurgia non tentamus, ob magnitudinem uasorum. Quae uero in extremis partibus, & artubus, aut in capite consistunt, eas sic aggredimur. Si ex apertione tumor factus est, sectionem rectam in longitudinem cuti insigimus. Deinde disparatis per hamulos labijs, uelut in uasorum exsectione dicebamus excoarantes, & per apta ad hoc instrumenta à membranis repurgantes, arteriam nudabimus, & acus sub ea transmissione, & per duo fila deligatione usi, ubi prius intermediam arteriae partem scalpello punxerimus, & quod continetur in ea euacuauerimus, suppurante curatione utemur, donec deligata filorum uincula excedant. Si uero ex arteriae ruptione dilatatio facta est, totum ipsum quantum eius fieri potest, unā cum cutē, digitis praeherere oportet. Deinde acum infra apprehensam transire, quae duplex filū trahat per post sectionē, ipsam duplicis filū ansam dissecare, & sic per duo fila tumorem hac illac deligare, uelut de strumate dicebam. Quod si tumor sit, ne fila dilabant, etiā alia acus transmittenda est, quae priorem per totum premat, similiterq; duplex filum trahat, & ansa dissecta, sic per quatuor fila tumorem deligabimus. Aut apertio iuxta medium tumore, post excretionem eius quod in ipso continetur, cutem amputamus, eo quod deligatum est relicto, & splenio uino ac oleo imbuto imposito, curatione per linamenta utemur.

Brouchocele  
Ramex gutta  
ria

De Gutturis ramice.

Cap. XXXVIII.

Ganglion

**T**umor sit in collo magnus & rotundus ex internis partibus, qui brouchocele graecis, latinis gutturis ramex appellatus est. Differētia ipsius duae sunt. Aliae. n. siccatae, aliae arteriarū dilatationes referunt. Quae igitur dilatationes referunt, eas ex iisdē notis quibus illas cognoscemus, & uelut de speratis reprobabimus quū omnes arteriarū dilatationes sunt periculosam aggressionē habeant, praecipue tamē quae circa collū consistunt, ob magnitudinē arteriarū. Quae uero siccatae referunt, eas sunt ut siccatae chirurgiam tractabimus, discretis ac transgressis uasis, eodem modo uelut de strumis dicebamus.

De Ganglio

Cap. XXXIX.

**G**anglium nerui in nodum coactio est, ex plaga aut laeore oborta, quae plerumq; circa manuum iuncturas, & malleolos, & corpuscula quae secundum



secundum articulum mouetur, consistit: fit tamen etiam in alijs partibus. Consequitur tumor concolor, renitens, doloris exors. Si uero quis uoluerit comprimere, torpidum sensum exhibet, non in profundo, sed sub ipsa cute consistens, & ad latera quidem transfertur, prorsum ac retrorsum nequaquam, etiam si quis per uim protrudat. Quæ igitur in cruribus, aut brachijs, aut extremis partibus consistunt, ea excidere tutum non est periculum. n. est ne mutila pars fiat. Quæ uero circa caput aut frontem sunt, ea aggredimur, cutem scalpello diuidentes, & si quidem parua fuerint ganglia, uolsella ipsa præhendentes, & ex fundo recidentes. Sin maiora, hamulis transfixa excoriamus ac amputamus, & labijs per suturas contractis, medicamento cruentis uulneribus commodo curamus.

De uena sectione. Cap. XL.

Vene sectio

Vene secandæ modus etiam si omnibus sit manifestus, tamen ut nihil quod ad chirurgiam pertinet desit, & propter artificiosas ipsius dissectiones, non erit nobis negligendus. Primus itaque uenæ sectionis scopus est redundantis sanguinis euacuatio. Duplex autem sanguinis redundantia demonstrata est. Vna ad uires, etiam si uenæ non plenæ appareant, ob quæ cito debiles & infirmi sunt, quum natura grauitatem, uelut onus quoddam ferre non possit. Altera ad continentia ipsum uasa, quæ in ipsa sanguinis sutura spectant, etiam si uires citra molestiam ipsum ferant. Ex qua dum rumpuntur aliquando uasa, sanguinis spuitiones, aut aliæ fluxiones contingunt. Redundantiam igitur ad uires, ex corporis grauitate cognoscere: ad uenas, ex distentione, & quod ipsæ repletæ apparent. Ambæ uero euacuationem indicant. Proinde etiam in prima morbi die aliquando uenam secabis, si necessitas urgeat, sola ciborum in uentriculo concoctione, aut etiam perfecta in hepate sanguificatione expectata. Si uero ab aliquam causam, uenæ sectio ab initio non fuerit assumpta, etiam ultra septimum diem uenam secare nihil absurdi fuerit, si & necessitas exigat, & uires non repugnent. Considerare insuper oportet eum qui uenam secare uolet, num multum stercore sit in intestinis retentum, quod si est, mollis prius infusus per dysterem illud euacuamus, ne uenæ ab intestinis aliquam putredinosam superfluitatum substantiam attrahant. Qui igitur ob præsentem morbum, sanguinis detractione opus habent, eis omni tempore uenam secabimus, uigore solum particularium exacerbationem in febris uitato. Si uero continua febris fuerit, omnino matutinum tempus commodius erit. Qui uero morbo non præsentente, præseruationis tamen gratia, sanguinis euacuationem requirunt, his Ver commodum est. At uero in ætatis, usque ad annum decimum quartum, euacuatio sanguinis recusanda est, quemadmodum etiam post sexagesimum annum, si non ineuitabilis necessitas nos cogat: & in summa, qui debiliores uires habent uitandi sunt. In partibus itaque recens inflammatis, ex oppositis partibus euacuationem facere oportet. In diuturnioribus inflammationibus, ex uicinis. In multis equidem corporis locis uenam secamus, plerumque tamen in ipsa cubiti intrinsecus flexura. Verum attendendum est. Nam internæ uenæ, quæ alaris appellatur, artetia subiaceret: Mediæ neruus: Superna, humeralis etiam appellatur, penitus omni metu uacat. Et in morbis quidem circa caput, humeralem secabimus: In his qui sunt infra collum, alarem: Vtrisque uero conuenit media. Oportet igitur partem aliquam circa brachij musculos, angusta quadam fascia deligare, & per manuum frictionem mutuam, repletam uenam cam quæ necessitati commoda est, transuersim diuidere, secundum totam ipsius latitudinem solum. Nam maiora quam pro hoc modo uulnuscula, æque cicatricem recipiunt: & quæ ualde angusta sunt, ad hoc quod crassioris humoris transitum impediunt, etiam inflammationem inducunt. At in quibus secunda die, aut tertia, quandoque etiam quarta, detractionem repetere uolumus, in his obliquius uenam secare oportet, quo in brachij flexura

Sanguinis redundantia duplex

Vicina & oppositæ partes quando secantur

Vene. III. in cubiti flexura  
Humeralis.  
Mediæ.  
Alaris.

xione hians, non cito cicatricem recipiat. Sic. n. Antylo uisum est. Ceterum quantitas eius qui euacuatur sanguinis, & uirium robore, & morbi magnitudine iudicetur. Si igitur humoris multitudo subest, & materia seruet, semel ad animi deliquium usque euacuamus, ualidis uidelicet adhuc uiribus, ægroto non propterea quod humor ad stomachum defluxit, animi deliquium patiente. Nam hac de causa multi statim ab initio, ante sufficientem euacuationem animo linquuntur: sed ratione euacuationis, his animi deliquium fieri oportet. Si uero multa quidem opus sit euacuatione, uires autem fuerint imbecilles, partiri euacuationem oportet, & prima detractione defectuosiore facta, rursus si opus fuerit, & tertio detrachere. Euacuamus autem totum non solum in repletionis affectione constitutum corpus, uelut Galenus ait, sed etiam ob magnitudinem affectionis, toto corpore in humorum commodatione constituto, uelut in sanguinis ex naribus, aut aliunde eruptione, quum non redundantia est, quæ profluit, etiam ex oppositis reuulsorio modo euacuamus. Imo etiam in uehementibus inflammationibus, quemadmodum in colicis, & rhenibus ex calculo laborantibus, lippitudinibusque & alijs acutis morbis urgentibus. Nam dolor, & color paritis inflammatae, causæ sunt fluxionis, etiam si totum corpus non habeat superfluos humores. Tunc itaque defectuosius hoc ipsum facere oportet, & ea euacuatione uti quæ conuenire uidentur ætati maxime, & ægroti naturæ, considerando insuper etiam tempus, & regionem, & consuetudinem ægroti. At uero in quibus iuxta diuisam uenam, inflammatio quædam magna est, quemadmodum in pleuriticis & hepaticis, in his optimum est expectare sanguinis mutationem in colore & compage. Alius autem est sanguis in inflammatione, ab eo qui secundum naturam est. Nam dum amplius calescit, si prius crudior erat, rubicundior & flauior euadit. Si uero talis prius erat, ad nigriorem colorem adassatus permutatur. Non tamen omni modo mutationem expectare oportet, sed aliquando etiam antea quam fiat, cessare conuenit, atque hoc duplici de causa. Nimirum aut ob uirium debilitatē, quam ex pulsuum tactu cognoscēs. Inuenies. n. ipsos inæquales in uehementia & magnitudine, uel etiam obscuros. Et fluxionis uigor labascens, debiles iam uires indicat: aut etiam ob inflammationis malignitatē. Quandoque. n. nihil remittit, sed uehementer adstricta est. Arsi nihil horum impedit, & ægre in uigore ætatis fuerit, mutationem expectare oportet, & hoc eo magis si ambiens aer temperatus fuerit. Porro si sanguis ante sufficientē euacuationem suppressus fuerit, id quod fit, aut ob timiditatem & animi deliquium, aut ob grumum, aut ob uolentam constrictionem, ad singula hæc initabimus: & animi quidem deliquium, odoramentis reuocamus: constrictionem uero, remisso uinculo laxamus: grumum autem oleo affuso, aut digitorum foru dissoluimus. Reliquis secandæ uenę apparatus, omnibus notus est. Atque hæc quidem in uenis flexuræ cubiti competunt. Si uero a frōte, uelut in capitis doloribus, detractio fieri debeat, fomento prius adhibito, fasciæ collum ipsis deligabimus, digito iuxta guttur immisso, ut suffocationē uitemus, & uenam in fronte repletam scalpelli uenę incisorij, aut alterius acie secamus. Eodem modo etiam singulares uenas in summa cute extantes, in lippitudine diuturna secamus, per specilli concauum sanguinis effluxionem facientes. Sed & sub lingua uenas, uelut in anginx affectione transuersas incidimus, uitata constrictione. Quidam etiā in magnis oculorū angulis conspicuas uenas, uelut in diuturnis capitis & oculorum morbis, eodem modo, secant. In quibus etiam eas quæ inter nares sunt aut compressione per specilli caput, aut per asperas quasdam res irritando rumpunt. Quin & uenas retro aures, propter affectiones circa caput diuidunt. Aut eas quæ circa poplitem sunt, in rhenibus affectis. Eas uero quæ in extremis partibus sunt, ubi & superius sitarum partium uinculis, & manuum confrictione, & pedum ambulatione repleuerunt, secant, in sinistra quidem manu, in

*Animi deliquij cause in uenę sectione*

*Indicationes euacuandi sanguinis*

*Venę frontis sectio*

*Venę sub lingua*

*Venę retro aures*

splenicis, eam quæ inter paruum & annularem digitum est; In hepaticis autem eam quæ eodem loco in manu dextra est. Nam extremarum partium euacuatio, quum magis & longinquo fiat, efficaciorē reuulsionem facit. In pede uero, uelut in coxendicum morbo, aut in uteri affectionibus, superiorem interno talo uenam secant.

De cucurbitula.

Cap. XLI.

**N**eq; in principiis affectionum, neq; dum repleta sunt corpora, cucurbitulis utimur, sed ubi totum corpus prius fuerit euacuatum, & nihil amplius insit parti, & opus fuerit aliquid mouere, agitareq; ac foras trahere. Leuis itaq; cucurbita inflationes soluit, & stomachi fluxiones sistit, & sanguinem attrahit, & eundem si feratur, rursus sistit, si oppositis partibus adhibeatur, & quod in profundo est, ad summam cutem educit. Et in summa, humorum quidem translationem, flatuum autem euacuationem efficit. Quæ uero cum scarificationibus affigitur, efficaciorē transpirationem causis præbet, ea quæ adfligunt ex profundo, ita ut sensu percipiamus, educens. Non enim sanguinis solum, sed etiam aliorum humorum euacuationem facit, & præsertim si cū largiore flamma adhibeatur. Verum si de carnosissimis partibus detractionem facere uolumus, primū facta scarificatione, postea cucurbitam imponimus. Si uero minus carnosæ fuerit pars, leuem cucurbitam prius agglutinabimus. Vbi uero in molem eleuata pars est, facta scarificatione rursus ipsam imponimus. Et si quidem parum uacuare uolumus, una fissura contenti erimus: Si plus, plures incutiemus. Et si tenuiorem contentum sanguinem deprehenderimus, in summo scarificabimus: si crassius, in profundum, quum etiam grumos sanguinis ex plaga euacuare uouerimus. Terminus autem moderatæ fissurarum profunditatis, crassiuscula sola cutis est. Quidam instrumentum ad hoc excogitarunt, tribus æqualibus scalpellis simul coniunctis, quo una aggressione tres fissuræ infligeretur. Verum nos hoc inutile ducentes, uno scalpello utemur. Alij uitreis cucurbitis utuntur, eo quod euacuatæ sanguinis quantitas in ipsa attractione ex ipsis pellitur, sed magis trahunt æræ, ampliore flammam sustinentes, quum uis præ facile frangantur. Sed & qui per cornua ore sugentes attrahunt, minus quidem euacuant, nihil autem resicant, quemadmodum quæ cum flamma adhibentur, si opus fuerit. At ubi iam cucurbitam affigere uoluerimus, erecta parte figurata, ex latere ipsam agglutinabimus. Si enim iacentibus ipsis funiculum lucernarium supernè admouerimus, una cum flamma in cutem illabens uehementer urit, nulla necessitas hoc exigere. Quandoque uero etiam cucurbitæ magnitudo sit pro ratione subiectæ partis. Hæc enim de causa etiam multæ sunt cucurbitarum, iuxta paruitatem & magnitudinem differentiarum: quemadmodum etiam aliquæ longiore collo, & ampliore uentre, fiunt ut magis quam aliæ trahant. Cauendum autem est ne prope mammæ cucurbitam adhibeamus. Illabentes enim in ipsas, & quandoque inde intumescentes mammæ, faciunt ut ualde difficulter illæ auelli possint. Et tunc spongijs ex aqua calida cucurbitas circumdare oportet. Ita enim remittunt. Si uero neq; sic remiserint laxatæ, iam perforatæ ipsas oportet.

De Aleustione.

Cap. XLII.

Aleustio

**I**n humeri coarticulatione contingente luxatione, in quibusdam sæpe & frequenter brachij caput excidit, aut ob redundantem humiditatem, aut quod ob assiduam eluxationē, loco huic uia facta est. Tunc igitur ad uisionem deuenimus. Oportet itaque aut supino, aut in sanum latus reclinato ægro, interiorem alæ cutem, qua parte maxime articulus excidit, duobus sinistræ manus digitis, aut uollesla distendere, & tenuibus ac oblongis ignitis cauterijs perurere, ita ut ex cauterio quod in aduersam partem pertrudimus, per unam aggressionem dux crusta fiant. Et si multo inter has fuerit spacium, specilli capite per ipsas transmissio, aliam in medio crustam faciemus,

urentes donec cauteriū contingat specillum. Sed & alias duas crustas uult fieri Hippocrates, ab utraque parte mediæ relatae, æquali intervallo uelut illæ distantes, iuxta quadranguli figuram. Profunditatem autem inuremus non altioreni cute. Nerui enim & glandulae, & alia subsistent, quæ inflammationem & operis difficultatem inducere possunt. Curare autem oportet per porri cum sale trito impositionem, & per reliquam ad crustas pertinentem curationem. Et postea caute actiones per manus obeunda strachare.

De agnascendis digitis, & de sedigitis.

Cap. XLIII.

Digitus agnascens

agnascens

Digitus agnascens

**A**gnascuntur digiti circa manū, quandoque prope magnos digitos, quandoque iuxta paruos, raro autem circa alios digitos uisunt. Qui uero ita agnascuntur, partim per totum carnosum sunt, partim etiam ossa in se habent, quandoque etiam ungues. Qui ossa habent, partim ab articulo exortum habent, in commissura ad articulum cum altero digito communicantes, partim ab internodio enati sunt. Qui igitur ab interno dio, siue spacio inter articulos, enati sunt, penitus immobiles sunt. Reliqui quandoque mouentur. At carnosum foris facilius est amputatio. Quicquid enim superuacuum est, per totum penitus scalpello refecimus. Eorum uero qui ab articulo exortum habent, difficilior est aggressio. At eorum qui ab internodio enati sunt, carnem primam in circulum ad os usque refecimus. Ipsum uero os excisorio scalpro dissecamus, aut seta amputamus. Deinde in curatione radimus ipsa, & cicatrice obducimus, quemadmodum de uulneribus in ossibus diximus.

De chirurgia & uestione suppuratorum.

Cap. XLIII.

Suppuratorum  
pectore uestio

**E**fficacissimum auxilium pectore suppuratis uestio inuenta est. Oportet igitur aristolochiae longae radicem oleo imbutam, ipsis per ignita cauteria uestis, in crustas indere, quarum una inter clauicularum commissuram inusta sit, sursum iracta cute. duae uero partae, paululum ad mentum à saporatis arterijs procedendo. duae sub mammas grandiores aliquanto, inter tertiam & quartam costam. Aliae duae inter quartam & sextam paululum nutantes retrorsum. Et alia in medium pectus. Et alia supra os uentriculi. Tres autem à tergo, una in medium dorsum, & ab utraque spina parte duae, eam quae in dorso est crustam transgredientes, non ita in summa cute. Alij uero, uelut etiam Leonides ait, cauterio oliuari igni candefacto per intermedium costarum spacium, qua parte abscissum esse notarunt, usque ad pus uestionem fecerunt. Quidam etiam chirurgia in his uti ausi fuerunt, per medium quintae ac sextae costae, transuersa sectione paululum suboblique cute diuisa, atque ita per acutum cultellum membrana costas succingente perforata, et pure excreto. Verum & hi, & qui per ferrum in profundum usque urunt, aut statim mortem inducunt, uitali spiritu aceruatim una cum pure euacuato, aut fistulas incurabiles efficiunt.

De cancro

Cap. XLV.

Cancer

**C**ancer tumor est inaequalis, asper, ab omnia bilis, subfluidus, dolorosus, quandoque absque ulceratione, quem etiam occultum Hippocrates nominauit, qui etiam ex chirurgia deterior euadit: quandoque uero ulceratus. Nam ex atra bile generationem habens, plerumque erosionem perpetitur. Et in pluribus quidem corporis partibus consistit, maxime uero circa uterum & mammas in mulieribus. Habet autem & uenas undique extensas, uelut animal cancer pedes, unde etiam nomen ipsi inditum est. Curationem equidem ipsius per medicamentum, in quarto libro sufficenter diximus. Eius uero qui in utero consistit, libro tertio. Quandoquidem uero corpora putrefacta, aut simpliciter à naturali situ digesta, ablationem expetunt, eos caneros qui in utero consistunt, ut chirurgia tentemus, fieri non potest, neque conducibile est. Proinde eorum qui in externis partibus, & praecipue circa mammas sunt, chirurgiam trademus. Quidam igitur cauterijs totum id quod redundat consumunt. Alij tota mamma excisa urunt. Galenus chirurgiam per sectionem solum assumit, hoc modo scribens. Si tamen aliquando ausus fueris per chirurgiam curare cancerum, ab atrabiliarij humoris purgatione eua curare incipe. Deinde

tota

totā affectā parte exacte resecta, ut nulla radix relinquatur, sanguinē effluere sine, & non cito cohibere, sed etiam circūlitas uenas preme, crallum sanguinem ex ipsis exprimēs. Postea similiter uelut alia ulcera cura. Hęc Galenus. Sed & reliqua maligna ac putredinosa ulcera, phagedenas, & gangranas, & consimilia, eodem modo per chirurgiam aggrediemur.

Phagedena  
Gangrena

De Turgentibus mammis in uiris.

Cap. XLVI

Quemadmodum in foeminis, ita etiam in maribus, circa pubertatis tempus, mammae aliquantulum inturgescunt. Verum plerisque rursus subsidunt. In quibusdam uero initio sumpto augeſcunt, adipe subenascēte. Hęc itaq; res quum effeminatæ naturæ opprobrium afferat, chirurgiam metito requirit. Proinde lunata sectione in internam mammae partem facta, & excoriatione sequuta, pinguedineq; detracta, suturis oras committimus. At si forte ob magnitudinem mammae suis partibus deorsum, uelut in foeminis, natat, duas lunares sectiones iuxta extremitates sese mutuo cōtingentes incidemus, ita ut minor à maiore comprehendatur: & intermedia cute excoriata, ac pinguedine detracta, similiter suturis utemur. Si uero aberrantes minus reſecuerimus, ea parte quæ redūdat rursus amputata conſuemus, & medicamentum cruentis uulneribus destinatum imponemus.

Mammae uirorum  
inturgide

De hepatis uisione.

Cap. XLVII.

Si cum grauitate dolor fiat his qui in hepate abscessum habent, carnosā ipsius pars affecta esse indicatur. Si uero acutus est dolor, in tunica magis pars est, & uisionem sic facere oportet. Cauteria tenuia oliuaria exacte candefacta, paululum supra inguen ad finem hepatis transmittimus, unam crustā incutientes: Perusta uero tota cute, & ad tunicam usque perducti, pus excernimus. Post cuius euacuationem, lenticula cum melle uli, medicamenti ex aqua mulsā & incarnantibus speciebus, postea uero etiam cicatricem inducentibus, utemur.

Hepatis uisio

De splenis uisione.

Cap. XLVIII.

Cute spleni incumbente per hamulos distenta, longo candenti cauterio per totum ipsam penitus perurimus, ita ut una aggressionē duæ crustæ fiant. Atq; hoc trifariā facimus. Vt omnes crustæ sex fiant. At uero Marcellus tridente, aut cauterio tridentis formam habente utens, una aggressionē sex crustas inurebat.

Splenis uisio

De stomachi uisione.

Cap. XLIX.

In diuturnis stomachi fluxionibus iuniores uisione uſi sunt. Et alij quidem oliuariis cauterijs tres crustas incutunt, Vnam in cartilaginē gladii referentem, alteras duas inferius, iuxta triangularem figuram, eā profunditate ut totam cutem perurant. Alij uero unam solum faciunt, eamq; maiorem, iuxta ipsum uentriculi osculum. Quidam neq; ferro urunt, sed isels uocatis. Sunt autem isels spongioſa quædam corpuscula, in quercubus & nucis regium arboribus nascētia, quæ Barbari magis in usu habent. Vlcera uero aliquādiu sinunt, nec cicatricem ipsis inducunt. Imò magis insuper ipsa lancinant, quo ob multā per ipsa exhalationē, os uentriculi fluxionē nō infestef.

Stomachi  
uisio

Isels quid sint

De hydropē.

Cap. L.

Quum hydrops siue aquæ inter cutem constitutionē, & quot huius sint differentiæ, & quæ causæ, cognitionem item, & per medicamenta curationē, tertio libro tradiderimus, & in illo etiam antea ostenderimus, quod solus Ascites hydrops chirurgiam admittat, hanc nunc tradituri sumus. Eredum itaq; statuemus hominem, sin minus id fieri possit, in sella collocabimus. Si uero neq; hoc fieri possit, recusanda est nobis chirurgia in eo qui ad tantam debilitatem deuenit. Stante itaq; erecto homine, iubebimus ministros à tergo ipsius stantes, ut tumoris molē per manus comprimant, & deorsum ad pectinem protrudant. Nos autem accepto cultello acuto, aut uenæ incisorio scalpello, si quidem à partibus circa intestina hydrops obortus est, iuxta perpediculum umbilici, tribus sub ipso digitis interpolitis, abdomen

Hydropicorum  
sectio

ad per,

ad peritonæon usq; appellatam membranam diffecamus. Si utero hepate pri-  
 mario affecto, ex similis umbilici partibus secamus. Si à splene, in dextris.  
 Non enim secanda est ea pars in quam ager decumbere debet. & excoriam  
 per instrumenti aciem cute incumbente, paululum supra priorem sectionē,  
 etiam ipsam peritonæum membranam diffecamus donēc ad uacuum locū  
 scalpellum peringat. Postea uero æneam fistulam, quę ad calami scriptorij  
 similitudinem exacta sit, & per abdominis, & per peritonæi sectionem de-  
 mitemus, & per ipsam humorem educemus pro uiribus moderatum, quia  
 ex pulsus contactu cognoscemus. Deindeeducta fistula humorem sistemus.  
 Sistetur enim statim ob alteratam illam factā sectionem. Sed & nos securita-  
 tis gratia, linamentum intortū per solam abdominis sectionem demitemus  
 & reclinato ac refocillato homine. postera die rursus parū humoris pro ui-  
 rium ratione, per fistulam euacuabimus, atq; ita consequentibus deinceps  
 diebus, donec quā minimum ipsius undiquaq; relinquatur, acruatam e-  
 uacuationem cauentes. Multi enim ex imperitia rem bene tractare cupidi,  
 unā cum humore etiam uitalem spiritum acruatim euacuauerunt, atq; ita ho-  
 minem occiderunt. Cæterum qui magis securitatis curam habent, modica  
 humoris per chirurgiam facta euacuatione, quo uires saltem à grauitate le-  
 uentur, reliquum per medicamenta aquam ducentia, & per arenam, solem,  
 sitim, & siccantia alimenta consumunt. Quin & uisione quidam uisunt, in  
 stomachum, hepar, splenem, imum uentrem, & umbilicum, quinque crustas  
 inarentes, alij ferreis tenuibus cauterijs, alij per ilcas appellatas, aut per aliq;  
 quandam eiusmodi materiam. Et multi sane hac ratione magis sanati sunt,  
 aliquando penitus nulla facta perpunctione.

De umbilici prolapsu.

Cap. LI.

Umbilicus pro-  
lapsus

Umbilici prolapsus fit aliquando rupta iuxta illum peritonæo membra-  
 na, & aut omento, aut intestino prolapsio: aliquando uero lento humo-  
 re sub umbilicum collecto, quandoq; aut carne subter excrecente: & quan-  
 doq; sanguine eò collato, ob uenę aut arterię ruptionem, uelut in arterię  
 dilatatione: quandoq; non sanguine, sed spiritu solū illic collecto. Si igitur  
 omentum foras prolapsum fuerit, tumor circa umbilicum concolor, ad ta-  
 ctum mollis, doloris exors, & inæqualis apparet. Si uero intestinum, supra  
 relata etiam amplius inæqualis, & ad digitorum compressionem dispans,  
 quandoq; uero etiam strepens, & ex balneis ac distentionibus magis auge-  
 scens. At si humor fuerit, mollis quidem similiter est tumor, sed ad compres-  
 sionem non cedit, neq; minuitur, neq; augefcit. Si uero sanguis, ad prædicta  
 signa, tumor etiā liuidior fuerit. Carne uero subter enata, durior & renitens  
 erit tumor, & in eadem magnitudine permanens. Qui uero spiritus inflatio-  
 nem illic collectam habent, his mollesces ad tactum adest, & sonitus quidā  
 sequitur ad pulsationem, & disparet ad compressionem. Hoc igitur modo  
 chirurgiam adhibebimus. Erectū hominem iubebimus, ut spiritu suppresso  
 seipsum distendat. Deinde tota umbilici prominētia circū circa atramento  
 scriptorio notata supinū eabimus, & iuxta notas factas, tumorē scalpello  
 circūscarificabimus. Postea mediā parte per hamulos distictū, filiū aut chor-  
 dam scarificationi circūdabimus. Sic enim retinebitur non dislabens, an-  
 nato nodo connexionē facta. Deinde constricō tumorē circa uerticem aper-  
 to, indicem digitum demitemus, diligenterq; perscrutabimur, anne aliqua  
 intestini conuolutio, aut omenti pars simul fuerit constricta. Et si quidē in-  
 testinum fuerit id quod constrictū est, ansato fili nodo laxato, ipsum interō  
 compellemus. Si uero omentum fuerit, hoc attractum quantum eius super-  
 uacanei fuerit resecamus, filo deligantes uelut par est, si quod uas intercur-  
 rat. Postea acceptis duabus acubus simplex filum ducentibus, iuxta Chias-  
 mum, hoc est ad literę gręcę. χ figuram, ipsas per factam scarificationem  
 transmittemus. Et dissectis filorum ansati nodi sinibus, uelut in uenę dilata-  
 tione dicebamus, ex quatuor principijs constricōnem faciemus. Postquā  
 uero

Nodus ansatus

Chiasmus

vero computriscerint ac exciderint corpuscula filis deligata, linam entorum ductu curabimus, ut cavior cicatrix fiat semper studio habentes. Atque hæc quidem omento aut intestino affectionem inducentibus adhibemus. Si vero caro, aut humor, aut sanguis, affectionis causa fuerit, media tumoris parte circum circa ablata, & quicquid extra membranam peritonæon, iuxta umbilicum insitum est, eo educto, iuxta concarnationis modum curationem faciemus. Cæterum affectionem prolapsi umbilici, ex arteriæ dilatatione, aut spiritus interlapse obortam, repudiamus, uelut etiam reliquas arteriæ dilatationes.

De peritonæi membrane uulnere. Et de intestini, aut omenti prolapsu. In quo etiam  
modus suendi ventrem. Ex Galeno. Cap. LII.

**Q**uomodo quis uulneratam peritonæon membranam optime tractarit, consequenter considerandū est. Si igitur parvus fuerit uulnus, ut prolapsum intestinum inflatum non amplius reprimi possit, necesse est aut illud euacuare, aut uulnus maius efficere. Melius autē esse puto prius illud facere, si fieri possit ut id assequamur. Quomodo uero quis hoc magis assequi possit, si causam ex qua intestinum inflatur amoveat. Quæ igitur est hæc ambiens aeris frigiditas, quare etiam per calefactionem sanatio contingit. Spongiam igitur mollem aqua calida imbuiere oportet, deinde exprimere, & per ipsam intestinum calefacere. Interim uero præparetur uinum austerum calidum. Nam et calfacit magis quam aqua, & intestino robur indit. Si uero ab horū usu, intestinum adhuc permanserit inflatum, tantū de peritonæo incidere oportet quantum opus habet id quod prolapsum est. Ad talem autem sectionem commoda sunt fistulis secandis apta instrumenta, syringa, toma recta appellata. Commoda est etiam ægro, uulnere in infernis partibus factum, figura decubitus sursum uergens: in supernis, deorsum: & in dextera parte factum uulnere, in sinistram reclinari, & uicissim in sinistra, in dextram. Atque hoc tum magnis, tum paruis uulneribus commune est. Verum intestinorum repositiones in propriū locum, in magnis uulneribus, ministro admodum perito opus habent. Oportet enim ipsum suis manibus forinsecus apprehensum totum uulnus intrò contrahere ac constringere, ita ut semper exiguum quid suenti denudet, & sanè etiam id quod consumum est modèrately adstringat, donec exactè fuerit totum confutum. Quis uero sit modus suendi ventrem ad huiusmodi idoneus, deinceps dicamus. Quandoquidem abdomen cum membrana peritonæo concreescere oportet, à cute initium sumendum est, ac uel ab externa parte intro transmissa. Vbi uero cutem & musculum rectum totum penetrarit, membrana adiacente præterita, transire acum ab interna parte per reliquam membranam oportet, atque ita hinc ab internis extra per alteram abdominis partem transire, & ubi penitus, pertransiit, rursus ab externis intro per hanc abdominis partem transmittere, & adiacente ipsi membrana præterita, & ad oppositam membranae partem transiitione facta, ab internis extra ipsa perpungere, & simul cum ipsa etiam proximum totum abdomen: Deinde ab hoc rursus initio factum, ipsum cum opposita membrana consuere, & postea per proximam cutem extra transmittere: illinc uero rursus intro transigere, & cum opposita membrana consuere, ac per proximam cutem extra transmittere: & hoc iterum atque iterum repetitis uicibus facere, donec totum similiter consuerimus uulnus. Interuallum autem futurarum, quantum ad constringendū subiecta attinet, breuissimum esse debet: quantum uero ad hoc, ut cutis inter futuras infracta permaneat, breue interuallū non est commodum. Fugiendus itaque est utriusque excessus, & quod moderatū est, eligendum: iam uero & hoc commune quodammodo omnibus ulceribus est, quemadmodum etiam ipsius filii compages. Quod enim durius est, cutem rumpit: quod mollius, ipsum prius rumpitur. Eodem modo etiam propinquissime ad summa labia acum transire, facit ac cogit ut cutis quæ paucissima restat, plerūque rumpatur. At si multa

Peritonæi membrane uulnus

IT

IT

sit comprehensa, inglutinata permanet. Atque hæc quidem etiam si omnibus ulcibus communia sunt, maxime tamen in ventris fisione vitare oportet. Et aut uelut antea dictum est facere, confectione habita ut abdomen eum peritonæo concreseat, eo quod quum nervosum sit, uix concreseat. Aut uelut aliqui faciunt, ea quæ secundum naturam cognata sunt inter se contrahere, peritonæum cum peritonæo, abdomen cum abdomine. Id quod hoc modo fit. Aut in nobis abdomine acui transire oportet, ab externa parte intro, per ipsum solum, & ambobus peritonæi labijs transgressis, rursus acum conuertere, et ab externa parte intro, per ambo peritonæi labia transire. Et deinde rursus conuersam, ab internis extra, iuxta oppositum abdomen transmittere. Hic modus à communi illo & uulgato, quo per quatuor labia, una aggreffione acum transiit, differt: quod peritonæum membranam intra abdomen exacte occultat. Cæterum medicamenta commoda sunt eiusdem materiæ cum his quæ cruentis uulneribus competunt. Quo uero nulla ex principalioribus partibus coafficiatur, lanam teneram moderato oleo calido imbutam, per totum spaciū inter inguina & alas, circumdare oportet. Præstat autem idem oleum calidum per clysterem intestinis immitti. Si uero etiam ex intestinis aliquod fuerit uulneratum, uinū sit id quod immittitur nigrum, austerum, tepidum: atque hoc magis, si totum fuerit perforatum ad internum usque meatum. Facilia igitur curatu sunt crassa intestina, ægre uero curantur tenuia. Penitus autem incurabile est seilunum, tum propter multitudinem ac magnitudinem uasorum, tum propter tenuitatem ac nervositatem tunice. Sed & bilem puram omnem excipit, & uicinissimum omnium est hepatis. At uero infernas uentriculi partes, carnosas illas, tentare oportet ut curemus. Fieri enim potest ut succedat, non solum quia crassiores hæc sunt, sed etiam quod curantibus medicamentis facilior sedes eo loco contingit. At uero uulnera in ore ipsius uentriculi ac stomachi, transiit solum medicamenta contingunt. Sed & his quæ in ore ipsius sunt, sensus subtilitas aduersatur, quo minus curatur. Quum uero peritonæo rupto, omentum prociderit, & aut liuidum, aut nigrum factum fuerit, parte ea quæ ante nigra facta est laqueo constricta, propter eruptionis sanguinis periculum, resecare oportet eam quæ post laqueum est, ita ut ad internū finem confusionis, laquei initia foras propendeant, quo facile eximi possint, ubi super purato uulnere resecta fuerint.

De præputio curto.

Cap. LIII.

Præputium  
curtum

IN quibus parum quid deest cuti pudendi, quidam decoris reparandi causa, duplicem chirurgiæ modum excogitarunt: quandoque quidem circa pudendi initium superne cutem secantes in orbem, quo soluta continuitate, cutis deorsum trahatur, quousque glans fuerit contexta: quandoque uero scalpello subexcoriantes iuxta internam partem, circa glandis radicem. Deinde deorsum trahentes. Et postea molli quodam linteo præputium obligantes: nimium linteo quodam in medio interposito iuxta factam excoriationem, quo præputium cum glande non concreseat. Hunc modum Antylus magis probat, latius ipsum exponens. Nobis autem summum solum attingere satis esse uisum est, eo quod in artis operibus raro talis chirurgia requiritur, quæ neque functionis aliquam difficultatem hæc affectio inducat, neque ita decorem uitiet, ut huius chirurgiæ tormentum subire quis sustineat.

Hypoepidie  
Canis pars  
penis  
Glans non  
perforata

De hypoepidie.

Cap. LIIII.

MULTIS ex natiuitate glans non est perforata, sed sub appellato cane, ubi glans absoluitur, foramen est. Atque hinc neque mingere in anteriore partem possunt, nisi ualde ad pectinem membrum refrigerint, neque liberos generare, quum semen ipsos in directum ejaculari in utero non contingat. Et ad hæc non uulgare dedecus affert hæc affectio. Simplicissimus igitur & periculi maxime exors chirurgiæ modus sit per resectionem. Oportet itaque affectum reclinare supinum, deinde glandem per sinistram manus digitos tor-

titer



titer extendere postea glandem scalpelli acie circa coronam amputare, non obliqua facta resectione, sed quæ similis sit sculpturæ circumcise factæ, ita ut in medio eminentia quædam appareat glandis similis. Quandoquidem uero sœpe sanguinis eruptio contingit, si quidem fieri poterit, per sanguinem sistitua ipsam sedabimus: Sin minus, uisione per tenuia ferramenta utemur.

De phimo, siue præputio circa glandem constricto. Cap. LV.

**D**uplex phimoseos id est præputij circa glandem constricti causa est. Quandoque. n. præputium ita intexit glandem, ut rursus detrahi non possit. Quandoque retrò abductum; non amplius induci potest: quæ species propriè paraphimosis appellatur. Prima igitur differentia fit, aut ob cicatricem in præputio factam, aut ob carnis accretionem. Secunda uero in purdendorum inflammationibus efficitur, quum abducta retrò cute glans intumuit, & non amplius præputium admittit. Si igitur prima constrictio nis species fuerit, chirurgiam adhibebimus, hoc modo. Postquam hominẽ prout conuenit collocauimus, attractio præputio in anteriorem partem, hamulos tres aut quatuor in summũ ipsum immittemus, eosq; ministris tenendos dabimus, & quantum fieri potest, extendere ac aperire ipsum iubebimus. Postea si ex cicatrice externa contractio facta fuerit, scalpello sectio, ni uenarum apto, aut cultello aculeato, ex internis partibus præputium diuidimus, in tribus aut quatuor locis, iuxta internas partes sectiones faciẽtes in directum extensas, & æquali spacio inter se distantes. Est autem duplex circa glandem præputium. Osculum igitur internæ in ipso partis diuidemus. Ita enim contractione ex cicatrice oborta exoluta, præputium abducemus. Si uero caro ex internis partibus agnata, constrictionem effecerit, detractio præputio in omnem carnem scarificationes faciemus, & eminentias intermedias carnis inter impacta uulnuscula derademus. Postea uero plumbeum canalem papyro sicca obuolutum toti glandi circumdabimus. Sit autem canalis undiquaque æqualiter expallus. Sic enim propter canalıs circumpositionem, præputium prohibebitur, ut ne rursus induratum concreseat, ut quod præ plumbo, & obuoluta papyro, distentum conseruetur. Papyrus enim ex irrigatione intumescens, cutem adhuc magis diuisat. Hoc igitur facimus, siue propter cicatricem, siue propter carnis excretionem, constrictio fuerit facta. Si uero paraphimosis dicta fiat, & inueterata fuerit, concreuit & incurabilis est, si non uelut in præputio curto cutari quis uelit. At si nondum ocaluerit, in directum factis uulnusculis tribus, aut quatuor, aut pluribus, & oleo calido multo affuso, ad externam partem ipsum attrahemus.

De coherente cum glande præputio. Cap. LVI.

**V**lceratione circa glandem aut præputium prægressa, circa utraque fit concretio ut cohereant. Oportet igitur subexcoriare, & quantum eius fieri potest, per scalpelli, aut cultelli polypis excidendis apti aciem, retinacula exoluere conari, & maxime quidem glandem à coherente præputio purè secernere. Si uero difficile hoc fuerit, magis aliquid de glande ad præputium assumere, quam uice uersa. Quum enim tenue sit præputium, facile perforatur. At post exolutam concretionem, tenue lineum aqua frigida madefactũ, inter glandem & præputiũ interponatur, ut ne rursus concretio fiat, & adstringenti uino adhibito cicatrix ipsis inducatur.

De circumcidendis. Cap. LVII.

**N**on de his qui gentilis religionis more circumciduntur, nunc nobis sermo est, sed de his quibus ex pudendi affectione præputium nigrescit. Oportet itaq; totum id quod denigratum est in ipsis, in orbem diuidere. Postea uero squama eris cum melle utendum est, aut etiam malicorio & eruo; ad modum eorum quæ linamentis excepta induntur. Si uero sanguis eruperit, lunatis cauterijs utendum est, ad utranq; rem conferentibus, ipsam inquam, sanguinis eruptionem, & uulnus depascendo proserpens. Si uero to-

ta glans aliquando fuerit consumpta, plumbeo canali in meatum indito, utrinam per ipsum reddere iubebimus.

*De thymis in pudendis.*

Cap. LVIII.

Thymi pudenda

**T**hymi carnosae sunt eminentiae, quandoque in glande, quandoque in præputio consistentes. Et ex his aliqui sunt maligni, aliqui non. Non maligni igitur scalpelli acie deradere convenit, & chalcitidem inspergere. In malignis autem post ablationem unctione utendum est. Si vero alternatim oppositi in præputio Thymi fiant, alij intra ipsam alij extra: non omnes simul aggredi oportet, ne præputium quod tenue est, non animadvertentes diffecerimus. Verum primum interni auferantur, & post induciam ipsis cicatricem, etiam externos aggrediamur. Quidam ex recentioribus forfice præfectos, seta equina obligatos, ipsos curabant: quemadmodum alij frigido cauterio ipsos adurunt.

*De Catheteris, & infusi immisione in vesicam.*

Cap. LIX.

Catheter, fistula

**S**uppressa urina in vesica, propter obturationem aliquam, velut ex concretis sanguinis grumis, aut ex calculis, aut propter aliam quandam causam, catheteris fistulae immisione utemur, ad recrementi urinae educationem. Accepto igitur arati, & generi congruo cathetere, ipsum preparabimus. Preparationis autem modus talis est. Lanam modicam per filum in medio deligamus, & filo cum iunco acuto per catheteris fistulam transmissio, lanam formini quod ad catheteris caput est adaptamus, & extra eminentibus lanam partibus forfice præfectis, catheterem in oleum immittimus. Aegroto vero in sede collocato, & cum fomento prius, si nihil impedit, rigato, acceptum catheterem immittimus, primum in directum usque ad colli fundum. Et postea pendendum ad umbilicum refringimus: Nam ab hac parte obliquus est vesicae meatus: atque ita catheterem ulterius admouemus. Postquam vero ad interfoemineum prope sedem pervenerit, rursus pendendum insito instrumento refleximus, ad figuram naturalem reducentes: Nam ab interfoemineo vesicae meatus sursum tendit: & catheterem propellimus, donec ad vacuum vesicae spacium perveniat. Postea vero insito in catheteris fistula filum attrahimus, quo una cum lana attracta, urina sequatur, quemadmodum in siphonibus contingit. Talis est immittendi catheteris modus. Quandoquidem utro saepe opus habemus ut ulceratam vesicam colluamus, si auriculares clysteres infusum transmittere possunt, ipsis utemur iuxta prædictum modum eos immittentes. Si vero per hos fieri non poterit, corio, aut vesica bubula, ad catheterem adaptata, per immixtam catheteris fistulam infusum immittimus.

Siphonem fistula

*De Calculis.*

Cap. LX.

Calculorum generatio

**C**alculorum generationis causam, & quod pueris quidem magis in vesica, ætate vero provecis in renibus calculi generantur, hæc sane quum alibi docuerimus, nunc ad calculorum excisionis modum deveniemus, ubi signa prius calculorum in vesica exposuerimus. Urinarum igitur excretio aquosa ipsis contingit, & subsidentia arenosa in ipsis: & dum assidue prurit, ut pendendum laxatur, & rursus præter rationem intenditur, eo quod ipsum assidue contendant dum iritantur, & præsertim pueri. Si vero in vesicae collum calculus incidat, etiam urina derepente supprimitur. Cæterum ex his quibus calculi excutantur, pueri quidem usque ad decimum quartum annum facile curantur, propter corporum mollitudinem. Senes autem difficultes, eo quod ulcera in corporibus ipsorum ægre sanentur. Medice inter has ætates, etiam in hoc medio modo se habent. Et rursus facile curantur qui maiores calculos habent, quia inflammationibus adfuerunt difficultes: autem qui minores, ob contrariam causam. His ita se habentibus, ad chirurgiam devenientes concussionem utemur prius, per ministris quandoque, & aliquando etiam ipso egro ab alto quopiam desiliente, quo calculus ad vesicae collum subducatur. Deinde collocabimus ipsum ita ut erectus se deat

dent, & manus ad foemora sua habeat, quo ad exiguum locum uestica decur-  
rat. Si igitur ad contactum nostrum forinsecus iuxta interfoemineum, inter  
anum & pudendum calculus occurrat, præ cōcussione elapsus, tunc statim  
ad chirurgiam nos conuertimus. Si uero non occurrat, indicem sinistrae ma-  
nus digitum, si puer fuerit ægrotus; aut etiam medium, si adultior fuerit, o-  
leo illitum in sedem immittimus; & supinis digitis perferuntur, ubi o-  
curret, paulatim ad uesticæ collum transferentes ipsum coarctabimus; &  
digito aut digitis foras protrudemus ipsum impactum, iussuq; ministro ut  
manibus uesticam premat, alterum tubebimus ministrum; ut per dextram  
manum testes sursum tendat, altera uero interfoemineum distendat in al-  
teram partem ab ea in qua sectio est facienda. Nos autem accepto instru-  
mento excidendis calculis idoneo, inter sedem & testes, non iuxta medium  
interfoemineum, sed ad alteram partem, ad sinistram narē, obliquam sectio-  
nem faciemus, in ipsum occurrentem lapidem secantes, ita ut sectio extrin-  
secus amplitudinem habeat, intrinsecus autem non amplius, quàm ut lapis  
per ipsam excidere possit. Aliquando enim per innixum digitorum aut di-  
giti citra sedem, simul ut sectio facta est, etiam citra extractionem, lapis pla-  
cide exilit. Si uero non exilierit, extractionem per instrumentum ad hoc  
paratum facimus. At uero post ductum lapidem, sanguinis eruptione per  
pulillos sanguinem sistentes, & manna thuris, & aloë, & symphyro, aut e-  
tiam misy ac similibus sedata, lanas aut lintea complicata uino & oleo im-  
buta imponemus, & calcularijs siue fena crura habentibus deligationibus  
utemur. Si uero sanguinis eruptionis tumor immineat, lineum complica-  
tum ex posca, aut rosaceo cum aqua imponatur, & reclinato ægrotō fre-  
quentius madefacimus. Tertia uero die facta solutione, & aquæ ac olei mul-  
ta assuptione, tetraphatmaco linamentis excepto utemur, ita ut soepius ipsos  
soluamus ac curemus, propter urinæ acrimoniam. At si inflammatio ali-  
qua succedat, cataplasmatibus & perfusionibus ad hanc commodis utemur.  
Et in uesticam rosaceum aut oleum chamæmelinum, aut butyrum immitte-  
mus, si non inflammatio aliqua nos prohibeat. Similiter uero etiam si ser-  
pendo depascens, aut aliàs quomodocumq; malignū ulcus fiat, ad singula  
conuenienter instabimus. Postquam uero ab inflammatione liberum est ul-  
cus, facta ablutione, emplastro ex succis ad lumbos ac imum uentrem, ute-  
mur. Per totum autem curationis tempus, foemora simul uincire oportet,  
quo auxilijs adhibitis inferuiant. Porro si paruus sit calculus, & in colem in-  
cidat, & per urinam eijci non possit, præputio in anteriorem partem uehe-  
menter attracto, ipsum ad summam glandem deligabimus. deligabimus eti-  
am retro pudendum ipsum colem, ad finem qui ad uesticam est restrictio,  
nem facientes, & postea inferne colem ad ipsum occurrentē calculum seca-  
bimus. Inflexo autem cole lapillum eijciemus, & exolutis uinculis, uulnus  
à sanguinis guttis mundabimus. Et uinculum quidem recto obligatur, ut  
ne calculus retrorsum recurrat. In anteriore autem parte, quo post extractū  
lapidem, dum deligatum præputium exoluitur, tecurrens cutis sectionem  
faciam congregat.

De Corporibus circa testes.

Cap. LXI.

QVum corpora circa testes, ad hernias secandi doctrinam conferant, de  
limitatione ipsorum prius adscribemus. Ipse igitur testis substantia est glā-  
dulosa & friabilis ad gignendi seminis facultatem facta. At Adstites qui  
& cremasteres appellantur, neruosi exortus sunt, ex membrana medullæ  
dorsæ, cum uenis arteriosis ad testes pertingentes, per quos seminis ad pu-  
dendum emissio contingit. Vasa uero seminaria uenæ sunt, quæ à uena  
caua ad testes pampinosiformiter inflexæ feruntur, per quas testes nutri-  
untur. Rubicunda tunica est natura neruosa, quæ iuxta gibbā partem, &  
ante testem absoluta est: iuxta cauas autem partes, & retrō testī adhæret,  
experitonæe membranæ tunica ortum habens. Hanc autem partem iuxta

Sanguinem fla-  
stentia  
Deligationes  
fena crura ha-  
bentes

Testis diffi-  
nitio  
Adstites, Cre-  
masteres  
Vasa semina-  
ria

Tunica Rubi-  
cunda

*Darti pellicule sunt*

quam testis adheret, posteriorem accretionem nominant. Darti uero pelliculae sunt extrinsecam eam ad rubicundam tunicam agglutinatam, & ipsi adherentes, qua parte etiam illa reus testibus adheret. Arrugosa illa extrinsecus cutis testibus circumdata, Scrotum appellatur.

*Scrotum*

*Hernia aquosa hydrocele,*

**S**ilentus humor circa partem corporum scrotum per exteriorem colligatur, & tumorem sensui expositum efficit, hydrocele, id est hernia aquosa, affectio nominatur. Constat igitur plerumque humor in tunica rubicunda circa testem in anteriore parte, ubi maxime rubicunda tunica a teste separatur. Raro uero in partibus extra rubicundam tunicam affectio consistit. Saepe autem in propria tunica humor continetur, & hanc affectionem chirurgi in supergenita tunica appellare solent. Si igitur ob praegressam causam, uelut est partium debilitas, affectio consistit, sanguis quia alimentari ratione affertur, in aquosam aut serosam lentam substantiam transmutatur. Si uero ob plagam, sanguinea aut seculenta essentia continetur. Commune igitur signum est tumor doloris exors, durans circa scrotum, qui iuxta nullam occasionem euanescit, sed cedit quidem in his qui modicum humorem habent non autem cedit in his qui multum. Et in quibus quidem in tunica rubicunda consistit humor, his tumor est fere rotundus uelut ouum. Atque his testis occultus est, ut qui undique circumfluatur. Si uero extra tunicam rubicundam, sub pelliculis dactis dictis fuerit, per pauca corpora occurrit. At si in supergenita tunica humor consistit, propter collectionem ac conglutinationem undique contingentem, tumor aliter testis imaginem praefert. Et si quidem aquosus fuerit humor, concolor tumor pellucet. Si uero seculentus aut cruentus, rubicundus aut lividus apparet. Si uero in utrisque scroti partibus signa haec comparuerint, hos geminata hernia correptos esse scito. Ceteri chirurgiam hoc modo facimus. Denudata pilis pube & scrotis, si non puer fuerit, hominem supinum in scamnum reclinamus, ita ut, tibis linteum multipliciter complicatum, scroto uero spongiam magnam subiiciamus. Et ex sinistris agri sedentes, ministrum a dextris ipsius agri sedentem iubemus, ut & pudendum in alteram partem distendat, & scroto eam ad abdomen extendat. Nos autem accepto scalpello scrotum diuidimus a medio exorisi secundum longitudinem, propemodum ad pubem usque, rectam sectionem facientes, similem & appositum ei lineae quae scrotum in duas partes secat, diuisione ad rubicundam usque tunicam progrediente. Si uero in supergenita tunica sit humor, qua parte apex eius tunicae significatione de se praebet, ea parte diuisionem facimus, & labijs sectionis per hamulum diductis, & dartis appellatis pelliculis detractis per herniarum cultellum ac scalpellum, & denudata tunica rubicunda, mediam ipsam per uenarum sectionem scalpello diuidimus, illa maxime parte qua a teste separata est, & humore toto, aut maiore ipsius parte, in uas quoddam excreto, rubicundam tunicam per hamulos auferimus, tenuissimam praesertim ipsius partem. At hinc iam Antylus futuris, & curatione cruentorum uulnorum utitur. Recentiores autem concarnante appellato ductu. Si uero testis putrefactione, aut aliquam aliam affectionem habere comperiat, uasis quae cum adlite contuncta sunt, per laqueum disparatis, & ipso adlite dissecto, testem eximere oportet. Et in gemina hernia praeditis, eodem modo dupliciter operabimur, sectiones utrinque circa scroti ad inguina partes facientes. Postea uero immisso per sectionem specilli capite, deorsum ad scroti finem, & scroto per ipsum specilli caput distento, acuto scalpello sectionem secundum subfluxum facimus, quo sanguinis grumi, & pus per ipsam excernatur. Per ipsum uero specilli caput lemniscum in longitudinem implicitum linamentum, ad supernam sectionem traicimus, & uiscibus spongia deterfis, lanas oleo maddidas per sectionem deorsum ad testem immittimus: & forinsecus alias lanas uino & oleo imbutas, scroto, imo uentri, inguinibus, interfoemineo, ac

*Tunica supergenita*

*Hernia geminata*

*Lemniscus li-*  
*namentum*

lābis, superponimus: & linteō triplicato insuper expresse, & deligatio-  
ne sena crura habente, & alijs ad hoc commodis facta, hominē reclinamus,  
lanis ad lumbos subiectis, quietis gratia: & pelle molli substrata, ad irriga-  
tiones excipiēdas. Irrigamus autem oleo calido, ad tertiam usq; diem. Post  
quā solutione facta, ad uulnus quiddē ter apharmaco linamētis excepto uti  
opoteret, ita ut lemniscū in solutione permutemus. Forinsecus aut rursus ir-  
rigationes adhibeātur propter inflammationē, usq; ad septimā diē. A quo  
medicamentū ad conseruandum linamentū adhibemus. At post ulceris res-  
purgationem, & moderatam incarnationem, ubi iam de cætero lauātur, Le-  
mniscum auferre oportet, & reliqua curationis sequela, uelut antea dictum  
est, uti. Quod si inflammatio aliqua sit, aut sanguinis eruptio, aut tale quid in-  
cerim accedat, conuenienti modo singulis occurrendum est, ut ne scæpe eun-  
dem sermonem repetāmus. Si uero ultiōnem in hernia aquosa libentius ad-  
hibuerimus, uelut iunioribus placet omnia quæ ante chirurgiam, & quæ  
post ipsam restita sunt, fiant, itemq; quæ in ipsa chirurgia retulimus, eo solū  
relicto ut ne ferro secemus, neq; secundum subeffluxionem sectionem facia-  
mus. Decem itaq; aut duodecim ferramenti literam. r̄ referētibus ignitis,  
& duobus cultratis, primum quidem scrotum per gammata illa per mediū  
peruremus. Et scalpello aut cæco hamulo membranas excoriantes, cultra-  
to cauterio uelut dissecantes uremus. Denu datam autem rubicundam tuni-  
cam, quæ ex albedine & densitate facillime cognoscitur, summa gāmātī cau-  
terij parte perurimus, & humorem excernimus. Ac postea totum quod de-  
nudatum est hamulis distentum cultrato cauterio auferimus.

De Carnosa &amp; Tofacea hernia.

Cap. LXIII.

Ferramenta  
ulceris gam-  
mata, & cul-  
trata

Si caro circa aliquam partem corpusculorum, quæ scrotum connectunt,  
nascatur, carnosæ herniæ affectio oboritur. Et hoc ex obscura causa, teste  
fluxione uexatō, aut in scirrū indurato, aut ex plaga, aut ex imperita post  
herniæ sectionem curatione. Adest autem & his tumor concolor, cum duri-  
cia. Si uero induratus est tumor, color uiriatur, & sensus exors est. At si ma-  
lignus est tumor, dolores punctorij consequuntur. Ad chirurgiam itaq; de-  
uenientes, egrotum uelut prius collocamus, & similiter sectionem facimus.  
Etsi quidem cum teste caro concreta affectionem fecerit, & darton pellicu-  
lam, & rubicundam tunicam similiter dissecamus. Deinde extento teste unā  
cum tunica rubicunda, ipsum foras educemus, & discreto i uasis neruo un-  
detestis dependet, uasā quidem adstringemus, neruum uero dissecabimus.  
Testem autem cum carne concretum, uelut alienum ejiciemus. Si uero cir-  
ca aliquam tunicam, aut uasculum, caro concreuerit, diuiso scroto & subie-  
ctis carni pelliculis, quicquid carnosum est auferimus. At si posterior accre-  
tio cum carne concreuerit, circumfiris partibus ablati, etiam testem unā  
cum ipsa tollemus. fieri enim non potest ut sine ipsa testis maneat. Cæterum  
Tofi qui & circa testem, & circa tunicam rubicundam consistunt, ex multo  
rensis, & duricia, ac inæqualitate, à carnosā & aquosa hernia discernuntur,  
Ethi igitur carnosæ herniæ chirurgiam requirunt.

De uaricosa &amp; flatusa hernia.

Cap. LXIIII.

Hernia Caro-  
nosaTofi circa  
testem

Vasa quæ circa testem, aut dartos pelliculas, uaricosa sunt, Varices sim-  
pliciter appellant. Reliqua testem nutriendia si uaricosa facta fuerint,  
herniam uaricosam affectionem uocant. Signa horum manifesta sunt. Col-  
lectio enim tumidior, & obliqua, & aliquantulum racemosa, & testiculi la-  
tatio apparet. Quædam item alia functionum impedimenta, maxime in  
cursu, & exercitijs ac professionibus. Chirurgiam autem facimus sic. Post  
commodam locationem, cōtrectato scroto, neruum à quo testis pender, ad  
internam partem detrudemus. Est autem cognitu facilis, & renuior uasis, &  
solidior ac renitens, ut qui fortis sit & ualidus. Sed & æger dolet, ad ipsius  
compressionem, insuperq; ad colēm situs est. Vasa uero per digitos tum no-  
stros, tum ministrī, in scroto apprehendimus, & fortiter distentis obliquam

Varices

Hernia uari-  
cosa

scalpelli autem contra ipsas uenas cuti inducimus. Deinde infixis hamulis, ubi subiectas cuti partes excoriamus, uasq; denuclauimus uelut in uulnere excisione, & arteriarum dilatatione dicebamus, acum duplex filum habentem transigimus, & secta fili ansa, uasa tum circa primam ipsorum uaricationem, tum circa infernam extremitatem, illaqueamus, sectione per medium in directum facta. Et collectio sanguinis euacuato, suppuratorio ductu ipsos curabimus, quo laqueorum uincula una cum uasis sua sponte excident. At uero Leonides, si quidem aliqua testem nutrientia uasa uaricosa facta fuerint, ita faciendum esse dicit. Si uero omnia, cum ipsis etiam testem euellendum esse, ut ne uasis nutrientibus priuatus relicteretur. Caterum haec tuosam herniam, quae in genere arteriae dilatatio est, Leonides penitus chirurgiae aggredi recusat, ob praesens eruptionis sanguinis periculum, qui nullo modo liti potest. Recentiores uero, quum duplex sit ipsius origo, altera à quatuor uasis testem alentibus exiens, altera ab arterijs in pelliculis darris diuisis ac scroto, hanc quidem reijciunt, priorem uero chirurgiae tractant. Discernimus autem ipsas, ex eo quod ea quae ab arterijs oriuntur, facile ad digitorum compressionem euanescent; quae uero à testem nutrientibus uasis, aut omnino non, aut cum multa cautione. Chirurgiam uero adhibemus uelut in hernia uaricosa dictum est, singulis uenis exceptis ac filo obligatis.

## De Intestini Hernia.

## Cap. LXV.

Hernia intestini

Intestini hernia est prolapsio intestini in scrotum. Fit aut propter ruptionem peritonaei membranae, circa inanem laterum locum ruptae. Aut ob eiusdem membranae distentionem. Ambo uero haec, & ruptio inquam & distentio, ex uolentia aliqua progressa sunt, uelut est plaga, aut saltus, aut clamo. Quae uero ob distentionem fit, priuatim etiam propter resolutionem, & ob alias corporis debilitates oritur. Signa communia utrisq; conspiciuntur circa testem tumore, & quod in exercitijs ac coloribus, et spiritus detentione, alijsq; incommoditatibus ipse seipso maior fit tumore, & quod dum digitis impressis notae sunt, tarde quidem dum comprimitur recurrat, cito uero rursus relabitur: & intestinum in figura corporis supina, superne in suo loco manet, donec rursus erecti consistent. Sed & stercoris in scrotum exceptio, saepe periculum ipsis inducit. Dolore enim ex eo infestantur, quandoque etiam ad compressionem rugitum sentiunt. At uero peculiaris signa eorum qui ob distentionem affecti sunt, habentur haec: quod non aequatim sed particulatim, temporis progressu, & ob quaslibet causas quandoque delapsio fit: & tumor aequalis ac profundus apparet, intestino delapsio cum membranam contractio. Eorum uero qui ob ruptionem affecti sunt, signa habentur haec: quod aequatim ab initio fit prolapsio, & ob firmas solum causas: & tumor ingens inaequalis, & in superficie statim ad cutem apparet, eo quod extra membranam intestina excidunt. Si igitur membrana rupta, omentum solum in scrotum exciderit epiplocele id est omenti hernia affectio uocatur. Si uero etiam intestinum, enteropiplocele id est omentum ac intestini hernia appellatur. Si uero etiam aqua in tunica rubicunda apparuerit, composita ex tribus etiam appellatio imponitur, ut hydroepiploenterocele id est aquae, omenti ac intestini hernia uocetur. Neque uero has, neque intestini propter ruptionem herniam chirurgiae aggredimur. Verum solum ob distentionem obortam intestini herniam chirurgiae tractamus hoc modo. Post supinam locationem, extentam cum ministro cutem quae ad inguen est, transuersum diffecamus, uelut in uasorum excisione dictum est secantes: Quidam uero non transuersim, sed in directum secant, & hamulo transfixam sectionem expandimus, ea mensura ut testis educendus locum habeat. Deinde rursus hamulis infixis in intima cute tot quot uulneris magnitudo requirit, hamulo caeco aut scalpello membranas & pinguedinem excoriantes diffecamus. Denudata autem undiquaq; membra-

Omenti Hernia  
Omenti ac Intestini Hernia  
Aqua, omenti, ac Intestini Hernia

na, immisso indice digito ad posteriores scroti partes inter membranam, & pelliculas darts appellatas, posteriorem accretionē exoluimus: & postea dextra manu extremitatem ipsarum duplicantes ad internas scroti partes, si multiplex sinistra manu membranam ad sectionem attrahentes, excipimus testem unā cum tunica rubicunda, & unum ex ministris testem extendere iubemus. Nos autem ubi posteriorem accretionem perfecte exoluimus, digitis inuestigabimus num aliqua intestini inuolutio in rubicunda tunica sit comprehensa, atq; hanc deorsum ad uentrem detrudemus. Deinde accepta acu magna que filum alias per se decuplum, tunc duplicatum habeat, ipsam ad extremitatem membranæ ad ipsam sectionem in medio transigimus, sectaq; ansa quatuor principia facimus, atq; his ex utraq; parte uicissim iuxta chiasmum id est literæ græcæ  $\chi$ . figuram implicatis, membranam uehementer constringimus, & rursus obuolutis principijs generose constringimus, ut nullum ex nutritibus uasis, alimentum suppeditare possit, ut ne hinc inflammatio oboriat, & alterum magis extrinsecus uinculū, minus quā duorū digitorū spacio à priore distans injicimus. At post hæc uincula eam membranæ partem, quā ad digiti magnitudinem reliquimus, totam circum circa resecaamus, auferentes uidelicet simul etiam testem. Et rursus secundum subestensionem scroto fecantes, & lemniscum transmittentes, & irrigationes ex oleo, & deligationes uelut in hernia aquosa adhibentes, omnia reliqua quemadmodum illuc dictum est peragemus. Nouimus autē quosdam non ineptos chirurgos, qui post rubicundæ tunicæ exsectionem, cautels caudentibus extremitatem ipsius inurant, ob sanguinis eruptionis timorem, uelut uersimile uidetur. Idem post chirurgiam statim etiam liquant affectos in solio longo ligneo aquam calidam habente, ad septimum usq; diem, atq; hoc quinq; dies in diei ac noctis unus spacio faciunt, & præsertim in pueris, & mirifice ipsis succedit, quoniam & ipsi absque inflammatione mancant loci, & uincula unā cum corporibus cito excidunt. Inter, postea uero inter lotiones tempore, prædictas irrigationes adhibet. Sed & alius quidā supra relata, etiā pipere trito cū oleo, spinā ipsorū eo tempore confricabat.

De Inguinis Hernia.

Cap. LXVI.

**H**ernia intestini quæ ob distentionē sit, inguinis hernia præcedit. Primum enim quum distenditur peritonei membrana, laxatur intestinum, interiusq; ad inguen sededit, & inguinis herniam facit: quā uetustiores hoc modo chirurgia aggrediuntur. Post factam sectionem transversum trium digitorum longitudine circa extumescentem inguinis partem, & post exemptas pelliculas ac pinguedinē, circa mediū membranæ denudatæ, qua parte fastigiatur, specilli caput adhibeatur. Ita enim intestina in profundū detruduntur. Similiter igitur membranæ partes, ab utroq; capitis specilli latere, iuxta inter se coniungemus, deinde specilli caput extrahemus, neq; membranā resecentes, neq; testem eiciētes, neq; quicquā aliud, sed ductu cruentis uulnibus destinato curantes. Quandoquidē uero iunioribus uisio magis probatur, merito etiam hanc trademus. Homo itaq; post moderatum motū uiolentius tussiat, ac intendatur cum spiritus retentione. Tumore uero circa inguen apparente, stramēto scriptorū aut collyrio urēdus locus circūscribitur ad triangulārē figurā. Ita ut sursum ad inguinis situm transversa linea locetur: sed & nota in mediū trianguli injiciatur. Reclinato autē agrotō, igne candefacti cauterēs in mediā notā immittantur, primū clauatū, deinde in latera trianguli, gammatū: & tertio Lateralis aut lenticularis totus triangulus exequetur, ministro per totam uisionem panniculo santem detergente: atq; ita in profundum uisio fiat, donec in his qui moderatum habitum habent, pinguedo attingatur. Neq; enim in his qui macilentī sunt notam hanc obseruabimus, obliquitatem, ut ne fallamur, & membranā inuramus: Neq; in crassioribus ac pinguioribus, in quibus etiam ante sufficientem uisionē pinguedo apparet. Imo potius ex artificiosa coniectura moderatam mensu-

Chiasmus

Hernia inguinalis

Cauteris uisio  
trianguli

Decussata deli-  
gatio Inguina-  
lis

Scroti laxatio

Rhacosis

Castratio

Medicine scro-  
porum

ram comperiemus. Post unctionē uero salem cum porro tritum crustæ insicie-  
mus; & inguinali decussata deligatione utemur. Sequentibus autem diebus  
crustam detrahentibus medicamentis utemur, quale est lenticula cum mel-  
le, & similia ad perfectam usque curationem.

De scroti laxatione.

Cap. LXVII.

Q Vum scroti cutis laxatur, absq; his corporibus quæ intra ipsum sunt,  
Rhacosis appellata affectio fit, maxime indecora. Leonides igitur supi-  
no reclinato homine, superfluum cutem per scalpellum, contra subiectam ta-  
bulam, aut durum aliquod corium sicut corpus, refecabat, & suturis labia  
cōmittebat. At uero Antylus suturis tribus aut quatuor superflua cute per-  
tusa, forfice acuta, aut scalpello, id quod ultra suturas extabat, refecabat, &  
per futuras munitione facta, cruentorum uulnere ductu percurabat.

De castratione.

Cap. LXVIII.

Q Vum nostra ars scopum habeat, ut corpora à statu præter naturam, ad  
naturalem reducat, castratio contrarium eius proficitur. Verum quan-  
doquidem sæpe etiam inuiti ab aliquibus præminentibus ad castrationem  
faciendam cogimur, breui quadam summa aggressionis modum referemus.  
Est autem hic duplex, alter per collisionem, alter per exsectionem. Modus  
per collisionem ita absoluitur. Infantes adhuc pueri in peluim aquæ calidæ  
collocantur. Deinde ubi laxata fuerint in ipsa pelui corpuscula, testiculi di-  
gitis colliduntur, donec euanescent, & dissoluti non amplius cōpacti adta-  
ctum occurrant. At per exsectionem modus huiusmodi est. Supinus in scā-  
num reclinetur castrandus, & per sinistræ manus digitos scrotum unā cum  
testibus comprimat, & ubi rectū suum habuerit, duabus sectionibus per  
scalpellum in directum secetur; ita ut ad singulos testes una fiat. Vbi uero  
profluuerint testes, excorrientur ac excindantur, tenuissima solum uasorum  
naturalium continuitate relicta. Hic modus præfertur illi qui fit per collisio-  
nem. Nam quibus collisi sunt testes, quandoq; coitum appetunt, parte qua-  
dam testiculorum, uelut uerisimile est, in collisione remanente.

De hermaphroditis.

LXIX.

A ffectio Hermaphroditorum per compositam uocem, ab Herma & A-  
phrodyte, id est, Mercurio & uenere nominata est, utriq; generi ualde  
indecora. Quum enim quatuor sint ipsius differentię secundum Leonidē,  
Tres quidem in uiris cōsistunt, una uero in fœminis. Nam in uiris quandoq;  
que circa interfœmineum, quandoq; circa mediū scrotum, muliebri-  
bus pudendi pilosis situs apparet. Supra has uero tertia est in qua uelut per puden-  
dum, per scrotum urinx effunduntur. At in fœminis supra pudendum iux-  
ta pubem sæpè uirilīs pudendi situs reperitur, tribus corporibus extantibus,  
uno uelut cōle; duobus quasi testibus. Tertia igitur in uiris, in qua urina  
per scrotum excernitur, incurabilis est. Reliquæ uero tres curantur, si super-  
fluæ partes auferantur, & uelut ulcerum curatio fiat.

De nymphæ accide præsectione.

Cap. LXX.

Q Vibuscum ingenti magnitudine est Nympha, ita ut indecora turpis-  
sime occurrat, & quemadmodum aliqui narrant, alique per hanc par-  
tem etiam arriunt uelut uiri, & ad coitum concitantur. Quapropter supi-  
na locata muliere, quod superfluum est in Nympha, id uolvens apprehen-  
sum scalpello refecamus; uitantes ut nē ex profundo ipsam excidamus, ne  
Rhyadica, id est fluida affectio, ex hoc sequatur. Sed & caudam, quæ carno-  
sa ab uteri osculo excretio est, & muliebri pudendum replet, aliquando ue-  
ro etiam ad externas partes instar caudæ prominet, similiter ut nympham  
refecare oportet.

De Thymis, Condylomatibus, &amp; Hemorrhoidibus, in muliebris locis.

Caput LXXI.

T Hymus eminentia quædam est aliquando rubicunda, quandoque alba,  
plerumque sine dolore, Thymi herbarum corymbis siue caudicibus simili-  
lis.

Hermaphro-  
ditisNympha præ-  
sectioCauda in fœ-  
minis præse-  
ctio

Thymi



lis. Condylomatâ ſi uero rugoſa extuberantiâ ſunt. Quemadmodum hamor-  
rhoïdes ſimiles illis ſunt quæ in ano ſiunt, quæ aliquando etiam ſanguinem  
fundunt. Omnes itaque cuiusmodi eminenſias, in ſceminis ſub conſpectum  
uenientes, & denudatas, uoſſella apprehenſas ſemiſpharulæ acie excidimus;  
& galla trita, aut alumine ſciſſo inſperſo, ad eas utimur. Maiores enim Chi-  
rurgi obligationem per fila in his non admittunt.

De non perforatis, & de phimo.

Cap. LXXII.

**M**ulieres quædam genitales partes non perforatas habent, quandoque ex  
natura, quandoque incremêto poſtea factò, morbo aliquo prægreſſo. Et  
hoc aliquando in profundo, aliquando in pudendi aliis, aut in intermedijs ale-  
cis, & aut ex concreſcione, aut propter obturationem. Quod uero obturat,  
aut caro eſt, aut membrana. Impedimentum autem multum inducit hæc af-  
fectio, partim in coitu, partim in conceptione, aut etiam partu. Quandoque  
etiam in menſis ſua purgatione, ſi ſanè id quod obturat, ſive caro, ſive mem-  
brana ſit, penitus obſtruat. Nam in aliquibus id in mediò perforat eſt. Cata-  
ſi itaq; inuenta, antè in promptu expoſita eſt, aut etiam per inſtrumentum ex-  
ploratori inmiſſionem: ſi concretio ſolum fuerit, recta ſectiõne per ſcalpel-  
lum ſiſtulis ſecandis deſtinatum hanc exoluemus. Si uero obturatio, hama-  
lis infixis diſtinctum corpus illud obturans, ſive membrana ſive caro fuerit  
eodem ſcalpello diſſecamus: & ſedata ſanguinis eruptione, ſiccantibus cic-  
tra mordacitatem medicamentis, & poſtea cicatricẽ inducentibus utimur,  
priuſi forma linamentum, cicatricem inducente pharmaco illitum ſubiici-  
entes, in quibus præſertim non ualde in profundo chirurgia facta eſt, quo  
partes rurius non cõcreſcant. Porro phimos quoque in uteri oſculo conſiſtẽs  
obturementum, eodem modo per chirurgiam tractatur.

De uteri abſceſſu.

Cap. LXXIII.

**A**bſceſſus circa uteri oſculum conſiſtat, qui chirurgiæ ſubiecti poſſit, nõ  
prompte ad exiſtentionem feſtinandum eſt, ſed abſoluta iam affectione, &  
plurimum aucta in inflammatione, & humidis corpusculis incumbenſibus at-  
tenuatis, eo quod principalis pars ſit uterus. At uero in aggreſſione locetur  
fœmina ſupina in ſella, ita ut crura ad ſummum uentrem contracta habeat,  
ſcœmora uero inter ſe diſparata. Subiiciantur autem ulnæ ipſius ad poplites,  
& uinculis i doneris ad ceruicem deligantur. Qui uero chirurgiam exercet,  
ex dextris partibus ſedens, inſtrumentò exploratorio dioptra appellato, pro-  
ptate conuenienti exploret, & per ſpecillum mulſebreis ſinus profunditatẽ  
metiatur, ne ſi longior ſit dioptræ fiſtula, uterum comprimĩ contingat. Et ſi  
longior ſinu reperta fuerit dioptræ fiſtula, lintea cõplicata pudendi aliis im-  
ponantur, quo ſuper ipſa locetur dioptra. Oporteret autem fiſtulam immitte-  
re ut cochleam ad ſuperiorem partem habeat, & dioptra quidem ab operan-  
te teneatur, cochlea uero per miniſtrum obtorqueatur, quo fiſtulæ laminis  
diductis ſinus diſparetur. Vbi uero occurrerit abſceſſus, ſi mollis ac tenuis  
ſit, id quod digiti cõtactu cognoscẽs, ſpathula aut acicula, in uertice diuida-  
tur, & poſt puris excretionẽ lemnifcus molliſſimus oleo roſaceo imbutus  
plagæ inſeratur, aut potius extra plagam, in ſinum mulſebrem, citra protru-  
ſionem. Forinſecus autem ad alas, & in peſtinem ac lumbos, lanæ fucidæ  
aut puræ oleo imbutæ imponantur. Tertia die aquæ ac oleo caſeatiſ inſi-  
deat, aut malux decoctio, factaq; deteſione lemnifcus leniter in plagam in-  
datur illitus tetrapharmaco perſe, aut cum cocto melle. Sit autem dilutum  
tetrapharmacum ex butyro aut roſaceo. Cataplaſmatisq; externæ partes in-  
tegantur, donec inflammatio ſedetur, & purum ulcus fiat. Si uero difficul-  
ter repurgeretur, per auricularem clyſterem, cum iridis aut ariſtolochiæ deco-  
cto, aut melle eluatur, & per emplaſtrum ex cadmia uino dilutum, & lina-  
mentis exceperum cicatricis inducatur. Ac ſi intra uteri oſculum abſceſſus fue-  
rit, chirurgia utitur.

Condylomata

Hæmorrhoides

Genitales partes non perforate

Phimos

Phimos

Uteri abſceſſus

Dioptra

**Q**Uum difficulter partientium curationem libro tertio tradiderimus, si  
 non ad illam partem corrigatur, ad chirurgiam merito devenimus, signa  
 prius collectis, an superstes euasura sit mulier, aut non. Et si euasura est, tunc  
 chirurgiam aggrediemur. Sin minus, eam uitabimus. Quae igitur perniciose  
 affectae sunt, lethargico modo in somnum deferuntur, ac reuoluntur, & ex  
 gra excitantur, atq; si excitatae fuerint per uociferationes debiliter respon  
 dentes, rursus in somnum deferuntur. Quaedam uero etiam conuulsorio mo  
 do contrahuntur, aut neruis distenduntur, aut alimentum non sentiunt. Pul  
 sus autem uehementer intumescens deprehenditur, uerum obscurus ac dei  
 bilis. At quae euasurae sunt, nihil tale patiuntur. Reclinata igitur in lecto su  
 pina iacere, & magis ut deorsum uergat, mulieres autem sinistrae quaedam  
 crura eleuata utrinque teneant. Si haec non adsint, per uincula quaedam thora  
 cem mulieris ad lectum deligato; ut ne dum attrahitur foetus, corpus ipsius  
 sequens, tractus uigore exoluat. Deinde pudendi alis per ministrum didu  
 ctis, sinistram manum contraeam, cum robustis ac constrictis digitis pingue  
 factam; in uteri osculum demittito, ac ipsum dilatat, & infuso in ipsum o  
 leo laxius reddito, & ubi commodum uncus infigi possit quaerito. Commodi  
 autem sunt loci ad uncum infigendum, in his qui in caput deferuntur, oculi,  
 occiput, os ad palatum, mentum, clauiculae, & circa costas ac praecordia lo  
 ci. In his uero qui in pedes deferuntur, ossa supra pubem, & costarum inter  
 media spacia, & rursus clauiculae. Et postea detentum dextra manu unum,  
 & flexuram ipsius inter digitos occultatam, per sinistram manum leniter in  
 ducito, & in quodam ex relatis locis infigito, usq; ad inanem locum, & alte  
 rum huic oppositum, quo equalis, & non ad alteram partem uergens attra  
 ctio fiat. Deinde aequaliter trahito, non solum in directum, sed etiam in late  
 ra, uelut in dentium extrahione fieri solet, & interim tensionem neruorum  
 to. Postea immisso indice digito pinguefacto, aut etiam pluribus, inter ute  
 ri osculum & impactum corpus, uelut si excories, in orbem circumducto.  
 Sequente uero pro ratione unco, ipsum in superiores partes transferre opor  
 tebit, atq; sic facere, usq; ad perfectam foetus extrahionem. At si manus for  
 tus praemissa sit, & impacta retrudi non possit, obuoluto panniculo ut ne ob  
 lubricitatem elabatur, aliquantulum attrahere illam oportet, & ubi prodio  
 rittotam de humero rescare. Idem etiam faciendum est, si ambae manus pro  
 mineant. Similiter etiam pedes prominentes, reliquo corpore non subse  
 quente, ab inguinibus rescare oportet, & postea conari ut reliquum corpus  
 dirigatur. Si uero ex eo quod maius est caput, obstructio fiat, si quidem hy  
 drocephalus est foetus, spatula polypis destinata, aut acicula, aut aculeato  
 cutello inter digitos occultato, caluaria diuidatur, quo aqua euacuata con  
 sidat. Si uero naturaliter ita amplum caput habet, diuisam similiter caluari  
 am, per forcipem dentibus aut ossibus extrahendis commodam contundi  
 mus, & si supereminet ossa, ipsa eximimus. At uero si protractio capitis, cir  
 ca thoracem obstructio fiat, eodem instrumento loci circa clauiculas usq;  
 ad inanem locum diuidantur, quo humore euacuato thorax concidat. Si ue  
 ro non concidat, facta dissectione clauiculas ipsas auferre oportet. Tunc  
 nim thorax concidet. Si uero imus uenter inflatus fuerit, mortuo foetu, aut  
 hydropo affecto, eadem ratione humor euacuetur una cum ipsis intestinis.  
 In his uero qui in pedes deferuntur, inclinatio facile ad osculum uteri dirigi  
 tur. Quod si circa thoracem aut abdomen impactus foetus haereat, pannicu  
 lo obuoluto attrahatur, & eodem modo facta diuisione, ea quae continen  
 tur euacuentur. At si reliquis ablatis caput recurrens detineatur, sinistram  
 manum immittito, & si quidem disparatum fuerit uteri osculum, manum in  
 profundum demittito, & repertum caput digitis ad osculum deuoluito, de  
 inde unco uno atq; altero infixo attrahito. Si uero conclusum sit uteri oscu  
 lum ob inflammationem, nulla uis inferatur, sed pinguis ac largis infusis  
 utendum

Fetus ex  
tractio

Fetus exsecutio

Hydrocephalus  
fetus

utendum est, in fessibus irem & irrigationibus ac cataplasmatibus, quo dispa-  
 rato osculo educatur, uelut dictum est. Porro qui in obliquum prodeunt foe-  
 tus, si quidem dirigantur, praedictis modis utendum est. Sin minus, totus foe-  
 tus intus dissecetur, & particulatim educatur, diligenti animaduersione ha-  
 bita, ne qua particula intus latens relinquatur. Post chirurgiam, curationi-  
 bus ad uteri inflammationes utendum est. Si uero etiam sanguinis eruptio  
 fiat, etiam huius curationem habes.

De secunda reliqua.

Cap. LXXXV.

Scæpenumero post foetus extractionem, secunda in utero detinetur. Paten-  
 te igitur uteri osculo, & ipsa secunda ab utero exoluta, ac circa partē ali-  
 quam uteri in sphaeræ modum conglobata, facilissima esteductio. Manum e-  
 nim sinistram calidam ac pinguefactam in profundum immittere oportet,  
 & occurrentem secundā eijcere. Si uero fundo uteri adhæserit, manus qui-  
 dem similiter immittatur, comprehensa uero secunda tendatur, neq; in dire-  
 ctum, ob uteri prolapsus timorem, neq; cum uolentia uehementi, sed leni-  
 ter primum ad latera hac illac transferatur, deinde aliquantū magis intentē.  
 Ita enim obedit, & accretio exoluitur. At si conclusum repertum fuerit ute-  
 ri osculum, relatis curationibus ad hoc utendum est. Quod si uires non de-  
 biles fuerint, etiam sternutatorijs utatur, & suffitibus in olla ex aromatibus.  
 Et si hiauerit uteri osculum, immissa manu conandum ut extra hatur, uelut  
 dictum est. Si uero neq; sic educatur, non oportet perturbari. Nam post pau-  
 cos dies, putrefacta, & in saniem dissoluta excidit. Cæterum quia foetore ca-  
 put obturat, & stomachum euerit, suffimenta conuenientia ad hoc requi-  
 runtur; probantur autem cardamomum, & siccus aridæ.

Secunda reliqua

Secunda potius  
 facta

De coxendicium uestione.

Cap. LXXXVI.

Quemadmodum humerus, ita etiam coxa, ob humoris copiam, quibus-  
 dam empta, uestionem exigit. Sic igitur Hippocrates ait. Quibuscunq;  
 ex diuturno coxendicium morbo uexatis, coxa excidit, his crus tabescit, &  
 claudicant, si non uesti fuerint. Oportet itaque etiam hic iuxta illum maxi-  
 me locum urere, ubi articulus excidit. Sic enim redundans humor resicca-  
 ripoterit, & locus ex cicatrice densatus, non amplius os excipiet. Quapro-  
 pter etiam ad multam profunditatem, uestionē hic facere oportet. Iuniores  
 porro tres crustas urendo inducunt, unam retro iuxta cauitatem clunis. Al-  
 teram ab externa parte paululum supra genu. Tertiam paululum supra ex-  
 ternum talum, iuxta carnosiores partem.

Coxendicium  
 uestio

De fistulis & fasis.

Cap. LXXXVII.

Quum locus hic postulet, ut de fistulis sedis agamus, non malum fuerit  
 prius de fistulis in uniuersum tractare. Fistula itaq; sinus est callosus,  
 doloris aliquantulum exors, in plurimis partibus consistens. Fit autem ple-  
 runq; ex abicessibus non probe curatis. Callus autem solida quædam, & al-  
 ba, & humoris exors caro est, quæ dolorem non sentit, quum neq; uena, ne-  
 que neruus, ad ipsam pertingat. Et Sinus aliquando quidem siccus est, ali-  
 quando uero humectus. Et humor ipse quandoq; indefinenter fertur, quan-  
 doq; quibusdam temporibus remittit, dum & obturatur osculum, & rursus  
 aperitur. Et quandoq; ad os fistulæ terminantur, quandoq; ad neruum, aut  
 aliam quandam principem partem. Et aut in directum tendunt, aut oblique  
 sunt, & aut unum osculū, aut plura habent. Quæ igitur ad arterias magnas,  
 aut neruos, aut tendines memorabiles, aut succingentem costas membra,  
 nam, aut ad aliquam principem partem pertingit, his aut omnino non, aut  
 cum multa cautione artificiosa, chirurgiā adhibenda est. Reliquas uero  
 hoc modo aggrediemur. Explorabimus primum, si quidem in directum ten-  
 dit fistula, per scalpellum: si uero obliqua est, per bicipes specillum quod faci-  
 le flecti potest. Talia autem sunt stannea, & tenuissima ex ære facta. In qui-  
 bus autem duo uel plura oscula sunt, ita ut per specillum explorari nō pos-  
 sint, his infuso per unum osculum in sinum immisso, ex infusi ad reliqua o-  
 scula

Fistula quid  
 sit

Callus quid  
 sit  
 Sinus

scula transitu comperiemus, anima multa oscula habens sit fistula, aut plu-  
res. Et facta tam exploratione, siquidem in superficie fuerit sinus, & angu-  
stus, immisso specillo hunc expandemus, & scalpello callum iuxta propriam  
figuram auferemus, aut unguibus, atque acie scalpelli deradentes. Si uero etiam  
amplitudinem habeat, superflua corpuscula auferantur. At si non in super-  
ficie, sed per profundum in directum procedit, quatenus id fieri potest in  
profundo ipso dissecto, totum callum circū circa auferimus. Et si quid de ip-  
so relinquatur, pharmaco ustorio hoc consumimus. Si uero multum id sit,  
& pharmaco non cedat, auterij ferreis aduremus. Quod si in os desinat fi-  
stula, & sit hoc illasus, solum ipsum rademus. Sin carie, aut alio quodam mo-  
do corruptum fuerit, totum id quod affectum est per opposita scalpula exci-  
soria amputabimus, facta prius si opus fuerit per terebram perforatione, si-  
ue ad secundam laminam usque solummodo, siue usque ad medullam fuerit af-  
fectum. Si uero etiam os superemineat, uelut caulis per transversum fractum,  
ipsum resecabimus. Accepris itaque duobus locis, alterius medietatem pro-  
minentis ossi subijcimus, ipsumque per ministrum sursum extendimus, alteri-  
us autem crassioris, aut etiam ex lana facti, similiter medietatem carni quae  
sub osse est adaptamus, & inijs infernè praeheñtis, ita per ipsum locum car-  
nem deorsum trahi subemus, ut ne serrae dentibus caro dilanietur. Atque hoc  
modo nos desectionē facimus. At uero ubi princeps aliqua pars subiaceret,  
uelut membrana succingens, aut medulla spinæ dorsalis, aut talis quaedam, di-  
excidimus aut desecamus os, membranae custodem laminam subijcimus.  
Quod si os non fuerit affectum, sed totum circum circa carne denudatum,  
eodem modo serra resecandum est: Fieri enim non potest ut ossa quae circū  
circa statum excipiant, carne inducantur. Similiter autem si extremitas ossis  
prope articulum affecta fuerit, resecare ipsam oportet. Et si totum scilicet os,  
uelut cubitus, aut radius, aut tibia, aut tale quoddam corruptum fuerit, totū  
amputandum est. Caeterum scemoris caput, aut coxam, aut spinæ dorsalis ar-  
ticulum affectum aggredi uidebimus, propter imminens ex adiacentibus ar-  
terij periculum. Hanc igitur rationem ita in singulis sequi oportet, ut ubi-  
que & situm, & uiciniam, & cognationem affectarum partium conside-  
remus. Itemque morbi magnitudinem, & aegroti utrum robur. Sed & sanus,  
qui sinus est fistulosus mellea humiditate fluens, fistularum & aliorum sinu-  
um chirurgiae ac curationi subijciatur.

De fistulis in ano.

Cap. LXXXVIII.

Fistulae aut

Fistulae in sede explorantur, quae quidem occultae sunt ex eo quod non ap-  
parente osculo dolor uexat, & purulenta humiditas per sedem profundi-  
tur, plurimae etiam abscessus signa praegressa sunt. Conspicuae uero ex  
specilli aut pili sutilli immisione: In profundum enim ad inanem usque  
locum, instrumentum descendit, & indici digito in sedem immisso occur-  
rit, perforata nimirum fistula ad internas partes. Verum in non perfora-  
tis, non sine medio instrumentum digito occurrit, sed per medium corpus  
id quod non perforatum mansit. Obliquae autem & labyrintho similes fistu-  
lae cognoscuntur ex eo quod instrumentum parum procedit, pus autem pro-  
ratione ad proportionem multum effluit. Quae uero prope intestinum sunt,  
eas cognoscimus ex eo quod aliquando lumbrici & sterces per osculum se-  
runtur. Atque in omnibus ferme callus quidam circa osculum apparet. Incu-  
rabilis porro est fistula quae uescicae collum perforauit, aut ad scemoris articu-  
lum consistit, aut ad ipsum rectum intestinum processit. Aegre uero curatur  
quae osculum non habet, & occulta, & in os desinens, & multifida. Reliquae  
omnino facile curantur. Manum itaque ipsis ita admoouemus. Aegro supino  
locato, & crura sursum habente, ita ut scemora ad uentrem uergant, quemad-  
modum in his quibus infusum per clysterem in aluum immitti solet, si in su-  
perficie fistulae terminus occurrat, immisso scalpello aut auriculario specil-  
lo per osculum, simplici sectione curem incumbentem resecamus. Si uero  
in pro-

Clysterem ad-  
mittentium sta-  
tum supinus

in profundum sedis fistulae finis desinat, immisso per osculum specillo, si qui-  
 dem perforatam inuenierimus, alterius manus quae affecto cluni opposita  
 est, indice digito in anum immisso, specilli caput apprehendimus, & in-  
 sum ipsum foras educimus, & corpuscula specillo incumbentia simplici se-  
 ctione exoluimus. At si nondum perforata fistula reperiatur, sed solum in pro-  
 fundum sedis finiat, & explorantibus nobis per indicem digitum, specilli  
 extremum occurrat, squamosa quodam ac membranoso corpusculo inter-  
 posito, tunc hoc per specilli caput uiolentius perforabimus, & educto per se-  
 dem specillo, rursus incumbentia ipsi corpora exoluemus, uelut antea dixi-  
 mus, aut fundo sinus ad sedem per falcem fistulis secandis commodam per-  
 forato, ipsosq; instrumento per sedem transmissos, hinc totum id quod in me-  
 dio est, falcis acie rescabimus, & post sectionem, corpuscula circumscisa uol-  
 sella aut forcipe uularia apprehensa amputamus: Sunt autem omnino cal-  
 li ea corpuscula: ita ut ubiq; musculum adstrictorium, sphincterem appellat, *sphincter mus-*  
 lum uitemus. Quidam enim minus artificiose facta in profundo sectione, uul- *sculus*  
 neraderint illum, atq; hinc inuoluntaria stercoris excretio homini accidu-  
 rit. Quod si quidam praeter timorem chirurgiam recusent, hippocratica lini ac filii deli-  
 gatione utendum est. Iubet enim Hippocrates linum quincuplum cruidum  
 perforato aut bicipiti specillo insertum, per fistulam transire, & initia lini  
 connectere, & quotidie adstringere, donec totum id corpus quod in medio  
 duorum osculorum situm est, dissectum sit, ac linum respuat. Si uero exolu-  
 tio protrahatur, puluillus siccus psari nomine, aut eiusmodi quispian lino,  
 inspergatur, atq; ita transiatur. Quidam fistulariae falcis foramini linum in-  
 ferunt, & relato modo transiunt, quod ego minime faciendum esse puto. Na-  
 dum chirurgiam uitant supra hanc etiam curationis tarditatem incurruunt.  
 Ceterum de occultis fistulis Leonides haec dicit. Quum profunda fuerit fi-  
 stula quae musculum adstrictorium perforauit, siue ab ano exorsa, siue mul-  
 tum progressa, in musculo tamen consistens, post relatam explorationem,  
 instrumento sedem diducente, parua dioptra dico, sedem uelut muliebrem  
 sinum diducito. Deinde ubi comparuerit fistulae osculum, specilli caput per  
 ipsum immittatur, & in profundum propellatur, & super ipsum occurrentes,  
 tota fistula per semispathulam aut spathulam fistulariam dissecetur. Nos au-  
 tem quum in eiusmodi affectionem incidissemus, hoc chirurgie modo uti  
 non potuimus, eo quod fistulae antrum uisui non occurreret. Erat enim in-  
 ter anum & musculum adstrictorium ad dextram partem situm, & instru-  
 mentum diductorium actioni magis tenebras offundebat. Postquam autem  
 per digitos facta diductione, rima quaedam comparuisset, quae iuxta unam  
 quantam ani rugam, uelut defluxio fistulae esset: pus enim per ipsam efflu-  
 bat: constituimus sane per hanc specilli caput ad fistulam transmittere, ue-  
 lut qui ad hanc ab illa deduceremur. Deinde dextrae manus indice ad mu-  
 sculum adstrictorium immisso, ubi inuenissemus corpus quoddam tenue  
 inter digitum ac instrumentum, impulso uehementius ad digitum specil-  
 lo, fistulae fundum sursum uersum perforauimus, & specilli capite per di-  
 gitum foras transmissio, totum corpus inter duo fistulae oscula situm, inter  
 id uidelicet quod ab initio ad antrum comparebat, & hoc quod iam a no-  
 bis factum erat, scalpello rescantes, specillum solum eduximus.

De hemorrhoidibus ani;

Cap. LXXIX.

Quum haemorrhoides ex eo quod euacuatur se nobis manifestent, ante  
 actionis aggressionem, plurimo per clysterem infuso utemur, quo simul  
 & superflua ex intestino euacuemus, simulq; sedem fritemus, ut paratior fi-  
 at ad euerisionem, & ani exitum. Locato igitur supino aegroto ad splendidam  
 lucem, si quidem constrictione uti uouerimus, filii lini quincupli labijs ue-  
 narum circumscribimus, & singulas haemorrhoidas cum hoc funiculo constrin-  
 gemus, urina relicta ad superflui sanguinis educationem. Nam & Hippocrates  
 hoc praecipit. Post adstrictionem uero, linteo complicato ex oleo madente,

Hæmorrhoides ani

& deligatione sedis idonea usi, ægrum quiescere iubebimus, oleo tepido & aqua mulla uentrem curantes. Deinde cataplasmate ex micis panis ac croco uentres, & post hæmorrhoidum elapsum, uino cicatricem inducentes. Leonides autem filii deligatione non utitur, sed uulnaria forcipe diu detentat scalpello excindit. Post chirurgiam manna thuris & amylo cum chalcitide, aut emplastro ex spongia usita cum pice utendum est: Sed et pastillo fistino ad perfectam aduersionem quidam usi sunt. Alij cauitates uulnarij cautetis ulsorio medicamento explent, & quæadmodum uulnata etiam hæmorrhoidas urunt.

De condylomatibus, extuberantibus, ac rimis in ano. Cap. LXXX.

Condylomata  
ani

Condyloma in ano, solum loco differt ab eo quod in muliebribus pudendis est. Est enim etiam ipsum rugosa sedis eminētia, inflammatione aut rima prægressa. Primum igitur eminētia appellatur. Vbi uero callescit, condyloma. Oportet itaque ueluti illa, ita & hæc uolsella præhensa excindere, & crustam inducentibus curare. At uero Rimas præ duro maxime stercore orientes, & eo quod callosæ fiunt, cicatricem tardius recipientes, renouabimus aut unguibus, aut scalpello ipsas lancinantes, & commode ad cicatricem perducemus.

Rima sedis

De Ano non perforato.

Cap. LXXXI.

Anus non per  
foratus

Pueris recens natis anus ex natura aliquando imperforatus reperitur, eo quod membrana est obstructa. Si igitur hoc fieri poterit, ipsis digitis membrana diffingatur: Sin minus, scalpellis acie illa excisa, uino curabimus. Quandoquidem uero etiam perfectis sæpe propter ulcus non probe curatum, concretio in ano contingit, etiam hanc instrumento commodo diffingere oportet, & curationem accomodatam facere, fistula plumbea aut eu neolo quodam in anum indito, usque ad perfectam curationem, ut ne rursus concresecat. Est aut cuncolus is aliquo ad cicatricem perducente medicamento fistilendus.

De Varicum sectione.

Cap. LXXXII.

Varicis sectio

Varix uenæ dilatatio est, quandoque in temporibus, quandoque iuxta imum uentris partem sub umbilico. Aliquando etiam circa testes. Maxime uero circa crura. Generationem autem ex materia atrabiliore omnino habet. Eorum igitur qui in testibus consistunt chirurgiam iam tradidimus, ubi de hernia uaricosa egimus. Sed & eos qui in crure sunt, similiter aggredimur, in internis fœmoris partibus aggressionem facientes, ubi etiam extortus ipsorum ferme in totum reperitur. Nam inferius in plures ramos filii, magis difficilem aggressionem exhibent. Lotum igitur hominem, laqueo in superna fœmoris parte circumdaro, ambulare iubemus, repletam autem uenam atramento scriptorio aut collyrio, secundum situm ipsius, ad tris aut paulo amplius digitorum longitudinem noramus: et reclinato extentis cruribus hominem, aliter laqueum supra genu circumdamus, & eleuata in fastigium uena, scalpello in loco quem notauimus secamus, non altius quam per cutem, ut ne uenam diuidamus: & labijs sectionis per hamulos distentis, & membranis per incurua scalpella ad herniam aquosam parata excoriatas, nudatasque uena, & undiquaque expassa, fœmoris uincula soluimus: & eleuato per cæcum hamulum uase, acum duplex filum trahentem subijcimus, binumque filii dissecamus & diuisa in medio uena per uenæ sectionum scalpellum, san guinis quantum opus est euacuamus. Deinde uno filo superiorem uasis partem constringimus, & crure in directum extento, manu expressione sanguinem qui in crure est euacuamus. Et postea rursus inferne uas constringimus, aut partem uenæ inter uincula interposita præfecta auferimus, aut etiam manere permittimus, donec sua sponte una cum uinculis excidat. Et linamentis sicis inditis, & splenio uino ac oleo imbuto imposito deligamus, ac ductu suppuratorio medicamentorum quæ linamentis excipiuntur curamus. Nec me clam est ueteres quosdam uinculis ufos non esse, sed quidam statim nudatum uas excindunt, quidam ex profundo extentum ipsum, cum uolentia extrahunt ac abrumpunt. Verum optimus est relatus chirurgiæ modus, omni

nisiq; securissimus. Quin in imo uentre consistentes uarices similiter tractamus. Itēq; eos qui in tēporibus cōsistūt, uelut in uasorū exsectione dictū est.

De dracunculis.

Cap. LXXXIII.

Tractationem de dracunculis, ut qui maxime per medicamenta tolluntur, libro quarto tradidimus.

Dracunculi

De extremarum partium praefectione.

Cap. LXXXIIII.

Extremis partibus aliquando patrefactis, uelut manu aut pede, ita ut etiam ipsa ossa corrumpantur, uel ex lacessente externa causa fracta, uel etiam praegressa interna causa putrefacta, atq; sic desectionē postulent ante q̄ hoc fiat, necesse est circūscita ossibus corpora primū dissecare. Verum quia hoc primum facimus, deinde longiore tempore sectionem per ferram adhibemus, & periculum est ne sanguinis eruptio sequatur, recte proinde Leonides non omnia primum corpora dissecat, nisi omnino fuerint putrefacta, sed eā partē ubi nō multas, neq; magnas uenas, aut arterias esse putat, primū celeriter ad os usq; dissecat. Deinde os quā cūctissime serra desecat, lineū panniculū sedis corpusculis circumdans, ut ne dum trahitur per ipsā serra, dolores inducat: & tunc reliquo resecto, candentes igne cauteris uasis adhibet, & sedata sanguinis eruptione, & linamētis inditis, & deligatione commode facta, curatione suppuratoria utitur.

Extremarum  
partium praefectio

De pterygijs circa Ungues.

Cap. LXXXV.

Pterygiū carnis circa ungues incrementū est, partem unguis operiens, in pedis & manus magnis digitis maxime consistens. Verum quā in pedibus consistit, ex offensione plerūq; sunt. In manibus uero ex paronychij neglectis, inflammationisq; ac in pus transmutatis. Pus enim diutius morā trahens, & radicem unguis erodit, & ipsum unguem corrumpit, & saepe totum consumit. Plerūq; uero mediā unguis partem ad ipsas aut radices partē quandam illius incorrosam relinquit. Aliquando etiā totā radicē illāsam linet. Quādoq; etiā os corrumpit, & odor grauis oboritur, & digitus in summo dilatatur, & liuidior apparet. His igitur chirurgia adhibenda est, ut omne reliquū unguis partē scalpelli acie praefecimus ac amputemus, deinde praefecta ac ulcerata partem cauterijs aduramus. Est. n. nome, id est ex depauperatione ulcerū genere pterygium, & nō sistitur haec, nisi quis adurat, adeo ut si neglecta fuerit, digitum corrumpat. At uero si os & unguis affectione careant, & externus unguis angulus adnatam ipsi carnem subiens ac pungens, inflammationis causa fiat: tunc pungentem unguis partem tenui specillo, aut eiusmodi quopiam subiecto eleuare oportet, & scalpelli acie auferre & idq; supereminet, medicamēto crustā inducente consumere. Et profectionē plurimi hoc modo per chirurgiā curati sunt. Si uero maius fuerit id q̄ supereminet, prius id scalpello praecidi, & postea ipsi medicamētū adhiberi debet.

Pterygia circa ungues

Nome

De Ungue contuso.

Cap. LXXXVI.

Quandoquidē saepe ex offensionibus unguibus contusis, dolores consequuntur, ad chirurgiā nos impellētes, Galeni uerba apponere satis fuerit. Sic igitur ait. Contusis unguibus palam dolorē sedās auxiliū experti sumus, sanguinis euacuationem, quum & pulsationes fiunt, & dolores uehementissimi uexant. Oportet autē obliquā facere sectionē, nō ē directo in profundū, superne deorsum, per acutū scalpellū, quo ita secta unguis pars, sanguine excreto, uelut operculū quoddā subiectiorū fiat. Si uero in directū sectionis, ex supernis deorsum, carnis excrecentia cōtinget nimirum per mediā sectionē, subiecta ungui carne aliud corpus producere. Atq; hinc rursus dolores corripiūt, quos in paronychij nominauimus, dum nascēs caro ab ungue comprimitur. Doloris itaque exortes statim in huiusmodi sectione agros uidebis. Sequentibus autem diebus licet nobis subsectam unguis partem leniter eleuare, saniemq; unguis exprimere, & rursus subsectae carni uelut operculum, quemadmodum dixi imponere. Reliqua uero totius digiti curatione mitigatoria ac discussoria uti conducit.

Unguis contusus

De clauis, verruca, & his quæ formicariæ verrucæ appella-  
luntur. Cap. LXXXVII.

Clauus

**C**latus callus est rotundus, albus, clauis capiti similis, per omnem corpo-  
ris partem consistens, maxime in plantis & digitis pedum, dolorem &  
actionis impedimentum in ambulando inducens. Circum circa igitur scari-  
ficatum clauum, & uolsella præhensum, acuto scalpello aut uenæ sectionis  
instrumento radicibus eximere oportet. Quidam uero ut ne rursus nascatur,  
cædentibus igne usi sunt ferramentis. Formicaria autem Verruca, eminentia est  
cutis parua, callosa, rotunda, crassa, in basi inherens, et si scalpatur, formicariæ  
moribus similem sensum inducens. In omni quidem etiam ipsa corpore  
re consistens, maxime autem in manibus. Quidam igitur, inter quos est etiam  
Galenus, duræ pennæ fistula, quales sunt ueterum gallorum, & anserum,  
ac aquilarum, circumscarifcandum esse censent, ita ut obtorqueatur per  
uim in profundum, & ex fundo verruca formicaria tollatur. Alij uero enea  
aut ferrea fistula idem faciunt. Verum iunioribus placuit eam circumscari-  
ficare, & uolsella præhensam, scalpello uelut clauos exciderè. At uero Ver-  
ruca, quæ acrochordon græcis appellatur, eminentia est cutis parua, dolo-  
ris exors, callosa, rotunda ut plurimum, basin autem habet angustam, ut  
pendere uideatur. Unde ita appellata fuit, quod summæ chordæ parti simi-  
lis existat. Extentam igitur eminentiam excidimus. Sin minus, filo saltem  
aut pilo ipsam deligamus. Noui autem quoddam & has, & relatas omnes emi-  
nentias plerique frigido caute consumunt.

De Telorum extrahitione. Cap. LXXXVIII.

**Q**uod ea pars chirurgiæ quæ tela extrahit, maxime necessaria sit, Porta  
Homerus indicauit, dum dixit.

Medici  
laus

Vnus uir Medicum multis est equiparandus.

Tela manu excident, & milia phernæa spargens.

Telorum uariarum  
differentiæ

**R**ecensendæ igitur primum sunt telorum differentiæ. Differunt itaque te-  
la, materia, figura, magnitudine, numero, habitudine, potestate. Mater-  
ia quidem, eo quod hastilia ipsa aut lignea sunt, aut harundinea: ipsa uero  
tela aut ferrea sunt, aut ænea, aut stannea, aut plumbea, aut cornea, aut ul-  
treæ, aut ossæ, aut harundinea etiam ipsa, aut lignea. Ac tot quidem differ-  
rentiæ, maxime apud Aegyptios reperiuntur. Figura uero eo quod alia  
sunt rotunda, alia angulosa, uelut sunt triangularia: alia cuspidata & læcata ap-  
pellata, uelut quæ tres cuspidas habent: alia aculeata, alia sine aculeis. Et ex  
aculeatis alia retrò uergentes aculeos habent, ut in extrahitione contra inhi-  
gantur: alia antrorsum, ut in impulsione idem faciant: alia opposito inter se  
modo insit fulminum, quo & dum trahuntur, & dum impelluntur, contra  
insigantur. Quædam uero etiam per cardinem mouentur, & aculeos habent  
qui contrahuntur, quicquid in extrahitione expanduntur, & teli extrahitionem im-  
pediunt. Magnitudine porro differunt, eo quod alia sunt magna ad trium  
digitorum longitudinem: Alia parua unius digiti longitudine, quæ sunt  
Micæ in Aegypto uocant: Alia inter hæc media. Numero uero, eo quod  
alia sunt simplicia, alia composita. Tenuia enim quædam ipsis inserunt  
ferramenta, quæ in teli extrahitione in profundo delitescencia manent.  
Habitudine autem differunt, eo quod alia extremam partem acutam ha-  
stili infixam habent, alia tubulum habent, cui hastile insitum est. Et alia  
quidem firmiter adaptata sunt ad hastile, alia neglectius, quo in extrahitione  
separantur, et intus manent. Potestate demum, eo quod alia sunt mes-  
dicata, alia non ueneno illita. Atque hæc quidem sunt telorum differentiæ.  
Verum extrahitionis ratio à nobis tradatur, tum in his qui in bello sauciati  
sunt, tum in his qui extra bellum, siue uoluntariè, siue inuoluntariè, ex qualicun-  
que occasione, ex quacunque materia facti fuerint tesa. Extrahitionis igitur te-  
lorum ex carne duplex differentia est, altera per attractionem, altera per impul-  
sionem. Nam in quibus leuiter telum infixum est, exemptio per attractionem fit.

Extrahitione  
telorum ex carne  
duplex

Simili-



Similiter etiam extrahuntur tela, quæ profundum quidem infixæ sunt, uerū  
 A oppositæ partes si uulnerentur, ex sanguinis eruptione, aut consensu, peric-  
 culum inducunt. Per impulsionem uero, in quibus et per profundum infixæ  
 sunt, & oppositarum partium corpora breuiâ sunt, & neq; nervus, neq; os,  
 neq; quicquam horum obstat, quo minus sectio fiat. At in osse fauciato, mo-  
 dus qui per attractionem sit adhibetur. Si igitur conspicuum fuerit telum,  
 statim extractionem facimus. Si uero occultum, debet inquit Hippocrates,  
 si hoc fieri potest, uulneratus in ea figura qua erat dum uulneraretur consti-  
 tuti, ac exploratio fieri. Sin minus, faciens saltem ad illam figuram conforme  
 tur, atq; sic exploratio per specillum fiat. Et si quidem in carne fixum est, per  
 manus telum extrahemus, aut per additamentum quod hastile uocant, si nō  
 excidit id quod ligneum maxime existit. Si uero excidit, per forcipem den-  
 tibus, aut radicibus, aut telis extrahendis destinatam, aut per aliud quod-  
 dam commodum instrumentum extractionem faciemus, carnem etiam ali-  
 quando præsecantes, si uulnus instrumentum non suscipiat. Quod si in op-  
 posita eius partis procefferit telum, & fieri non possit ut per eam partē ex-  
 trahatur, per quam in fixum est, oppositis diuisis per illa ipsum educemus,  
 aut extrahentes, uelut dictum est, aut etiam per fissurā impellentes, atq; hoc  
 aut hastilibus, aut si id excidit, impulsorij instrumenti immisione, cauendo ut  
 ne neruum, aut tendinem, aut arteriam, aut aliquam necessariam partem di-  
 uidamus. Turpe n. fuerit telum extrahentes grauius telo malum inducere.  
 Et si quidem telum extremam partē hastili infixam acutam habet, id quod  
 ex specillo immisso cognoscitur, impulsorij instrumenti scemina immissa  
 ac adaptata, telum propellemus. Si uero tubulum habet, masculo. At uero  
 si exemptum telum arenas aliquas habere compertiat, ita ut alia tenuia fer-  
 tamenta ipsis inferi potuerint, rursus specilli exploratione usi, si illa inue-  
 nerimus, eisdem rationibus educemus. Quod si aculeos oppositos inter se  
 habeat telum, & ideo non concedat, locum uicinum incidere oportet, si nō  
 necessaria aliqua pars appositâ sit, & nudatum telum citra uexationem ap-  
 prehensum extrahere. Quidam etiam harundinem aculeis ipsis circumpo-  
 nunt, atq; sic telum extrahunt, ut ne carnes ab aculeis dilanientur. Et si qui-  
 dem inflammatio absit à uulnere futuris adhibitis, cruentorum uulnere  
 curatione utimur. Si uero inflammatum sit, per irrigationes & cataplasma-  
 ta, ac similia inflammationem curamus. Porro in telis medicatis, omnē car-  
 nem quæ ueneno participauit, si fieri poterit amputamus. Cognoscitur au-  
 tem ex eo quod à sana carne diuersa est. Vehementer enim pallida & liui-  
 da, & uelut mortificata apparet. Ferūt autem Dacas ac Dalmatas, oblinere  
 aculeis helenium, quod & Ninum appellatur, atq; sic hoc sanguinem uulne-  
 ratorum contingens occidere. Si uero edatur etiam ab ipsis, innoxum esse,  
 & nihil mali facere. At si telum in osse fixum sit, rursus instrumentum explo-  
 rabimus. Et si caro impedimento fuerit, hanc amputamus, aut dispa-  
 ramus. Si uero in profundo ossis infixum fuerit, id quod cognoscimus ex eo  
 quod intus firmatum non cōcutiatur, etiam si uis afferatur: excisorio cultro  
 circumsciso osse ablato, aut etiam terebris, si crassum sit, prius perforato, telū  
 exoluimus. At si in principem aliquam partem infixio facta sit, uelut est ce-  
 rebrum, guttur, cor, pulmo, hepâr, uētriculus, Intestina, renes, uterus, uel u-  
 ca, & lethalia signa iam apparuerint, & extractio multam uexationem in-  
 ductura sit, aggressionem recusamus, ut ne supra hoc quoddam nihil profici-  
 mus, etiam conuiciandi occasionem idiotis exhibeamus. Si uero euentus  
 adhuc dubius sit, periculo prædicto aggredi oportet. Multis enim etiam  
 abscessu in aliqua necessaria partē oborto, salus præter omnem expectatio-  
 nem contigit: quum sanè etiam iecoris fibra, & omenti pars, itemq; peri-  
 tonæi membranæ, & totus uterus sæpe ablatus esse cognitus sit, & tamen  
 mors in his sequuta non sit. Sed & guttur sæpe de iniuria in anginis disse-  
 camus, uelut de summi gutturis sectione diximus. In his igitur relinquere  
 x j telum

Extractione ten-  
 lorum ex osse

Instrumenta  
 masculina &  
 feminina

Dacas  
 Dalmate  
 Helenium, Mi-  
 num appellat-  
 tum

Partes inter-  
 ne ablato ci-  
 trante dama-  
 num

telum, inuitabilem mortem inducit, supra hoc quod attem ab omni humanitate alienam id ostendit. At eximere telum, multos uelut par est, seruauit. Nec uero difficilis est, principalium partium fauciatarum cognitio, ut quæ ex symptomatum proprietate, itemque his quæ excernuntur, & partium situ reperitur. Membranis enim cerebri fauciatis, dolor capitis circumcirca uehemens oboritur, & oculorum seruos, cum rubore linguæ, & mentis emotio. Si uero cum cerebro fauciata fuerint, collapsio, uocis interceptio, faciei distortio, bilis uomitus, sanguinis per nares excretio, humoris albi ac pultacci per auditorium meatum euacuatio, si sanies per uulnus transitum reperit. Si in uacuas thoracis partes infixum sit telum, ita ut seruetur spacij amplitudo, spiritus pertransit. At corde uulnerato, circa similitam mammam telum apparet non in uacuum locum progressum, sed uelut in alio fixum, & quandoque pulsatorium motum præferens, contingitque sanguinis atrii excretio, si transitum repperit, perfrigeratio item & sudor, & nimis deliquium, & circa dilationem mors sequitur. Pulmone uero fauciato, si spacium sit, per uulnus spumofus sanguis euacuatur. Si non sit, magis euomitur, & uasa circa collum eleuantur, & lingua colorem mutat, & magnum spiritum habent frigidum appetentes. In septo transuerso uulnerato, telum ad spurias costas infixum apparet. Inspiratio fit magna, cum dolore & suspitio per totam humorum nexus partem. Si uero in abdomen uulnus fiat, ex his quæ excernuntur manifestum fit, si spacium sit, aut etiam telo extractio, aut hastili intus fractio. Nam de uentriculo succus euacuatur, de intestinis sterqus. Quandoque etiam omentum aut intestinum prominet. At uelut ca uulnerata, urina excernitur. Proinde cerebro & membranis uulneratis, telum per caluarie perforationem educemus, quemadmodum in capitis fracturis statim dicetur. In thorace uero, si non sequatur, per moderatam spacij inter costas medij incisionem, aut etiam unius costæ excissionem, membranae custode subiecto, telum extrahendum est. Similiter etiam in uentre, & uesica, & reliquis in profundo partibus, si quidem sequatur telum, circa curiositatem eximatur. Sin minus, rursus ampliori incisione, et cruentorum uulnerum curatione utendum est. In uentre tamen si opus fuerit, futura adhibeatur, uelut dictum est. At si in magno aliquo uase, uelut in iugularibus in profundo aut caroridibus, aut circa alas, aut in lingua magnis arterijs, infixum telum, amplioris sanguinis eruptione, propter exemptionem minatur, prius laqueis ab utraque parte ipsa adstringere oportet, & deinde telum extrahere. Si uero partis ad partem per telum affixio fiat, uelut si brachium thoraci affigatur, aut cubitus alijs corporis partibus, aut pedes inter se, si quidem non per totas utrasque partes telum aut hasta transierit, forinsecus eam acceptam, uelut in una parte, extrahemus. Si autem per totum penitus utrasque pertransierit, defecto in medio ligno, particulatim singula educemus, iuxta faciem figuram. Quandoquidem uero etiam lapides scepe, aut murices, aut massæ plumbeæ, aut eiusmodi quædam è funda emissa infiguntur, tum ob uolentiam, tum quod angulosa existunt, deprehendere hæc ipsa oportet, ex eo quod asper & inæqualis tumor occurrat: & quod non omnino in directum directionem tendat, sed etiam maior sit, & caro uelut confusa ac liuida: & quod cum grauitare dolent. Hæc igitur emota per apta ad hoc instrumenta, aut per specilli concauam partem, aut per uulnerarium specillum eximere oportet. Si uero uulnus admittat, etiam per forcipem dentibus aut radicibus euellendis destinatam extrahantur. Multis etiam infixæ tela latuerunt, & uulneribus ad cicarricem perductis, post multum tempus, abscessu eo loco factio ac ruptio, telum extulit.

*De Fracturis, et ipsarum differentiis.*

Cap. LXXIX.

Consequens professio fuerit ut post doctrinam eorum quæ per chirurgiam exercentur in carne, etiam de his quæ ossibus accidunt, fracturis inquam & luxationibus agamus, eo quod etiam hæc chirurgiæ generi subter-

ita sunt, & primum de fracturis, atque his prius quæ in capite consistunt, tum quod hæc inter chirurgias, quæ in carne, & quæ in osse sunt, medium locum obtinent, tum quod calvaria omnes corporis partes supereminet. Proinde Fractura in summa, diuisio est ossis, aut ruptio, aut dissecio, ab externa aliqua uiolentia contingens. Differentiæ Fracturarum multe sunt. Aliqua enim raphanatum, alia scandulatum, siue assulose, alia in unguem, alia polentæ modo, alia per defractionem fieri dicitur. Raphanatum igitur facta, est ruptio ossis in figuram transversam per crassitudinem. Quidam etiam cucumetatum, & caulatim factam nominant, ex similitudine qua cucumeres & caules franguntur. Scandulatum uero facta, est ruptio ossis oblonga. In unguem uero, eruptio est ossis parte quadam recta, ad finem autem lunaris. Eadem etiam harundinatum facta dicitur. Polentæ autem modo facta, est ruptio ossis in multas tenues partes. Eadem etiam nucatim facta quibusdam dicitur. Defractio uero, aut etiam præcisio, est ablatio partis ossis, per ruptionem superficie, ita ut pars ablata deficiat. Atque hæc Fractura, tum differentiæ sunt.

Fractura quid sit  
Fracturarum differentiæ

De Fracturis in capite. Cap. XC.

PROPRIETATE uero fractura in capite, diuisio est calvariæ, quandoque simplex, quandoque multifida, ab externa aliqua uiolentia inducia. Differentiæ autem fracturarum capitis hæc sunt, fissura, excisio, expressio, depressio, cameratio. In infantibus etiam contusio. Fissura igitur est diuisio calvariæ superficialis, aut profunda, in qua affectum os foras emotum non est. Excisio uero est diuisio calvariæ, cum ossis affectu refractione. Si uero etiam defractionem sitos affectum, deasciationem aliqui affectionem appellauerunt. Expressio est diuisio ossis in multas partes, una cum hoc quod ossicula fracta deorsum ad membranam secesserunt. Depressio est diuisio ossis, cum qua os affectum in naturali loco decedit deorsum ad membranam. Cameratio est diuisio calvariæ, cum ossium affectionum eleuatione. Aut ut Galenus ait, ad interna secessio ac cauatio, similiter ut in expressione. Sic enim ille putat. Quidam etiam pilationem his annumerauerunt. Est autem pilatio fissura angustissima & sensum latens. Quapropter sæpe delitescens, eo quod non exacte cognita fuit, mortis causa exitit. At uero contusio non est ossis diuisio, ideoque merito neque fracturam dixerit quis hanc affectionem, sed est impulsio, & uelut flexio calvariæ introrsum, cauans ipsam citra solutionem, quem admodum in ancis & crudis coriaceis uasis contingit, dum extrinsecus percutiuntur. Sunt autem & contusionis duæ differentiæ. Aut enim per totam suam crassitudinem os contunditur, ita ut sæpe etiam membrana abscedat, uel omnino per totum à calvaria prematur. Aut non per totam crassitudinem, sed circa externam solum superficiem usque ad secundam laminam. Quidam ad has differentiæ etiam Resonitum apposuerunt, qui ex ipsorum sententia, est ruptio calvariæ in oppositis his quæ percussæ sunt partibus. Verum hi errant. Neque enim uelut in quibusdam uitreis uasis, ut ipsi dicunt, etiam hæc contingit. Illa enim eo quod uacua sunt, hoc perpetiuntur. Calvaria autem plena est, & alioqui fortis. Etenim capite in multis alijs partibus percusso, uelut in cadendo contingit fissura calvariæ quæ citra solutionem contiguitatis cutis contingit, postea abcessu circa ipsam facta, & hoc secto apparens, putata est ab ipsis iuxta oppositam plagæ partem facta esse. Sed & hæc uelut primum dicta fissura curatur. Si igitur fractura in capite facta est, manifestum id sit ex eius quod ictum fecit corporis acumine, aut grauitate, aut duricia, aut uiolentia, & ex symptomatis quæ sauciato accidunt, uelut est uertigo, uocis interceptio, repentina collapsio, & maxime in depressione, aut contusione, aut expressione, aut ad interna cameratione, cerebro compresso. Quin & ex sensus significatione percipitur. Si enim memorabilis fuerit cutis diuisio, per ipsam promptè cognoscemus. Si uero omnino non sit diuisio, aut angusta quædam, fracturam tamen factam esse suspicemus, diuisa cute, per

Fractura in capite, differentiæ  
et v. habet  
Fissura  
Excisio  
Deasciatio  
Expressio

Depressio  
Cameratio

Pilatio

Simile  
Contusionis  
differentiæ duæ

Resonitum

Dissimile

l. uertigo  
uocis interceptio

uifum, & per inftrumētū explorationem, hoc cognofcemus. Si enim aliqua ex alijs fracturis eft, ftatim manifefatur. Si uero fifsura folum angufta & pilaris, fenfum latēs, pharmacum quoddā nigrum liquidum, aut etiam atramentum fcriptorium affundimus, & os radimus. Ipla enim fifsura nigra confenditur, quare in radendo perfeuerare oportet, donec fifsurae fignum obfeuretur. Si uero ad membranā ufq; fifsura tendat, à radendo abftinemus, & ad dignotionem progredimur, utrum ab offe difcefferit membrana, aut affixa maneat. Si enim manet, uulnus moderatè inflammatione deftinatur, & rger paulatim à febre liberatur, & pus concoctum apparet. Si uero difcefferit membrana, dolores augentur, & fimiliter febris, & os alium colorem induit, & pus tenue ac crudum fertur. Si uero neglexerit id Medicus, & perforatione nō utetur, longè grauiora fymptomata accedent, bilis uomitus, conuulſio, mentis percuſſio, & febris acuta, in quibus aggreſſionem recuſare oportet. At fi hæc non adſint, fi quidem membrana non difceſſit, & fifsura folum fuerit, per raſorium inftrumētum folum curatur, etiam fi ad profundū ufq; deſcenderit. Si uero folum ad ſecundā laminā, ad illā ufq; raderum eſt, aut etiam fractum os tollendum, uclut dicemus. Si uero etiam internæ partes contritum ſit, etiam hæc diligenter auferre oportet per idoneum inftrumētum. Quod ſi etiam difceſſit membrana, & tu ab initio uulneratū ſuſcepifti, hyeme quidem ante decimū quartum diem omnino offis ablationem facere coneris, æſtate uero ante ſeptimū, ante quā relata ſymptomata accidant. Chirurgiā autem aggredieris hoc modo. Præſtis pilis ad uulnus ipſum duas ſeciones facimus, quæ ad rectos angulos ſe mutuō ſecāt, ad ſimilitudinē literæ græcæ χ. harum tamen altera ea ſit quæ iam antea adefit. Deinde quatuor angulis in uertice excoriatis, ut os quod perforandū eſt totū denudetur, ſiquidem ſanguinis eruptio fiat, linamēta poſca imbuta indemus: Sin minus, ſicca. Deinde linreo complicato, uino ac oleo imbuto impoſito, uinculo cōueniēti utemur. Poſtera die ſi nō recētius aliquod ſymptoma impediāt, perforationē affecti offis aggrediemur. Aegro itaq; in ſella, aut ſupino reclinato, prout uulneri conuenit, & auribus ipſius lana obturatis, propter ſonitum pulſationis, uulneris uinculum ſoluēmus, & amotis linamentis omnib; ſactaq; per ſpongiās deterſione, duos miniſtros iubebimus, ut circundatis tenuibus faſciolīs, quatuor incumbētium fracturæ corporum angulos retrahant, & ſi infirmum os fuerit, uel natura, uel ex fractura, oppoſitis ſcalpris exciſorijs hoc auferemus, primū cauſa à latiore indipientes, & poſtea cum anguloſioribus permutantes, deinde etiam ad ſpecilli formā habentia tranſeuntes, & maſleo leniter impellentes, ita ut uitemus capitis concuſſionem. Si uero robuſtum fuerit os, prius hoc terebellis ſe nō demergentibus perforabimus: Taſſa autem ſunt quæ paululum ſupra aciem eminentias habent prohibentes ne ad membranā demergātur: & tūc ſcalpris exciſorijs uſi, affectum os auferemus, non a ceruatim, ſed particulatim, ſi fieri poterit digitis, ſin minus, forcipe dentaria, aut oſſaria, aut uolſella, pilaria, aut tali quopiam inftrumēto. Inter foramina autem tantum ſpacij reſtinguatur, quantum eſt maximum ſpecilli caput. Profunditas uero ipſorum ea ſit, ut prope ad internam offis ſuperficiē accedant, cauendū tamen ne terebra membranā cōtingat. Quapropter pro offis craſſitudine terebram eſſe oportet, pluribus ea de cauſa præparatis. At ſi ad ſecundā tantum laminā caluariæ fractura procedat, ad hanc uſq; ſolum perforabimus. Poſt offis ablationem, explanata per exciſionem inducta aſperitate, cum raſorio aut ſpecilli formā habente exciſorio ſcalpro, membranæ cuſtode ſubiecto, & oſſiculis aut aculeis, uelut uerſimile eſt remanentibus, induſtriè educiſis, ad linamentorum uſum progrediemur. Hic communis ſimulq; facillis & periculi exors chirurgiæ modus eſt. Sed & per ſcalprum exciſorium lenticulatum dictum excidēdi modus, inſigniter à Galeno laudatur, citra perforationem, poſt ſcalpturam per cauā ſcalpra factā adhibitus. Sic igitur dicit. Si uero

Perforationis  
uſus

Cibiſtue

Terebella ſe  
non demer/  
gentia

Scalprum len/  
ticulatum

A uero semel unam nudaueris partem, subiecto scalpro excisorio, quod lenticu-  
 latam partem ad finem prominentem, obtusam ac leuem habet, ac cursu ue-  
 ro in longitudinem rectam, quum latam lenticulati scalpri partem supra mem-  
 branam firmaueris, paruo malleolo impellens, hoc modo caluariam dissec-  
 des. Contingit enim ex his actionibus omnia quibus opus habemus. Nam  
 membrana ne si dormitans quidem quis operetur, fauciari potest, latae soli  
 parti scalpri lenticulati occurrens. Et si alicubi caluariae adhæreat, etiam hu-  
 ius appensionem citra lisionem auellit rotunda lenticulati scalpri extremi-  
 tas. Sequitur autem à tergo ipsam præeuntem, scalprum caluariam dissecas.  
 Quare neque qui magis periculo careat, neque qui citius operetur, alium perfo-  
 rationis modum reperire licet. At uero per terebras, & modiolos, choenicis  
 das appellatas chirurgi, à recentioribus uelut praua reprobata est. Atque sic  
 quidem aggressionem uelut in fissura exposuimus. Idem tamen modus ex-  
 tendendorum ossium, etiam in reliquis caluariae fracturis conueniet. Sed &  
 quantitatem ossium quæ excindi debent, Galenus nos docet, ita palam di-  
 cens. Quatum uero affecti ossis excindere oporteat, deinceps tibi exponam.  
 Quod quidem uehementer contritum est, totum id eximere oportet. Quod  
 si quædam fissura ab ipso amplius extendantur, quemadmodum aliqui do-  
 coningere uidetur, has ad finem usque persequi non conuenit, ut qui probe  
 sciamus quod nullum damnum ex hoc sequetur, si alia omnia recte fuerint  
 peracta. Post chirurgiam, linteolum simplex pro magnitudine uulneris, ro-  
 faceo imbutum membranæ integenus, & lanæ floccum paruum, similiter  
 rosaceo imbutum, prædicto linteolo imponemus. Deinde complicatum du-  
 plex linteolum uino & oleo imbutum, aut etiam ipso rosaceo, toti uulneri  
 circumponemus, considerando ut ne membrana grauetur. Postea lato deli-  
 gamento utemur, neque per hoc constringentes, sed ut tantum conseruentur  
 linamenta. Eructum inflammationem arcentem ac febrilem appellatum ex-  
 hibebimus, frequentius interim irrigantes rosaceo membranam. Tertiâ uie-  
 ro die facta solutione, & per spongiâs deterfione, cruentorum uulnorum &  
 inflammationem arcente curationis ductu utemur, inspergentes membra-  
 nâ aliquem puluillum capitalem siccum, usque ad concarnationem. Quan-  
 doque etiam radêtes os, si forte opus sit, ob aliquos præminentes aculeos, aut  
 etiam propter ipsam incarnationem. Quin & reliquam medicamentorum  
 materiam, uelut in uulnere dictum est, adhibebimus. Quandoquidê ue-  
 ro sæpe post chirurgiam membrana inflammatur, adeo ut non solum calua-  
 riæ crassitudinem, sed etiam ipsius cutem transgrediatur, cum renisu, & na-  
 turalis ipsius motus pulsatorius impediatur, ad quæ conuulsio maxime, &  
 alia grauiâ symptomata, aut mors consequuntur. Inflammatur autem, siue  
 ob acutam aliquam ossis præminentiam pungentem, siue ob linamentorum  
 grauitatem, aut ob frigiditatem, aut multum cibum, aut uini potum, aut eti-  
 am ob aliquam obscuram causam. Si igitur ob manifestam causam inflam-  
 matur, hæc cito recidenda est. Si uero ex obscura, plus contendere oportet,  
 adhibendo aut uenæ sectionem: si non sit quod prohibeat aut cibi abstinen-  
 tiam, aut uisum ad inflammationem commodum. Sed & localibus utendū  
 est auxilijs, uelut est calidi rosacei irrigatio, & perfusio ex decocto althææ,  
 aut scenæ græci, aut seminis lini, aut chamæmeli, & similibus. Cataplasmatibus  
 etiam ex cruda ordeacea farina, & semine lini, cum prædicto decocto, & a-  
 dipe gallinaceo. Irrigationibus quoque per lanam in capite & occipite, insil-  
 lando etiam auditorijs meatibus oleum quoddam ex his quæ inflammatio-  
 nem arcet. Sed neque uiscera negligenda sunt, quo minus cataplasmata ipsis  
 imponamus. Totius item corporis prouidentiam facere oportet, ita ut in a-  
 quam calidam ipsos inducamus ac inungamus. Si uero perseveret inflam-  
 matio, & nihil aliud prohibeat, etiam bilem educente medicamento Hippo-  
 crates ipsos purgare iubet. Porro denigrata membrana, si quidem in superfi-  
 cie sit nigricies, ex medicamento aliquo hanc uim habente inducitur, uellitis  
 triplum

Modiolus  
 Choenicidas

Eructum

Uisum febrilis

Rasure ossis  
 usque

Membrana ce-  
 rebri inflama-  
 mata

Eructum

Eructum  
 adhibendum

Membrana cere-  
 bri denigrata

tripulum rosa ceo ammixtum, per linamenta indemus, & sic curabimus, con-  
sequenter etiam reliqua adhibentes. Si uero spontanea nigricies fiat, & ma-  
xime in profundo, cum alijs malis signis, tunc sanè de his desperandum est.  
Insiti enim à natura caloris mortificationem significat. Noui quendam qui  
post annum ab accepto uulnere, caluariæ perforationem admisit, & super-  
stes euasit. Erat enim in incipite fractura ex telo inducta, & effluxionem ha-  
bebat, propter quam membrana illaesa seruata fuit.

De Naso fracto &amp; contuso.

Cap. XC I.

Nasus contusus.

Nasus fractus.

**N**Asi inferna pars quæ cartilaginosa est, non frangitur, sed contunditur,  
& si ma sit, & distorta quetur. Superna uero, quæ ossæ naturæ est, quan-  
doq; frangitur. In his uero Hippocrates deligationem reprobatur, ut quæ ma-  
gis similitatem, & ampliorē distortionem inducit, præterquam si quæ circa  
medium nasum partes ob impulsione superemineant. In his enim conue-  
nientem deligationem, cum medicamentū impositione assumit, quo oppres-  
sus nasus naturalem figuram recipiat. Fractio itaq; naso in infernis partibus,  
indice aut paruo digito immisso, directionem partium foras facere oportet.  
In interioribus uero etiam cum specilli capite hoc faciendum est, statim in  
prima die, aut non multo post eam. Nam circa decimam diem nasi ossa cor-  
roborantur. Extrinsecus quoque indice & magno digito hunc conformatum  
oportet. Quo uero conformatus figuram suam in collapsam conseruet, cu-  
neolos ex linteolo intortos ac inuolutos duos naso indere oportet, insinua-  
las nares unum, etiam si altera solū nasi pars sit distorta, & hos sinere, donec  
os aut cartilago corroboretur. Quidam etiam pennas anserum, uelut cala-  
mos adaptatas, linteis insutas naso indiderunt, quo & figura conseruaretur,  
& respiratio non impediretur, quod sanè necessarium non est, quum per os  
respiratio fiat. Quod si inflammatus sit nasus, medicamentū aliquod inflam-  
mationem arcens imponemus, uelut est emplastrum ex succis, aut ex aceto  
& oleo, aut tale quoddam. Aut cataplasma ex similaginetricea, cum man-  
na & gummi cocta imponimus, tum ob inflammationem, tum ut nasus con-  
tineatur. At si in alteram partē nasus fuerit distortus: Hippocrates post con-  
gruam conformationem, iubet lori longi, digiti latitudinem habentis alte-  
ram extremitatem, glutino aut gummi illitam, ad summam nasi partem, ex  
eo latere quod inclinatum est agglutinare, & postquam siccata induruit, lor-  
um iuxta oppositam aurem ad occiput & frontem ducere, atq; eo loco pos-  
stea alteram lori extremitatem firmare, quo in latus retractsus nasus ad me-  
diam figuram dirigatur. Verum hoc nō ualde probatum est iunioribus. At  
uero si in tenues partes fracta fuerint nasi ossa, diuisionem facere aut ma-  
pliare oportet, & tenuibus ossiculis uolsella pilaria exēptis, disparatas par-  
tes futuris cōtrahere, & cruentorum uulnērū ac glutinatoria curatione curari.  
Si uero etiam intra nasum uulcus factum fuerit, lemniscis dictis linamentis,  
ex medicamentis congruis illitis ac inditis curetur. Quidā etiam plūbeis  
fistulis usq; ad cicatricē inductā usi sunt, ut ne caro ex ulceribus excresceret.

De inferna maxilla fracta, &amp; aure contusa.

Cap. XC II.

Auris contusa.

Maxilla infer-

na fracta.

**D**E aure contusa in tertio libro tradidimus, eo quod talis affectio ad fra-  
cturas non pertineat. Maxilla uero inferna frangitur ob multas causas.  
Si igitur extrinsecus solum fracta, non autem instar caulis, in trō cauetur, no-  
tæ expositæ sunt ad manum. Proinde alterius manus, dextra, si dextra ma-  
xilla fracta sit, sinistra, si sinistra, indice & medio digito agroti ori immisso,  
internum fracturæ gibbum industriè foras protrudere oportet, ita ut altera  
manus foris illum excipiat. Maxilla uero rectitudo, ex dentium inferiorum  
ipsi æqualitate colligatur. At si caulatim facta est fractura, tensione utriusq;  
retrō usus, & ministro tenente, directionem uelut dictum est facito. Ceterū  
disparatos circa fractam partem dentes, coniugatos uelut Hippocrates ait  
colligare oportet auto, hoc est aureo lino siue filo. Verum quā hoc non om-  
nibus promptū sit, filo linceo forti, aut bysso, aut setis equinis, aut aliquo alio

huius

Aures fila.

huiusmodi. Quod si cum ulcere facta est fractura, explorandum specillo est, an etiam defractio ossis facta sit. Et si hoc ita habet, & parua est diuisio, ampliata ea, defractum os siue unum, siue plura sint, per idoneum instrumentū eximere, & labia ulceris suturis contrahere, & cruentorum vulnere medicamento adhibito deligare oportet. Si uero sine ulcere, cerato simplici maxillæ imposito, conuenienter deligare, ita ut mediâ fasciæ pars ad occiput locetur, deligationes autem utrinque ad aures in summum mentū procedant, deinde rursus ad occiput, postea sub mentum, & hinc per genas ad sinu put, & rursus hinc sub occiput, ubi etiam finire fasciâ debet. Adhæc rursus superiectio faciendâ est, hoc est aliud ligamentum fronti circumdatum in posteriore capitis parte cōnectatur, ad omnes prædictas deligationes cōstrin- gendas. Quidam etiam ferulam leuem, uelut alij alutam æqualis longitudi- nis maxillæ imponunt, & uelut dictum deligant. Alij deligatione quæ capi- frum dicitur utuntur. Porro si ambæ maxillæ iuxta summum mentum auel- lantur, quâ parte etiâ coalescunt, ambabus manibus paululum diductas ip- sas, rursus inter se coaptato, & coniugatis dentibus uelut dictum est, deliga- to, & congrua usus deligatione, quiescere iussi, tenuibus & forbilibus ali- mentis utantur. Manducatio enim ipsis inimica est. Et si quid de figura cmo- tum esse putaueris, tertiâ quæq; dissoluens rursus deligato. Atque ita facito donec callus obducatur. Obducitur autem callo maxilla intra tres maxime hebdomadas, eo quod & laxa, & medullâ plena est. Si uero inflamatio quæ- dam oboriatur, nihil irrigationum ac cataplasmarum ad hanc omittendum est, id quod in omnibus similiter tibi obseruandum est.

De clauicula fracta.

Cap. XCIII.

Capitulum, de  
ligatio

CLauicula in naturali figura, iuxta internam partem pectori coalescit, iux- ta externam ad summum humerum articulatur. Et propterea quum hu- merum aut etiam ipsum brachium sustineat, si fracturam pertulerit in qua, cumq; tandem parte, ea pars quæ ad humerum est plerumq; magis quam inter- na eius extremitas deorsum fertur, ut quæ unâ cum brachio detrahatur. Pre- stat autem caulatim, & non scandulatim, aut harundinatim clauiculâ fran- gi, ex multorum sanè sententiâ. Quod enim caulatim fractum est, per exten- sionem & compressionem digitorum, promptè ad naturalem statum redit. Reliqua uero eminentias habent, quæ difficulter adaptari possunt. Si igitur per totam crassitudinem quocumq; tandem modo fracta fuerit, duo ministri, alter brachium id quod est ad fractam clauiculâ manibus amplexus, ad ex- ternam partem simulq; sursum trahens, alter oppositum humerum, aut om- nino collum attrahens, sic in contraria faciant extensionem. Medicus autē suis manibus fracturâ componat, prominētiora impellens, & quæ in pro- fundo sunt extra attrahens. Quid si ampliorem opus fuerit extensione, globū fatis magnum ex panniculis aut lanis, aut eiusmodi aliquid molem alē subij- cito, & cubiti flexuram ad costam quæ ad ipsum est adducito, & reliquam uelut dictum est facito. Si uero extremitatem clauiculæ ad humerū, in pro- fundum elapsam, ad superficiem attrahere non potueris, supino reclinato homine, & puluinari congruo dorso subiecto, & ministro ambos humeros deorsum deprimente, ut os clauiculæ quod in profundo est refringatur, rur- sus ipsis digitis fracturam composito. Si uero pars quædam à clauicula de- fracta, & emota, inconstans ac pungens sentiat, scalpello in directum dis- secantes, & defractam auferemus, & reliqua per excisoriam scalpâ explana- bimus, clauiculæ subiecto membranæ custode, aut alio excisorio scalpro, ictus firmandi gratia. Et si quidem inflammatio abest, futuris: sin minus, lina- mentis utemur, & splenijs diuersis præparatis, ad supereminētis ossis incli- nationē, maiora & crassiora apponemus, si adsit inflammatio, oleo madentia: si nō sit, sicca. Et cōgruo ex lana globo alē subiecto propinquæ, cōuenientē inducimus deligationem, per alas, & affectam clauiculam, & scapulâ pro- ut conuenit, deligationes ducentes. Et si clauiculæ ad humerum pars, deor- sum

Clauicula fra-  
ctis

Brachij appen-  
sio

sum inclinata est, latioris lori media parte cubiti gibbo, quæ ad ipsam est, subiecta, totum brachium de collo suspēdemus, ex alia etiam fascia manu, quæ ad ipsam est, suspensa, uelut in his quibus uena in cubiti flexura secta est fieri solet. Si uero, ad supernam extremitatem uergit, id quod raro contingit, recusanda est brachij appensio, æger uero supinus reclinandus est, ac tenui uictu nutriendus. Si uero opus fuerit, etiam irrigationes adhibeantur, & reliqua secundum rationem fiant, usque ad callum inducitur. Inducitur autem clauiculæ callus ut plurimum in uiginti diebus.

De scapula. Cap. XCIII.

Scapulae fractu-  
ra  
Scapulae spina.

Scapula circa latam & menfariam partem non frangitur. Verum iuxta spinam suam fracturam patitur, quæ aliquando exprimitur, aliquando rupturem simplicem sustinet, aliquando etiam defrangitur. Expressio tactu cognoscitur caua occurrens, torporemque uicini brachij, & punctorum dolorem inducens. Ruptio uero tactus asperitate, & loci dolore cognoscitur. Ambo autem inflammationem arcente ductu curantur. At defractio, quæ etiã ipsa tactu cognoscitur, si quidem quiescit, conuenienti deligatione affigitur. Si uero innatat & pungit, per sectionem, & ablationem, & futuris uelut antea dictum est, curatur. Deligationes autem etiam hic similiter uelut in clauicula adhibeantur. Et reclinatio in oppositum latus fiat.

De pectore. Cap. XCV.

Pectoris ossis  
fractura

Media ossis pectoris pars frangitur & exprimitur. Summa uero pars defrangitur. Si igitur ruptio distorta facta est, loci dolor & inæqualitas sequitur, & ad digitorum innixum strepitus. Si uero expressio, dolor uehemens, spirandi difficultas, tussis dum membrana costas succingens pungitur. Raro etiam sanguiniseductio. Causas quoque ossis fracti & cessio. Sed & nunc curatio similiter disponenda est, uelut in scapula dictum est. Verum in expressione repositionis modus secundum Hippocratem assumatur, quæ ille in clauicula quæ intro cessit, exposuit, per supinam reclinationem, & ceruicalis sub dorsum subiectionem, & scapularum depressionem, unã cum hoc ut & costas utrinque manibus contrahamus. Intectis autem costis cum lana, circularis deligatio assumatur, subiectis antea in directum duobus locis ex humeris dependentibus, ita ut postea amborum initia ad opposita conueniantur, & circulares deligationes decidere prohibeantur.

De costis. Cap. XCVI.

Costas dici etiam  
an spalias

Ex costis, quæ etiam spathæ dicuntur, quæ quidem osses sunt, in omni parte ruptionem sustinent. Spuriæ uero, iuxta spinam solum. Nam hic solum osses existunt. In anteriore uero parte, in chartilaginem transeuntes contunduntur, & non franguntur. Signa non difficulter colliguntur. Nam loci inæqualitas digitis explorantis occurrit, & strepitus, & adductio ad partem fractam. In his autem quæ intro uergant, etiam dolor uehemens punctorius, grauior eo qui in pleuritidis sentitur, eo quod uelut aculeo membrana costas succingens sauciatur: spirandi difficultas, tussis, sanguinis sepeeductio. Et alias quidem emotiones digitis conformare licet. eam uero quæ intro cessit non item, eo quod desperata sit reuersionis facultas. Vnde quidam flatuosum & multum cibum exhibere iubent, quo per inflationem & reuersionem fractura foras propellatur, id quod necessarium non est. Nihil enim commune est thoraci cum nutritorijs membris, quantum ad hoc attinet, supra hoc quod etiam inflammatio à repletionem augetur. Alij cucurbitam affigunt, quod non alienum est à methodi ratione, nisi corporum ex contractione coaceruatio, fracturam amplius ad interna impulsura esset. Quapropter

Soranus

Soranus dicit. Lanis oleo calido madidis partes integantur, & per lintecola complicata, inter media costarum pars expleatur, quo deligatio secundum circulem obductionem æqualis ac plana fiat, uelut in pectore. Omnia uero uelut in pleuritidis fiant, ad magnitudinis proportionem. Si uero magna aliqua necessitas cogat, ob uehementem succingentis membranae puncturam,



nam, diuidere cutem oportet, & fractā costā partem denudare. Deinde mē,  
 branæ custo de subiecto, ut ne succingens uulneretur, induritiē excindere,  
 & pungentia ossicula eijcere. Post hoc, ea quæ inflammatione carent con-  
 iungere, & uelut cruentum uulnus curare. Inflammata uero, oleo tinctis li-  
 namentis tegere, & nutrire ac curare his quæ inflammationem sedant. Re-  
 clinare autem prout illi facile tulerint.

De coxæ, & pubis ossibus.

Cap. XC VII.

**C**Oxarum aut ilium ossa raro franguntur. Eisdem autem fracturarum dif-  
 ferentias habent quas scapulæ. defranguntur enim iuxta fines, & rum-  
 puntur in longitudinem, & exprimuntur in medio. Sequitur ad hæc loci  
 dolor punctorius, ac uisatorius sensus. Et cruris ē directio siti corporis, si facta  
 est expressio. Exigunt eandem quam scapulæ repositionem. Solum uero re-  
 cusant eius quod defractū est exemptionem per externas partes, per chirur-  
 giam, quum si opus sit digitis conformentur. Consentaneam etiam reliquā  
 curationem facere oportet, irrigationibus utendo, & cauas ilium partes cō-  
 plicatis linteolis explendo: quodum circulares deligationes obducuntur,  
 deligatio plana fiat. Eadem dicenda sunt & de pubis ossibus. Neq; enim ha-  
 bemus quicquam quod de his peculiariter dicamus.

De uerticulis, & spina dorsii, & de ossi sacro.

Cap. XC VIII.

**V**erticulorum plexus ac ambitus aliquando confusione, Raro etiam  
 fractionem sustinent, ob quas dum spinalis medullæ membranæ com-  
 primuntur, aut etiam ipsa medulla, nervorum per consensum affectiones fi-  
 unt, & mors cita sequitur, & magis si etiam circa colli uerticula consistat af-  
 fectio. Quare prædicto periculo, si fieri potest aliquid audere oportet, & per  
 sectionem premens ossiculum eximere. Sin minus, saltem inflammationē  
 arcente ductu hos mitigare. Si uero processus aliquis uerticulorum, ex qui-  
 bus spina constituta est defrangatur, ita ut fragmentum ad digitorum con-  
 iunctionem moueatur, & uicissim recurat, incisa cute hoc eximere oportet,  
 & facta per suturas contractione, cruentorum uulnecum curatione uti.  
 At uero si os sacrum fractum sit, indicem sinistræ manus digitum in sedem  
 domittere oportet, & altera manu fractam partem quantum fieri potest con-  
 formare. Si uero quid defractum sentiamus, etiam hoc facta diuisione exi-  
 mendum est, deligatioq; ac curatio commoda adhibenda.

De brachio.

Cap. XC IX.

**I**N brachio fracto Hippocrates extensionē sic fecit. Oportet inquit, lignū  
 oblongum, qualia sunt ligna quæ in foramina ligonum immittuntur, ab  
 extremis partibus funibus illigare, & transuersum de trabe aliqua suspen-  
 dere. Hominem uero in alta quadam sede locatum, erectiorem quā in ea  
 figura qua erecta ceruice dormimus, manum suam supra dictum lignū trās-  
 mittere, ut mediam ligni partem per transuersum alæ suæ adaptet. Inflexo  
 autem in rectum angulum cubiti gibbo, minister flexis genibus incumbēs  
 manum eius teneat: Et postea graui aliquo, uelut est lapis, aut massæ plum-  
 beæ pondus, aut eiusmodi quiddā, de cubiti gibbo appenso, atq; ita ut sub-  
 lime dependeat dimisso, fracturam dirigito ac composito. Aut pro graui il-  
 lo appenso, minister brachium deorsum trahat. Quidam uero pro ligno  
 quod in foramina ligonum immittitur, gradu scalæ usi sunt. Soranus autem  
 sic. Homine in sella colloccato, aut quod melius est resupinato, quo minus  
 affligatur. Deinde manu iuxta articuli iunctionem laqueo ligata, & de cer-  
 uice suspensa, quo angularis ipsius figurā seruetur, duobus ministris impe-  
 ramus, alteri ut supra fracturam, alteri ut infra, digitos apponant, atq; sic ex-  
 tensionem perficiant. Si uero intensiore tractione opus sit, duo lora aquali-  
 ter secta brachio circundamus, alterum supra fracturam, alterum infra, &  
 ministro qui super caput ægroti stat, itemq; alteri qui ad pedes, lorum ini-  
 tia damus, & in contrarium extendere iubemus. Si uero ad summum hume-  
 rum fractura consistat, mediam lori partem alæ subijcimus, & ei qui ad ca-

Coxarū ac ilii  
 ossiū fractura

Pubis ossium  
 fractura

Verticulorum  
 fractura

Ossis sacri frac-  
 tura

Brachij fractu-  
 ra

put ad fiat tenendam damus, atq; ita altera oppositum in cōtrarium trahen-  
 re, extensionem in diuersa uelut dictum est facimus. Quemadmodum etiam  
 si ad cubiti gibbum fractura sit, iuxta flum, aut etiam iuxta manus artieu-  
 lum lorum injiciatur. At uero ossibus fracturæ probe coaptatis; extensio  
 remittatur, deligatio autem secundum Hippocraticam legem fiat. Verum  
 si quidem inflammatio abest, & recens sit fractura, sine eis utendum est fasciis;  
 oblongis quidem, latitudine uero trium aut quatuor digitorum, aqua aut  
 postea madidis. Si uero adsit inflammatio, lanis tenuibus ac mollibus oleo  
 imbutis. Et si in medio brachij fuerit fractura, principium fasciæ supra fractu-  
 ram immittere oportet, & ubi iterum atq; iterum deligaris; lursum ferre,  
 quo sanguinis inquit influxiones intercipientur, atque illic desinat. Vten-  
 dum etiam est altera fasciæ, initio eius similiter fracturæ immisso, & in reli-  
 quis eodem modo uelut in priore, ut tamen ex supernis deorsum tendat, ita  
 que hinc rursus ad superna recurat, ibique ita desinat. Moderata uero si  
 at adstrictio, & ad nostrum, & ad ipsius ægroti sensum. Si uero ad summum  
 humerum fuerit fractura, priori fasciæ humerus & scapulæ ac pectus com-  
 præhendantur, quo gruina appellata deligatio fiat. Secunda autem usque  
 ad cubiti gibbum distribuatur, illincq; ad superpositas partes recurat,  
 comprehendens humerum, scapulas & pectus, ueluti prior. At si ad cu-  
 biti gibbum fractura sit, etiam cubitum simul deligare oportet, angulati  
 figura seruata. Eodem modo etiam in alijs artubus, uelut sunt cubiti, for-  
 mora, tibiar, si iuxta partem, aut etiam prope articulum, & non in me-  
 dio artu fractura est, articulus simul deligandus est. Iuniores post deliga-  
 tionem statim etiam ferulas imponunt, quo figura repositionis continetur,  
 adstringentes ipsas ad sensum, & inflammationis molem. Verum anti-  
 qui post septimum diem ferulas adhibuerunt. Nam intra hunc decreuerunt  
 inflammatione, membrum tenuius redditur. Soluere porro deligatio-  
 nes Hippocrates tertio quoque die iubet, ut ne operto citra resolutionem  
 membro, tensio aliqua aut pruritus accedat, neque diutius per spirationes  
 impediantur firmata iam fractura, ob quas contingit, ut non solum anxie  
 quidam pruriant, sed etiam ut erosa per saniei acrimoniam cute exulcera-  
 tio fiat. Affundendum igitur est aquæ temperate calidæ tantum, quantum  
 satis est ad saniem discutiendam. Post septimum diem, pluribus diebus in-  
 terpositis soluere oportet. Nam neque partes saniei excretionem amplius o-  
 pus habent, & calli incrementum sic melius procedit. Ferulas autem hoc  
 modo adhibere oportet. Splenia triplicata oleo imbuta fasciis deligatis cir-  
 cumdamus. Si igitur æquale fuerit crassitudine membrum, æqualitet. Si  
 inæquale, cauescentes partes splenijs explentur, atque ita æqualis crassitu-  
 dinis pars, ad ferularum impositionem efficitur. Deinde ferulis lana aut  
 stappa moderate obuolutis, ipsas circum fracturam adhibemus, non mi-  
 nore quam digiti spacio inter se distantes, leniterq; adstringimus; cauem-  
 do quantum eius fieri potest, ut ferulæ articulum non contingant, & ma-  
 xime iuxta internam flexuræ partem. Vlcerum enim in ipsis aliquando, &  
 neruorum inflammationes efficiunt. Proinde breuiiores ipsas circa articu-  
 los esse oportet, uelut sanè etiam fortiores, qua parte fractura in gibbum  
 attollitur. Præstat autem & brachium ad thoracem moderate deligare, ut  
 ne si id commoueatur, figuram euertat. Si uero inflammatio adsit (hanc au-  
 tem cognoscimus & ex circumscito tumore, & rubore, & quod nunc ma-  
 gis quam primum adstringitur membrum) aut etiam fractura distorta sit  
 aut etiam nihil horum, sed laxæ appareant, aut rursus adstrictiores quam  
 conuenit deligationes, soluere ipsas oportet, & deligationem corrigere.  
 Reclinetur itaque æger supinus, super stomachum manum habens. Bra-  
 chio autem subijciatur ceruical molle, corium inductum habens, quo ir-  
 rigationum influxiones suscipiat. Irrigetur autem quotidie oleo calido, &  
 maxime si adsit inflammatio. Et nutritur tenuiter quidem tempore inflam-  
 mationis

Gruina deli-  
 gatio -

Ferularum  
 usus

mationis, postea uero moderate, ad calli generationem, & quiescat usque ad callum induratum. Concalescit & brachium, & tibia, circa quadragessimam diem: post quem facta solutione, & balneo adhibito, emplastris fracturis de sinatis curatio perficiatur. Atque hic agressionis modus ferme etiam omnibus alijs fractis artubus conuenit.

## De Cubito &amp; radio.

## Cap. C.

Cubiti fractura

ra

Radii fractura

**C**ubitus & Radius quandoque ambo simul franguntur: quandoque alter solum aut circa medium, aut circa partem ad cubiti gibbum, aut ad manus articulum. Pessimum igitur est ambos simul fractos esse. Deinde cubitum solum, facillima uero curatio est, si radius frangatur. Etsi enim maior sit cubito, illum ipsum tamen subiectum habet, in quo uelitur. Verum si quidem alter solum fractus sit, iuxta illum maxime extensionem uehementiorem facere oportet. Si uero ambo, similiter extendere conuenit, figurata manu in angularem figuram, ita ut pollex omnium digitorum alissimus sit. Minimus contra, infimus. Ita enim continget, ut cubitus radio subiiciatur. Quod si robustiore opus fuerit extensione, ambobus maxime fractis, non solum manibus, sed etiam loris facienda est extensio, uelut de brachio dictum est. Sed & omnem deligationem, & reliqua consequenter, una cum ferularum impositione, uelut in illo facere oportet, donec ossibus callus obducatur. Inducitur autem callus circa cubitum plerumque in diebus triginta. Sed & Depositis similis ei quae brachio fractio sit, adhibeatur, exceptis his quae subiiciuntur.

## De summa manu, cunctisq; digitis.

## Cap. CII.

**A**rticuli ad manum, brachialis appellati, & oppositae ei partis ossa, itemque digitorum ossicula, quum laxa sint & natura fistulosa, plerumque contunduntur. Raro autem franguntur. Collocato igitur agro in altiore sella, praecipuum est ei, ut in tabellam aliquam planam, manum pronam ponat, & extensis per ministrum fractis duobus digitis, pollice ac indice ipsa componantur. Verum appressa deligatione utendum est, quo tempore inflammatio accedit. Nam propter laxitatem, facile in ipsis calli redundantia excrefcit. Si uero internodium aut simpliciter digitus fractus sit, si quidem magnus, qui & pollex appellatur, is fuerit, post idoneam deligationem, inferne ad palmam deligandus est, ut quiescat. Si uero index, aut paruus, ad uicinum deligetur. Si ex medijs aliquis, his qui ab utroque latere sunt alligetur: aut etiam omnes ex ordine simul colligandi sunt. Melius enim quiescunt, quemadmodum si fracti etiam ferulis adhibitis colligati essent.

Ossium articuli ad manum

fractura

Brachiale

Brachiale

Brachiale

Brachiale

Brachiale

Brachiale

Brachiale

Brachiale

Brachiale

Brachiale

Brachiale

Brachiale

Brachiale

Brachiale

Brachiale

Brachiale

Brachiale

Brachiale

Brachiale

Brachiale

Brachiale

Brachiale

Brachiale

Brachiale

Brachiale

Brachiale

Brachiale

Brachiale

Brachiale

Brachiale

Brachiale

## De Femore.

## Cap. CIII.

**F**emoris eadem est quae brachij ratio. Priuatim uero femur dum frangitur, magis in anteriorem locum distorquetur, itemque in externum. Nam in hos etiam naturaliter dilatatum est. Reponitur autem per manus, & lora, ac laqueos aequaliter extensos, altera supra Fracturam, altero infra circumdato. Si uero iuxta partem facta sit fractura, si quidem ad femoris caput sit, mediam lori lanam obuolutam habentis partem, ut ne corpora secat, ad interfemineum locamus, & initia ad caput adducentes, ministro tenenda tradimus. Infra fracturam autem circumdato laqueo, initia eius alteri ministro extendenda damus. At si ad genu fractum sit, lori supra fracturam circumponimus, & initia sursum extendenda praebemus. Ipsum uero genu uinculo adstrictum tenemus, atque sic iacente adhuc hamine, & extenso crure, fractam partem componimus. Osa uero pungentia sursum tracta tollimus, uelut saepe dictum est. Reliquam curationem in brachio diximus. Concalescit femur diebus quinquaginta ceterum de positionis modus post totam de crure doctrinam dicitur.

Femoris

fractura

Femoris

fractura

Femoris

fractura

Femoris

fractura

Femoris

fractura

Femoris

fractura

Femoris

fractura

Femoris

fractura

Femoris

fractura

*Patella genu  
fractura*

*hondur*

*De patella genu*

*Cap. CIII.*

**L**Axum os est genu patella, & supernè ac infernè à corporibus ualide cō-  
tinetur. Et scpe quidem contunditur, raro autem frangitur. Patitur aut  
ruptionem per crassitudinem, & in tenues partes fractionem, cum uulnere,  
aut sine uulnere. Notæ conspicuæ sunt. Solutio enim continuitatis occur-  
rit, & cauitas, & strepitus. Componitur autem pars crure externo ita enim  
quæ in duas partes diuisa est digitis contrahitur, donec labia fracturæ mu-  
tuo se contingant ac cōmittantur. Quæ uero in tenues partes fracta est, con-  
formatur. Nam etiamsi non fiat calli obductio, eo quod utraq; pars per con-  
nexos musculos ac nervos, à fœmore & tibia in contrarium retrahatur: ta-  
men multum de distantia contrahetur, actionisq; difficultatem affectis indu-  
cet. Neq; enim dum laborant, diutius id genu sustinet, & in deambulando  
maxime impediuntur ad ascensus. Etenim ad motus in planicie, actionis  
difficultas occultatur. Ad ascensus autem, eo quod genu nō flectatur, circa  
cruris eleuationē ac depositionem depræhenditur. Sed & nunc pungens  
ossiculum cum attractione eximimus, ac consequentem curationem adhi-  
bemus.

*De Tibia*

*Cap. CIIII.*

*Tibia fra-  
ctura  
Fibule fra-  
ctura*

**C**onsona est Tibiæ cum cubito ratio. Nam & hæc duobus ossibus con-  
stat, crassiore altero, quod eodē nomine Tibia appellatur, altero tenuio-  
re, quod ex similitudine fibula appellatur: easdemq; fracturarum differenti-  
as habet, ut quæ ad omnem locum distorqueatur, quum ambo ossa contri-  
ta fuerint, ad ires: quum alterū, intrò & extrà, & tibia quidē etià retrorsum,  
Fibula uero antrosum. Quapropter etià similiter dirigitur ac reponitur, g-  
manus, aut laqueos, ita ut laquei supra fracturam aliquando ipsi tibiæ cir-  
cumdentur, aliquadò fœmori. Quū. n. robustius sit genu, articulus in exten-  
sione illæsus conseruatur. Similiter etià loris infra fracturam utendū est,  
uelut de cubito dictum est. Reliqua uelut de brachio tradidimus, fiant.

*De summo pede.*

*Cap. CV.*

*Summi pedis  
osium fractu-  
re  
Nauiculare os*

**T**alus omnino non frangitur, eo quod undiq; corporibus munitus sit per  
tibiā & fibulam, & os cubiforme. At Nauiculare os, & ossa pedis  
summi ac digitorū pedis, & ipsum os Cubiforme, franguntur similiter ut os  
sa in articulo ad manū, & opposita eius parte, et digitis manus. Quare ne fœ-  
pius eadem dicamus, ea quæ de illis tradita sunt, illinc huc transferantur.

*De Depositione Cruris.*

*Cap. CVI.*

*Depositionis  
cruris modus*

**F**œmore aut tibia fracta, depositionis modus non minore diligentia, quā  
reliqua omnia quæ ad curationem pertinent, adhibeatur. Nam fractarum  
partium æqualitas maxime per illam probe adhibitam conseruatur. Qui-  
dam igitur in canalē, alij ligneum, alij testaceum, fractum membrum depo-  
nunt, aut etiam crus ipsum. Quidam uero sola cum uulnere fracta, eo quod  
hæc, inquirunt, ferulis adstringi non possint. Verum posteriores canalium  
usum penitus reprobarunt, ob multas causas, maxime tamē ob compressio-  
nem ex duricia horum oborientem. Neq; enim negatum est, etiam cum uul-  
nere fracta membra ferulis adstringere, uelut ostendemus. Supinus itaque  
æger reclinetur, & crassum quoddam pallium cruri longitudine æquale, u-  
trinq; contortum ac conuolutum, canali iuxta mediā oblongam cauitatē  
proportionis similitudine respondens, cruri, qua maxime parte fractura  
est, subiiciatur. Expādatur autem super illam cauitatem pallij pellis mollis,  
ad frigationē excipiendās. Deinde huic canaliformi cauitati, crus in lon-  
gitudinem adaptetur, & à lateribus alia pallia, aut lanæ apponantur, ut ne  
in obliquis partes membrum euertatur. Ad uestigium uero pedis, tabella  
panniculo circumdata ob mollitiem, erecta applicetur. Et maioris securi-  
tatis gratiā, duorum aut trium ligamentorum medias partes canaliformi illi  
pallio subiiciamus, & cum ipso simul fractum membrum leniter deligamus.  
Si uero non tolerans hoc æger, totum pedem contrahere cōetur, hunc tu-  
xta summum pedem obuolutum, leniter ad tabellam deligare oportet, ut

*Candili usus*

ne inuitus inter dormiendum, uelut fieri possit, pedem contrahat. Qui-  
dam etiam stragula in medio lecti dissecant, ut omnino immobiles sint ex-  
gri, & per stragulorum hiatum urinæ ac alui crecrementa excidant, do-  
nec callus obducatur.

De Fracturis cum uulnere.

Cap. CVII.

Si cum uulnere facta sit fractura, & sanguinis eruptio adsit, hæc prius siste-  
mus. Si inflammatio, auxilijs ad ipsam utemur. Si uero carniū cōtussio,  
scarificabimus partem, ut de gangræna timor succidat. Si uero etiam hæc  
accedat, aut alia quædam depascendo proserpens putrefactio, prout conue-  
nit occuremus. Habes autem singulorum horum curationem libro quarto.  
Quod si nihil horum adsit, neq; multum de ossibus nudatum sit, hamulis &  
sutaris usi, cruentorum uulnere ductu hos curabimus, detractis ossiculis  
& pungentibus aut innatantibus prius exemptis. At si magnum aliquod  
os supereminet, quod ob magnitudinem in extensione non commissum est,  
huius prospicere oportet. Hippocrates enim in foemote & brachio fractis, e-  
minentia ossa penitus reponere dissuadet, periculū futurū his prædicēs, pro-  
pter inflammationem, aut etiam conuulsionem musculorū, ex tensione ob-  
orientem. Tempus tamē reperit aggressionem aliquando conducentem. In  
quocunq; igitur osse eminetium aggressionem facimus, nequaquam in in-  
flammatione hoc tentabimus, sed prima statim die ante inflammationem,  
aut circa nonam, sedata iam inflammatione. Adapramus autem ipsa per ues-  
ciem, ferreum autem est id instrumentum longitudine septem aut octo di-  
gitorum, crassitudine moderata, ut inter agendum non inflectatur, circa sum-  
mam partem acutum & latum, et moderatē incuruum. Huius acutam extre-  
mitatem incumbētis ossis eminentiæ subiicientes, & iuxta alteram partē  
renitentes, simulq; moderatam membri extensionem facientes, fracturæ ex-  
tremitates inter se non componimus. Si uero hoc facere nō poterimus, per  
scalpra excisoria opposita, id quod eminet amputamus, aut serra defeca-  
mus, quo modo in fistulis tradidimus. Et ossium asperitatem explanata, mem-  
broq; directo, linamentorum ductu curabimus. Maxime uero providendū  
est in coniugatis artubus, aut bifugis appellatis, ubi utrinq; in ipsis os ex  
parte defectum est, quo incontractum maneat membrum, ut etiam exacta  
extensione utamur. Deligatio uero ita adhibenda est. Circulares obuolutio-  
nes ab utraq; uulneris parte fiant. Obliquæ uero circa ulceris longitudinē,  
ita ut iuxta litetæ græcæ χ. figuram, chiasmon dictam, & latinis decussatio-  
nem, à denarij numeri notā χ. similitudine, fasciæ expandantur. Et si quidē  
sordidum adhuc est ulcus, purgantia adhibere oportet. Si purum, incarnan-  
tia, linamentaq; ac reliquam experientia cognitā materiā. Hippocrates  
picato emplastro per linamēta utitur: Hoc autē dicūt esse Tetrapharmacum  
regium: Post incarnationem adhibeantur ferulæ. Quidam etiam ab initio  
ipsas apponunt, ulceris locum uitantes, & prout necessitas urget, ipsas ad-  
stringentes, aut remittentes. In quibus portò squama emeritura est: id quod  
cognoscimus ex eo quod copiosior humor tenuiorq; excernitur, et quod ca-  
ro circa ulcera uacua ac laxa euadens attollitur: in his deligatione laxiore  
utimur, hamulo uero aut eiusmodi aliquo instrumēto squama exempta, to-  
bustiore deligatione utemur. Per totum autē ulcerationis tempus, linamen-  
torum custos ex aliquo inflammationem arcente medicamento, uulnere in-  
cumbat, & simplex ligamentum adhibeatur, quod in singulis curationibus  
soluatur, et reliquis relatis manentibus uelut de brachio tradidimus.

De callo in fracturis superincrecente.

Cap. CVIII.

Calli in fracturis superexercentes decorem omnino uitant. Quādoq;  
etiam actionem impediūt, si prope articulum fiant. Si igitur adhuc recēs  
callus fuerit, ualde adstringentibus medicamentis utemur, per deligationē  
ea apprimentes. Aliquando etiam laminam plumbeam imponētes, id quod  
opus fuit peregitimus. Si uero lapideus ac solidus fuerit, resectum rademus,

Fractura cum  
uulnere  
GangrænaVellus defec-  
tioChiasmos  
DecussatioPicatum em-  
plastrum Hip-  
pocrati est  
Tetrapharma-  
cum  
Ferularū ususCallus in fra-  
cturis excre-  
scens

scalpris excisorij id quod supereminet tollentes, & si opus sit, etiam terebris circumcirca perforantes.

De Callo in distorsione.

Cap. CVIII.

Callus in distorsione obducitur

**Q**Uum ex callis in distorsione obductis, non modicum actionis impedimentum consequatur, maxime si in pedibus fuerint, refractionis modus non est assumendus, ut qui extrema pericula inducat. Sed si recens adhuc est callus, laxatorijs perfusionibus, & cataplasmatibus ex caricis pinguib., et lictore columbino, & alijs medicamentis callum soluentibus utimur. Insuperq; frictione ac contractione per manus hunc dissoluemus. Si uero lapideus sit, diuisa per scalpellum superficie, ossis continuitatem scalpris excisorij soluemus. Deinde fracturam curabimus, uelut antea dictum est.

De fracturis sine callo permanentibus.

Cap. CX.

Callus si fracturis non obducitur

**F**Racturae quaedam callo non obducuntur, ultra praescriptum à natura terminum, aut propter assiduas solutiones, aut ob immodicas perfusiones, aut ob intempestiuum motum, aut ob multitudinem fasciarum, aut quod totum corpus alimentum non sentit, in quibus etiam tenuius membrum reddi contingit. Proinde tum alias causas praescare oportet, tum praecipue, alimentum sensum interceptum, ita ut partim per calidiorum adhibitionem, materiam ad partem attrahamus: partim ut alimentum sufficiens suggeramus, balnea item ac reliquam animi exhilarationem. Signa uero in his quibus iam callus obducitur, tum alia adsunt, tum maxime quod fasciae cruentae fiunt, etiamsi non adsit uulnus, id quod fortassis ideo fit, quod quam substantia circa callum coit, dispersas in ossium cauernis sanguinis guttas exprimit.

De Luxationibus.

Cap. CXI.

Calli obductio nis signum

Luxatio quid sit

**L**UXATIONUM tractionem ad fracturas consequentem, par est ut deinceps aggrediamur. Luxatio igitur ut in summa dicam, est elapsio articuli ex propria cauitate ad inusuetam sedem, à qua uoluntarius motus impeditur. Huius autem differentias alias dicere non possumus, nisi eam quae iuxta maioris ac minoris rationem consistit. Si enim perfectè articulus excessit, communi generis nomine Luxatio appellatur: si sectio. Si uero solum motus est, aut usque ad cauitatis supercilium delatus, subluxatio uocatur.

De inferna maxilla.

Cap. CXII.

Maxilla inferior luxata

**R**VSUS igitur à superioribus initio sumpto, de inferna maxilla dicamus. Superna enim quum immobilis sit, luxationis affectionem effugit. Inferna uero Luxationem quidem non sustinet, eo quod capita ipsius ad supernam maxillam firmiter sunt conclusae. Subluxationem tamen saepe patitur, eo quod muscoli ipsam continentes, praeter assidua mandendi ac loquendi exercitatione molliores existentes, ob quaslibet causas facile laxantur. Nam uerbum *χαττα* apud Hippocratem laxatur significat. In quibus sanè citra aliquam molestiam sua sponte articulus ad proprium locum redit. Verum de perfecta maxillae luxatione, satis est illius uerba apponere, quae cum compendio, & citra defectum, clara existunt. Sic igitur dicit. Luxatur quidem & excedit maxilla raro: laxatur tamen saepe in hiatis, uelut etiam aliae musculorum ac neruorum emutationes hoc faciunt. Manifestum uero ex his maxime fit, ubi excidit. Prominet enim inferna maxilla in anteriorem partem, & in contrariam luxationi partem abducitur: & ossis cornu circa supernam maxillam tumidior fit & infernas maxillas difficulter committunt. Quae uero repositio his conueniat, manifestum est. Oportet enim aliquem uulnerati caput deinere, & alterum infernam maxillam intrinsecus ac extrinsecus ad mentum digitis apprehendere, hiante homine quantum moderate potest, & primum quidem maxillam aliquandiu hac atque illac manu abducere, & ipsum hominem iubere, ut maxillam laxam habeat, & simul abducatur ac quum maximè remittat. Deinde repente tribus figuris simul laxare oportet, diligenti

χαττα apud Hippoc.

genti in hoc animaduersione habita. Nam & ex distortionē ad naturam deducere oportet, & infernam maxillā retrorsum protrudere, ita ut æger hæc sequatur, & maxillas committat, ac non hiet. Atque hæc quidem repositio est, & neq; alijs figuris fieri poterit. Curatio uero breuis sufficit. Splenium enim in ceratū apponitur, ac laxo deligamento deligatur. Securius autem hæc aggressio perficitur, homine supino reclinato, & puluinari plenissimè facto capiti supposito, ut in ipsum trinitente quàm minimum cedat. Insuper autem & caput uulnerati aliquis detinere debet. Si uero ambæ maxillæ luxatæ fuerint, curatio quidem eadem est, uerum hi os minus committere possunt. Nam his genæ prominentiores sunt, sed indistortæ. Quod uero distortæ non sint, maxime cognoueris ex dentium tum supernorum, tum infernorum terminis, è directio inter se correspondentibus. His confertur quàm citissime reponantur. Repositionis autem modus prius dictus est. Si uero non reponantur, animæ periculum imminet, præ febrisbus continuis, & torpido sopore. Soporiferi enim hi musculi sunt, & dum alterantur, & dum intenduntur, præter naturam. Solet etiam his aluus biliosa, meraca, pauca egerere. Et si uomuerint, meraca uomunt. Hi igitur etiam moriuntur decima maxime die. Hoc repositionis modo etiam nos sæpe usi sumus, fomentis prius ex aqua & oleo calidis, per spongiam ad luxatam maxillam adhibitis, ubi maxime ægrè cedit circa introitum: hominēque in terram locato, nos retro ipsum stantes iuxta prædictum modum operamur.

De Clauicula, &amp; summo humero.

Cap. C X III.

Clauicula interna extremitate non excidit: Coarticulata enim est pectore unde neque circa ipsum mouetur. Si uero per uolentiam ab alicuius externi acuti ictu auellatur, ad fracturæ ipsius directionem ac coaptationē reducitur. Quæ uero ad humerum articulata est ipsius extremitas, non ualde excidit, ut quæ & à bicipite musculo, & à summo humero prohibeatur. Sed neque uolento à iquo motu clauicula priuatim mouetur, ut quæ propter solam thoracis distentionem facta sit. Vnde solus homo inter animalia clauiculam habet. Si uero in palæstra contingat, uelut uerisimile est, ut hæc subluetur, & per manus conformationem, & per multiplicium spleniorū appositionē, una cum conuenientibus deligationibus reponitur. Eadem curatione etiam summus humerus subluxatus ad proprium locum reducitur. Et porro cartilagineos ossiculum, quod clauiculā cum scapula colligat, & in exiccatis cadaueribus latet, id si subluxatum sit, imperitis imaginationem exhibet, uelut brachij caput sit elapsum: Nam ob hoc summa humeri pars acutior apparet, locus autem unde discessit cauus. Verum inter hæc distinctionem facere oportet, ex signis quæ deinceps referemus.

De Humero Luxato.

Cap. C X IIII.

Caput brachij ad scapulæ cavitatem articulatum sæpe quidem excidit, sed neq; sursum, ob anchorę similem scapulæ processum: neq; retrorsum, ob eandem scapulam: neq; in anteriorem partem, ob bicipitis musculi tendinē, & ipsum summum humerum. Sed raro quidem intrò & extra: assidue autē, & maxime in infernam partem, minus carnosus. Verū his facile quidem & excidit, & rursus reponitur: Carnosis uero uice uersa, tarde excidit, & difficulter restituitur. Quibusdam uero etiam non luxatis, sæpe ob plagā elapsus suspicio oborta est, eo quod inflammatio uehemens sequuta fuit. Certe cum eos quibus ad infernam partem luxatio facta sit cognoueris. Affectus humerus ad sanum collatus multū differt. Nam & summa humeri pars, unde elapsus factus est, cauus apparet: & summus humerus, uelut de ipso subluxato diximus, acutior quàm pro naturali modo uidetur: & elapsum brachij caput in ala manifeste occurrit: & huius manus cubiti gibbus magis à costis discessit. Si uero cogas ipsum, cum dolore ad costas adducitur: et neq; extento cubiti gibbo, manum ad aures adhibere possunt, neq; alium multiformem

Clauiculæ luxatio

Clauiculam solus homo habet

Humerus si manus subluxatus

Ossiculum cartilagineosum

Humerus luxatus

formem motum per ipsam facere. In pueris igitur, aut his quibus recens & non multa facta est elapsio, etiam prominenti medij digiti flexi nodo, tñ Me-  
 dici, tum laci sang manus, si nō puer sit, soepe restitutio facta est, uelut inquit  
 Hippocrates. Verum efficaciores repositiones hae sunt. Oportet lorum ho-  
 minem, & perfusionibus magis laxantibus usum, ad terram supinum reclina-  
 re, & globum moderatum siue coriaceum, siue alium quendam, non ualde  
 de mollem ad alam adaptare, & sedentem medicum ad latus affectum, ita ut  
 aspiciat latus, si quidem dexter humerus affectus est, dextri pedis calcaneū  
 super pilam alē prius subditam accommodare: Si uero sinister, sinistri & ap-  
 prehenfam manum affectam ad pedes trahere, simulq; calcaneo ad alam re-  
 niti, ita ut etiam minister aliquis retro ad alterum humerum renitatur, ut ne  
 corpus circumtrahatur. Est etiam alius repositionis modus, per humeri sup-  
 positionem. Oportet enim iuuenem ægro longiorem, aut saltem altiore,  
 ad affectum ægri latus stantem, humerum suum illius stantis alae subicere,  
 & manum illius extētam ad uentrem suum trahere, sic ut reliquum laci cor-  
 pus retro eum qui humerum supposuit sublime pendeat. Si uero levis sit æ-  
 ger, alius quidam levis puer ex ipso dependeat. Dum enim manus, & reli-  
 quum corpus, æquali momento illa anre, hoc retro, deorsum trahuntur, con-  
 tingit ut suppositus alae humerus elapsum articulum immittat. Quin & per  
 pistillum appellatum hoc facimus. Est aut lignum oblongum quod erectū  
 in solo supra aliud quoddam primum constituitur. Huius itaq; extremitas  
 superna rotunda, & non ualde crassa, neq; tenuis, alē ægroti aut stantis, aut  
 sedentis subijctatur, prout longum fuerit pilillum, & manu supra pistillum  
 extēta ac deorsum tracta, reliquo autem corpore econtra deorsum uergen-  
 te, aut sua sponte, aut alio quodam trahēte, repositio fiat. Sed & in scalæ gra-  
 du hoc fieri potest, uelut in brachij fracti extensione dicebamus. Hic uero  
 rotundum quoddam corpus graduū alligetur, quod alae ægroti conuenit, et  
 brachij caput propellere potest. Si uero ob affectionis uetustatem, aut propter  
 corporis duriciam, repositio difficultatem exhibeat, crepidinis etiam  
 instrumentum utemur. Est autem crepido lignum longitudine bicubitali, la-  
 titudine quatuor digitorum, crassitudine duorum digitorum, quod alteram  
 extremitatem rotundam habet, & alae cauitatem facile subit, perinde ut pi-  
 stilli extremitas. Hanc igitur extremitatem linteo obligatam quo lenior sit  
 fiat, brachij capiti sub alam adaptamus, totam uero manum ad lignum ex-  
 tentam, ad ipsum alligamus iuxta brachium, & cubitum, & summam ma-  
 num. Postea supra lignum transuersum, inter duas columnas rectas adapta-  
 tum, aut rursus supra scalæ gradum, manum cum ligno transferimus, ut alae  
 transuersum graduū adapteatur: & manum deorsum trahentes, reliquum cor-  
 pus in alteram partem sublime dependere sinimus. Sic enim articulus im-  
 mittetur. Post repositionem autem, moderatam pilam ex lana, si inflamma-  
 tio absit, siccam: si adsit, oleo imburam alae subicimus, ac deligamus, ita ut  
 per hanc alam, & humerum, & alteram alam, fasciæ deligationes iuxta chi-  
 asmum ac decussationem factae appareant, decussatione affectio humero in-  
 cumbente. Brachium uero ad costas deligamus. Cubiti autē gibbum cum  
 summa manu ex ceruice appēdimus, ut ne rursus recēti lapsu articulus exca-  
 dat. Post septimum diem & tardius facta solutione, moderata fritione uten-  
 dū est, quo corpore diuore facto, articulus difficulter elabatur. Si uero soepe  
 excidat articulus, aut ob humiditatem, aut uia iam ex longa consuetudi-  
 ne facta, ad unctionem progrediendum est, uelut antea dictum est. Quum ue-  
 ro foetibus in utero, aut à partu dum adhuc augescunt, pars luxata fuerit, &  
 non iterum reposita, in humero quidem carnes nihil à naturali modo defici-  
 unt. Neq; enim impeditur manus in quolibet opere obeundo, os autem bra-  
 chij non augescens, breuius manet, & uocantur tales ancī, græcis galeanco-  
 nes, quali mustellæ cubito præditi. In foemore uero, & os augmentum non  
 capit, & totum crus corrumpit. Quum enim corporis grauitatem ferre non  
 possit

Per pistillum  
repositio

Per crepidinē  
repositio

Chiasmus  
Decussatio

Anci  
Galeaucones



possit, non exercetur. Sed & in alijs artubus, si luxati maneant, & non reponantur, subiectæ partes omnino læduntur.

De cubiti gibbo.

Cap. CXV.

Quanto magis uaria est articulatio circa cubiti gibbum, quam circa humerum, tanto difficilior existit circa elapsus, & tardius elabitur, & difficilius reponitur, propter eminentiarum & cauitatum densitatem. Patiuntur igitur aliquando subluxationem solum. Soepe uero etiam perfecte elabitur, iuxta omnem figuram, maxime autem anteriorem & posteriorem. Cognoscitur facile, & ad uisum, & ad tactum, elapso occurrente in loco in quem excidit, & eo loco unde excidit cauo apparente. Hæc autem fani cubiti gibbi in speculo maxime declarat. Statim igitur repositionem facere oportet, antequam inflammatio præoccupauit, ægre sanantur. Quædam uero etiã penitus, incurabilia fiunt, & præsertim si in posteriorem partem eluxatio contingit. Omnium enim luxationum quæ in cubiti gibbo fiunt, dolorosissima est & maxime periculosa ea quæ in posteriorem fit partem. Mediocres itaque emotiones etiã moderata intensio restituit, seruis quidem manum extentam circa brachium ac cubitum tenentibus ac retrahentibus; medico uero manus suæ uola id quod excidit in naturalem situm protrudente. At uero Hippocrates eluxationem in anteriorem partem, per acerrimam manus flexionem dirigit, uolam eius ad humerum è directio impellens. Eam uero quæ in posteriorem partem facta est, rursus per acerrimam et multam extensionem: quandoquidem etiam eluxationes, quæ in anteriorem partem fiunt, per uiolentam extensionem maxime fiunt: quæ in posteriorem; per uiolentam similiter flexionem. Si uero perseveret luxatio, etiam uehementiore extensione utemur. Talis autem maxime est ea quæ in fracto brachio ab Hippocrate relata est, ubi lignum quod in foramina ligonum immititur, assumit. Quidam ex recentioribus repositionem sic faciunt. Duobus ministris, uelut dictum est, extendentibus manum, altero superne ad alam tenente, altero inferne ad manus articulum, medicus stans ex aduerso ipsi ægroto, ambabus uolens ad articulum brachium amplexitur, & ubi iussit palmarium obuolutum oblongum, aut fasciam latam, suis manibus simulque ægroto brachio circumdare, & ad externam partem ac deorsum ad summam manum retrahere, ipse sequens cum intensione restrictas manus trahit, donec cubiti gibbi articulum transgrediatur. Oportet autem prius ægri manus oleo illinere, quo lubrica fiat, & medici uolens prompte deducatur. Sic enim ea quæ elapsa sunt, dum pertrahentium manu uiolentia premuntur, in proprium locum reuertuntur. Post repositionem uero, manu in angulum figurata, curatione per splenia & conuenientem deligationem utemur.

De luxatione articuli ad manum, & digitorum.

Cap. CXVI.

Articuli ad manum, & digitorum luxatio, nullam habet difficultatem, nisi cum ulcere fiat. De hac itaque dicitur, ubi de luxationibus cum ulceratione agemus. Eos uero qui absque ulcere luxati sunt, moderata extensione, & curatione inflammationem arcente sanabimus.

De uerticulis spine.

Cap. CXVII.

Spinæ uerticula si perfectam luxationem sustineant, celerissimam mortem inducunt. Neque enim leuem compressionem spinæ medulla sustinet: quædo sanè etiam neruorum solum ex ipsa exortus, si comprimitur, ad periculum inducendum sufficit. At subluxationibus soepe apprehenduntur, & quandoque in anteriorem partem, quandoque in posteriorem, quandoque in latera emotio contingit. Ex his prima Repandatio, secunda Gibbositas, tertia Obstriptas appellatur. Quum igitur multa uerticula simul paululum emota fuerint, hæc plarium simul emotio, secundum circulem flexionis circumferentiam facta apparet. Et quidam decepti, unius uerticuli multum emoti magnam emotionem esse putant, quum tamen magna emotio non rotundam, sed angulari faciat spinæ flexionem, quando etiam maius periculum imminet.

Cubiti gibbi  
Luxatio

Manus articuli  
luxatio

Verticulorum  
spine luxatio

Repandatio  
Gibbositas  
Obstriptas

minet. Spina igitur ad interna emorio, nullo modo dirigi potest, quum ab anteriori parte per uentrem oppositio fieri non possit. Qui enim aut in scapula extendentes ita affectos, aut cucurbitas affligentes, aut sternutationes, aut iussiles, aut inflationes mouentes, se aliquid efficere posse putarunt, satis ab Hippocrate conuicti sunt. Quandoquidem uero sepe detractio quaedam osiculorum spina facta, cauum efficit locum, uelut de fracturis dictum est, qui dam hanc affectionem repandam esse putauerunt. Deinde hac breui curata: promptè enim callus obducitur: scilem curatu Repandationem esse dixerunt, etiam si penitus incurabilis, aut egrè admodum curabilis existat. Nam urinarum & stercoreis suppressio in hac cōtingit, & corporis perfrigeratio. Postea uero etiam inuoluntaria recrementorum excretio. Hac autem obneruorum & musculorum affectionem per consensum fiunt, & ita affecti cito moriuntur, & maxime si in supernis ac circa collum uerticulis affectio consistat. At uero Gibbositatem ex paruo maxime puero factam, & diuturnam esse, & non celerem mortem asserere, sed morbum inducere, eumq; incurabilem Hippocrates pronunciauit. In recens autem facta gibbositate ex casu, machinamenta per scalam, & rectam ægri suspensionem, & utris inflatione, ridicula sunt. Sola uero Hippocratis directio ac repositio sufficiet. Oportet inquit, lignum magnum ea longitudine ac latitudine, ut hominem capere possit, aut scamnum ligno tali æquale, ad parietem apponere in longitudinem extensum, non ampliori quàm pedis ab illo distantia, & super ipsum uersimenta quædam expandere, ut ne hominis corpus frangatur. Deinde hominem lotum prouum supra lignum illud, aut scamnum extendere. Et postea lorum bis circumpectus obductum per alas ad dorsum deligare, initiaq; lori ad lignum oblongum pistilli forma erectum alligare, & hoc ipsum in pauimento ad finem subiecti ligni aut scamni statuere, & superna parte tenendum ministro retro egri caput stanti præbere, ita ut dum inferna extremitas reclinatur, superna uero supra caput adducitur, oportuno tempore extensio fiat. Alto insuper lora pedibus simul circa partes supra malleolos deligatis, & rursus alio partibus ad lumbos, ut huius connexio in lumbis fiat, rursus horum lorum extremitatibus coniunctis, & similiter ad aliud lignum pistilli forma præditum deligatis, pistillum hoc in fineligni aut scamni ad pedes statuemus, quemadmodum illud prius. Atq; ita ministris ut per pistilla extensionem in contraria faciant iubebimus. Quidam uero per appellatos Asellos extensionem faciunt. Sunt autem Aselli, hi axes qui in erecto statuto ligno uertuntur, & utrinq; ad magnum lignum siue scamnum, iuxta pedum ac capitis finem locantur, quibus lora obuoluuntur. Dum porro ita fit extensio, nos manuum nostrarum palma gibbositatem deprimimus, & si opus fuerit, & nullus alioqui merus sit, super ipsam insidemus. At si hoc modo spina non dirigatur, & ferat homo depressionem, appositum parietem in longitudinem instar canalis excuare oportet, è regione ipsius gibbositatis. Vt si rima excuata longitudine cubiti, quæ neq; altior sit, neq; humilior, quàm ægri spina. Imò hanc rimam prius præparatam habere oportet. Huius enim gratia etiam lignum ab initio prope ad parietem apponere iussimus. Et postea tabulæ moderatè alteram extremitatem in parietis rimam immittimus, altera uero gibbositatem dorsum deprimimus, donec spinæ directio sensu percipiatur. Verum ut Hippocrates dicit, Et extensio sola absq; tabula, & rursus sola per tabulam depressio, ad id quod opus est præstandum sufficit. Si uero hoc uerum est, nihil absurdi fuerit etiam in repandatione & obstipitare, ab initio facere prædictam extensionem, citra uidelicet depressionem. Cæterum post repositionem, laminam ligneam trium digitorum latitudine, longitudine uero ea, ut & gibbum, & reliquas sanas uertebras contingere possit, lineæ aut stupea fascia obuolutam, uertebris imponere oportet, & conuenienter deligare, ac tenui uictu uti. Quod si postea etiam reliquæ aliquæ gibbositatis restent, curatione per laxantia ac mollientia medi-

Aselli, axes  
uocantur

medicamenta, unâ cum laminâ appensione utendum est. Quidam uero plumbea laminâ utuntur.

De coxæ luxatione.

Cap. CXVIII.

Coxæ luxatio

Quum reliqua hominis ossa quandoq; subluxationem, quandoq; etiam perfectam luxationem patiatur, coxæ & humeri coarticulatio soli luxationis emotioni subiacent, & magis coxæ, eo quod profundam & rotundam cavitatem habet, alioribusq; marginum supercilijs munita est. Articulus itaq; ob uehementem aliquam uiolentiam extra propriam cavitatem elapso, prout magis aut minus hoc contingit, multæ luxationis differentiæ fiunt. Et iuxta quatuor modos, aut potius locos, coxæ luxatio cōtingit. Aut enim intro, aut extra, aut in anteriorem, aut in posteriorem partem discedit. Et intro quidem ac extrâ frequenter, & multo frequentius intro. In anteriorem autem & posteriorem partem raro. Quibus igitur intro luxatio facta est, his affectum crus si ad sanum comparetur, longius apparet, & genu promi-  
nensius, & iuxta inguen crus flectere non possunt, & iuxta interfoemineum tumor manifestus occurrit, nimirum capite foemoris illic firmato. Quibus uero extra elapsum est, his contraria signa adsunt. Nam & crus breuius apparet, & iuxta interfoemineum cauatur, & ad nates in tumorem eleuatur, & genu magis intus est, & crus flectere possunt. At quibus in anteriorem partem luxatum est, hi crus citra genu dolorem extendunt, sed dum ambulare conantur, neq; ad interna procedere possunt, & urinæ ipsis supprimuntur, & inguen intumescit, & nates rugosæ ac excarnes apparent, & in progressu calcaneo innituntur. Qui uero in posteriorem partem luxati sunt, nō extendunt neq; poplitē, neq; genu, & neq; flectere possunt prius quàm inguen inflexerint. Sed & his crus breuius est, & inguen laxius, & iuxta nates foemoris caput se ostendit. In quibus igitur ex puerili ætate, aut simplici ter multo tempore præterito, hic articulus elapsus neglectus est, & sic manet, in his desperata est curatio, callo membro iam obducto. Quibus uero recens luxatio cōtingit, his hippocratis curatio succurret. Celeriter itaq; ad repositionem progredi oportet. Nam luxationes circa coxam moram trahentes, penitus incurabiles fiunt. In communi igitur in his quatuor luxationibus repositio conueniet, quæ secundum obuersionem ac circumductionem articuli fit, & quæ per extensionem. Si enim affectio fuerit recens, & affectus homo iuuens, aliquid foemur præhendentes, & hac illac circumducen-  
tes, articulum immittimus. At uero intro facta luxatione, etiâ crure solo acerrime ac fortiter ad inguen penitissime flexo, successum sensimus. Si uero his non cesserit, extensione utendum est, primum per manus, ita ut alij crus inferi circa foemur & tibiâ apprehensum trahât, alij superi sub alis corporis apprehendant. Si uero fortiore opus fuerit extensione, laqueis textis aut nexis, aut loris crus deligetur, omnino supra malleolum, & ut ne quid genu patiat, etiam adhuc ipso superius. Verum partes circa pectus ligare non est necesse, sed uel dictum est, manibus sub alas missis apprehensio fiat: & lorum molle ac forte media sui parte ad interfoemineum adaptatum, ab anteriore parte per inguen & clauiculam, à posteriore per dorsum, ad humerum attrahimus, & ambo lori initia ministro damus. Et postea omnes simul trahentes, ut agri corpus eleuetur, extensionem faciant. Hic modus extendendi communis est quatuor luxationis foemoris differentijs. Verum in uariis quoque priuatim modis impulsiois uariât. Dum enim homo extenditur, si quidem intro articulus excidit, lori circa interfoemineum mediam partē, inter foemoris caput, & ipsum interfoemineum locare oportet, & per appositum inguen ac clauiculam ipsum lorum sursum ferre. Sit autem iuuenis quidam, qui affectu foemur crassiore sui parte ambobus cubitis amplexus, fortiter ad externam partē trahat. Hic modus repositionis alijs facilius est. Verum si huic articulus non cedat, etiam alijs utendum est magis uarijs & efficacioribus. Extēdere enim hominem oportet in magno ligno, aut scam-

no, in quo etiam gibbositatem in spina habentes extendimus. Insculpantur autem per totum ferme oblonga quadam cauerna, longitudine & profunditate trium non amplius digitorum, quae inter se distant spacio digitorum quatuor ad summum, quo uentis extremitate in ipsis renitente, in utramque partem opus fuerit, impulsio fiat. At in medio ligno siue scammo, aliud lignum infixum sit longitudine pedali, crassitudine ligni quod lignorum foraminibus immittitur, ut dum homo extenditur, lignum hoc inter femoris caput & interfemineum interueniat. Nam & simul impediatur, ne corpus his qui ad pedes trahunt concedat, & hoc contingente, scilicet neq. opus est, si per se in contrarium extensione simulq. dum extenditur corpus, lignum ipsum ad externam partem femoris caput expellet. Extensio uero iuxta superius dictum modum fiat, & maxime pedis. Si uero sic non repositum fuerit, lignum quidem erectum infixum tollendum est, a latere uero situs eius quem illud habuit utrinque, duo ligna infigantur uelut postes, non minore quam pedis longitudine. His autem lignis aliud adaptetur, uelut quidam scilicet gradus, ut sit trium horum lignorum figura similis litterae graecae.  $\pi$ . Hoc autem continget, si paululum infra summa duorum lignorum capita, medium lignum fuerit adaptatum. Postea uero in sanum latus iacente homine, sanum ipsius crus inter postes sub illum ueluti scalae gradum producemus, affectum autem crus supra ipsum gradum transferimus, ut ad ipsum femoris caput gradus adaptetur, instrato antea ipsi multiplici stragulo, ut ne femora latera tuerentur. Aliud porro lignum latitudine moderata, longitudine uero ea, ut a femoris capite usq. ad malleolum pertingat, intrinsece subiectum ad crus deligetur. Dum autem sit extensio, aut pistillis, uelut antea in gibbositate diximus, aut aliquo alio instrumento, crus deorsum una cum adalligato ligno trahatur, quo per hanc uiolentiam femoris caput in proprium locum reuertatur. Est praeterea alius repositionis modus, citra extensionem in ligno, qui ab Hippocrate laudatur. Oportet, inquit, manus egri molliter ad latera deligare, & pedes ambos fortiter ac mollioribus circa malleolos & supra genua, quatuor digitorum spacio inter se distantes, ita ut laesum crus duobus digitis amplius quam alterum sit extensum. Et postea hominem in caput suspendere, ut a terra ad duos cubitos absit. Quo facto iuuenis quidam peritus suis cubitis laesum femur apprehendat qua crassissimum est, ubi etiam caput femoris exeat, & de repente ad suspensi hominis corpus se appendat. facile enim ita articulus ingredietur. Hic repositionis modus praeter omnibus alijs simplicissimus est, ut qui non per multum apparatus fiat. Sed plerique ipsum uelut miserabilem repudiarunt. At si extra luxatio fiat, extendatur quidem homo uelut superius. Verum lorum ad interfemineum per oppositas partes, inguen uel delictet & chusculam, ferre conuenit. Medicus autem ab externa parte ad internam propellat, uelut iuxta conuenientem autem ex his quae insculptae sunt renitente, & ministro ad sanam natem obstitere, ut ne cedat. Quod si in anteriorem partem facta sit luxatio, dum extenditur homo, uir quidam robustus dextrae manus suae uola in affectum inguen posita, altera manu contra primat, ita ut deorsum, & ad genu depressio fiat. Si uero in posteriorem partem facta est luxatio, non ut in sublime eleuetur, hominem extendere oportet, sed supra solidum quiddam decumbat, sicut etiam quum extra facta est luxatio. Quemadmodum autem dictum est de gibbositate, supra lignum aut scamnum pronus homo extendatur, non ad lumbos, sed in crure uinculis iniectus, uelut paulo ante dictum est. Utendum est etiam de depressione per tabulam ad nates, ubi etiam articulus prolapsus exeat. Atque haec quidem de his qui ab extrinsecus lacessente causa, coxam luxatam habent. Quandoquidem uero etiam ob humoris multitudinem, uelut humerus, ita etiam coxa excidit, uisione ad hoc utendum est, quemadmodum suo loco de ipsa diximus.

Instrumentum  
formeliter

De genu luxatione.

Cap. CXIX.

Genu luxatio

GENU tribus modis excidit. Intro, & extra, & ad popliteum. Nam in anteriorem

riorem partem ne excidat, à patella prohibetur. Eisdē igitur extensionis modis, quandoq; per solas manus, quandoq; etiā per laqueos usi, prout conuenit deligabimus, ac reliquam curationem adhibebimus, ita tamē ut pars diutius asseruetur, ne ullum motum faciat.

*De malleoli luxatione, ubi etiam de digiti pedis.*

Cap. CXX.

**C**Oarticulatio iuxta malleolum si modice emota fuerit, per moderatā extensionē curatur, Vbi uero perfecte luxata est, maiore coactione eget. Conandum igitur & hic fortiore extensione per manus uti. Si uero repositio non fiat, hominē supino in terrā prostrato, inter duos femora ad inferos minimeum, lōgum quandam ac ualidum paxillum in altū erectum in terram defigemus, quo ad ipsum corpus renitens, ad extensionem pedis non cedat. Imo potius antea quam homo reclinatur, defigatur. Quod si adsit magnum illud ligum, quod in medio pedale lignum infixū habere diximus, in hoc extensio fiat. Ministro autem femur tenente & retrahente, alius minister manibus aut etiam per lorū trahat pedem. Medicus autem manibus dirigat luxationem. Sed & alterum pedem aliū inferre teneat. Post repositionem deligatio tuta fiet, fasciis partim ad summum pedem partim ad malleolum obductis, ita ut uistemus ne retrō ad calcaneum tendinem adstringamus. Et homo ad quadagesimū diem asseruetur ne ambulet. Nam hī si ante perfectam curationem ambulare conentur, parti functionis difficultatē inducunt. At uero si quis ex saltu, uelut contingere solet, calcanei os emouisset, aut etiam aliam quandam inflammatoriam affectionem incidisset, leni quadam extensione, & conformatione, & irrigationibus inflammationem arcentibus, & firmis deligationibus hoc corrigat, hominē similiter in quiete seruato usq; ad integram restitutionem. Sed & digitorū in pedibus emotionem, uelut in manibus diximus, non difficile est moderata extensione reponere. In omnibus porro luxationibus ac subluxationibus, post repositionem & quietis dies, permanentem in articulis inflammationem aut tumorem, quæ etiam diuturnas functionis difficultates inducunt, mollientibus medicamentis ad hoc paratis sanabimus, quorū materiam nemo ex hīs qui artis opera tractant ignorat.

*De luxationibus, cum exulceratione.*

Cap. CXXI.

**I**N luxationibus cum exulceratione multa prudentia opus est. Nam hæsi reponantur, extrema pericula, quandoq; etiam mortem inducūt. Inflammatis enim prætensione neruis ac musculis propinquis, dolores uehementes & conuulsiones ac febres acutæ succedunt, maxime in cubiti gibbis, ac genibus, & superioribus articulis. Quanto enim principalibus partibus luntuiciniore, tanto maius periculum inducunt. Hippocrates itaq; horum & repositionem penitus reprobat, & uehementiorem deligationem, solisq; inflammationem arcentibus & mitigatorijs auxilijs in principio uti iubet. Sic enim fortassis uita ipsis cōtigerit. Quod uero ipse in solis digitis consuevit, hoc nos etiam in omnibus reliquis articulis facere conabimur, & statim ab initio, parte nōdum inflammata, articulum elapsū per moderatam extensionem reponemus. Et si quidem iuxta seoptum successerit, in solius inflammationem arcentis ductus usu perseverabimus. Si uero inflammatio aliqua, aut conuulsio, aut aliquid ex prædictis accesserit, rursus eijcere ipsos oportet, si quidem citra uiolentiam remiserint. Si uero & hoc periculum reuereamur: fortassis enim non remiserint inflammati: melius fuerit in maioribus articulis repositionem differre. Vbi uero inflammatio deferuit: hoc autem contingit post septimum aut nonum diem: tunc prædicto repositionis periculo, & quod si non reponatur, manci omnino in posterum utuent, conabimur citra uiolentiam facere aggressionem, uectis etiam usu, quo fasciulus id fiat, adhibito. Cæterum ulceris curationem, uelut in fraçuris cum ulcere dictum est, faciemus.

*Malleoli luxatio*

*Calcanei ossis luxatio*

*Digitorum pedum emotio*

*Luxatio cum exulceratione*

De Luxatione una cum fractura facta.

Cap. CXXII.

Luxatio cum  
fractura

Si cum fractura absq; ulcere luxatio fiat, communi extensione, & per ma-  
nus compositione utendum est, uelut in simplicibus fracturis dictum est.  
Si uero etiam cum ulcere, ex his quæ de fracturis ac luxationibus priuati-  
dicta sunt, conuenientem aggressionem facere oportet.

## SEPTIMI LIBRI CAPITA.

In hoc septimo ac ultimo totius tractationis libro, de medicamentorum omnium  
simplicium, tum compositorum facultate egitur, quorum maxime in superioribus sex li-  
bris mentionem fecimus. Horum ordo sic se habet.

De tēperamentis quæ à gustus qua-  
litatibus iudicantur. Cap. IDe ordine & distantia temperamen-  
torum Cap. IIDe facultatibus particularium sim-  
plicium medicamentorum Ca-  
put IIIDe medicamentis simplicibus pur-  
gantibus Cap. IIIIDe medicamentis compositis pur-  
gantibus Cap. VDe custodia eorum qui purgantur,  
& quid sit faciendū his qui ex sum-  
pta purgatione non purgantur  
Cap. VI

De his qui nimis purgātur Cap. VII

De hieris antidotis Cap. VIII.

Illitiones purgatoriae sedis, & umbi-  
lici Cap. IXMedicamenta uomitoria, & fumen-  
di uerati modi. Cap. X

De diuersis antidotis Cap. XI

De pastillis Cap. XII

Depuluisis qui insperguntur, & de  
smegmatis Cap. XIII

Illitiones oris Cap. XIII

Iucundæ &amp; utiles potiones Cap. XV

Collyria &amp; agglutinatoria Cap. XVI

Emplastra, & coctura ipsorum mo-  
di, & de ceræ ad oleum addendæ  
modo Cap. XVIIMalagmata & Epithemata Caput  
XVIIIAcopa, Illitiones, dropaces, & Sina-  
pismi Cap. XIXOleorum & ungentorum prepara-  
tiones uariæ. Cap. XXOenanthariorū preparationes Ca-  
put XXI

Suffimenta &amp; Cyphi Cap. XXII

Preparatio Malucha, quod aliqui  
Masnaphium uocant Cap. XXIII

Pessi diuersi Cap. XXIIII

De medicamentis inter se uicissim  
succedaneis Cap. XXV

De ponderib. &amp; mēsuris Cap. XXVI

## PAULI AEGINETAE REI MEDI-

CAE LIBER VII. IANO CORNARIO

Medico Physico interprete.

De temperamentis quæ à gustus qualitatibus iudicantur.

Caput I.

Odoris ratio



Colorum ratio

Saporis ratio

De sensiliū corporum temperamento coniecturam face-  
re, neq; ex odore firmum est: Nam quæ inodora sunt, cras-  
sam quidem substantiam habent, sed nondum constas  
quomodo in caliditate ac frigiditate se habeant. Odores  
uero, tenuia quodā modo sunt, & calida, quantitatē iamē  
tenuitatis, aut caliditatis non indicant: eo quod in qua-  
lis sit ipsorum substantia: Adhuc uero magis neq; ex co-  
loribus exacte colligere licet, per singulos enim colores inueniuntur & cali-  
da, & frigida, & sicca, & humida. Ar uero in gustu, omnes partes corporum  
sapore præditorum linguæ occurrunt, & sensum mouent, ut ex ipso manife-  
stū est.

si etiam facultates ipsorum in temperamentis reperiuntur. Quod igitur adstringit, id ipsum cogere, obstruere, densare, repellere, & crassescere, insuperque ad hæc omnia, frigescente & siccare potest. Quod uero acidum est, secare, diuidere, attenuare, aperire & perpurigare, citra calefactionem. Quod autem acre est, similia acido facit, attenuando & purgando. Differt autem in eo, quodd acidum frigescenti, acre calefacit. Et amplius in eo, quodd acidum repellit, acre attrahit, discutit, effringit, & crustas inducit. Sic uero etiam quodd amarum est, perpurgat meatus, & extergit, & attenuat, & secat crassos humores, citra manifestam caliditatem. Quod aquosum frigidum est, densat, compingit, cogit, obstruit, mortificat, & stupefacit. Quod salsum, cogit, adstringit, conditum assuat, siccatur, citra insignem caliditatem, aut frigiditatem. Quod dulce est, laxat, decoquit, molliat, carfacit. Quod oleosum est, humectat, molliat, laxat.

De ordine et distantia temperamentorum.

Cap. II.

**M**oderatum medicamentum, ita ut simili sit temperamenti cum eo cui adhibetur, in eo quodd neque siccatur, neque humectatur, neque frigescenti, neque calefacit: hoc ipsum neque siccum, neque humidum, neque frigidum, neque calidum nominare conuenit. Quod uero siccius est, aut humidius, aut calidius, aut frigidius, hoc à prædominante facultate appellatur. Satis autem est, ut in unoquoque prædominio, quatuor, quantum ad usum attinet, ordines faciamus. Sic ut calidum nominemus in primo ordine, quod nos calefacit, non tamen euidenter, sed ut opus sit rationali quadam demonstratione. Sic autem & frigidum, & siccum, & humidum, quod demonstratione indiget, non, quam actionem fortem & euidentem habens. At uero quæ manifeste iam siccare, aut humectare, aut calefacere, aut frigescenti possunt, talia secundi ordinis esse dicuntur. Quæ uero iam uehementer quidem, non tamen ad summum, tenij. Quæ uero ita calefaciunt, ut crustam inducant, & urant, quarti. Sic etiam quæ frigescenti, ut iam mortificent, quarti ordinis & hæc sunt. Cæterum siccans medicamentum quarti ordinis nullum reperire datur, absque hoc ut urat. Nisi quodd summè siccatur, hoc omnino urit. Talia uero sunt chalcitis, & misy, & calx. Tercij tamen ordinis siccantium esse aliquod potest etiam non urens, quemadmodum quæ uehementer adstringunt omnia, de quorum numero est omphacium, Rhus, & alumen.

De facultatibus particularium simplicium medicamentorum.

Cap. III.

**A**rotonum calefacit & siccatur in tertio ordine, estque discussoria ac sectoria facultatis, paucissima enim participat acerbitate, & si affricetur cum oleo per totum corpus, rigores per circuitum repetentes sanat. Est autem sto macho noxium. Vsum uero magis quam non usum siccans, alopecias facit, cum tenui aliquo oleo illitum. Agallochum lignum est induratum, Thy, id ligno simile, odoratum, quod commanum gratum oris odorem facit. Est etiam sufficiens. Radix eius drachmæ unius pondere pota, nimiam stomachi humiditatem ac exolutionem sanat. Sed & hepaticis, & dysentericis, & pleuriticis conuenit. Agaricum radix, est appendix à trunco exorta, compage laxa, ex aerea ac terrea substantia composita, usum habens discussoriam & sectoriam crassorum humorum. Et obturationes in uisceribus maxime repurgat. Ageraton facultatis est discussoria, & leniter quoddammodo inflammationem arcentis. Agnus siue lygos, hoc est vitex, calcatur ac siccatur in tertio ordine. Est autem tenuium partium, & status discutit. Vnde etiam ad castitatem facere creditur, non modo in cibo ac potu acceptus, sed etiam substratus. Semen ipsius ad hepatis ac splenis obturationem facit potum. Si uero torreatur, minus flatuosus est, & facile distribuitur.

Agrostis, id est gramen, ex parnasso maxime utile est, siccatur & moderate refrigerat, & tenue, & subacerbum est. Quapropter uulnera cruenta glutinat, Et decoctum ipsius lapides frangit. Anchusæ quatuor non eisdem omnes facultatis sunt. Quæ enim Onoclea appellatur, adstringentem & sub

Temperamentum moderatum

Ordines 4 temperamentorum

Simplicium medicamentorum facultates

Thyia lignum

Lygos  
Vitex

Gramen

Onoclea  
sub

subamaram radicem habet. Vnde splenicis & nephriticis prodest. In cata-  
plasmate cum polenta erysipelatis conuenit. folia minus quam radix frige-  
faciunt ac siccant. Quapropter etiam ad alui profluum bibuntur.

*Lycapfos* At Lycapfos magis quodammodo adstringens, similiter erysipelatis con-  
*Alcibiadios* ducit. Onochilos autem quæ & Alcibiadios, uim habet magis medicatam,  
*Onochilos* & a uisera morbis prodest, in cataplasmate imposita, & alligata, & in cibo  
accepta. Quarta uero quæ fere sine nomine est, & reliquis minor, amarior  
autem quam Alcibiadios, ad latus lumbricos conuenit, ac tabuli mensura  
pora. Adarce uelut spuma quedam est aque falsæ, scortis ac arundinibus  
circumpacta. Est autem acerrima & calefactoria, ut propemodum uras, si  
cum alijs foris adponatur. Nam intra corpus ut fumatur, fieri non potest.

*Semperuiuum* Adiantum siccatur, attenuatur, discutitur moderate. Verum in medio quo-  
dammodo est calidi & frigidi. Itaque alopecias sanat, & tumores discutit, &  
lapides atterit potum, & ex pulmone educationes siccatur, & fluxum alui li-  
st. Aizoon, id est, Semperuiuum ex tertio ordine frigefacit. Siccatur au-  
tem & adstringit moderate. Qua de causa etiam ad ignes sacros, & herpe-  
tas, & inflammationes ex fluxione conuenit. Aetonychon in lapidum  
tractatione refertur. Athera pulicula est forbilis, ex molita Zea aut ex fru-  
mento parata, pueris conueniens. Competit etiam in cataplasmata.

*Auena erratica* Aegilops, id est Auena erratica, discussoriam uim habet. Vnde etiam  
*Populus nigra* inflammationes induratas, & aegilops sanat. Aegirus hoc est populus  
nigra, tertio quidem ordine calefacit, sed siccatur moderate, & est tenuis suis  
partibus. Huius folia cum aceto imposita podagricos dolores sedant.

*Pudendū cerui* Ar resina ipsius quia floribus calidior est, ac opis & malagmatis misce-  
tur. Fructus autem cum aceto potus comitialibus prodest.

*Fuligo* Aedoron, id est pudendum cerui masculi, siccatur, & tritum, cum ui-  
no potum, morbis a uisera auxiliatur. Miscetur etiam compositis medica-  
mentis. Aethale, id est fuligo, quæ etiam Lignys appellatur, in litera L  
refertur. Aethiopis folia habet uerbasco similia. Radicis eius deco-  
ctum potum coccidicibus opitulatur, pleuriticis item ac sanguinem spu-  
entibus, & arteriæ asperitati cum melle.

*Sanguis* Aema, id est sanguis frigidus  
nullus est, sed Suillus humidus est, & minus calidus, temperamento ma-  
xime similis humano. Columbinus autem, & palumbi, & turturis, quum  
temperatus quodammodo sit, suffusos ex plaga oculos sanat, si calidus in-  
stilletur. Etsi in perforata caluaria membranæ crassæ infundatur, inflam-  
mationem arceat. Nocturæ sanguis cum uino aut aqua potus, spirandi diffi-  
cultati opitulatur. Vespertilionum mammas uirginum tuetur, & si illina-  
tur pisorum exortum arcere dicunt. Eodem modo etiam ranarum san-  
guis, & chamaeleontis, & ricinorum in canibus. Galenus tamen factio rei  
periculo, hæc ementita esse dicit. Caprinus ob siccitatem aqua inter cu-  
tem laborantibus prodest, si cum melle bibatur: & renum calculos atterit.

Gallarum domesticarum sanguis, eruptiones sanguinis ex cerebri  
membranis cohibet. Agninus comitialibus prodest, Hædinus recens coa-  
gulatus diuiniæ heminiæ mensura cum pari aceto potus, sanguinem e tho-  
race educens sanat. Ursorum & caprarum syluestrium, & hircorum, &  
taurorum abscessus maturare dicitur. Terrestris crocodili sanguis uisum  
acuit. Equorum admissariorum in compositiones erodentes miscetur.

*Lolium* At uero antidotus ex sanguinibus, quæ contra letalia medicamenta da-  
tur, anatis, & hædi, & anseris sanguinem recipit. Aera, id est lolium, cal-  
facit ac siccatur prope ad tertium abscessum siue distantiam a temperatis, ut  
quod facultate iridi par sit. Acacallis fructus est fruticis in Aegypto na-  
scentis, cuius cremor collyrijs ad acuendum uisum destinatis miscetur.

*Vrtica* Acacia tertij ordinis est siccantium, primi frigefacientium. Si uero loca  
fuerit, secundi. Est autem acerba & terrea. Acalyphes, id est urticæ & se-  
men, & folia, tenuium sunt partium, & citra morium siccant, tumoresque  
discutunt.



discutiunt, ac extergunt, & uentrem subducunt. Moderate uero flatuosa sunt. Quare etiam ad uenerem concitant. Acanthus, quem alij melampyllum, alij pæderota uocant, facultatem discussoriam ac siccatoriam habet. Acanthium tenui ac calida facultate præditum, conuulsis auxiliatur. Acantha leuca, id est spina alba, radicem siccantem & moderate adstringentem habet. Quare & stomachicos, & sanguinem spientes, & dentium dolores iuuat. Semet autem tenuis & calida est facultatis. Vnde etiam conuulsionem sanat. Acantha Aegyptia, aut ut alij Arabica, ualde adstringentis ac siccantis est facultatis. Vnde & sanguinem, & alias fluxiones sistit. Acinos, id est Ocimastrum, simile est ocimo, & moderate adstringit. Vnde alium sistit & mensesc pota. In cataplasmate uero imposita, panos & sacros ignes iuuat.

Aconitum quod Pardalianches uocant, erodentis ac uenenosæ est facultatis. Vnde intra corpus assumendum non est, foris autem in his carnibus quæ erodi postulant, ipso utendum est. Quod uero Lycostion non appellatur, eiusdem est cum superiore facultatis, sed priuatim lipos occidit, quem admodum illud pardos. Acorum calfacit ac siccac in tertio abscessu. Vtuntur radice ipsius ad eciendas urinas, & ad induratum splenem. Attenuat etiam corneæ oculorum tunicæ crassitudinem.

Acridæ, id est Locustæ sufficit difficultatem mingendi maxime in mulieribus iuuat. Verum locustæ quæ alas non habet, à scorpione ictis auxiliatur, ut puta cum uino. Actæ magnæ, id est Sambucus, & chamæactæ, id est Ebulus, utraque siccatoriam uim habet, & moderate discussoriam ac glutinatoriam. Quod si bibantur aut edantur, aquam per uentrem ducunt.

Alës, Sal omnis multum siccantem ac adstringentem uim habet. Vnde quicquid humidi in corporibus est, id totum depascitur. Quod uero reliquum est, adstringendo compingit. Quapropter etiam condita asseruat, & à putrefactione tuetur. At uetus Sal maiorem discutendi uim habet.

Althæa siue Ebiscus, species est maluæ syluestris, discussoria, laxatoria, inflammationem arcens, mitigans, tubercula maturans. Radix autem & semen, reliqua quidem intensa habent, sed & utiligines detergunt. Semen uero etiam calculos aiterit. Alimon diuisionarium partium est, salum & subastringens. Plurima ipsius pars calida est temperata, cum humiditate quæ confici non potest. Lac itaque & semen gignit.

Alexa syluestris itidem maluæ species est. Cum uino autem pota dysenterias & rosiones sanat, & magis radix ipsius. Alcyonia omnia detergunt ac discutunt, ac remota qualitatem habent. Verum Milesium (Est autem uermi simile & purpureum) optimum est. Quapropter etiam uisum alopecias sanat, & impetigines ac utiligines detergit. Quod uero superfluum leuem habet, acerrimum est, non solum detergens, sed etiam excorians. Quod autem lanis succidis simile est, omnium debilissimum est.

Alme, id est Muria, si nullam aliam substantiam ammixtam habet, simili salis uim habet, sed debiliorem, ob aquæ mixturam. At salforum piscium, & oliuarum colymbadum muria, magis extergentem uim habet. Itaque coxendicum morbo laborantibus, & dysentericis infunditur.

Aloe primo abscessu calfacit, tertio siccac. Commodat stomacho; extergit, discutit, & ex aluo stercorea expellit. Lota uero minus extergit, sed magis stomacho commodat, inflammationesq; arect, & ulcera ad cicatricem perducit, maxime quæ in sede ac pudendo existunt.

Alos anthos, id est flos salis, liquidum est medicamentum, magis tenui partium quam sal ustus. Satis item acré est ac discussorium.

Alos achne, id est Salis spuma, spumosa salis efflorescentia est, magis tenuium partium ac discussoria quam ille, sed minus compingit.

Alme quæ & auricula muris, helxinæ similem uim habet, frigefacientem & humectantem. Quare ad feruentes inflammationes conducit.

Alpy

Metaphylon  
Pæderos  
Spina alba

Ocimastrum

Pardalianches

Lycostion

Locusta

Sambucus

Ebulus

Sal omnis

Ebiscus siue  
biscus

Muria

Flos salis

Spuma salis

Auricula muris

14

Alypi semen atram bilem deorsum purgat, si pari copia uelut epithymum sumatur, cum sale & aceto. Verum intestina leuaret exulcerat.

*Vulpes* Alysson nomen ex eo habet quod à cane rabido morsus auxiliatur. Quis autem siccantem & discussoriam ac extetforiam uim habeat, rhenes ab ob-  
turatione liberat, & maculas solares extergit. Alopex, id est uulpes ani-  
mal, tota in oleo uiua aut mortua cocta, discussorium efficit oleum, quod  
humores ex profundo ad superficiem trahit. Vnde qui in solium iuderunt,  
& in hoc arthriticos locarunt, ut diutius immorarentur, affectionem inci-  
pientem sedarunt, inueteratam uero moderatiorem fecerunt.

Amaracum calefacit ordine tertio, siccant secundo. Amaranthum at-  
nuat, & secant. Menses itaque ducit potum cum uino, & sanguinis guttos dis-  
soluit cum uino multo: omnes item fluxiones siccant stomacho infestum.

*Arena* Ambrosia in cataplasmate imposita, uim habet adstringentem ac repel-  
lentem. Ammi tertij ordinis est calefacientium ac siccantium. Est & ter-  
tium partium & discussorium, & urinam ciet. Semen autem maxime uti-  
le est. Amiantum in Cypro gignitur simile alumini scisso, quod flammam  
quidem ab igne concipit, non autem uritur. Quidam ipso in psilothrasic  
cantia utuntur. Ammos, id est Arena, quae quidem in littoribus maris est,  
multum siccant. Feruescit itaque à sole, aquosa corpora in ipsa obtura exsic-  
cat. Torrefacta uero siccum fomentum praebet, pro milio & sale.

*Vitis blucstris* Ammoniacum thymiana succus est mollientis facultatis intensae. Vnde  
scirrhos & tofos dissoluit. Amurca secundi ordinis est calefacientium  
ac siccantium intensi. Hac itaque ratione ulcera in siccis quidem corpori-  
bus curat. In alijs autem auget & exacerbat. Ampeloprason uel ut sylue-  
strepotum est, acerrimum & calidissimum ad extremum ordinem. Vn-  
de etiam laedit. Secandi item uim habet, & ab obturatione liberat, & stoma-  
cho ingratum est. Ampeli, id est uitis syluestris racemi & uirgulae exter-  
foriam uim habent. Et adstrictorij quiddam possident. At uitis satiuæ simi-  
lis quidem facultas est, sed debilior. Vitis albae, quam & bryoniae et psilo-  
thrum uocant, germina quidem uelut stomacho grata eduntur, & urinam  
ciet. Radix autem exterioria & tenuum partium est, ac moderate calida.  
Quapropter & splenes pota consumit, & foris cum sicibus imposita scabi-  
es & lepras sanat. Vitis autem nigra, quae & ipsa bryonia appellatur, prae-  
dictae similis est, sed debilior.

*Vitis nigra* Amygdalae amarae attenuant, & ab obturatio-  
ne à crassis ac uiscosis humoribus in profundo indurata liberant, & cutis ul-  
tia detergunt. Sed & arbor ipsarum eandem uim habet. At uero dulces mo-  
derate calidae sunt. Amylum ex tritico sit puro, quod in aqua sub ardori-  
bus canicularibus maceratur, quae aqua quinquies in die diffunditur. Post-  
quam autem mollissimum factum fuerit excolatur, & rursus affusa aqua fur-  
fures separantur, & in sole siccatur cito prius quam acescat. Vism habet per-  
frigeratoriam moderate, & siccantem, & acrium mitigatoriam.

*Portulaca* Amomum uim acoro similem habet, sed acorum siccius est: hoc autem ma-  
gis concoquit. Anagallis utraque facultatis est multum extetforiae, habens  
etiam quid subcalidum & attractorium, ut & aculeos extrahat, & succus  
ipsum è naribus purget. Anagyrus frutex est graue olens & acris, cali-  
dae ac discussoriae facultatis. Semen autem tenuius est, & uomitum ciet.

*Ascyron* Andrachne, id est portulaca frigefacit tertio abcessu, humectat secun-  
do. Ideo sanè & ardoribus prodest uentri imposita, & fluxiones repellit. Vi-  
scolitate item sua dentium stuporem ex acidis inductum leuigat. Verum  
ob adstrictionem, & dysenterijs, & sanguinis eruptionibus prodest.

*Dionysias* Androsamon duplex est, alterum ascyrrum uel ascyroides nominatur,  
& est hyperici species: alterum dionysias. Semen ipsorum purgat. Folia ue-  
ro magis siccant. Androsaces amara & acris herba est, discutiens ac  
siccans. Et ipsa, & semen ipsius in potu urinam ciet.

Anemoniae omnes acris & extetforiae, attractoriaeque ac oscula uasorum  
aperientis

aperientis sunt facultatis. Vnde pituitam alliciunt, & leptas remouent si ap-  
 ponuntur: & lac attrahunt. Anethum calfacit secundo ordine intenso,  
 liccat prope. Hoc si in oleo coquatur, discutit, dolorem eximit, fornum in-  
 ducit, & crudos tumores concoquit. Vitum autem tertij ordinis calefacit  
 entium ac siccat uim euadit, & nimium humidis ulceribus inspersum pro-  
 delit. Humidius uero, & minus calidum ac concoctorium, est uiride.

Anthyllis duplex est. Ambæ autem siccant ulcera. Quæ uero similis est  
 chamæpityi, magis tenuium partium est, ut etiam comitialibus conueni-  
 at. Est etiam magis extensoria. Anisi semen acrius est, calfaciens ac sic-  
 cans in tertio abcessu. Ideoque & urinam ciēt, & flatus discutit.

Antirrhinon siue Anarrhinon similē bubonio uim habet, sed defectuo-  
 siorem. Ex illo igitur etiam de hoc discēs. Anonis aut Ononis calidam  
 uim habet, maxime in radice. Huius succus potus cum uino urinas ciēt, &  
 calculos atterit, & crustas rumpit, & dentes mitigat. Aparine quam alij  
 philanthron, alij omphacocarpon uocant, moderate detergit ac siccat. Ha-  
 bet etiam quid tenuium partium. Apios, id est pirum, temperamento  
 inæquale est, partem terream habens, partem aqueam. Quare si edatur, sto-  
 macho commodat, & sitim eximit. Si uero in cataplasmate imponatur, sic-  
 cat & moderate perfrigerat. Apocynon, aut cynocrambe, id est brassi-  
 ca canina, dicitur etiam Cynomoron, quoniam cinisime canes occidit. Est  
 autem a hominibus uenenum. Hæc ualde grauitus olet, & calida est, citra  
 liccatem. Vnde etiam in cataplasmatibus discutit facultatem habet.

Apochympix est quæ uetus iam nauibus deraditur. Diffundit autem  
 & siccat ac discutit tumores. Araneum animal commolitur emplastro,  
 & impositum fronti, ac temporibus tertianos circuitus exoluere dicit Dio-  
 scorides. Tela ipsius imposita sanguinis eruptionem sistit, & ulcera in su-  
 perficie absque inflammatione conseruat. Argemone extensoria ac dis-  
 cutoria est facultatis.

Arisaron & minus est multo quam arum, & a-  
 crius. Habet autem radicem oliuæ magnitudine. Aristolochia omnis  
 calida & tenuium partium est, & extensoria, & amara, & subacris, & ad me-  
 dicinas utilissima. Verum rotunda magis tenuis est, & per omnia efficaci-  
 or. Clematidis autem odorata quidem est, sed debilior. Longa uero in reli-  
 quis medium inter has locum obtinet, sed calida non minus quam rotunda  
 est. Arceuthos, id est luniperus calefacit ac siccat in tertio ordine. Fru-  
 ctus autem calefacit quidem similiter, siccat autem ordine primo.

Arceon quæ & prosopites, id est personata uocatur, folia colocynthi-  
 dis folijs similia habens, sed maiora & duriora, discutit & siccat, & adstrin-  
 git. Quare etiam folia ipsius uetera ulcera sanant. Arction uerbasco si-  
 mile est. Radicem habet teneram & albam ac dulcem. Tenuis autem & sic-  
 cantis ac moderate extergentis facultatis est. Armeniacum uim habet  
 extensoriam, cum modica acrimonia, & pauciore adhuc adstrictione. Qua  
 propter ocularibus compositionibus miscetur. Et pilos in palpebris auget.

Amabo ex aromaticis est undemum. In ungēta miscetur, ut quod ca-  
 lide ac siccat facultatis in tertio ordine, cassiæ ac Carpesio simile. Vnde et-  
 iam Posidonius, cinamomo non presente, hoc usum se esse dicit. Arno-  
 glossum, id est plātago, frigefacit simulque siccat in secundo abcessu, ex aquo-  
 sa & terrea substantia mixta est, adstringens etiam quid habens. Quapro-  
 pter ad maligna ulcera, & ad fluxiones, & ad putredines conuenit. Et ob  
 temperamenti commoderationem etiam sanguinis eruptiones cohibet, et  
 plurimis competit. Nam & siccitate non mordente participat, ei frigidita-  
 te non dum stupefaciente. Aron primus est ordinis in calefaciēdo ac siccādo.  
 Estque & hoc ex terrea substantia & calida ac extensoria conflatum. Radices  
 aut ipsius calidiores sunt. At uero Dracontion fortius est. Arsenicū uis-  
 tiam uim habet. Vtūtur ipso etiam ad obolendos pilos. Si uero diutius adha-  
 serit, etiam ipsam curē contingit. Vtū autem magis tenuium partium euadit.

Artemissæ ambæ calefaciunt secundo ordine, siccant primo. Sunt etiam tenuium partium, ut etiam calculos in rhenibus atterant, & uterorū sementis conueniant. Artos id est panis si in cataplasmate imponatur, magis discutit quam pro tritici facultate, ut qui & sale, & fermento participet. Namque in profundo harent fermentum attrahit. Asarum similem acoro uim habet, sed magis intensam. Asbole id est fuligo qua pictores utuntur, ex utraque sumitur officinis, & facultatis discussoriae & acris est, ut & uras, & erodiat. Vitis uero ad cicatricem perducit cum rosa ceo cerato. Ascalabotes id est Strilio animal, ad reliqua quidem inutile est. Verum a scorpione ictus auxiliari ipsum impositum aiunt. Miscetur etiam medicamentis intendendi membri uirilis facultatem habentibus. Asclepias ualida & siccā & tenuium partium existens, torsionibus in uino pota conuenit. In cataplasmate uero imposita ad ferarum uenenatarum morius facit, & ad maligna in utero ac mammis ulcera. Ascyron in Androsmo dictum est. Aspalatus facultatem partium dissimilium habet, utpote acris, & adstringens, & per utraq; siccans. Quapropter ad putredines, & fluxiones utilis est. Asparagus per traxus aut myacanthinus, exteriorior est. Inter caliditatem & frigiditatem medius, rhenes & hepar ab obturatione liberat, & maxime radix ac semen. Dentium item dolores sanat. Asplenium tenuium partium uim habet, non tamen calidum est. Hac itaque ratione & calculos atterit, & splenes confumit. Astaphis id est una passa, satius quidem concoquendi simulq; adstringendi ac discutiendi leniter, facultatem habet. Syluestris uero acris fortiter est, adeo ut pituitam detrahat, & uehementer extergat. Astereticus, quem aliqui bubonium, id est inguinariam uocant, eo quod non solum imposita, sed etiam appensa inguinum tumores sanare credita est: mixtam habet facultatem discussoriam ac perfrigerantem. Astragalus frutex est exiguus, habens radices adstringentes, non ingenerose siccans. Vlcera itaque uetera ad cicatricem perducit, & aluum sistit. Radix cum uino pota. Plurimus autem in pheneo Arcadiae nascitur. Asphaltus id est Bitumen siccatur & calcacit secundo ordine. Quapropter cruenta uulnera glutinat. Asphodeli radix exterioriam ac discussoriam uim habet. Cinis autem ipsius uis calidior & siccior, & magis tenuium partium euadit. Quare etiam alopecias sanat. Atracylis siue Cnicus syluestris, ex spinosorum genere est, siccantem & moderate calidam uim habens. Atriplex humectat ordine secundo, frige facit primo. Quapropter etiam per uentrem permeat. Semen ipsius exterioriam est facultatis. Vnde etiam morbo regio ex hepatis obstructione oborto utilis est. Aphace adstringentem facultatem uelut lens habet. Si uero edatur, magis agre quam lens concoquitur. Vchementius autem rescat, simulq; moderate calefacit. Aphronitrum discussoriae ac exterioris est facultatis, ut non solum fordida extergat, sed etiam pruritum sanat. Potum uero stomacho noxium est. Apheos nitri id est Spuma nitri, similem nitro uim habet, sed substantiam tenuiorem. Quapropter etiam leuis est uelut farina. Achras id est pyrum syluestre, similem piro satiuo uim habet, sed magis intensam. Vnde etiam uulnera magna glutinat. Absinthium calidum est primo abscessu, siccum tertio, adstringentem & aniam, & acrem qualitatem simul adeptum. Quapropter etiam biliosos in uentre humores, & per uentrem, & per urinas euacuat. In quibus autem pituita abundat, his propter adstrictionem nihil prodest. Succus autem herbalongē calidior est.

Incipientia à litera. B.

Glaus ungentaria

Balani myreplicæ id est gladii ungentariae pars interna uelut carnosa, exterioriam simulq; incisoriā cum adstrictione uim habet. Quare cum aqua mulla pota drachma pondere, uomitum ciet, & infernam aluum subducit. Cum posca uero ad uiscera obstructa conuenit. Cutis etiam uicia cum aceto illitum extergit. Cortex autē ipsius ualde adstringit. Baccharis boni

*ari* odoris herba est similis cinamomo, coronaria & acris. Huius radix decocta obturata referat, & urinas ac menses mouet. Folia ipsius adstringunt, & fluxionibus profunt. Balustium flos est mali punice syluestris, uehementer adstringens, siccamq; ac frigidam uim habens. Vlcera itaq; superficialia ad cicatricem perducit, & fluxiones sistit. Balsami id quod uelut lignum est, siccat & calefacit secundo abscessu. Est & tenuium partium. Succus autem eius multo tenuior est. Fructus similis quidem est facultatis, sed minus tenuis. Ballote quam Marrubium nigrum uocant, acris & exterioris est facultatis. In cataplasmate itaq; impositum cum sale à carne morbis prodest.

Flos mali punice syluestris

Marrubium nigrum Rubus

Bati id est rubi, fruticosa pars multum adstringit & siccat. Quare & uulnera glutinat, et fluxiones sistit. Radix autem ad hoc quod adstringit, etiam non modice tenuium partium est. Ex quo etiam calculos in renibus attexit. Fructus autem si maturus est, calidior est cum moderata adstrictione, & deoq; etiam editur. Immaturus autem acerbus est, & uehementer resiccat, maxime siccat. Similiter etiam flos. Batrachium id est ranunculus herba quatuor differentias habet. Omnes autem calidae & siccae excellenter sunt facultatis, acrisq; ac uisoriae, ut exulcerent cum dolore. Quod si quis moderate ipsis utatur, cutis uitia solum detergent. Radix autem sicca sterutatorium est medicamentum.

Ranunculus

Rana

Batrachi id est ranæ, aduersus ferarum uenenatarum morsus in iusculo eduntur. Vltarum ipsarum cinis siccat, simus euadit, & sanguinis eruptiones sistit, & alopecias sanat, cum pice liquida. Bdellium & Scythicum, & Arabicum, uim habet molliendi in scirrhum indurata, maxime recentia. Arabicum uero & urinas ciet, & lapides atterit, & concoquit. Betonica herba est exilis habens ramulos, pullegij ramulis similes, & tenuiores, & qui gustantibus nullam ferè qualitatem exhibent. Nascitur maxime in locis petrosis, eaq; utuntur etiam in renalibus compositionibus. Est autem & alia apud Romanos Betonica ap-

Betonica Romana Cestrea Psycotrophon

pellata, quam Dioscorides Cestrum nominat, alij uero psycotrophon, eo quod frigidis locis gaudet. Hac nihil simile prædictæ habet, præterquam actiorem. Et ad hoc ut urinam moueat, etiam alia multa facit, & maxime radix ipsius cum aqua multa pota uomitum concitat. Folia autem aluum subducunt. Bechium siue Bechicum id est Tussilago, dicta est ab eo quod tusiles et erecta ceruice spirationes suffitu iuuat. Composita uero est ex substantia calida & aquosa. Blitum editur, & est olus humidum ac frigidum secundo abscessu. Bulbus qui editur, amaritudine simulq; adstrictione quodammodo participat, siccatq; ac glutinat uulnera, & extergit. Vomitorius autem bulbus calidior est huius facultate. Botrys quam alij Ambrosiam, alij uocant Artemisiam, planta est ualde boni odoris, quæ cum uino pota recta ceruice spirantibus prodest. Bubonium in Astere attico dictum est.

Tussilago

Ambrosia Artemisia

Buglossum humidum & calidum est temperamento. Vnde etiam uino insectum leticiam inducere dicitur. Bunium quod alij arctium appellant, calidum est, & urinam ciet, & menses ducit. Sed & Pseudobunium huic simile est. Buprestis animalculum est cætharidi simile. Reponatur itaq; eo dem uelut illa modo. Butyrum concoquentis et moderate discutientis est facultatis in mollibus corporibus. Inguinū itaq; & glandularum tumores, & parotidas iuuat, & gingiuas attenuat, maxime in dentientibus pueris, et humores in thorace hærentes delinctum concoquit. Bupthalmum florē chamæmelo similem habet, sed multo maiorem & acriorē, & ideo discusso rium, ut etiā duricias sanet cerato ammixtus. Brathy id est herba Sabina similis est cupresso, calefacit ac siccat in tertio abscessu. Est & tenuissimarū partiū, attenuantis & discussoriæ existens facultatis, si bibatur. Est item ad putredines simile cupresso. Britannica adstringentis & glutinantis est facultatis, similiter uelut lapathum syluestre speciem præferens. Succus ipsius putrefactiones in ore sanat. Bronius id est Avena similem orneo uim habet. Siccat autem & discutit moderata & citra mordacitatem. Habet etiam aliquod

Arctium

Herba Sabina

Lapathum

Avena

*Muscus marinus* aliquid adstrictionis. Vnde & alui profluua sanat. Bryon id est Muscus marinus frigefacit & adstringit. Quare feruentes inflammationes impolit, *Muscus arborcus* iuuat. Est & alius Muscus, qui splanchnon appellatur, & in quercubus ac populis albis, & piceis reperitur. Hic discutit simulq; moderate mollit, praesertim qui in cedris reperit. Bryonia dicta est in ampelo, id est uite alba.

Initium literæ. γ.

*Lac omne* Gala id est lac omne compositum est ex tribus substantijs, caseosa, serosa, & pinguis, quam plurimam habet lac bubulum, ex qua etiam butyrum fit. *Serum* Serum autem ipsius exterioriam uim habet. Vnde & alui subducit, si quis ipsum in coctura separet. Caseosa uero & crassa magis inferciunt, & propterea acrimonia obundit. Coctum autem lac siue siliicibus ignitis immixtum, siue aliter, optimum medicamentum est dysenteriae, & fluxionum uentris acrium. Totum lac ad acres oculorum fluxiones, & alias acrimonia conducit. Temperatissimum autem est lac mulieris. Post hoc, caprinum. Deinde alinum, & ouillum. Postremum bubulum. *Mustela* Gales id est Mustelæ cinis multum descutit. Cum aceto itaq; illius podagris & articulari morbo prodest. Sale uero condita ac assiccata, comitialibus commodat.

Galion ex eo quod lac coagulat nomen reperit. Simile est aparinae, sicans & subacre. Flos ipsius ad sanguinis eruptionem conductus, & ad ambusta ab igne. Galio plus quam alij galio bdolon uocant, similis est urticae, leuior tamen & graueolens. Vim habet discussoriam & mollitoriam tumorum induratum. Facit etiam ad serpendo depascentia in cataplasmate impositum. Garum calefacit ac siccatur potenter. Quapropter & ad putredinem ulcera foris ipso utuntur, & dysentericis ac coxendicis morbo laborantibus per clysterem infundunt. Gentianæ radix multum efficax est ad attenuandum, perurgandum, extergendum, & ad obturata referenda.

*Terra omnis* Geranion quod solta habet anemonæ similia, radicem uero quæ editur, eius radicis una drachma cum uino pota, inflammationes uteris soluit. Alterum Geranium ad medicinam inutile est. Gga id est Terra omnis siccatur. Quæ uero nullam aliam substantiam ammixtam habet, etiam citra mordacitatem. Si uero ignea aliqua qualitas ipsi ammixta sit, lota etiam hanc deponit. Quæ igitur colitur terra pinguis omnis, utilis est ad curationem omnium partium quæ resiccatione opus habent. Itaq; Aegyptiæ terræ luto utuntur ad quas & lienosas affectiones, & ad Laxos tumores, & euidentem utilitatem sentiunt. Ex medicatis autem terris Lemnia rubrica, quæ sphragis id est sigillum dicitur, ad hoc quod resiccatur, etiam moderate adstringens, aduersus leuissima medicamenta auxilio est, & maligna ulcera sanat cum aceto aut uino. Et sanguinis eruptiones sistit omnes, & dysenteriam serpendo depascentem sedat, aqua multa prius per clysterem infusa. Deinde muria. Minium uero siue rubrica Sinopica uehementior quam lemnia est, & in compositiones obducentes meatus miscetur. Pota etiam lumbricos occidit. Multo uero mitior est Samia quam Lemnia terra, ut quæ glutinosa est ac uiscosa. Vtendum igitur ipsa ad ea quæ mitigare oportet. Sed & sanguinis spuma uenit, sanat. Selinusia & Chia magis exterioria sunt. Quare etiam quædam mulieres ipsi pro sinegmatibus defrictorijs in facie utuntur. Ulcera item incarnant & ad cicatricem perducunt, & magis igne ambusta. At Cimolia mixta est facultatis frigefacientis ac discussoria, si illota est. Lota uero magis frigefacit, & ambusta cum posca curat. Ampelitis terra (Est autem ea quæ uitibus illinitur, ut uermes in ipsis perdat) siccatur & discutit fortiter, neq; id citra mordacitatem. Cretica aërea est, & extergit citra mordacitatem Eretria euidenter adstringit. Vitis uero etiam siccatur citra morsum. Melior autem est cinerea. Prigitis similem Cimolia uim habet, uerum nigra est. Armenia quam & bolum nominant, siccatur. Vnde dysentericis, & fluxionibus per uentrem, sanguinisq; sputo, & tabi, & respirandi difficultati ob humiditatem ductæ, & humidis ulceribus, & pestilentibus affectionibus, generose

*Minium Synopicum*  
*Rubrica Synopica*

*Bolum armeniacum*

generose conuenit. Bibitur cum uino tenui diluto: Sin febricitent, cum aqua. Sed & Alana bolus similis Armeniæ uim habet. Arochra discutien di ac erodendi uim habet. Vlcerataque carne nimium crescentia depri mit, & caua explet cerato ammixta. Geras idest Senecia serpentis latis siccat. Aceto itaque seruata dentium dolores curat. At Aspidis exuuium cum melle ac illitum, maxime uisum acuit. Ges entera id est Intesti na terre, siue uermes terreni triti sauciati sunt eruis impositi, statim mirifice iu uant. Gigarta, Vinacea secundo ordine siccant, frigefaciunt primo. Quis itaque satis acerbis sint, omnibus fluidis affectionibus conueniunt.

Gingidium caliditatem non adeo manifestam habet. Siccat autem in ter tio abcessu, & adstringit. Ideoque stomacho gratum est. Glaciū adstrin git cum quadam iniu cunditate. Sed & manifeste frigefacit, ut etiam sacros ignes qui non sunt adeo uehementes curet. Glaux herba calida & humi da temperamento est. Quare etiam lac generat. Glechon id est pulegium calefacit & attenuat uehementer: Vnde impositum rubefacit, & humores crassos ac uiscosos ex thorace & pulmone expuere facit. Glocos id est sordes balnearum calfacit moderate, mollit, discutit, fissuris & condyloma tis tuberculis conuenit. Glycyrrhiza id est Radix dulcis tepidi ac humi di est temperamenti, habetque aliquid adstrictionis. Vnde etiam asperitates leuigat, non solum in arteria, sed etiam in uelica scabiosa. Est etiam sitis exemptrix. Glycyside quam alij pentorobon, alij pæoniā uocant, radi cem habet a crem, & subamaram, ac clicantem, quæ & aliquid adstringens habet. Vnde menses mouet, & rhenes ac hepar expurgat, amygdala ma gnitudine pota cum uino. Si uero austerum uinum fuerit, etiam fluxiones per uentrem sistit. Alligata puerorum morbos comitiales sanat.

Gnaphalium nomen habet ex eo quod folijs ipsius, utpote teneris, pro gna phalo id est tomento utuntur. Sunt autem alba & moderate adstringunt. Quapropter ad dysenterias cum uino austero bibuntur. Gongilidis id est rapi & radix, & semen, flatuosa sunt, & semen generant, & uenerem stimu lant. Gordylion quod alij Sefeli uocant, calidum est, & urinam ciet, & menses ducit. Radix ipsius cum melle delincta, humores in thorace educit. Gyris id est pollen, simile amylo uim habet, uerum calidiorem quodam modo. Gypsum ad hoc quod siccet, meatus obducendi uim habet. Vnde ad sanguinis eruptiones conuenit, cum polline, & oui candido. Vstum ue ro non amplius similiter meatus obducit, sed magis siccet, & repellit, ma xime cum posca.

#### Initium literæ. M.

Dades id est Teda habent quid acre, & concoctiorum ac exterforium. Vnde aceto coctæ dentium dolores sanant, si acetum colluatur. Si uero etiam mel ammixtum fuerit, pituitam detrahunt. Arsi in medicamenta quæ delinguntur misceantur, humores in thorace hærentes educu faciles faci unt. Damascena in loco prunorum referuntur. Damasonium ex terforiam quandam uim habet. Quare calculos atterit & quæ per aluum prodeunt, ad urinas transfert. Dauus qui & staphilinus dicitur, duplex est. Satiuus cuius radix flatuosa est, & uenerem stimulat. Sed & ipsum sati ui semen quid habet quod uenerem stimulat. Syluestris autem semen peni tus flatu expers est, & urinam ciet, & menses mouet. Similiter autem & herba. Daphnes id est lauri arboris folia siccant & calefaciunt uehemen ter. Magis tamen fructus. A radicis cortex amarus & adstringens aliquā uisum, calculos atterit, & hepaticis commodat, trium obolorum pondere cum uino odorato potus. Daphne herba quæ etiam Alexandria uocatur. Calida, & acris, & subamara est. Quapropter menses & urinas mouet. Sed & daphnoides eiusdem facultatis est, itemque chamædaphne. Hæc autem etiam editur. Derna id est pellis ouilla rechs detracta adhuc calida, his qui flagris cæli sunt circumdata, mirifice ipsos sanat. Arsi hippopotami pel

Bolus Alana

Senecia ser pentis

Aspidis exuui um

Intestina terre

Vermes ter re ni

Vinacea

Pulegium

Sordes balneo rum

Radix dulcis

Pentorobon

Pæonia

Rapum Sefeli

Pollen

Teda

Staphilinus

Laurus arbor

Alexandria

Chamædaphne

pellis ouilla

Pellis Hippo potami

*Pellis viperæ* lis usta, & cum aqua trita imposita, tubercula dispergit. Viperæ uero pel-  
*lola ueteris* lis trita imposita, alopecia laborantibus mirifice pilos producit. Pelles siue  
 coria solearum ueterum ustarum, cinerem siccantem faciunt. Vnde aruita  
 ex calceamentis curant, si non amplius inflammata sunt, itemq; ambusia,  
*pseudodistillas* & intertrigines, & extuberantia. Distamnium magistenuis est facultatis  
 quam pulegium. Reliqua similia ipsi habet. At quod pseudodistamnium ap-  
 pellatur debilius est. Dionysias dicta est in Androsamo. Diphryges  
 mixta est facultatis. Habet enim & adstringens quiddam, & moderate acie.  
 Quapropter etiam ad maligna ulcera commodum est medicamentum.

Dipsaci spina radix siccata ordine secundo, Habet etiam quid exterforis.  
 Dorycnium simile quid habet temperamento, papaueri & mandragoræ,  
 immoderate perfrigerans. Nam modice sumptum stuporem inducit. Am-  
 plius autem acceptum occidit. Dracontium simile quid Aro habet. Sed  
 ipso acrius & amarius est, calidius item ac tenuius. Habet etiam quid adstri-  
 ctionis. Radix igitur ipsius uiscera purgat pota, & malignorum ulcerum o-  
 ptimum est medicamentum. Sed & folia similia sunt. Semen autem fortius  
 est. Dryopteris dulcis est & acris, & subamara. In radice uero etiam acer-  
 ba. Vim habet erodentem. Vnde etiam pilos tollit. Dryosid est quercus  
*Quercus* folia & fructus siccantem & calidam uim habent, adeo ut & uulnera re-  
 cia glutinent, & inflammationes incipientes sedent. Quod uere sub glan-  
 dis cortice est membranofum, circum fructus carnem, id quod magis ad-  
 stringat, & ad fluxum muliebrem, & ad reliquos fluidos morbos datur.

Initium literæ γ.

Ebenus lignum uim habet calefactoriam exterforiam ac tenuem. Vn-  
 de etiam ea quæ pupillis tenebras offundunt extergere credita est. Sed &  
 in alias oculares compositiones miscetur. Encephalos id est cerebrum  
 leporis coctum, & affricum, ac comestum, dentientibus pueris commo-  
 dum esse fertur. Quidam etiam tremoribus auxiliari cerebri esum scripse-  
*Cerebra uide*  
 runt. At Galli cerebrum cum uino potum, serarum uenenatarum mor-  
 bus auxiliari, & sanguinis ex cerebri membranis eruptiones cohibere,  
 116 dioscorides dicit. Cameli uero cerebrum siccum cum aceto potum, comi-  
 tiales curare tradit Galenus. Similiter etiam mustelæ cerebrum. Verum  
 Hirundinis cum melle ad suffusiones facere. Ouisillum autem similiter  
 præparatum, infantibus dentientibus exacte opitulari.

Elæas id est oleæ ramuli tantum frigiditatis habent, quantum etiam adstri-  
 ctionis. Fructus exacte maturus moderate calidus est. Immaturus adstri-  
*Olea* ctior est & frigidior. At oleæ Aethiopice lachryma similis ammoniac  
 tenui, exterforiam uim habet. Quare ad cicatrices, & albugines, & uisus  
*Oleum* hebetudinem ipsa utuntur, & ad dentium dolores in cauernas indita. Qui-  
 dam hanc syluestrem oleam esse tradunt. Oleum porro ex oliuis drupis, dul-  
 ce calidumq; moderate est, & magis humefians. Verum ex immaturis, in  
 quantum particeps est adstrictionis, in tantum etiam frigiditatis. At quod  
 lotum est, magis mordacitatis exors est. Antiquum uero quantum est anti-  
 quius, tantò est calidius, & maiore discutiendi ui præditum, & maxime si  
 etiam ab initio tenuium partium fuerit. Hoc cognoscitur ex puritate & pel-  
 luciditate, & si ex pauco multa corporis pars illinatur, & facile à cute imbi-  
 batur. Tale uero maxime Sabinum est. At uero quod ex syluestri sit oleas  
 exterforium est simulq; adstringens, & pro oleorum ratione siccissimum.  
 Sed & Cicinum æqualem uim cum uetere habet. Reliqua uelut est Sesami  
 num, aut raphaninum, & alia, pro substantiarum ratione ex quibus facta  
 sunt, etiam facultatis differentiis habent. Elæomeli. In Syria ex tunco  
 quodam arboris oleum fuit crassius melle ac dulcius, quod duorū cyathorū  
 rum mensura, cum aquæ hemina potum, crudum & biliosum humorem  
 per aluum ducit. Torpidi autem sunt qui id accipiunt, quod ueteri non o-  
 portet, sed ipsos excitare. Elaterium appellatur succus fructus cucumeris



nis syluestris. Et est secundi ordinis calefacientium, mensesq; prouocat, & foetus corrumpit appositum, propter summam amaritudinem. Euacuat etiam per nares, si cum lacte in ipsas infundatur. At inferne per clysterem in fustum pituitam euacuat: quandoq; etiam sanguinem. Elate id est Abies arbor calfacit ac siccatur similiter ut populus nigra. Versu de resina ipsius in resinarum tractatione referetur. Elatine herba est similis helixinae. Frigescit ac adstringit moderate. Elaphoboscus calidus ac sicce est facultatis, secundo ordine, & partium tenuium. Elelisphacus id est Salvia euidenter calefacit, & subastringit. Elenium calidum est & siccum cum humidiore superflua. Quapropter in delinctis ammixtum, humores ex pectore educit. Sed & partes per ipsum rubefaciunt. Eleoselinu id est Apium quod in aquis nascitur locis, eadem potest quae apium hortense, sed maius ipso est. Elephantis ex ungue ramenta si in cataplasmate imponantur, redurias curant. Ossium item ac dentium ipsius ramenta quum sicca sint & exteriorae facultatis, talibus medicamentis miscentur. Elcysina id est argenti recrementum. Habet eandem uim quam plumbago. Adstringit enim & attrahit. Vnde Emplastris fuscis & ad cicatricem perducuntibus miscetur. Elleborus id est ueratrum utruq; calfacit ac siccatur tertio discessu. Est etiam acre ac exteriorum. Vnde etiam ad leprosam cutem conuenit. At nigrum si fistulis indatur, in tribus diebus callum ex ipsis eximit.

Eliechryson, alij chrysanthemum alij Amarantum uocant, planta est coronaria, comam habens auricolorem, quae cum uino pota urinae difficultati, & reptilium moribus, & coxendicibus, & ruptionibus conuenit. Menses item ducit, & sanguinis grumos dissoluit, cum uino mulso pota. Auxilia, tunc etiam destillationibus. Elxine quam alij perdicium, alij parthenium, alij sideritum, alij heracleam uocant, uim habet exterioriam & leniter adstringentem, cum subfrigida humiditate. Elxine quae & Cissampelus, discussoriae est facultatis. Elymos quae & Meline id est panicum similem mliouim habet, siccans ac frigefaciens forinsecus impositum. Siccatur autem & uentris fluxiones. Emperron aut praesoides, medicamentum est purgatorium pituitae ac bilis. Est autem et saluum. Vnde fuerit etiam exterioriu.

Epithymum siccatur & calefacit tertio abscessu, estq; Thymo efficacious.

Epimedij uis est moderate frigefaciens cum aquosa humiditate. Haec in cataplasmate imposita mammas erectas conseruat. Pota etiam steriles facit, redicitur. Epimelis quae Vnedo apud Italicos rusticos appellatur, est uelut malus syluestris. Cuius fructus acerbus est, stomacho malus, & capitis dolorem inducens. Epipactis quae & Elleborine, contra laetalia medica menta bibitur, & ad hepatis morbos. Erebinthus id est Cicer, legumen familiare flauosum est, nutriendum, aluo commodum, urinam ciens, lac & semen generans, menses ducens. Quod uero Aries siue Arctetinum appellatur, magis quam reliqua urinam ciens. Decoctum ipsorum calculos rhenum auerit, & maxime nigrorum. Quod aut Orobizum id est Eruium uocatur calidius his est, & subamarum. At agreste omni modo fortius est satiuo.

Eria id est lanæ. Sordida ad irrigationes commodae sunt. Oesypus enim tephraum concoctorius est uelut butyrum. At non sordida materia solu existunt. Vitzero uim habent acrem & calidam ac siccant, simulq; tenuium partium, ut etiam humore flaccidas in ulceribus carnes citissime consumant.

Erica discussoriae citra mordacitatem facultatis est. Flore autem & folijs ipsius maxime utendum est. Erinos aquatica herba est. Cuius seminis drachmae duae cum mellis drachmis quatuor illitae, oculorum fluxionem sistunt. Succus autem ad aurium dolorem facit. Ermodactyli radix purgatorium uim habet, tunc ipsa, tum decoctum ipsius. Priuatim aut arithritidis in ipsis fluxionibus exhibetur. Stomacho multum noxia est. Erypylos id est Serpillum calefacit, utrinque & menses moueat. Erythrodanum rubra tinctiorum radix est, acerbata & amara, quae splenem & hepar & rhenes expurgat,

A ut est,

Abies arbor

Salvia

Apium palustre

Argenti recrementum

Veratrum

Chrysanthemum

Amarantum

Perdicium

Parthenium

Sideritis

Heraclea

Cissampelus

Meline

Panicum

Praesoides

Vnedo

Elleborine

Cicer

Lanæ

Oesypus

Serpillium  
Rubra tinctiorum  
radix

ut etiam cruenta per urinam expellat, & menses moueat. Cutis quoque sordes  
 Irio extergit. Erysimi id est Irionis semen feruidum est & calfactorium instar  
 nascitur. Quapropter torrefactum in fermento, & in delinctis additum, thoracem purgat. Verum in cataplasmare duricis mollit, & occultos cancores  
 Eruca suauat. Euzomon id est eruca, similis superiori est temperamento, sed  
 flatuosa. Quare etiam ad uenerem stimulat. Semen ipsius etiam urinam ciet.  
 Syluestris uero satiuia fortior est. Eupatorium tenuem ac incidit uim  
 habet, absque manifesta caliditate. Vnde etiam obturationes hepatis expurgat.  
 Habet & quid adstrictionis. Euphorbium urentem ac tenuium partium  
 uim habet, similiter ut reliqui spissi liquores. Ephemerum non uenenum  
 illud, sed quod iris syluestris appellatur, mixta facultatis est, repulsoria ac  
 discussoria. Echidnes id est uiperæ carnes, calidae & siccae sunt tempera-  
 mento euidenter, totum corpus percutem expurgantes. Quare multi Ele-  
 phantici ex ipsarum esu aut potu sanati sunt. Quæ uero in maritimis aut alijs  
 siccis locis degunt, etiam sitim magis inducunt. Echinus herba est acer-  
 ba, ac repulsoria, & siccandi uis prædita. Echini id est Erinacei terrestris  
 Erinaecei ter- caro assiccata, fortiter discutit ac siccat. Pota igitur Elephantiæ, & malo ha-  
 restris bitu præditis, alijsque pluribus auxiliatur. Pellis aut ipsius uis, magis sicca  
 ac discussoria euadit. Alopecas itaque cum pice liquida illita sanat. At mari-  
 ni pars ea quæ editur, urinam ciet, et aluo commoda est. Testa uero uis, terre-  
 stris Erinacei pelliculæ similis est. Echion quam alij dorida, alij etiam hanc  
 Erinaecei ma- Alcibiadium uocant, herba spinosa est, quæ non solum à reptilibus bestia mor-  
 rimas sis opitulatur in uino pota, sed etiam præhibita eos qui mordentur illæso  
 Doris conseruat. Epsema eodum mustum est, quod alij Siræum, alij sapam appellant, ea  
 Alcibiadium lesacit moderatè ac concoquit. Meatus etiam obducit, & morsus exors est.  
 Mustum coctum  
 Sireum  
 Sapa

Initium literæ. Z. Zea similem tritico uim habet, medium obtinens inter caliditatem ac fri-  
 giditatem, leniter autem siccans. Habet etiam uim obducendi meatus.

Zingiberis radix calefacit fortiter, sed non primo statim occurso, quum  
 inelaboratam quandam crassiorum partium humiditatem habeat. Obquam  
 facile etiam perforatur. Perseuerantem autem conseruat caliditatem.

Ceruilla Zythus quam ceruillam uocant, compositam substantiam habet. Nam  
 & acris est, uelut ex putredine factus, & frigidus, ex acida qualitate. Quare  
 Fermentum etiam mali humoris. Zyme id est fermentum etiam ipsum ex contrarijs  
 componitur. Nam & aciditate frigida participat, et putredinosa caliditate,  
 insuperque ea quæ ex sale & farina acidit. Est igitur non moderatè calidum,  
 ac discussorium.

Iuscula piscium Zomos, id est iusculum, ex recentibus piscibus aluum  
 subducit, & per se, & cum uino potum. Priuam uero id quod ex phycis,  
 Iusculum galli scorpijs, iulij, percis, & alijs teneris petrosus sit simplex, cum aqua & oleo,  
 & anetho ac sale. Similiter etiam id quod fit ex his quæ testa integuntur, ma-  
 xime tellinis, chamis, & conchulis. Sed et galli antiqui cum sale plurimum  
 cocti iusculum aluum subducit. At Gallinæ uice uersa sistit.

Initium literæ. M. hoc est. e. longi.

Menta Hedyosinum id est menta, calida est & tenuis, & acris facultate ex tertio  
 ordine, cum semicotta humiditate, ob quam etiam ad uenerem stimulat,  
 habet etiam quid amari. Quare etiam lumbricos necat. Verum acerbitate sua re-  
 centes sanguinis eductiones compescit. Hedyfarum aut pelecinus, ama-  
 rum & subacribum est. Vnde potum stomacho commodum est. Viscerum  
 Pelecinus autem obturationes expurgat. Heliotropium magnum quod etiam scor-  
 Scorpionum piuron uocant, calidæ est ac siccae & exterforiæ facultatis. Huius decoctum  
 potum ducit pituitam & bilem. Semen ipsius in cataplasmate impositum,  
 uerueas formicarias & alia consimilia ressecat. At paruum & hanc tollit, &  
 Populi nigre lumbricos occidit, si cum semine, & nitro, & hyssopo ac nasturtio bibatur.

Lachryma Electrum populi nigre lachrymam, circa Eridanum flumen distendi  
 & congelari aureo colore tradunt. Hoc tritum potum stomachi & alui flu-  
 xiones,

xiōnes; itemq; sanguinem sistit. Hemerocallis radix similem radici lilij uim habens, similiter ut illa ambustis auxiliatur. Hemionitis adstrictio necum amaritudine participat. Quare etiam splenicis prodest cum aceto pota. Hepar canis rabientis assatum si edatur, ab ipso morsu auxiliari dicunt. Capre uero hepatis assati santhem nyctalopis instillatam prodesse. Sed & uaporem ipsius cocti oculis suscipere iubent, & ipsum in cibo sumere. Et si edatur, comitiales manifestare. Eadem etiam hircinum facere tradunt. Atlacerta iecur corrosis dentibus inditum, dolorem eximit. Lupi uero hepar in medicamentum hepaticum ex Eupatorio constans iniicitur. Asinum assatum si comitiali laborantes ieiuni edant, opem inde sentiunt. Asprinum recens siccatum itum cum uino ad reptilium morsus bibitur. Mercurius uero hepar siccum potum calculos efficit. Erigeron id est Senecio mixtam uim habet frigefactoria ac moderate discussoria. Eryngium calefacit quidē non manifeste, siccitatis aut non obscurae nec modice particeps est.

Initium literae. H.

Thalassion hydor id est aqua marina acris & moderate calefactoria est, siccadiq; uim habet. Et pota quidem stomacho noxia est, aluum autem turbat, & pituitam ducit. At si calida affundatur, attrahit ac discutit. Thaliotrum uim habet siccantem citra mordacitatem. Diuturna itaq; ulceram cicatricem perducit. Thapsia acris est & fortiter calefactoria cum humiditate. Trahit itaq; ex profundo uolenter, & attractum discutit.

Thion id est sulphur attricatoria & ipsum est facultatis, calidumq; ac tenuium partium, ut ad multa uenenum ei aculantia resistat, & maxime in pestinacia marina, & dracone siue siccum inspergatur, siue etiam ad saluum, aut urinam pueri, aut oleum, aut mel ammiscetur. Sed & scabiosa mirifice sinat. Thermos id est lupinus qui editur, meatus obducendi uim habet. Amarus autem extergens, & discutiens, & siccans citra mordacitatem, lumbricos tollit, tum in cataplasmate impositus, tum potus. Et uiscera expurgat cum ruta & pipere potus. Sed & cutis uitiis extergit, & tumores discutit, cum aceto multo impositus. Syluestris autem amarior est, & per omnia uehementior satiuo. Thelypteris quam aliqui nymphæam, aut pteridid est filicem nominant, quod facultate filici similis sit. Hæc pota cum uino latis & rotundis lumbricos occidit. Fœtus etiam perdit. Folia uero eius comesta aluum molliunt. Thlaspis semen est facultate acre, ut etiam internos abscessus potum rumpat. Menses etiam mouet & per sedem infusum coxendicibus prodest, cruentā euacuando. Nam & alias biliosos humores sursum ac deorsum purgat, si acetabuli mensura bibatur.

Thridax id est lactuca humidum ac frigidum olus est, non externè, sed iuxta fontanarum aquarum temperamentum. Quare ad calidas inflammationes conuenit. Sitim item eximit, & genituræ fluxum sistit pota, itemq; seminis per somnum effusionem. Syluestris minus quàm hæc frigefacit ac humefacit. Est autem succulentior. Thymus calefacit ac siccacit tertio ordine. Vim habet secandi uiscosos ac crassos humores. Thymbra syluestris eadem quæ thymus potest. Hortensis autem per omnia debilior est. Sed ad esum melior. Thymelæa ex qua granum cnidium est, similem ipsi uim habet.

Initium literae. I.

Idea radix sapore ac facultate acerba, ad sanguinis eruptiones, & fluxidas affectiones conuenit pota, ac foris imposita. Idræta id est sudorem per se colligere operosum est. Miscetur autem in palæstris eorum qui se exercet ad puluerem, paton appellatum qui repulso iam solum uim habet, & euadit totū hoc discussorium. Inflammatis itaq; mammis efficax est auxilium, & ad extinguendum in ipsis feruorem. Facit etiam ad glandularum tumores, si uero siccus id fuerit, cyprino aut rosaceo emolliatur.

Ixos id est uiscum calefacit cum acrimonia. Trahit itaq; fortiter ex profundo, & discutit similiter ut Thapsia. Sed longè inefficacior quàm illa est.

A. lon

Hepar animalis

Senecio

Aqua marina

Sulphur

Lupinus

Nymphæa

Pteris

Filix

Lactuca

Granum Cnidii

Sudor

Paton

Viscum

*Viola* Ion id est uiola folia habet, quæ aquosam ac subfrigidam substantiam præpollentem obtinent. *Aerugo* Ios id est ærugo, acrem qualitatem gustantibus exhibet, discutitque ac tollit & consumit, non teneram modo, sed duram etiā carnem. Si uero quis parum de ipsa ad multum cerati miscuerit, extensorum citra mordacitatem medicamentum efficiet. Ippocampus marinum est animal, cuius usti cinis cum pice liquida alopecias densat. Ippolapathum in paludibus nascitur, & lapathum id est rumici simile est.

*Equus flus  
nitilis*

Ippomarathrum id quod cachryi id est rosmarini semini simile est, magis siccatur quam marathrum id est fœniculum. Quare etiam aluum sistit, & calculos atterit, & menses mouet. Quod uero semen coriandro simile habet, simile illi est, sed debilius. Ippopotami id est Equi fluminatilis testis siccus potus, aduersus reptilium morsus prodest. Ipposelinum similem Selino id est apio uim habet. Sed tamen debiliorem. Ippuris adstringentem cum amaritudine qualitatē habet, & propterea siccatur fortiter, simulque citra mordacitatem. Vulnura itaque maxima glutinat, & intestinorum herniæ prodest, & fluidas affectiones sanat cum uino pota. Ippophaes aut hippophaeos quo expoliunt uestes, frutex est sarmentitius, cuius radix exsiccatur uelut thapsia. Succus autem obolus unus cum erui farina datus, bilem ac pituitam purgat. Sed & tota planta siccata purgatoria uim habet. Iris calefactoria & multum tenuium partium est, extergiturque ac concoquit. Ad tussim itaque conducit, & humores in thorace ductui faciles efficit, & tormina sanat, & ulcera sordida purgat. Pota uero cum aqua multa aluum euacuat.

*Phasiolum*

*salix*

*Gluten piscium*

Isatis satiuæ quæ tinctorum utuntur, siccantem uim habet, itemque adstrictionem. Itaque etiam magna uulnera durorum corporum glutinat, & sanguinis eruptioni ex ipsis prodest, & laxos tumores discutit, & omnibus malignis resistit. Syluestris autem magis mordax, & propterea magis siccans, ad humectas putredines fortius resistit. Ad alia uero peior est, utpote mordax. Verum ob fortem facultatem etiam splenicis utilis est. Ilopyron aut phasiolum, semen amarum ac subacerbum habet. Extergit itaque & secatur crassius ac uiscosus humores, ita ut simul corpora contrahatur ac adstringat. Quæ propter etiam ea quæ in profundo sunt purgat, & sanguinem spuentibus non aduersatur. Itea id est Salix folia habet & florem, facultate siccandi citra mordacitatem prædita. Habet etiam quandam adstrictionem. Siccior autem est cortex, cuius usti cinis ex fortiter siccantibus est. Nam & clauos & uentricas fornicarias tollit cum aceto. Ichthyocolla id est gluten piscium facultatem meatuum obducens & siccantem habet. Commodatur ad emplastra capitalia & glutinantia: & ad compositiones ad lepra paratas. facit etiam ad faciem erugandam.

Initium literæ. x

Cacani radix siccatur moderate, & citra mordacitatem meatuum obducit. Quapropter etiam arteriarum asperitatibus prodest delincta cum uino, & commania uelut tragacantha, & glycyrrhiza. Cancanum lachryma est ligni Arabici, quæ myrrhe similis est, & odorata, quæ etiam pro suffitu uisitur. Vim habet extenuandi obesos, extensoriamque ac ab obturatione liberantem.

Cadmia ambæ siccatur. Sed botrytis id est racemosa, tenuiorum partium est. Placitis crassiorum. Vsta uero cadmia citra mordacitatem siccatur & extergitur, & fit utilis ad ulcera repletionem indiga, circa oculos & totum corpus, & maxime humidiora, in moloribus corporibus. Nam in durioribus efficacioribus opus est medicamentis. Caccalia uim & usum cacano simile habet.

Calamagrostis siccatur. Quapropter succus & decoctum radicis ipsius in oculares compositiones miscetur. Semen urinæ ciet, & stomacho commodum est. Calamintha calida & sicca temperamento est tertio ordine. tenuium itaque partium & acris, multoque fortior quam mentha. Est. n. uelut syluestris mentha. Facile itaque ex profundo attrahit ad seipsam, ideoque sudores mouet, & totum corpus discutit, & rigores per circuitum repetentes sedat, tum si extrinsecus cum oleo strenue affricetur, tum si intra corpus bibatur. Sed & ad coxendicæ dolo-

res imposita, ipsos soluit. Et uitiatos circa cutem humores detergit.

**A** Calamus aromaticus calfacit ac siccat secundo ordine. Habet etiā quid te  
nuū, partiū & adstringēs, urināq; ciet, & cōpositionibus stomachicorū &  
hepati ac utero destinatis ammiscetur. Qui uero phragmites appellatur ex  
teriorior est. Folia uero ipsius uiridia moderate frigefaciunt. Cortex autē u/  
stus calefacit & siccat tertio ordine. Radicē ipsius cū bulbis in cataplasma  
te impositā spicula & aculeos attrahere dicit. Campæ id est Erucæ olerū  
illitæ cū oleo, à moribus eorū quæ uirus efuculantur tutos præstare dicunt.  
Cantharides quæ in tritico inueniuntur, luteas transueras zonas habē  
tes, aceti calefacti uapore suffocata multū usum sui exhibēt. Nā & scabio/  
sos ungues eximūt cū cerato, & clauos ac scabiosas affectiones iuuāt. Ero/  
dunt etiā ac urūt. Quidā etiā urinā cientibus medicamentis parū quid ex  
ipsis misceuerūt ac exhibuerūt. Cannabīs semen flatus discutit & siccat,  
adeo ut etiā geniturā reficet. Succus eius uiridis ad auris dolores ex ob  
turatione facit. Canopum sambuciflos est, de quo dictū est. Capnion aliq;  
Capnos, id est fumaria siue fumus terrę, nomē habet ex eo quod succus ipsi  
us multam lachrymā attrahit. Nam uisus ac uim inducit. Acris autē & ama  
ra est. Vnde etiā urinas biliosas multas propellit: & obturationes ac debili  
tates hepatis sanat: stomachumq; corroborat, & uentrē mollit. Capparis ra  
dix extergit & expurgat, & amaritudine ac redineq; sua secat ac discutit: a/  
cerbitate uero contrahit, adstringit ac densat. Quapropter lienes indura  
tos iuuat pota & forinsecus imposita. Menses item mouet, & pituitam per  
os educit. Malignis quoq; ulceribus prodest, & dentium dolores sanat. Tu  
mores etiā ac uisilignes discutit, & uermes in auribus necat. Folia itē ac  
fructus similē quidē, sed debiliore uim habēt. Cardamū id est nasturtiū Se  
mē habet urendi uis præditū, uelut sinapi. Quarcin cataplasmate impositum  
rubefacit. Secat etiā crassos humores, si cū alijs bibatur. Sed & herba ipsa  
seca quidem similis est facultatis, humida uero moderatior. Quare etiā  
crudam ipsam edunt. Cardamomum acre quidem etiā ipsum est, sed na  
sturtio debilius. Habet etiā quid amaritudinis ob quā lumbricos necat,  
& scabiem extergit cum aceto. Caris id est squilla piscis tritus, & cū bryo  
niæ radice potus, lumbricos occidit. Cancrorum ustorū cinis, si quidem  
fluuiatiles sint, siccat similiter ut erinaceorum & cochlearum cinis. Verum  
totius substantiæ proprietate, mirifice operatur potus in rabiosi canis mor  
su. At mariorum cinis excellentem habens siccitatem, ad hoc quidem nō  
cōuenit, sed his qui maiore resiccatione indigent prodest. Fluuiatilis cerē  
si tritus, in cataplasmate imponatur, spicula & aculeos eiecit. Caros se  
men siccat & calfacit tertio ordine. Flatus itaq; discutit, & urinam ciet, nō  
semen solum, sed & tota planta. Carpesium aromaticum est & tenuium par  
tium. Extergit itaq; uiscerum obturationes, & urinas mouet, & rhenes ex  
purgat calculo laborantes. Carya Nux arbor in germinibus quidē adstrin  
gens quid habet. Verum plurimum in nucum ipsarum corticibus. Succus  
itaq; ipsorum coctus cum melle stomachicū, ori commodum fit medica  
mentum. Putamen autem nucis uisum, tenuium sit partium, & citra mor  
dacitatem siccat. Quod uero ex ipsa editur, quum oleosum sit, facile in bi  
lem transit. At oleum ex ipsa, tenuium partium est, ac discussorium tumorū  
ac putredinum. Quæ uero rancidæ sunt nuges ob uetustatem, exterforiam  
cutis uictorum uim habent. Cæterum nux pontica, quæ & tenuis ac parua  
appellatur, frigidiior est & austera, in reliquis autem magnæ similis.

Caryophyllon non pro nominis ratione etiā substantiam habet, quū  
folium nucis illo significetur: Verū ex India uelut flores quidam arboris,  
festucarum speciem præferentes, nigri digiti ferē longitudine afferuntur, a  
romatici, & acres, subamari, calidiq; ac sicci circa tertium ordinem. Hi mul  
tiplicis usus sunt, tum in obfonijs, tum in alijs medicamentis. Cassanum  
quidam balsami fructum esse dicunt, de quo supra in balsamo egimus.

Erucæ olerū

Fumaria  
Fumis terræ

Nasturtium

Squilla piscis

Nux arbor

Nuges rancide  
Nux pontica

Cassia calfacit ac siccatur tertio ordine. Est & satis tenuium partium, acrisq;  
 ac moderate adstringens. Secatur itaq; simulq; discutitur, & instrumentis tobur ad  
 dit. Ducit etiam menses. Castoreum calfacit ac siccatur cum partium tenuita  
 te excellenti. Ob quam supra alias actiones, etiam nervorum ex humorum copia af  
 fectionibus convenit. Et perfrigerata facile recalfacit, tum foris adhibitu  
 rum potum, ita ut nullam aliam partem laedat, etiam si utentes eo moderate febris  
 citetur, quemadmodum in delationibus in sopore, & lethargis. Moveret etiam me  
 ses, & secundas eijcit. In cerebri uero & pulmonis affectionibus suffragum  
 per inspirationem magnopere prodest. Caulalis quam alij daucum sylvestrem  
 appellat. Nam & uelut daucus calefacit, & siccatur, & urinam ciet, & sale conditus  
 reponitur. Cenchros id est milium frigidum primo abscessu, siccatur secundo.  
 Est etiam quodammodo parum tenuium partium. Forinsecus itaq; in sacculis proso  
 mento adhibitu, & in cataplasmate impositum siccatur solet. Cedrus tum quae  
 fruticosa, iunipero similis est, tum quae arbor est, calfacit ac siccatur tertio or  
 dine. Oleum autem ex ipsis, quod Cedraem uocant, etiam quartum ordinem at  
 tingit, multum tenuium partium existens. Teneras itaq; carnes prompte & citra  
 doloris erodit. Duras autem & maxime mortuorum siccatur, & a putredine asser  
 uat. Pediculos item, & lentes, ac ascarides, & aurum uermes necat, & alia plu  
 ra facit. Centaurij magni radix acris & calida, cum terrea adstrictione est. Me  
 ses itaq; propellit, & foetus necat ac eijcit. Vulnere item glutinat, & sanguinem  
 spuentibus prodest. Itemq; alijs circa thoracem affectionibus. At parui centaurij radix  
 quidem inefficax est. Ramuli uero fortiter & citra mordacitatem siccatur. Unde  
 supra ea quae de magno Centaurio dicta sunt, decoctum ipsius ex coxendicis  
 morbo laborantibus per sedem infusum, biliosa euacuat, quoniam etiam cruenta, &  
 magnopere auxiliatur. Ceras id est cornu caprae ac cerui usus, dentes ni  
 tidos facit, gingiuas nimia humiditate flaccidas contrahit. At ceruinum cum ui  
 no tritum, deinde oblitum, dentes mobiles sistit. Post unctionem autem lotum, dysente  
 riam, coeliacis, sanguinis sputionibus, & morbo regio prodest, duorum cochlear  
 riorum mensura. Miscetur etiam in oculares compositiones. Taurinum autem cornu  
 cum aqua potum sanguinis eruptiones cohibet. Cerasia dulcia quidem per alium  
 magis subeunt, austera uero magis stomacho commodant. Acida propter secedi  
 uim, pituitosis & extremis stomachis conveniunt. Argummi arboris ex  
 asperatas arterias leuigar, & calculo laborantes cum uino potum iuuat. Cera  
 tonia arbor, & fructus ipsius cerata id est siliquae, siccatis ac adstringentis  
 sunt facultatis. Haec uero etiam dulcedine quadam participat. Cephalae id est  
 capita sale asseruatarum manarum usta, siccantur acquirunt facultatem, non ualde  
 acram. Rimis itaq; sedis, & gurgulionibus diu induratis commodant. At cerri  
 piscis caput totumustum ad alopecias facit cum adipe ursino. Idem facit & mu  
 ris caputustum cum melle. Ceterum milui caput siccum sine plumis, quantum tribus  
 digitis praehendi potest, cum aqua potum, podagricis prodest. Lacertae uero  
 caput aculeos educere tradit, & formicarum uerrucas, itemq; alias, & cla  
 uos. Cicis id est Galla omphacitis acerbum ualde est medicamentum. Va  
 de siccatur, & fluxiones repellit, & contrahit, ac adstringit laxas ac debiles par  
 tes. Omnibus item fluidis affectionibus conducit. Et sit sanè tertij ordinis in sic  
 cando, secundi frigidificando. Altera uero flaua, ac laxa, et magna siccatur qui  
 dem, sed minus quam illa, quantum etiam adstringendi uis inferior est. At inflam  
 mationes in sede, & prolapsus sedis cocta dituat. Vltima uero gallae & ace  
 ro restinctae sanguinem sistunt. Cepaea portulacae similis est. Folia eius pota  
 scabiosae uesicae auxiliantur. Radix cum a sparago myacanthino pota, urinis  
 stillicidijs ex obturatione abortum sanat. Cera quum temperata sit, aliorum me  
 dicamentorum materia est. Ipsa uero per seipsam ex leniter concoquentibus est.  
 Habet enim exiguum quid discussoriae & calidae facultatis. Ceryces id est mu  
 rices, siue buccina, restae habent, quae usta uim ualide siccandi citra mordaci  
 tatem habet. Quapropter malignis ulceribus conuenit. In putredinosis autem cum  
 aceto, aut uino, aut a ceto mulso, ipsa utendum est. Quae uero uelut caro ipsor  
 um

*Daucus syl  
vestris*

*Bilium*

*Cedrea*

*Cornu anti  
melium*

*Siliquae*

*Capita anina  
lium*

*Galla*

*Murices  
Buccina*

rum est adhuc uiuentium, ea in oleo coquitur, oleumq; hoc auribus dolentibus prodest, si ipsis instilletur. Circeos id est ricini semen purgat, exterforiamq; ac discussoria uim habet. Ita etiā foliū, sed debilius. Verū de oleo dictū est. Cinnabaris actis moderatē facultatis est. Habet etiam quid adstrictioris. Cinamomum summē tenuium partium est, nō tamē summē calidum, sed ex tertio ordine. Nihil autē siccā adeo, ex his quę ex æquo cū ipso calefaciunt, propter partium substantiæ tenuitatē. Cinamomis uero uelut debile quoddā Cinamomū est. Quidā ipsum Pseudocinamomum uocāt. Circeæ radix calefactoria & odorata est, quæ cū uino pota uteros expurgat. Semen cum sorbitione potum, lac generat. Cisseris, id est putrex extersorius maxime dentiū est, nō solum facultate, sed etiā asperitate. Injicitur & in medicamēta carnes in ulceribus generatā, & in ea quæ cutis uitiā extergēt. Si uero uratur, magis tenuiū partiū & mordax sit. Lotus mordacitatē deponit. Cisthos aut Cissarus frutex est adstringens, & leniter frigidus facultate. Folia ipsius ac germina tantū siccant, ut etiā uulnera glutinent. Flores aut sicciores circa tertiū ferē ordinē, dysenterias & alias fluxus affectiones sanāt potū. Forinsecus aut putredinosa ulcera iuuāt. Cissos id est hedera ex cōtrariis cōposita est facultatibus. Adstringit. n. & frigefacit, acrisq; est ac calida, aquosa ac tepida substantia participā; quum uiridis est. Huius folia cocta cum uino uulnera glutināt, ambuisti & iplenicis profunt. Succus medicamentū est quod naribus infunditur, & diuturnas in auribus fluxiones sistit. Lachryma ipsius ut quæ acrior sit, pediculos necat, & pilos abolet. Citriū quod & malū Medicū, mediā sui partē acidā aut qualitatis exortē habet. In qua semen tertiū frigefacientium ac siccantium ordinis est. Cortex siccāt secundo ordine, non etiam frigefacit, sed acris est. Caro ipsius crassi succi & pituitosa ac frigida est. Semē aut discutit et siccāt secundo abcessu. Sed & folia siccant ac discussoria sunt facultatis.

Cichoriū aut picris, uelut syluestris seris est, frigefaciens ac siccās primo abcessu. Habet etiā quid adstringens. Vnde hepaticis dysenterijs conducit. Clematis quā alij daphnoides, alij myrsinoides, alij polygonoides uocāt, farmēta habet lōga, crassitudine iunci holoschœni appellati: foliū simile lauro. Vim habet siccantē. Itaq; alui profluuiā, & dysenterias, & dentiū dolores sedat, & morsis a hestijs uenenatis succurrit. Altera clematis arboribus obuoluitur uelut simlax, acrisq; ac ustoria est facultatis. Huius semē cū aqua potū, pituitā ac bilē deorsum ducit. Folia cataplasmaris modo imposita, lepras remouēt. Clinopodiū calefactis ac siccatis est facultatis, nō dū urētis, sed tertiū ordinis. Cnici semine ad purgationes solū utimur. Si uero quis foris ipso utatur, tertiū calefacientū ordinis fuerit. Conchyliā similē buccinā uim habēt. Coeliā id est uentrē mergi aut recētē coctā, aut assiccā, stomacho cōmodā esse dicūt, si edatur. Similiter etiā gallinarū internā in tra uētriculū tunicā, si sicca bibat. Verū Galenus factō experimētō, ambo falsā se comperisse asserit. At palūbis uentrē paulatim potū, calculos per uirinā expellere, tradit dioscorides. Mustelæ uēter potus cōtra omnes uenenas bestias medicamentū auxiliare dicitur. Coccus Cnidius, id est granū Cnidii fructus est Thymelææ, nō chamelææ, uelut quidā putarūt. Estq; acris ac urentis facultatis. Potū aut aquam deorsum purgat. Coccus baphicūs id est Granū tinctorium citra mordacitatē reslecat. Quapropter magnis uulneribus cōducit, & sauciatīs neruis, cū aceto aut aceto mulso tritum. Coccymelææ id est pruni fructus alui subducit recens magis, siccat minus. Decoctum etus collutum gurgulionis inflammationes sanat. At gummi arboris incidētē & tenuiū partiū uim habet. Hoc cū uino potū quidam lapides attere dicūt. Cum aceto uero impetigines puerorū sanare. Cæterum syluestriū prunorū fructus euidenter adstringit, & alui sistit. Nomiatum autem plantā hæc in Asia prumnon. Videntur autem domestica pruna siccata esse ea quæ nunc Damascena appellantur, ut dicit Galenus.

Ricini

Putrex

Hedera

Malū Medicū

Picris

Seris

Daphnoides

Myrsinoides

Polygonoides

Ventre ania  
malium

Granū cnidii

Granum tinctorium

Pruna

Damascena

*Gluten* Colla, id est gluten, quod ex simlagine & polline fit, meatus obducen-  
*Cucurbita* di & concoquendi uim habet. Colocynthe, id est cucurbita humidi ac fri-  
 gidi temperamenti est in secundo abscessu. Vnde tota in cataplasmate im-  
 posita calidas inflammationes refrigerat. Colocynthis, id est syluestris  
*Arbutus arbor* cucurbita uim fortem purgatoriam habet. Ipsius uiridis succus asfrictus, co-  
*Menecylon* xeniticum doloribus prodest. Comarus, id est Arbutus arbor est acer-  
 ba sua qualitate, una cum fructu, quem Memecylon appellant. Est autem hic  
 stomacho noxius, & capitis dolorem inducit. Commi, id est Gummi

*Lixiuum* siccantis & meatus obducentis facultatis est. Et nimirum etiam asperitate  
 sanat. Conia, id est Lixiuum appellatur quod uelut lotura cineris est.  
*Protoflection* Quod ex ficulneo & Tithymalorum cinere fit, praeter omnibus extergit acie-  
 cat maxime, ut fere erodentem iam habeat facultatem. Si uero etiam calce  
 assumat cinis, uistoria uel praeditum lixiuum facit, quod sane etiam protoflec-  
 tion nominant, & medicamentis quae per clysterem in sedem infunduntur  
 maxime miscetur. Omnium autem fortissimum est, quod ex sola calce fit.

Conyzae ambrae siccant ac calefaciunt tertio abscessu. Vnde etiam ole-  
 um in quo coquuntur, rigores per circuitum repetentes sedant. Sed & flo-  
 res similem uim habent, quorum decoctum menses mouet, & foetus efficit.  
 Quae uero in aquosis locis nascitur, graueolentior & facultate debiliore est.

*Stercus animae*  
*lana*

Copros, id est Stercus omne calidae & maxime siccantis ac discussoriae  
 facultatis est. Euariatur autem iuxta animantis excernentis ipsum temperan-  
 ram, & uictum. Canum itaque stercus quum ossa uorauerint siccatum, cum  
 scisso lacte potum dysentericos sanat. Item uetusta ulcera, si medicamentis  
 ad haec idoneis ammiscetur. At in anginis & inflammationibus tonsillis melle ex-  
 ceptum illinitur. His autem & puerorum non superfluo uictu uictorum ster-  
 cus magnopere prodest. Stercus luporum quod & ipsum albidius inqui-  
 busdam fruticibus reperitur, colicis generose opitulatur, non potum modo  
 sed etiam appensum. Appendere autem ipsum oportet ex lana de ouicula  
 quam lupus dilaniauit, aut ex pelle ceruina. Caprinum stercus acrius est,  
 & magis discussorium, & induratos tumores discutit impositum, & maxi-  
 me in duris carnibus. Vstum uero, magis exterforium & tenuium partium  
 euadit. Bubulum habet etiam uim quandam attractoriam. Vesparum itaque  
 & apum plagas sanat. Sed & si hydropicorum totum corpus bubulo sterco-  
 re in sole illinatur, magnifice prodest. Ouillum si cum aceto adhibeatur uet-  
 rucas formicarias & alias, itemque furunculos ac clauos sanat.

Columbarum syluestrium stercus, multo acrius quam aliarum est, & cum  
 nasturtij semine rubefacit. Gallinarum domesticarum cum aceto mulso,  
 aut aceto, aut uino mulso potum, strangulantes fungos per uomitum edu-  
 cit, & auxiliare medicamentum fit. Hoc etiam colicis bibendum quidam de-  
 dit. Aliqui etiam ciconiarum stercus potui, recta ceruice spirantibus auxilia-  
 ri dicunt. Murium stercus magis quam alia extergit, alopecijque conuenit.  
 Et puerorum sedi appositum, ad excretionem proritat. Sturnorum stercus  
 ubi oryzam ederint, exterforium fit, ut etiam maculas solares exteat.

Crocodilorum terrestrium uirilignes extergit, quemadmodum Nilia-  
 corum crocodilorum stercus, albugines attenuare creditum est.

Corallium uelut arborea planta est, quae in lapidem indurescit, non in  
 terra nascens, sed in coenosa maris parte. Est autem colore rubicundum, la-  
 pidi simile. Vim habet ualde siccantem, & moderate adstringentem. Con-  
*Cimices* uenit itaque sanguinem spuentibus, & dysentericis. Cores, id est Cim-  
*Hypericum* ces animalia, a crem uim habent. Scribunt itaque aliqui, quod si cum aceto bi-  
 bantur, hirundines efficiant. Coris herba, quam alij hypericum uocant,  
 acris est & odorata. Semen eius potum urinas & menses mouet. Auxiliatur  
 etiam morsis a phalangij. In opisthotonicis qui retro conuelluntur cum o-  
*Coriandrum* leo illinitur. Corianum aut Corion, hoc est Coriandrum ex contrariis  
 facultatibus compositum est, tenuium quidem partium tetrea, amara quo-  
 sa uero



sa uero humiditate tepida. Habet etiam parum quid adstrictioris, ut inflammationibus & ignibus sacris non ualde feruidis conueniat, & tumores molliores est aliquo ad id idoneo discutiat. Semen modicū potū cū passio mulbricos expellit. Amplius acceptum mētem percellit. Corydosi siue Corydalis, id est Galerita siue Alauda, auicula cocta cum simplici iure, colicis opitulatur. Verum assidue & sēpē edere ipsam cum iure oportet.

Galerita  
Alauda

Coronopodis radix etiam ipsa coeliacis commoda est, in cibo accepta creditur. Costus modicā ualde amara, plurimā acris ac calidā qualitatis particeps est. Vnde ubi aut calfacere partem aliquam propositū est, aut humorem aliquem ex profundo ad superficiem trahere, ad costum defugiunt. Vrinam itaq; ciet, & menses ducit, & lūbricos occidit. Habet etiā quid flatuosi. Quare & uenerē stimulat cū uino mulso potus, coxēdicumq; morbo laborantibus, & resolutis, & rigorib. per circuitū redeuntibus conducit cū oleo affricus. Coryledon perfrigerat & repellit, extergitq; ac discutit. Folia ipsius cū radice in cibo sumpta, calculos atterere credunt, & urinas ciet. Cochleari usque multū succantiss sunt facultatis, & moderate calidā. Pro sunt dysenterijs nondū putredinosis, si ad quatuor partes harū, ammiscetur piperis albi pars una, & gallarum partes dug. At uero nō usq; totā triē uentri impositā in hydropicis, & articulis in arthriticis, donec suā spē de ciderint, utiles sunt. Et in summa humorem in profundo fortiter rellicant.

Cranii, id est Corni arboris fructus acerbus si edatur, fortiter uentrem supprimit. Sed & folia ac germina acerbitate sua fortiter siccant, ut & maxima uulnera glutinēt in duris corporibus. Crambe, id est brassica siccantē uim habet, si & edatur, & foris imponatur, non tamē euidenter acrem. Vulnera itaq; glutinata, & maligna ulcera, & tumores agrē solubiles sanat. Habet etiam quid exterforium, per quod lepras curat. Semen ipsius potū lūbricos tollit, presertim Aegyptiē. Caulium ipsius ustorū cinis urendi uim habet. Cum adipe laterum doloribus diuturnis conducit. Syluestris fortior satua est per omnia. Vnde neq; intra corpus citra lāSIONem fumiur. Marina subsalsa & subamara quum sit, uentrem mollit. Crataegoni herbe semina, acriter gustantibus est, & uehementer utentibus, mīlio simile. Crethmon salum quodāmodo est, cū modica amaritudine. Quapropter etiā uis ipsius exterforia est ac siccatoria.

Cornū  
Brassica

Crithe, id est ordeū frigefacit ac siccatur primo ordine. Habet etiam quid exterforium modice. Magis autē quā fabarum farina siccatur, & magis flatus discutit. At polenta longe adhuc magis quā ordeum siccatur. Prisana uero ad hoc quod magis humectat, magis etiā extergit. Crimmon appellatur crassa pars farinā ex tritico & ex zea. Magis quidem nutrit quā polenta, sed acrius cōcoquitur. Crinis, id est lilij flos temperamēto mixtus est, ex substantia tenuiū partiū ac terrea, & aquea quadam temperata. Vnde et oleū ex ipso compositū, discussoriā ac molliētem uim habet, inflammationib. uteri conueciens. Radix & folia siccāt, extergūt ac discutit moderate. Quare ad ambusta cōmodant. Succus liliorū etiā neruos fauciātos iuuat cū aceto mulso. Crocodili semē et succus, calidā & siccā ac discussoriā est facultatis. Urinas itaq; mouet ac menses. Radix autē expunctiones ex thorace iuuat. Ducit etiā per nares sanguinem. Crocus secundū ordinis est calefacientiū, primū siccantiū. Adstringit & concoquit.

Ordeum  
Polenta  
Prisana  
Farina crassa  
Lilium

Crommyon, id est Cēpa quartū ordinis calefacientiū est, et crassarū partiū substantia. Vnde hemorrhoidas apposita aperit. Est itē exterforia. & utiliginos aufert cū aceto. Et alopecijs affricata citius q; Alcyoniū psilos producit. Siccus ipsius suffusus oculis aut hebetib. ob crassum humore prodest. Cyanos, id est faba, nō multū a medio tēperamēto abest, tū perfrigerādo, tū calfaciēdo. Caro ipsius etiā exterforia quadā facultate participat. Itaq; expunctionib. ex thorace & pulmone cōuenit. Quā autē cortex habeat quid adstrictioris. tota faba coeliacis ac dysentericis pdest in aceto cocta. In cataplasmate uero impōita inflammationē & tūores sedat, et lac in thāmis extinguit.

Cēpa  
Faba

Cyanos

Cyanos acrem uim habet, deprimentem ac consumentē, itemq; discus-  
soriā ampliore[m] quā[m] est in Cinnabari, participat etiā[m] adstringēte.

Cyclaminus uariam uim habet. Nam & extergit, & secat, & aperit, & attrahit & discutit. Succus itaq; eius appositus hæmorrhoidas aperit, & duricias discutit cum alijs. Verū cum melle suffulis oculis commodat, & duras purgat, & imò uentri illitus aluum subducit, & foetus corrumpit. Raddix tota succo quidem debilior est, uehemens tamen etiā[m] ipsa, adeo ut cū aqua mulsa pota trium drachmarum pondere, interna expurget. Extergit etiā[m] cutis uitia. At uero altera cyclaminus, quā[m] & Cissanthemon uocat, quum radicem inutilem habeat, semen habet efficax, ita ut potum prioris, mislia faciat. Cyminum calefacientis est facultatis tertio ordine. Vrinā

etiam cict, & flatus discutit. Cynosbati id rubi canini fructus non inge-  
nere adstringit. Folia uero moderate adstringunt. Vitare oportet id quod  
Cupressus fructu uelut lanuginosum est. Nam arteriam lædit. Cyparissi, id est cu-  
pressi pilulæ ac germina siccantem uim habent, cui nihil manifestæ calidi-  
tatis adest, adeo ut uulnera magna glutinet in duris corporibus, & in flacci-  
dis putrefactionibus humiditates in profundo citra molestiam depascantur,  
Iuncus quadra- & intestinorum rami opituletur. Cyperus, id est iuncus quadratus ca-  
tus lesa cit ac siccac, citra mordacitatem. Vnde humidiora ulcera mirifice adci-  
catricem perducit, & ulcusculis in ore commodat. Habet etiā[m] uim incidē-  
di, calculosq; atterit, & urinas ac menses ciet. Cypri, id est ligustri folia  
& ramuli mixtam habent facultatem, discussoriā & adstringentem, & ci-  
tra molestiam ac mordacitatem siccantem. Vnde decoctū ipsorum affusum  
ambusta sanat, & feruidis inflammationibus conuenit. Feruidis item uulcu-  
sculis oris, commansa profunt. Et splenicis compositionibus miscentur.

Ligustrum

Cytisi folia leniter discussoriā ac tepidā facultatem habent, quem,  
admodum, & maluæ. Conium, id est Cicuta, quod summe perfrigeran-  
tem uim habeat, manifestum est. Coni, id est strobili arboris cortex &  
Circuta folia, similem pino uim habent. Verum ac riora sunt & efficaciora. Fructus  
Conus arbor- autem quem strobilon, id est nucem pineam nominant, quum uiridis est,  
strobilus habet quid amarū & acre cum humiditate. Quapropter affectionibus tho-  
racis ad facilem eductionem commodat. Qui uero editur, in aqua macera-  
tus ut acrimoniam deponat, temperatuseuadit, mordacitatisq; exors est, ac  
Strabiles fru- meatus obducit. Quare etiā[m] asperitates leuigat.

Circuta  
Conus arbor-  
strobilus  
Nux pinea  
Strabiles fru-  
ctus

Initium literæ. λ.

Lagopus siccantis est facultatis, & alui fluxiones resiccat. Ladanoni  
è cistho Ladone dicto sit. Nam capellæ ipsum depascentes, in barbis ac for-  
moribus suis, id quod pinguius est & succulentū auferunt. Id collectum La-  
danum existit optimum medicamentum, calidum in secundo abscessu, &  
tenuium partium, moderateq; molliens ac discussorium & concoctorium.  
Quapropter uteri affectionibus priuatim competit. Habet etiā[m] quiddam adstrin-  
gens. Vnde de his pilos corroborat. Lathyrus species est Tithymalli.  
Quidam tradunt succum eius similiter ut illum purgare. Verum semen hu-  
ius maxime purgatoriā uim habet. Lapsana si edatur malum humore  
generat. Si uero in cataplasmate imponatur, extensoriū quid ac discussoriū  
habet. Lapathum, id est Rumex, discussoriā moderate uim habet. At  
Rumex oxylapathum supra hanc etiā[m] repulso-  
rium quid habet. Semen autem præ-  
fertim oxylapathi adstringit, ideoq; alui profluvia ac dysenterias sanat. Cæ-  
terum folia contrario quodam modo se habent ad semen. Nam hæc aluum  
exturbant, illud autem potum aluum cohibet. Limonij fructum ut qui ad  
sterus sit, cum uino dant coeliacis ac dysentericis & Sanguinem spuentibus,  
& ad muliebrem fluxum acetabuli mensura. Lichen qui in petris nascitur,  
uelut muscus est, extensoriā & moderate frigefacientem ac siccantem ha-  
bens facultatem. Curat autem impetiginis lichenas dictas, & inflammatio-  
nes arcet. Quemadmodum autem dioscوريدes ait, etiā[m] sanguinis erupcio-  
nes sic

Rumex  
Oxylapathum

nes sistit. Lichenes equorum impetigines cum aceto tritas, comitiales & omnis uirulentæ bestię morsum sanare dicunt. Leontopetalı radix

calidæ ac siccat in tertio ordine, itemq; discussoriæ est facultatis. Lepidi um quam etiam Iberidem uocant, ex quarto calefacientium ordine est. Et si milem quidem nascituro uim habet, sed minus ipso siccat. Lepis, id est

Squama omnis fortiter siccat & adstringit, & non ingenerose mordax est. Verum quæ ex ære est, amplius siccat, & magis tenuium partium est, ha betq; aliquid æruginis, & magis ea quæ ex cyprijs clauis decutitur, quam propterea Helitim, id est clauarem nominant. Ac ferri squama plus adstri

ctionis habet, atq; hac adhuc magis stomomatis. Vnde etiam ad maligna ul cera præstantior est. Sed & carnem magis deprimit ac consumit, quàm quæ ex ære est. Leuca canthum, alij Polygonaton, alij Ichiada uocant. Huius radix fecat ac siccat in tertio ordine, calefacit in primo. Leucas calcificat ac siccat tertio ordine. Prædominatur tamen acrimonia. Leuconij, id est uiolæ albæ totus quidem frutex extersoriam & tenuium partium uim ha bet. Magis tamen flores, & quæ ex his sunt sicciore. Quare & menses mo uent, & fetus perdūt ac expellunt. Et si quis ipsorum uim per aquæ ammix tionem obrundat, etiam ad inflammationes conducunt, & maxime eas quæ in utero sunt. Radices item eandem uim habentes, crassiorum partiū sunt et magis terræ. Hæ cum aceto induratis inflammationibus profunt.

Leuce arbor, id est populus alba, ex aquosa ac tepida & terrea substan tia constans, extersoria facultate participat. Libanotides tres sunt. Vna sterilis, duæ fructifera. Vim habent extergendi, incidendi, discutiendi ac molliendi. Harum succus cum melle uisus hebetudinem ex humorum cras situdine obortam sanat. Eius uero quæ in coronas necitur decoctum potū, regio morbo laborantibus prodest. Libanotus, id est Thus, calcificat or dine secundo, siccat primo. Habet etiam modicum quiddam subadstringens. Cortex ipsius manifeste adstringit. Quare etiā siccat secundo abscessu cōple to. Est etiam crassiorum partiū quàm thus, & minus acris. Vnde & sangui nem spuentes, & dysentericos, coeliacosq; ac stomachicos sanat, & foris, et intrò assumptus. Fuligo autem thuris calefacit ac siccat in tertio abscessu, ha bens etiam quid extersorium, quod ulcera in oculis repurgat ac extergit.

Lignys, id est fuligo, quarundam rerum dum uruntur est, uelut thu ris, myrrhæ, terebīthi, styracis, picis liquidæ, cedri. Hæc siccat, & terrea ac tenuium partium existit. Differentiæ ipsius secundum speciem, iuxta usū materiam sunt. Utuntur autem ipsa maxime ad compositiones ocularias, et ornandis palpebris destinatas. Præ omnibus in usu est fuligo thuris, uelut mitor. Fortior autem est pini, conis, ac picæ. Vnde ad glabras palpebras, & putridos ac erosos & lachrymantes oculorum angulos commoda est.

Ligustici & radix, & semē, in tantum calefaciunt, ut menses moueāt. Flatus item ualde discutiunt. Lithargyros, id est Spuma argenti, medi j inter metallica ordinis est. Quapropter uelut materia sæpe ipsa utimur, ad alia medicamenta in compositiones ipsam ammiscientes. Siccat tamen mo deratè, & extergit ac adstringit. Quare etiā ad foemoriū intertrigines cō modat. Lithi, id est lapides omnes, quemadmodum etiam terra, siccat. Verum Hæmarites adstringit & multum siccat, ut aspretudinibus oculo rum conueniat, si abstrinflammatio, cum aqua si adsit, cum ouo. Conducit etiam sanguinis sputo potus, & ulcera nimia carne excresecientia deprimit.

Schistos, id est scissilis lapis similem huic uim habet, sed debilior est. Et post ipsum Galactites. At Melitites habet etiam quid caliditatis. Moroxus quem & Leucographidem uocant, quantò his mollior est, eo quòd nullam habet efficacem qualitatem, tantò moderatior est, magisq; dolore eximit. Quapropter in mollibus corporibus ad ulcera cicatrice inducenda, cum ce rato ipso uruntur. Iaspis subuirdis fortior uim habens, cicatrices & pte rygta extenuat. At uiridis Iaspis stomacho prodest, et appētus, et in dīgito gestatus.

Iberis

Squama

Helitis

Stomoma fer

rum

Polygonaton

Ichiada

Viola alba

Populus alba

Thus

Fuligo

Spuma argēti

Lapides omnes

gestatus. Iudaicus lapis calculos in rhenibus atterit. Vnde etiā Tēcōlithi  
iuniores ipsum appellauerunt. Pyrites ex fortiter discutientibus est ad na-  
mores ac sanguinis grumos. Hoc non praesente, mylite utuntur. Phrygius  
una cum hoc quoddam fortiter siccatur, etiam adstrictionis ac mordacitatis quid  
habet. Vnde & repellit, & discutit. Quare etiam oculariis compulsionibus  
miscetur. Ageratus adstringendi, ac discutiendi vim habens, gurgulionibus  
inflammatis prodest. Aliae petrae flos in tantum tenuium partium est, ut haec  
carnes citra mordacitatem resiccet, Gagates quum multum siccet, in  
stationibus diuturnis maxime conducit. Magnetes qui & lapis Heracleus,  
simile hēmatitū vim habet. Arabicus ebori similis est, siccatur & adstringit. A  
labastriten usum quidam stomachicis bibendum exhibent. Smiris exterso-  
riam vim habens dentes exfolit. Lapides qui in spongijs reperiuntur, calcu-  
los in rhenibus atterunt. Similem hīs vim habent qui in Agro Cappado-  
ciae monte generantur. Similiter & qui Ophites appellatur, qui etiam à  
pera morbis alligatus prodest Ostraciten & Geoden multū siccare produnt,  
ut etiam tumores inflammatos sanent. Cotis Naxiae detrimentum frigefac-  
torum esse dicunt, ut & uirginum mammas, & puerorum testes contrahat.  
Quod uero ex olearia cote deteritur, extersorium est, & alopecij commo-  
dum. Hieraciten & Indicum lapidem aiunt appensum hæmorrhoidum san-  
guinem sistere. Saphirum autem potū, à scorpione percussus prodesse. Aphro-  
selenium uero eomitilibus. Armeniacus aluum quidem deorsum purgat.  
Est autem stomacho noxius. Lithospermon quod alijs liosporon, alijs he-  
ractium uocant, herbae Actonychi dictae semen est, lapidosum, album. Hoc  
cum uino albo potum, calculos atterit, & urinas ducit. Liospermon,  
id est lini semen, calidum est in primo ordine. Medium autem inter hūme-  
dantia ac siccantia. Si edatur flatuosum est etiam si torreatur.

Linozostis, id est Mercurialis aluum satis largē subducit. In catapla-  
smate uero apposita discutit. Nolle uero hoc conuenit, quod mercurialis se-  
men eminentijs corporis praeter naturam affricium, ipsas abolere comper-  
tum est. Has autem eminentias uulgo naphia uocant. Oportet autem uiri-  
de semen esse, & eminentias saepe ipso confricare. Litrum siue Nitrum  
in medio est facultatis aphytonis ac salis. Vltimum autem tenuiorum partium  
ac magis diffusorium euadit. Etsi intra corpus sumatur, secatur & attenuat  
erassos ac uiscosos humores plus quam sal. At chalastrum (Est autē locus  
Thessalonicae Chalastra) acrius est & magis siccatur. Quare etiam ad flux-  
iones à capite, & ad articulorum affectiones ipso utuntur. Lonchitidis  
quae semen triangulare habet, uelut cuspis, radix similis dauci radici, u-  
rinam ciet. Eius uero quae scolopendrio similis est folia uiridia quidem uul-  
nera glutinant, sicca autem cum aeto pota, lienes induratos sanant.

Lycapsi radicem ut quae adstringens sit, Dioscorides ignibus sacris con-  
uenire dicit, si cum polenta in cataplasmate imponatur. Tritum uero ac cū  
oleo illitam sudores mouere. Lycium ex diuersi generis facultatibus  
compositum est, altera calida & tenuium partium ac diffusoria; altera ter-  
rea frigida & leniter adstringente, ut secundo ordine siccet. In calefaciendo  
uero ac frigefaciendo medium tenet. Quapropter uelut extersorio ipso u-  
tuntur, in his quae pupillis tenebras offundunt. Verum uelut adstringente  
in coeliacis ac dysentericis, & ulceribus malignis. At in inflammationibus  
uelut diffusorio. Primarium autem est Indicum. Lysimachium adstringen-  
tem facultatem praedominantem habet. Vnde uulnera glutinat & ipsa, &  
succus ipsius, sanguinemq; sistit, & dysentericis prodest pota, & per sedem  
infusa. Lychnidis quae in coronas necitur, semen calidum est & siccum  
secundo ordine completo. Lotus herba satiaua, quam aliqui triphyllon  
id est trifolium uocant, extersorium & moderate siccantem vim habet. Tem-  
perata autem est in caliditate. Am syluestris semen secundi ordinis est cale-  
facientium. Habet etiam quiddam extersorium. Verum Aegyptiae semen etiam  
in pa-

Cos naxia

Cos olearia

Actonychos

herba

Lini semen

Mercurialis

Naphia

Nitrum

Chalastrum

Triphyllon

Trifolium

*in panes conficiuntur.* Lotus arbor tenuium partium est; & siccatur, & adstringit moderate. Vnde ad fluxum muliebrem, & ad alui fluxiones pota conducit cum uino aut cum aqua; aut etiam per sedem infusa defluos item capillos corroborat.

### Initium literæ. µ.

Macer cortex est qui ex India affertur, siccans tertio ordine, Medius in caliditate ac frigiditate. Est etiam adstringens, tenuium partium. Vnde coeliacis & dysentericis conducit. Malabathri folium spicæ nardi similē uim habet. Malache, id est Malua, syluestris moderatē discutit ac molli. Hortensis ut humidior, ita debilior est. Semen autem tantō fortius, quam obsocius. Mamas uelut radícula quædam est herbæ, habens frequenter quosdam uelut nodos. Hæc cicatrices & albugines attenuare creditur: nimirum quæ exterforiam habeat facultatem. Mandragoras tertij frigefacientium ordinis est. Mala uero eius etiam caliditate aliqua participant, itemq; humiditate. Vnde etiam soporofam uim habent. At radice cortex uehementissimus, non frigefacit solum, sed etiam siccatur. Interna uero ipsius pars debilis est. Manna Thuris similem thuri uim habet, remissam tamen, & leniter adstringentem. Marathrum, id est fœniculum calefacit tertio ordine, siccatur primo. Quare etiam lac generat, & suffusus oculis opitatur. Mastiche, Chia quidem calefacit ac siccatur secundo abscellu. Est autem compositæ facultatis, adstringentis simulq; mollientis. Vnde stomachi, alui, intestinorum, & hepatis inflammationibus conducit. Aegyptia uero nigrior quodam modo est, siccaturq; ac discutit magis, sed minus adstringit. Ideoq; furunculos discutit. Melan, id est Atramentū, Indicum ut Dioscorides dicit, ex his est quæ leuiter frigefaciunt, & rumpunt inflammationes ac tumores laxos, ulceraq; purgant. Atramentum autem quo scribimus satis etiam ipsum siccatur. Verum si posca diluatur, ambustis illitum illatim auxiliatur. Melantheria, id est atramentum metallicum multum adstringit, cum partium tenuitate. Melanthium calefacit ac siccatur tertio abscellu. Est etiam tenuium partium. Vnde destillationes olfactu sanat, & suntōsumatur, status maxime discutit. Est etiam amarum, unde lumbricos occidit. Extergit item ac secatur, unde recta ceruicē spirantibus conducit, & lepras deterit, & formicarias uerrucas eximit, & menses mouet.

Meli, id est Mel calefacit ac siccatur secundo ordine, & satis abunde extergit. Cōctum minus acre & exterforium est, & uentrem subducit, sed magis nutrit. At amarum mel, uelut & id quod in Sardonis quæ, mixtam habet facultatem, terream ac calidam. Cæterum Saccharum quod ex felici Arabia affertur, minus dulce est eo quod apud nos est, sed æquale uim habet, ad hoc quoddam neq; stomacho noxium est, neque sitim inducit, uelut hoc nostrum. Melia, id est fraxinus nota est arbor. Cuius folia pota morsis à uisera commodant. Cortex ustus & cum aqua illitus, lepras remouet. Liguriamenta pota letalia esse dicunt. Melilotum mixtam uim habet, adstringentem ac discussoriam & concoctoriam. Melissophyllon, id est Apiastrum similem marrubio uim per omnia habet.

Memecylon comari, id est arbuti fructus relatus supra est in litera. η. Mespila quæ alij tricocca, à tribus quæ habent granis appellant. Acerbus admodum hic fructus est & uix edi potest, uentremq; cohibet. Sed & germina & folia arboris ipsius abunde acerba sunt. Medij radix aliquantum contrariam semini uim habet. Hæc enim austera est, & fluxiones sistit, ut etiam muliebrem fluxum sistat. Semen autem menses propellit, utpote tenuium partium & incisoriarum uim habens. Mecon, id est papauer multas species habet. Verum hortense, quod & Thylactin uocant, in cibi usum uenit, & cum panibus comeditur, estq; moderatē somnificum. Quod autem Rheas uocatur, eo quoddam semen ipsius citō defluat, id fortius quam hortense est. Editur itaq; non per se, sed paucissimum ad copiosius mel miscetur.

Malua

Mala Manna  
dragore

Fœniculum

Atramentum  
Indicum  
Atramentum  
scriptorium  
Atramentum  
metallicum

Mel

Saccharum

Fraxinus

Apiastrum  
Comarus  
ArbutusPapauer  
Thylactis

Rheas

scetur. Quod uero uelut desidentem ac depressum calicem habet, id semen habet nigrum & medicatum, abunde frigidum. At quod oblongiorem calicem habet, & albas contractiorem, id omnium medicatissimum est, ut torporem inducat usque ad mortificationem. Est enim quarti frigefacientium abscessus, tum ipsum, tum succus ipsius, quem per excellentiam opium appellant. Cæterum papauer Ceratitidis, id est cornutum, exterioriam uim habet. Quare radicis ipsius decoctum potum, hepaticis prodest. Folia uero & flores ualde fœdida ulcera purgant, & crustas remouent. Heracleum & spinosum appellatum papauer, semen habet quod pituitam purgat.

Mela, id est mala omnia humiditatem superfluum in se habent ac frigidam. Verum exoluta & aquosa, frigidiora & humidiora alijs sunt. Dulcia uero aquosa quidem sunt, non tamen manifeste frigida. Austera frigidiora dulcibus sunt, sed minus humida. Acida frigida quidem & ipsa sunt, sed humores in uentre secant. Acerba uelut sunt cydonia & struthia dicta, frigidum ac terrecum temperamentum habent, et propterea aluum sistunt, & uulneta glutinant. Ita etiam folia, & succi, & cortices arborum inter se differunt. Mali persicæ germina ac folia manifeste amara sunt. Lumbricos itaque occidunt, trita umbilico imposita. Fructus ipsius, malum uidelicet hoc persicum quod editur, humidum est ac frigidum secundo abscellu. Mali Armeniacæ fructus, quem nunc præcocia uocant, eiusdem cum persicæ facultatis est.

Mei radices calide sunt tertio ordine, siccae secundo. Menses igitur & urinas cient. Quod si ramentum uberius sumatur, capitis dolorem inducit. Milax & leuis, & aspera, quæ arbores amplectitur, calidæ & acris est facultatis. Misy ex crustam inducentibus a cumentibus, cum forti adstrictione, medicamentis est. Minus autem mordet quam chalcitis, eo quod tenuium partium exsistit. Sed & chalcitidem & Sori, ob uetustatem in Misy transmutari Galenus dicit, mutatione ex superficie incipiente.

Molybdæna, id est plumbago spumæ argenti similem uim habet, à medio temperamento ad frigidius progressa. Molybdos, id est plumbum, uim habet perfrigerantem. Habet etiam humidam substantiam plurimam à frigiditate compactam. Si igitur in ipso aut uinum, aut oleum crudum, aut aliquem frigefacientem succum contriueris, ad ulcerosas inflammationes circapendenda ac sedem, optimum medicamentum habebis. Lamina porro plumbea circa lumbos gestata, seminis per somnum effusiones cohibet. Sed & ganglia, hoc est neruorum in nodum coactiones diffundit lamina plumbea ipsis imposita. Vsum plumbum magis quidem siccatur, sed habet etiam quid amari. Si uero lotum fuerit, citra mordacitatem siccatur, & malignorum ulcerum optimum est medicamentum.

Morcas id est mori, fructus maturus alui subducit, & in medicamenta ori destinata, stomatica dicta, & ad alia quæ moderata adstrictione opus habet, utilis est. Immaturus autem siccatus medicamentum ualde adstrictorium euadit. Cortex radicis arboris purgatorius est cum quadam amaritudine. Unde latum lumbricum necat. Foliorum autem & germinum media quodam modo est inter alui subducentia ac sistentia facultas. Myagros quæ alij uocant melampycnon, herba est farmentitia ac pinguis. Pinguedo ex ipsa corporis asperitates explanare uidetur. Et semen Myagri pingue est, & quod in ipso est oleosum, meatus obducendi habet facultatem.

Myaces, id est Mituli ustri eadem quæ buccina faciunt. Magis autem proprie loti, palpebrarum crassitudinem & albugines deterunt cum melle. Caro ipsorum morsis à cane utiliter imponitur. Mycellos, id est Medulla uim habet indurata & in scirrhum coacta corpora molliendi. Optima est ceruina. Deinde uitulina. At taurorum & hircorum acris est, & magis siccatur. Et quæ quidem ex artubus est, pinguior est, & magis mollior. Quæ uero ex spina, durior ac squallidior.

Mycetes, id est fungi frigidi & humidi admodum temperamento sunt. Quidam etiam ex ipsis in cibo accepti necant, & maxime qui ex ipsis naturam putredinosa qualitate per-

Opium  
Ceratitidis

Mela &amp; omnia

Præcocia mala

Plumbago

Plumbum

Mora

Melampycnon

Mituli

Medulla

Fungi

*penmixtam habent.* Myosote, id est auricula muris dicta est in alfine. *Auricula muris*

Myxa fructus arboris est minor primo, sed facultate similis.

Myrica secandi ac extergendi uim habet, citra hoc ut manifeste siccet. Habet autem & aliquam adstrictionem. Decoctum itaque ipsius lienes iuuat potum. Sanat etiam dentium dolorem. Fructus autem & cortex ipsius prope ad gallæ facultatem ac cedunt. Cinnis arboris magis siccet.

Myriophyllum, id est Millefolium siccantem adeo uim habet, ut uulne

raglutinet. Myrrha siue Myrrhis secundi ordinis calefacientium est, habens etiam quid tenuum partium. Radix ipsius odorata ac dulcis est, men-

sesque mouet, & quæ in thorace ac pulmone hærent repurgat.

Myrrhine, id est myrtus ex contrariis substantiis constat. Prædomina-

eat tamen in ipsa, terrea frigiditas. Vnde fortiter siccet. At myrtis, quæ in trunco ac ramis eius eminens appendix est, siccet & adstringit uchementius. Sed & folia sicciora magis quam uiridia siccant. Fructus quoque ac succus similem uim habent, tum foris adhibita, tum intra corpus assumpta.

Moly quidam rutam syluestrem, alij armalan, Syri besalan uocant, ter-

tij ordinis calefacientium est & tenuum partium. Vnde etiam crassos ac uiscosos humores secat ac discutit, & urinam propellit.

\* Initium literæ. v.

Nascaphthon quod alij Narcaphthon uocant, Indicum est aroma, quod ad uterum adstrictum sufficit. Napy, id est Sinapi calefacit ac siccet in quarto abscellu. Nardostachys, id est Spica nardi. Huius radix calefacit primo abscellu, siccat secundo. Habet etiam quid adstringens, & acre, & subamarum. Proinde hepati & stomacho conuenit foris adhibere, & intro potum. Urinas item ciuit, & internarum partium fluxiones si-

lit. Indica fortior ac nigrior est quam Zyraca. Nardus autem gallica siue Celtica similem relatæ uim habet, sed debili-

or est, præterquam ad urinam ciendam. Nam calidior est quam illa, & minus adstringit. At montana Nardus, quæ & Thylacitis & pyritis dicitur, prædictis debilior est. Nariheis, id est ferula semen attenuat ac calefacit. Quod uero intus uelut medulla est, dum adhuc uiridis est, adstringit. Quare sanguinem spuentibus & coeliacis prodest.

Narce, id est Torpedo marina, si caput dolentibus adhuc uisua apponatur ad caput, dolorem eximit. Fortassis ob hoc ipsum quod torporem inducit. Sed & oleum in quo uisua cocta fuerit, illitum acriores morbi articulares dolores mitigat. Sedem etiam prolapsam, ipsam appositam reprimere ferunt.

Narcissi radix secandi uim adeo habet, ut etiam maxima uulnera glutinet, usque ad tendines etiam dissectos. Habet etiam quid exteriorium ac attractorium. Neuras quam alij poterium uocant, siccantem citra mordacitatem uim habet, ita ut & ipsa neruos dissectos glutinet. Radices autem hoc maxime faciunt impositæ et potæ. Nerion siue Rhodaphne, si forinsecus in cataplasmate imponatur, discussoriam uim habet. Intro sumpta occidit.

Nymphæa uim habet siccantem citra mordacitatem. Proinde & uentrem sistit, & genitale semen resiccet. Verum quæ albam radicem habet fortior est, adeo ut etiam fluxum mliebrem sanet et pota cum uino nigro & austeto. Quæ uero nigram radicem habet, exteriorium etiam quid habet, quo uiriliginis cum aqua illita sanat, & cum pice liquida alopecias.

Initium literæ. f.

Xanthium aut phasganium, id est Lappa semen habet discussorie facultatis. Xiris siue Xyris tenuium partium uim, discussoriamque & attractoriam habet, & nimirum siccantem, & magis ipsius semen, ita ut urinam ciuit, & splenem induratum sanat. Xiphij id est gladioli radix attracto-

tiam & discussoriam ac siccantem uim habet.

Initium literæ. s.

Oë arbor, cuius fructus oë, ab aliquibus uero uā id est Sorba uocantur, Sorba

B : adstringit

*Auricula muris*

*Millefolium*

*Myrtus*

*Myrris*

*Ruta sylue*

*Siris*

*Armala*

*Besala*

*Sinapi*

*Spica nardi*

*Celtica nardus*

*Thylacitis*

*Pyritis*

*Ferula*

*Torpedo mari*

*na*

*Poterium*

*Rhodaphne*

*Phasganium*

*Lappa*

*Gladiolus*

adstringendi uim habet, sed minus quam mespilus. Othonnam aliqui succum esse aiunt herbae in Arabia quae ad Aegyptum est nascentis. Alij lapidem Aegyptium. Extergit autem & mordet, omnia quae pupillis tener nebras offundunt deterens. Oenanthen plurimus usus syluestris uitis florem esse nouit, qui abunde adstringit & corroborat maxime partes circa uentrem. At Dioscorides aliam huic facultati contrariam describit. Vnde & secundas ipsam eijcere dicit, & urinae stillicidium ac morbum regium sanare. Oenos id est uinum ex secundo ordine est eorum quae calefaciunt ac siccant. Quod uero admodum uetus est, ex tercio. Mustum autem in primo. Oelypus in lanarum tractatione relatus est. Olynthi id est grossi, acrem ac discussoriam uim habent, propter eum qui in ipsis est succum. Coeli igitur duros tumores discutiunt. Crudi uero uerrucas formicarias, & eas quae thymi appellantur eximunt. Olosteon siccantem uim habet cum adstrictione. Vnde ipso etiam ad ruptiones utuntur.

Omphacium succus est uinae acerbae. Adstringit abunde, & siccantem abscissu. Vnde fluidis affectionibus & maxime stomachicis conuenit.

Ocnagra quam alij cenotheram, alij cenothurium uocant, frutex est arborosus, cuius radix in cataplasmate imposita, fera ulcera mitigat.

Onosma siue onomis, aut phlomisitis, aut ononis, acris & amara est. Vnde folia ipsius pota cum uino, foetus necant ac eijciunt.

Onobrychis rarefacientem ac discussoriam uim habet. Tubercula itaque discutit, et urinae stillicidia sanat, & sudores prouocat. Oni id est aselli qui sub uasis aquarijs reperiuntur, & in globum se contrahunt, discussoriam ac siccantem uim habent. Itaque poti cum uino urinae difficultatem, & morbum regium sanant. Angina laborantibus insinuantur cum melle. Et ad aurium dolorem triti cum rosaceo calefacti in mali punici putamine instillantur. Onyches conchyliorum Indicorum opercula sunt, haec suffita eas quae ab utero strangulantur excitant, itemque a comitiali praeparatos. Pota uero aluum turbant. Ononis radicem habet calefaciorem circa tertium ferme ordinem. Cortex ipsius extergit ac secant. Vnde etiam calculos atterit.

Oxos id est Acetum mixtae facultatis est frigida ac calida, quae ambae tenuium partium existunt. Praedominatur tamen frigida calida. In tercio autem ordine siccata. Oxyacanthos arbor pirastro similis est specie ac facultate, habetque etiam quid tenuium partium. Fructus eius myrti bacis similis est. Opium in tractatione de papauere dictum est. Opos id est Succus: & cyrenaeicus, & Medicus, & Syriacus, per excellentiam dicuntur. Sunt autem ualde calidi ac flauosi. Vtrum Cyrenaeicus omnem calidissimus & maxime tenuium partium est.

Origanum omnes species secandi ac attenuandi, siccandi que ac calefacienti uim habent in tertio abscissu. Oreoselinon id est apium montanum similem apio uim habet. Sed fortius est. Orobanche siccant ac frigidi temperamenti est in primo ordine. Orobus id est Eruum calefacit ordine primo, siccant secundo. Est autem amarum. Vnde secant & extergit, & aperit obstruita. Si uero amplius fumatur, sanguinem per urinas ducit.

Orrhionum parubio specie simile est, calidumque ac moderate siccum, & extensorium. Venerem itaque stimulat, & oculorum crassitudines depurgat cum melle, & tumores laxos discutit, & aculeos extrahit. Syluestre fortius est latiuo.

Oryza habet quid adstringens. Quare etiam uentrem moderatè sistit. Orchis herba appellatur etiam cynosorchis, id est Testiculus canis, habetque radicem duplicem bulbo similem. Vis maioris humida est ac calida, quare etiam ad uenerem stimulat. Minoris autem calida est ac sicca. Itaque uice uersa uenerem cohibet. Orchis quae & Serapias, & ab alijs triorchis, quasi tritesticularis dicitur, magis priore siccant. Tumores itaque laxos discutit, & ulcera sordida ac putredinosa purgat, & herpetas sanat. Siccata uero magis siccant. Quia uero subadstringit, inde adeo etiam

Vinum

Grossi

Phlomisitis

Aselli sub aquarijs

Conchyliis Indica

Acetum

Cyrenaeicus succum

Apium montanum

Eruum

Cynosorchis

Serapias Triorchis



am aluum sistit cum uino pota. Osiris ex qua scopas faciunt, amara est, & hepar ab obturatione liberat. Ossa uisita discussoria & admodum siccantem uim habent, & maxime humana, uelut alunt. Suillum certe talum uisum, inflationes & tormina sanare tradunt. Est quidam qui ossa uisita bibenda exhibet, & morbum comitialem ac articulare curat. At bubulum talum uisum, mobiles dentes firmare dicunt. Idem cum melle potus lumbricos rotundos exigit. Cum aceto multo uero splenem consumit. Illitus etiam uirilgines leucas dicitur iuuat. Idem etiam uenerem stimulat. Sed & scemora bouis uisita pota, sanguinis eruptiones & alui fluxum sistunt. Ostrea id est testæ ex fornacibus trita, siccantem & exterforiam uim habent. Vnde dentes poliunt. Et cum aceto illita pruriginis, & pustulas, & podagricos iuuant. Cum cerato uero strumas discutiunt. Ostreorum testa uisita buccinorum testis similem facultatem habet, sed minus crassam partium. Faciei itaque uisita extergit, & dentes dealbat. Si uero lauetur, mordacitatem amittit, & humidis ulceribus ad expletionem, & cicatricem inducendam commodat.

Ouron id est urina omnis calida & acris est. Sed debilissima inter animalium urinas humana est, exceptis sushis castratis. Est autem admodum exterforia, eaq; aliqui in peste pota seruari sunt. Lepras item & putrida ulcera, & manantia capitis ulcera, & furfures curat. Attritus quoque pedum ex offensione, si non fuerint inflammati. At impubium puerorum urina fortior est, ex qua etiam chryscolla fit. Mulorum urina in articulares compositiones conuenit. Camelorum & caprarum urina aluum subducit, unde hydropicis bibenda exhibetur.

Initium literæ. ω.

Pancratium & specie & uiribus simile est squillæ, sed debilius.

Paliuri folia & radix adstringunt. Vnde etiam fluentem uentrem sistunt. Sed & tubercula discutiunt non ualde calida. Fructus in tantum secat, ut etiam calculos aterat, & expuitionibus e thorace auxilietur.

Panaces heracleum est ex quo oppopanax fit, qui tertio ordine calefacit, siccatur autem secundo, mollit item ac discutit. At radice cortex succo debilior est, habetq; quid exterforium ac incarnans. Semen eius etiam menses mouet. At uero Asclepium & Chironeum panaces priore sunt calidiora. Vnde ipsorum floribus & semine ad maligna ulcera ac panos utitur. Papyrus non uisita materia quædam est. Vsa uero siccatur, quemadmodum etiam charta uisita. Verum papyri cinis debilior est.

Paronychia herba dicta ex eo est quod paronychias id est reduuias digitorum sanat. Vis eius tenuium partium est, siccaturq; citra mordacitatem. Pentaphyllos id est Quinquefolium, siccatur tertio ordine, minus uero acris, ideoq; ad multos usus commoda est.

Peplos quæ alij papauer spumofum uocant. Et hic frutex succum habet, & purgat similiter ut Tithymalli. Peplion quoque succum habet, & nascitur circa mare. Et in reliquis quidem inutile est. Verum semine ipsius feruidum, similiter ut peplos purgat. Piperis radix costo similis est facultate. Fructus autem ipsius recens germinantis, est piper longum, estq; humidius ac calidum. Qui uero uelut uua immatura est, piper album est, quod acris nigro existit, quum id sit nimium assatum. Ambo autem calefaciunt ac siccant. Pepo exterforiam uim habet. Vnde caro ipsius maculas solares & similes extertit. Semen uero rhenes ab obturatione liberat. Periclymeni folia & semine, secantem simulq; calefacientem uim habent, adeo ut urinam cruentam excernant pota ad sextum usque diem: uerum si ad quadraginta dies bibantur, lienosis & difficulter spirantibus profunt. Persifereon id est Verbenaca in tantum siccatur & adstringit, ut uulnera glutinet, & sanguinis eruptionem sistat. Persæa arbor est Aegyptia, cuius folia siccant & adstringunt. Quare & sanguinis eruptionem sistunt.

B 3 Petasites

Talus Suillus

Tali animalium

Teste uaria

Urine uaria

Chryscolla

Oppopanax

Charta uisita

Quinquefolium

Papauer spumofum

Verbenaca

Petalites ex tertio ordine siccantium est. Vnde in malignis & phagē dānicis ulceribus ipso utuntur. Petroselinū semen calidum ac siccum est tertio abscellu, uim secandi habens. Vrinam item & menses largi et. Flatus quoque discutit.

Peucedani & liquore & succo admodum calefaciente, discutientēq; ac attenuante utimur, tum pro odoramento, tum in portione, ad affectiones in pulmone ac thorace, ex humorum crassitudine obortas, & ad induratum lienem. Sed & dentibus corrolis triditur, dolorem statim sedat. Conuenit etiam affectionibus neruorum. Radix autem etiam ossium squamas remouet, & maligna ulcera sanat, calefaciens ac siccans ordine tertio.

*Pinus* Peuce, id est picea similem pino uim habet, sed moderatiorem.

*Picea* Peganum, id est ruta, syluestris quidem quarti ordinis est calefacientium ac siccantium. Satiua uero tertij. Secarq; ac discutit crassos et uiscosos humores, & menses mouet. Estq; tenuium partium & status discutit. Vnde & uenerem cohibet.

*Ruta* Pix sicca secundo ordine siccatur, minus calefaciens. Liquida uero uice uersa. Habent etiam quid exterforium ac concoctorium, discussoriumq; & acre. Quapropter & scabros ungues exigunt, & imperigines exterunt, & tumores concoquunt. Fortior autem est liquida, ut etiam anhelosis & pectore suppurata delincla commodet. At sicca magis uulnera glutinat.

*Oleum piceinum* Pissalæon id est oleum picinū ex liquida pice fit, & in substantia magis tenuium partium est quā ipsa pix. Pissaciōrū fructus in cibo acceptus moderatē stomacho commodus est, & hepatis obstructiones aperit, & maxime putaminū ipsius aromaticorum decoctum ex uino. Auxiliatur etiā morsu à uisera. Pitydes uocantur fructus pinorum, estq; mixtæ facultatis, adstringētis & acris.

*Pinorum fructus* Vnde ad expuitiones ē thorace faciunt. Pitycanpe id est pinorum, & rucæ eandem uim habent, quam cantharis & buprestis.

*Pinorū cruce* Pini cortex ad stringentem uim prædominantem habet, qua intertrigines & ambusta inspersus iuuat, & uentrem sistit si potetur. Folia uero etiam uulnera glutinant. Pityusam quidam tithymalli speciem esse dicūt, quod & succum habeat, & similiter ut illi purgent.

Platanus humidiorē ac frigidiorē uim habet. Vnde etiam folia uiridia inflammationes quæ adhuc sunt iuuant. Cortex autem & pilulæ magis siccantem uim habent, ut ille in acetos coctus dentium dolores sanat: Pilulæ uero cum adipe ambusta curen.

At uultus cortex magis siccans ac exterforius euadit, ut lepras & humida ulcera sanat.

*Pulmo animæ* Pncumon id est pulmo agninus & suillus atritus ex ealeca mentis curare creditur. At uulpinus assiccatus si bibatur, anhelosis: Marinus autem pulmo recens tritus, podagricis & pernionibus prodest.

*Pileletæon* Polemonium quod alij philetæon uocant, tenuium partium est & siccat. Vnde aliqui ad coxendicum morbum, & disenteriam, & induratum splenem, radicem eius bibendam præbent cum uino.

*Polemonium* Potium minus quo etiam ad antidotos utimur, tertij ordinis est calefacientium ac siccantium. Omnia itaq; uiscera ab obturatione liberat, & urinas ac menses mouet. Et ubi adhuc uiride est, magna uulnera glutinat. Siccum autem maligna ulcera inspersum ipsis sanat.

*Polygalon* Polygalon folia habet moderatē austera. Potum autem, lac generare uidetur, calidum nimirum ac humidum habens temperamentum.

*Polygonatum* Polygonatum mixtum est ex adstrictione, & acrimonia ac amaritudine & quadam iniucunditate quæ nominari non potest. Quapropter neq; multi usus est. At radicem ipsius quidem uulneribus imponunt, & maculas faciei cum ipso exterūt.

*Polygonum* Polygonum id est Sanguinaria habet quiddam quid adstringens. Verum prædominatur in ipsa frigiditas aquosa in secundo ordine. Prodest itaq; frigidis imposita his qui stomacho exuruntur, & ignibus sacris, & inflammationibus calidis. Quum uero tale sit, fluxiones repellit, atque ea de causa siccandi uim habere putatur. Est autem mascula fortior quā semina.

*Polycnemon* Polycnemon calfacit ac siccatur secundo ordine, ut etiā uulnera glutinet.

*Polypodium* Polypodium

Polypodium siccantem abunde uim citra mordacitatem habet. Potum purgat deorsum. Pompholyx citra mordacitatem siccatur, ut cancris ulceribus, alijsq; malignis opituletur. Miscetur etiam in oculares compositiones. Purpuræ usitæ similem testis uim habent. Opercula uero ipsarum cum oleo cocta fluentes capillos corroborant: cum aceto pota lienes tumentes sanant: fistula ab utero strangulatas excitant, & secundas eijciunt.

Potamogiton frigefacit & adstringit similiter ut polygonum, ut cui similem facultatē habeat. Poterū alij phrynion uocant. Huius radices cōcise, ac cōcise neruos dissectos ac uulnera glutināt. Decoquū aut ipsius potū, affusionibus circa neruos opituletur. Prasion id est Marrubiū calfacit secūdo ordine, magis autem siccatur. Hepar & lienem, & thoracem, et pulmonem ab obturatione liberat. Menses etiam propellit. In cataplasmate impositū extergit ac discutit. Sed & alijs exteriorum est, ac incidendi uis præditū.

Prason id est porrum mali succi est & acre. Ut uero Dioscorides ait, etiam grauiā somnia inducit, & uentri commodat, & urinam cicit, et attenuat. Habet etiam quid exterioriū. Nam & ptisanæ incoctū, in Thorace hærentia educit. At semen ipsius in rhenales compositiones miscetur. Folia habet etiam quid adstrictionis. Vnde succus ipsorum sanguinem cohibet.

Prinos id est filix similem quercui uim habet. Sed multo fortior quam ipsa est. Propolis calefacit secundo abscessu, & moderate extergit. Habet uim tenuium partium, & ab obturatione liberantem. Parmicæ folia sternutationem mouent. Totus autem frutex uiridis, sugillata, & alios liuores ab humoribus sub cutem effusis discutit. Est enim calida & sicca uiri diū quidem secundo, sicca uero tertio gradu. Ptelæa id est ulmus, siccantem & exterioriam uim habet, ut etiam uulnera glutinet. At cortex adhuc magis, si quum recens est, uulneribus uelut ligamentum obducatur. Sanat item lepras cum aceto. Sed & radices eandem uim habent. Quare decoctio ipsarum fracturæ quæ calli inductione opus habent perfunduntur.

Pteris id est filix siccandi uim habet, & amara est. Vnde & foetus necat, & latos lumbricos occidit, quatuor drachmarum pondere cum aqua mulsa. Quia uero moderate adstringit, ulcera siccatur circa mordacitatem.

Pynocomon discussoria & acrem uim habet. Folia igitur panos & faruncululos discutunt. Semen uero ad hæc & aculeos extrahit. At radix bi lem flauam purgat. Pyrethri radix urentem uim habet, & dentium perfricatione dolores mitigat: Erante rigores per circuitum repetentes affricatur cum oleo. Insuperq; torpores ac resolutos iuuat. Pyros id est Triticum primo ordine calefacit. Verum inter sicca & humida medium tenet. Habet etiam quid uiscosum, & obscurandi uim habens. Ptya id est coagulum omne acris & attenuatis, ac discussoria, & nimirum siccantis est facultatis. Verum leporinum comitiales curare scripserunt, si cum aceto bibatur, fluxum item muliebrem sanare, & lac in grumos in uentriculo concretum dissoluere. Similiter autem & sputa sanguinis ex thorace, ipsum cohibere dicunt. At equinum coagulum coeliacis ac dysentericis, conuulsiue scripserunt. Phocæ autem coagulum castorei uim habere.

#### Initium literæ. ꝑ

Racos id est panniculus ustus, si ex lana est, lanæ usitæ similem uim habet. Lineus autem panniculus dum adhuc uritur, tenuis partium summum edit, qui & distillationes in capite obturatas soluit, & uteris sursum currentibus conuenit. At ubi idem iam ustus est, prope ad lanæ uim accedit.

Rhānus siccatur secūdo abscessu, frigefacit primo. Vnde herpetas et ignis sacros sanat non ualde feruidos. Utendum autem est folijs teneris.

Raphanus calfacit tertio abscessu, siccatur secundo. Syluestris efficacior est. Vtriusq; autem semen uehementius est. Discutunt itaq; sugillata & alia liuefacta. Rheon alij rha uocant, compositum est ex terrea frigida, & tenuium partium aërea substantia, calidaq; ac leniter acry. Vnde conuulsa

B 4 & rup,

Phrynion

Marrubium

Porrum

filix

ulmus

filix

Triticum

Coagulum

Panniculus la-  
neus & lineus

Rha

& rupta & erecta ceruice spirationes iuuat. Item liuida, discutiendo. At adstringendo, sanguinis spurationibus, & coeliacis & dysentericis prodest. A  
Vtraque uero facultate, hepaticis. Resinae omnes calefaciunt ac siccant. Sed Terebinthina primas fert, quae discussoria & mollitoria, tenuiumque partium ac exterioria existit. Quare etiam scabiem sanat. Larix quoque huiusmodi est. At resina piceae & adhuc *magis* strobilina, acrior quidem est, non tamen discutit plus, neque attrahit. Mediae uero inter ipsas sunt, resina ex pinu, & ex abiete. Rosae compositae naturae sunt, ex aquosa substantia calida adstringente & amara. Flos ipsarum adhuc magis adstringit. Vnde etiam siccatur. Rhodia radix calefacit in secundo abscessu, estque tenuium partium ac discussoriae facultatis. Rhoeae id est Mala punica, omnia quidem uim adstringentem praedominantem habent, propter quam frigescent ac siccant. Verum dulcia ambo haec minus quam alia habent. At austera magis quidem frigescent, sed sicciora sunt, & stomacho commoda. Acida uero plus frigescent, & incisoria quid habent. Ceterum nucleis maligis adstringunt ac siccant quam succus. Et his adhuc amplius putamina, sidia & malicoria appellata. Similem autem his uim habent flores, cythni dicti. Rhois coriarij uocati fructus maxime ac succus, medicis in usum ueniunt. Abundè autem adstringit, & siccatur ordine tertio, frigescent secundo. Rhypos id est Sordes ex aereis statuis, aut uasis in quibus largum oleum remanet, habens etiam quid aeruginis, discussoriam uim habet, & moderate siccantem ac mollientem. Crudos itaque panos discutit. At uero de sordibus in palæstra, quam aliqui etiam paton uocant, in sudoris tractatione dictum est. Ceterum aurium sordes, reduuias sanare dicitur.

## Initium literæ. σ.

Sagapenum succus est uelut ferulae, calidus & tenuium partium. Habet etiam quid exteriorium, ut oculorum cicatricibus ac suffusionibus commode. Salamandrae usque cinerem aliqui ad compositiones erodentes, & ad lepras ac scabiem destinatas ammiscunt. Sampsuchum calefacit ac siccatur tertio abscessu. Est autem & tenuium partium & discussorium.

Sandaracha urendi uim habet, quemadmodum etiam arsenicum.

Sandyx aut Syricum, tenuium partium & siccantem uim habet, non tamen calidam. Saprotis id est caries lignorum, maxime ulmi, purgat & tepet ulcera humida. Sapo exterioriam uim habet. Sarcocolla lachryma est arboris persicae, meatus obducens & citra mordacitatem siccans. Et ob id etiam uulnera glutinat. Saxiphages hoc est Saxifraga, & urinam ciet, & calculos attrahit. Saryrium aut Triphyllon id est trifolium, humidum est ac calidum temperamento, itemque flatuosum. Vnde ad uenerem sit mulat. Quidam etiam retrò distentos ipsum sanare dicunt, cum uino austero potum. Ceterum in libro de Theriaca dicit Galenus, trifolium quod hia cyntho simile est, quum ueris tempore praegnans, semen habet cinereo syluestri simile, tunc decoctum ipsius si ad phalangij aut uiperæ morbum assum datur, ipsum curare. Si uero sano loco adhibeatur, simile affectionem efficit inquit, his qui ab horum aliquo commossi sunt. Sauræ id est lacertæ herpar & caput, in proprio loco relata sunt. Tota uero resecta et imposita ictos a scorpione sanat. Selinon id est Apium calidum est in tantum, ut & urinas cieat, & menses. Flatus item discutit, & maxime semen ipsius. Serts subamarum olus est, admodum frigescentia humectans. Habet etiam quid adstrictionis. Seriphon calfacit secundo ordine, siccatur primo. Estque simile absinthio, sed minus ipso adstringit, & magis calfacit, ac lumbricos occidit. Modice quoque stomacho noxium est. Sefelis radix, & magis semen, abunde calfacit cum partium tenuitate. Vrinae item ciet, & ad comitialem morbum, & erecta ceruice spirantes commodat. Sepiae testa, ostrei testae similem uim habet, uerum tenuium partium est, & magis exterioria. Vnde si uista fuerit, pterygia oculorum attenuat cum sale fossili. Non uista uero,

*A*ficofes exterit affricta. Vicia item cutis detergit. Sefamoides magnum, quod & Anticyricum ueratum nominatur, eo quod semen eius fimiliter ueraturum purgathoc & reliqua facultate ueratro simile est, & extergen- do, & calefaciendo, & siccando, similem illi uim habet. Sefamoidis albi semen calefacit, & extergit, & rumpit. Sefamum non exiguam habet ui- scositatem ac pinguitudinem. Vnde meatus obducit, & mollit, & modera- re calfacit. Seps quam aliqui Lacertam Chak idicam uocant, in uino po- ta, morfos ab ipsa sanat. Sialon id est Saliua hominum ieiunorum maxi- me discussoriam ac extensoriam uim habet. Impetigines itaq; puerorum is- lim exterit, & furunculos concoquit, si cum tritico commanso imponatur, suggillata item tollit. Bestijs quoq; uenenatis hominem occidentibus maxi- me aduersatur. Sideritis heraclea quæ etiam Helxine dicitur, relata est. At Achillea sideritis illi quidem similis est, sed magis adstringit, Vnde flui- dis affectionibus conuenit. Sideros id est Ferrum in aqua lœpe extinctis, siccitatem abunde uim in ipsam deponit. Hæc itaq; pota splenicis competit. Si uero in uino ferrum extinctum fuerit, coeliacis & dysentericis, & chole- ra morbo uexatis, stomachoq; exolutis, uinum id potum auxiliatur.

Sicys id est cucumis qui editur, dum adhuc uiridis est frigefacit et hume- dat secundo ordine. Et caro quidem ipsius feruentes mitigat inflammatio- nes. Semen autem extergit & secat. Vrinæ itaq; mouet, & nitidum cor- pus efficit. At sicus primo ordine siccatur, & magis extergit tum semen; tum radix. Cæterum syluestris cucumeris fructus succus, elaterium dictus, rela- tus est. Sed qui ex radice ac folijs est succus, similis quidem elaterio est, sed debilior. Radix extergit, discutit, mollit. Siccantem uero uim succus habet.

Sillybon planta est spinosa similis chamæleonis albo, in cibi usum ueni- ens. At radices ipsius succus drachmæ unius pondere potus cum aqua mul- sa, uomitus ciet. Silurus sale asseruatus in cibo acceptus, arteriam humectat expurgat. In cataplasmate impositus a culeos educit. Silphæ id est blattæ, qui in pistrinis ubi panes fiunt, reperitur interanea cocta trita aurum dolo- res sanant. Silphium id est laserpitium calefacit strenue. Est & flatuosum ac ex præ concoquitur. Verum extra corpori adhibitum efficacius est, & ma- gis succus attractoriam uim habens. Habet etiam uim contrahendi ac de- primendi carnem. Sison calidus est, urinam ciet, & concoquit. Menses item ducit, & uiscera obturatione liberat. Sion calidum est, urinam ciet, & discutit, calculos item in renibus atterit, & menses ducit. Sisari radix cocta stomacho commodat, & urinam ciet, calidamq; est secundo ordine.

Silymbrium tenuium parium discussoriæq; ac calefacientis & siccantis est facultatis ac temperamenti, tertio ordine. At Semen quoq; tenuium par- tium est discussoriumq; ac forte. Quare etiam singultientibus datur, & his quos tormina uexant cum uino. Silymbrium quod & Cardaminen uocant, nasturtio simile est. Et aridum quidem calefacit ac siccatur ordine tertio. Vbi uero humidum est, secundo. Stammaonia calidæ est ac discussoriæ & bi- liosorum humorum extensoriæ facultatis, & magis succus eius, qui sanæ etiam panos discutit, & appositus fœtus perdit, & lepras educit. Ad diutur- nos item capitis dolores irrigationis uice usurpatur cum oxyrhodino. Ra- dix pota purgat tum ipsa, tum decoctum ipsius. Cum aceto autem & farina ordeacea cocta, eoxendicum morbo in cataplasmate imponitur.

Scandix syluestre olus est calefaciens ac siccans secundo ordine. Vrinæ etiam ciet, & uiscera ab obturatione liberat. Scinci partes circa renes, uelut medicamentum attrigens membrum uirile bibuntur. Verum contrari- um ipsis affectum inducere uidetur lactucæ semen cum aqua potum. Itemq; lentium decoctum cum melle. Scilla secandi uim habet. Calfacit autem & siccatur secundo ordine. Præstat autem ipsam assatam aut coctam sumere.

Scolopendra marina cocta in oleo, & illita, pilos abolet. Sed & cœta cœta pruritus excitat. Scolopendrium est asplenon. Scolymus id est Cardu-  
us

Veratrum An-  
ticyricumLacerta chala-  
cidica  
Saliua human-  
na

Sideritis

Cucumis

Elaterium

Blattæ

Laserpitium

Cardaminis

Asplenon

uus calefacit & siccet secundo ordine. Radix ipsius copiosam graueolenti-  
 urinam educit cum uino cocta. Sed & alarum & totius corporis graueolen-  
 tias sanat. Scordium uarium est, ut quod amarum sit, & acerbum, & acre.  
 Purgat itaq; simulq; calefacit uiscera. Vrinam quoq; ac menses mouet. Per-  
 frigerata item omnia calefacit, & uulnera glutinat ac repurgat, et ad cicatri-  
 cem perducit, si siccum inspergatur. Scordon id est Allium calefacit ac sic-  
 cat quarto abscellu. At ophis cordon syluestre allium, satius fortius est.

Allium

Ophis cordon

Scorodoprason & sapore, & facultate mixtum est ex allio ac pomro.

Scorpioides calefacit tertio, siccet secundo ordine. Scorpius terrestris

Recrementa

metallorum

crudus impositus, proprie plagæ auxilium affert. Similiter etiam si assatus

edatur. At marinus sel habet utile ad oculos suffusos. Scorcia id est recre-

mentum omnis metalli ab hūde siccet. Sed ferri amplius, quod coctum ac le-

uissime tritum cum aceto, aures pure fluidas mirifice sanat. Sed & his qui

Aconitum biberunt auxiliatur potum cum aceto mulso. At plumbi recre-

Taxus arbor

Myrrha

mentum plumbo respōdet, magis tamen adstringens. Smilax aut Taxus

arbor est uenenosa facultatis. Smyrna id est Myrrha secundi ordinis est

calefacientium ac siccantium. Vuulnera itaq; capitis, inspersa ipsis glut-

inat. Habet etiam quid amari. Vnde lumbricos & foetus necat. Extergit itē,

ideoq; in ocularias compositiones miscetur. Thoracis quoq; affectiones

expurgat, citra arteriæ exasperationem. At Boeotica myrrha uim habet ca-

lesacioriam, mollientem ac diffundentem. Smirnum alij hipposelinum,

Hipposelinum

Apium siliace-

stre

alij apium syluestre nominant, calefacit ac siccet tertio ordine, apio solum

fortius, peroselino uero imbecillius. Menses itaq; ducit, & urinas ciet.

Sonchus adstringit & frigefacit manifestè, & impositus, & in cibo acce-

ptus. Siccatus autem moderatè calefacit. Sparganium siccantem uim ha-

Gniffa

bet. Spartum id est Gniffa, qua uites ligant. Hulus semen & flos pota-

cum aqua mulla obolorum quinq; pondere, supernè purgant, uelut uera-

trum album, citra periculum. Semen uero etiam infernè purgat. At uingul-

ta coxendicibus profunt. Specula risū, quidam per.ph. Spheleariū scribūt,

Lapis specu-

laris

Diaphenes

id est lapis specularis, quo quidam pro speculis in fenestris utuntur, quare

etiam diaphanes à pelluciditate appellatur, gypsea substantiæ est. Verum

uim habet similem uitis testis siue ostreis. Spongia noua quæ adhuc ma-

ris odorem conseruat, uulneribus eum uino, aut aqua, aut posca imposita, i-

pse glutinat. Vsta uero acrem ac discussoriam uim acquirit. Sed & cum pi-

ce liquida aut bitumine si uratur, & ita ardēs apponatur, sanguinis eruptio

nes sistit. Spodium similem pompholygi uim habet. Staphylinus id est

Pastinaca

pastinaca, urinas mouet, & menses propellit, semen præsertim ipsius & ra-

diæ. Folia exteriora uim habentia, phagedænicis affectionibus conueni-

unt uiridia cum melle. At syluestris pastinaca ad omnia debiliior satius est.

Stachys similis marrubio frutex tertio ordine calefacit. Menses itaq; mouet,

& foetus necat, & secundas expellit. Steata id est Adipes omnes humedant

ac calefaciunt corpus humanum. Verum iuxta diuersum animalium tempe-

ramentum uis ipsorum euariat. Suillus itaq; humidissimus omnium est, pro-

pæ ad olei uim accedens. Vnde etiam mordacitatem obtūdit. Caprinus sic-

cior est & cito congelatur. Quare etiam his qui in recto intestino morsum

sentiunt infunditur. Anserinus calidior et magis tenuium partium est. Me-

dium horum gallorum ac gallinarum adeps obtinet. Leoninus omnium ca-

lidissimus & maxime tenuium partium est. Vnde etiam maxime discutit.

Bubulus medium temperamētum inter suillum & leoninum habet. Vris-

us alopecias sanat. Vulpinus aurium dolores. Quemadmodum uisperi-

nus pilos abolere, & oculorum suffusiones impedire ne fiant dicitur. In-

ter omnes autem semper calidior ac siccior masculorum adeps est, & ex his

eorum quæ testes habent animalium quam ex eorum, & grate uigendum

quam aliorum. Vetustate uero omnis adeps seipso calidior euadit.

Stibium

Stimmi id est Stibium ad hoc quod siccet, etiam adstrictionem habet. Vn-

de in oculatia collyria miscetur. Stœbes semen & folia siccant tertio ordine, adstringentemq; uim habet. Vnde uulnera magna glutinant, & ipsorum decoctum dysenterias, & sanguinis eruptiones, & aures pure manantes sanant, & oculorum ex plaga confusiones, in cataplasmate imposita sanant.

Stœchas ab obturatione liberat & attenuat, extergitq; ac roborat uisce omnia, & totum animalis habitum. Stratiotes aquarius frigidam uim habet. Terrestris autem etiam quid adstringens. Vnde ulcera glutinat. Quiddam etiam ad sanguinis eruptiones ipso utuntur, & ad fistulas.

Strychnon id est Solanum horrense & quod editur adstringit, & frigidum facit secundo ordine. Halieacabum uero horrensi simile, fructum habet qui urinam ciet, acino uix similem. At somniferi solani radicis cortex cum uino drachmæ pondere potus, somnum inducit. Huius quoque semen urinam ciet, eliq; tertij frigefacientium ordinis. Vnde si plures quàm duodecim cornubi ipsius bibantur, insaniam facit. Quartum genus inutile est ut intra corpus sumatur. Foris autem impositum ulcera serpendo depascentia curat, estq; secundi ordinis in frigefaciendo ac siccando. Stryteria id est Alumen omne acerbissimum est & crassarum parum. Præ alijs tamen magis tenuium partium est scissum. Post hoc rotundum & astragalotum. Crassarum uero abunde partium est liquidum, & id quod placitis, & quod plinthis nominatur. Styra calfacit, mollit, concoquit. Ad tussis itaq; & desillationes ac grauedines commodat. Menses item propellit potus & apertus. Syca id est ficus, aridæ quidem calidæ sunt secundo ordine. Verum pingues magis concoquunt duos tumores. Acriores autem extergunt & discutunt. At decoctum ipsarum ad mellis crassitudinem redactum, quod sanæ & ipsum aliqui Siræon uocant, similem mellis uim habet. Virides ficus siccis imbecilliores uim habent. Ambæ tamen aluum subducunt. Ficus autem caprificorum acris & discussoria sunt facultatis, quemadmodum etiam grossi ex ficis satius. Syce id est Ficus arbor temperamenti calidi ac tenuium partium est, adeo ut et liquor eius, & foliorum succus, non solum mordeat aut extergat uehementer, sed etiam exulcret, & ora uenarum aperiat, & formicariæ uerrucas exigit. Habet etiam uim purgatoriam. At syluestris ficus, quam caprificum uocant, ad omnia plus potest quam satia.

Sycomorî fructus non nutrit, et stomacho noxius est. At arboris succus uim habet mollientem, glutinantem uulnera, discutientem tumores. Bibitur autem & illinitur ad reptilium morsus, & lenibus induratis, & ad scorchos, machi dolores, & ad horrores. Symphytum petrarum ex contrarijs compositum est facultatibus. Habet enim & quid incisoriū, quo & pus in thora, & rhenes expurgat. Habet etiam quid quod contrahit, quod ad sanguinem spūetes, & rupta ac conuulsa, & rubicundum fluxum, & intestinum herniam conducit. Habet item quandam calidam humiditatem, per quam si uim eximit, & asperitates in arteria sanat. At alterum symphytum magnum, uiscozum quid & pruriginosum habet, scillæ simile. Utuntur autem ipso ad eadem, ad quæ etiam petreum. Sphondylii semina ac radix acrem ac incisoriā uim habent, ut anhelosos, & comitiales, & morbum regium sanent. At radix circumrassa & fistulis indura, callum ex ipsis eximit. Succus floris ipsius in aures instillatur, diuturnissimis ulceribus competens.

Schinos id est lentiscus per omnes partes suas secundo ordine perfectio siccatur. In calefaciendo ac frigefaciendo medius est, in tantum adstringens, ut hypocistidis succo in adstringendo propemodum accedat. Schœni anthos id est iunci rotundi odorati flos calefacit moderate, sed minus adstringit, & à tenuium partium natura non alienus est. Vnde & urinam ciet, & menses ducit, & ab obturatione liberat, in fomentis & potionibus ac cataplasmatibus assumptus. Et radix quidem ipsius magis adstringit. Flos autem calidior est. Schœnos lea id est Iuncus leuis duplex est. Sed eius qui oxy schœnos id est Iuncus acutus appellatur, semen somnificum est. Qui uero

Solanum

Halieacabum

Alumen omne

Placitis

Plinthis

Ficus

Siræon

Caprificus

Grossi

Ficus arbor

Caprificus

Lentiscus

Iunci rotundi  
odorati flosIuncus leuis  
duplex

Oxy. Iuncus

uero

uero holofchcenus, quasi totus iuncus dicitur, eius semen minus id potest. Capitulis idem dolorem inducit. Ambo autem fricta si cum uino bibantur, fluxiones uentris siccant, & muliebrem fluxum cohibent. Sori similem Misysium habet, sed multo magis crassarum partium est quam illud. Initium litetæ. 7.

- Salsamenta** Tarichotum id est salsamentorum caro acrem & siccantem uim habet. A prestere itaque uipera morbis datur, ut quam plurimam edant, & uinum bibant copiose, & reuomant. Conuenit etiam ad acriū esum. Vtiliter quoque in canis morfu imponitur, itemque in aliorum reptilium moribus.
- Xylocolla** Taurocolla quam alij xylocollam uocant, gluten est quod ex bubulis corijs fit, facultatemque habet admodum extensoriam. Vnde aceto diluta imperigines & lepras superficialiarias remouet, & ambusta inflammari prohibet aqua calida resoluta. Est etiam uulneribus comoda cum aceto multo mita.
- Gluten** Tellinæ afficcatæ uisæ cinerem urendi ut prædictum efficiunt, qui ce-  
dræ mixtus si instilletur, pilos palpebrarum radicitus euulsos, rursus nasci prohibet.
- Terebinthus** Terminthos id est Terebinthus calcacit secundo ordine, siccatur aut ubi uiridis est primo ordine, ubi siccus, secundo. Fructus aut siccus tertij ordinis siccantiū est. Ideoque & urinā ciet, & lienī prodest. Tettiges id est Cicadæ dantur a quibusdam crudæ siccatur tres, aut quinq; aut septē bibendæ colicis cum piperis granis eiusdem numeri. Alij tostas ipsas bibendas exhibent his qui uescicam affectam habent.
- Cicade** Teutlon id est beta nitrosa est. Vnde & extergit & discutit, & per nares purgat. Et hoc magis ea quæ alba est. Cocta uero uim habent arcendi inflammationes, leniterque discutiendi.
- Beta** Teutlon calc facit secundo ordine, siccatur tertio, incidendi ac tenuium partium uim habens. Vnde & lienes sanat.
- Cinix omnis** Tephra id est cinis non omnis idem exacte temperamentum habet. Sed iuxta uisæ materiæ differentiam euariat. Et acerborum quidem cinis, uelut quercuum & sicum, non modicam adstrictionem habet, ut etiam sanguinis eruptionem cohibeat, nullo alio præsentē. At acrium cinis, uelut fici & Tithymalli, acrior est, & magis extensorius. Telephium calefacit primo ordine, siccatur secundo. Est etiam extensorium. Vnde ad putredinosa ulcera conducit, et uirilgines tum leucas tum alphos dictas, sanat cum aceto.
- Fenū græcū** Telis id est fœnum græcum calidum secundo ordine est, siccatur primo. Quare feruidas inflammationes exacerbatur. Verum minus calidas & quæ indurata sunt discutiendo curat. Tithymalli omnes ex quarto calefacientium ordine sunt cum acrimonia & amaritudine forti. Verum radix quum aliquo modo debiliore sit, cotrosorum dentium dolores cum aceto sedat. Ceterum succi uehementiore uim habentes, in cauernam quidem dentium induntur. Verum reliquum corpus si contingant, ipsum adurunt. Quare etiam pilos auferunt uel modice illiti. Et uerrucas tum alias, tum formicarias, & alia huiusmodi auferunt. Affectiones item circa cutem extergunt, & maligna phagedenica ulcera sanant. Quum autem septem sint ipsorum species, fortissimi sunt characias, & myrsinites, & qui in petris nascitur arboris specie. Deinceps autem qui uerbasco similis est, & cyparissias. Deinde paralys, & postremum helioscopius. Titanos id est Calx uiua uehementer urit, ut crustam efficiat. Extincta uero, urit quidem statim, sed post dies non amplius. Contrahit tamen & consumit carnes. Si uero lota fuerit, mordacitatem amittit, sæpe ex aqua lota. At si fuerit ea aqua marina, abunde discussoria inde euadit. Tragacantha similem gummi uim habet. Tragion planta est in Creta, lentisco similis, calida ordine tertio. Vim habens discussoriam auræcloriamque ac tenuium partium. Aculeos itaque educit, & calculos auerit, & menses mouet, drachmæ pondere pota. At aliud Tragion amarulentius quam hoc, scolopendrio simile, ubique quidem nascitur, sed abunde adstringit. Quare etiam ad fluidas affectiones conuenit. Tragoriganus origano uim similem habet, assumptisque insuper aliquid adstrictionis.



Tribulus moderatè frigefacit, sed terreſtris in ſiccando fortis eſt. Aqua  
 ticus etiam leniter humectat. Ambo uero ad inflammationū generationes,  
 aliasq; influxiones conueniūt. At terreſtris fructus quū tenuium ſit partium  
 calculos in rhenibus atterit. Tragos frumētaceus zeę ſimilis eſt, ſed ma  
 gis egrè concoquitur, & alium mollit. Trigla piſcis, id eſt mullus, ſi aſ  
 liquē edatur, uilius hebetudinem inducit. Verum crudus diſſectus & impo  
 ſitus, draconis marini, & ſcorpj & araneſ morſum ſanat. Tripoliꝝ radix  
 uim calidam habet tertio abſceſſu. Eſt & acris Trifolium, triphylon, aliꝝ aſ  
 phalton, aliꝝ oxytriphylon, aliꝝ menyanthes nominant. Eſt autē uis ipſius  
 calida & ſicca tertio ordine. Triches, id eſt pilꝝ uſti, lanis uſtis ſimilē uim  
 habent. Trigonis, id eſt paſtinacę marinę aculeus, denti debili illiſus,  
 atterit ipſum & excidere facit. Tryx, id eſt ſex uini nō uſta quidem cō  
 poſita eſt, abūdē ſiccans ac diſcutiens. Adſtringendꝝ uero uis, iuxta uini ex  
 quo eſt ſpeciem, ipſi accedit. Utendum igitur ipſa in humidioribus & ſui,  
 diſaffectiōibus. Sed & panos diſcutit, & in turgentibus māmīs lac extin  
 guit. Aſt uſta, quam etiā ſphecien, hoc eſt ſecem huc feculam priuatim ap  
 pellant uſtoria euadit, ut etiam urentibus medicamentis ammiſceatur. Vn  
 gues itaq; ſcabros eiꝝcit cū reſina, & pilos ſlauos facit cū lentifcino oleo per  
 totam noctē illita. Lota uero exteſſoriꝝ oculorū cōpoſitionibus ammiſce  
 tur. Ceterum acetꝝ ſex per omnia fortior eſt uini ſece, & magis adſtringit.  
 Troglodytes paſſer eſt minimus omnium auicularum, regulo excepto.  
 Verſaturq; maxime circa ſepes. Hic & aſſatus, & crudus ſale aſſiccatus, in  
 cibo ſumptus, calculos in rhenibus atterit. Sed & uſti ipſius cinis potus, idē  
 facit. Tyros, id eſt caſeus recens compactus & mollis, repulſoriam uim ha  
 bet leniter perfrigerās, ut & uulnera glutinet impoſitus. At qui oxygalacti  
 nus dicitur, ultra repulſoriam etiam diſcuſſoriam modicā acquirit, & plus  
 glutinat uulnera. Vetus autem caſeus, & magis qui pinguis eſt, diſcutit, ut  
 etiam ad tophos arthriticorum commodet, maxime cum ſuillę carnis deco  
 ctio, quę ſalla ſit ac pinguis.

## Initium literę. v.

Hyacinthi radix bulbi ſpeciem habēs, primi ordinis eſt in ſiccando, ſe  
 cūdi in frigefaciendo. Proinde pueros diutius impuberes conſeruare credi  
 tur, ſic cum uino in cataplaſmate imponatur. At ſemen leniter extergit & ad  
 ſtringit. Itaq; regio morbo laborantibus datur cum uino, magis ſiccans, mi  
 nus frigefaciens. Hyalos, id eſt uitrum tritum potum cū uino tenui &  
 albo, calculos in ueſica atterere dicitur. Hydnon, id eſt tuber terrę, ſub  
 ſtantiam magis terreā habet, cum modica quadam tenuium partium fa  
 cultate. Hydrargyros, id eſt argentum uiuum ad medicum uſum nō ita  
 ualde aſſumitur, quū uenenum exiſtat. Verum quidam uſum ipſum ac in  
 cinerem redactū, aliꝝq; ſpecieb. permixtū, colicis & uoluuuloſis bibendum  
 dederūt. Hydropiper calida eſt herbula, ſed nō uelut piper. Virides autē  
 unā cū ſemine in cataplaſmate impoſita, ſuggillatā, & induratos tumores  
 diſcutit. Hydor, id eſt aqua, optima & nullam aliā ſubſtantiam ammixtā  
 habens, frigefacit & humectat iuxta propriam ſubſtantiam. Verum ubi ac  
 quiſitiōi caliditatem ſuſcepit, quandiu ipſam conſeruauit, calefacit. Vbi ue  
 ro frigida ſit, frigefacit. At uero quę aliquā ammixtionem habet, uelut ni  
 troſa, aut bituminoſa, ea ammixtę ſubſtantię uim acquirit. Pluuialis autem  
 & adſtriſtionis quid habet, propter quam in oculariꝝ cōpoſitiones miſce  
 tur. Qualem uero optimam aquam eſſe oporteat, in primo libro dictum eſt.  
 Hyoſcyamus qui nigrum ſemen habet, & qui ſlauū, uenenosus ſunt. Ap  
 tiſſimus autem ad medicinas eſt is cuius & ſemen & ſoſalbulum colorem ha  
 bet, ex tertioq; frigefacientium ordine eſt. Hypericū duplex eſt, alterū  
 Androſemon & quod aſcyrrhon appellatur, dictum eſt. Alterum calefacit  
 ac ſiccit, tenuiſq; partium ſubſtantiam habet. Vnde urinas & menſes to  
 tus ipſius fructus mouet. Si uero cum ſoliꝝ uiridis imponatur, uulnera ad ci  
 caricem

Mullus piſcis

Trifolium

pili

Paſtinaca ma  
rina

Fex uini

Spheccla

Paſſer troglo  
dites

Caſeus

Vitrum

Tuber terrę

Argentum ui  
uum

Aqua omnis

Androſemon  
Aſcyrrhon

catricem perducit. Arida uero folia ulceribus humidis ac putredine ossis in-  
spersa, ipsa sanant. Datur etiam coxendicum morbo laborantibus bibendum.

Hypocoon frigefacit tertio ordine, prope ad papauer accedens.

Hypoglossum frutex est. Huius radix & succus molliem uim habet.

Hippophaes  
Hypocistis succus est eorū qui uelut cytini ad radices cisti hī, itēq; cistha-  
ri appellati subnascitur. Est autē efficax medicamentū ad omnes fluidas affe-  
ctiones, siccando ac corroborando partes. Hypophæston species est spi-  
nae fulloniae, quemadmodum etiam Hippophaes. Huius ex capite, & folijs  
ac radicibus succus siccatus, trium obolorum pondere cum aqua mulla, a-  
quam & pituitam euacuat. Maxime autem conducit ad rectae ceruicis spira-  
tiones, comitiales, & ad affectiones circa neruos. Hyssopum calfacit ac  
siccit tertio ordine. Est etiam tenuium partium.

Initium literae. ϕ.

Lentes Phaci, id est lentes siccant ordine secundo. uerum caliditatis ac frigidi-  
tatis medium obtinent. Habent etiam quid adstrictionis. Ipsum itaq; lentis  
corpus siccet, & uentrem sistit. Decoctum uero propellit. Quapropter pi-  
or aqua diffunditur, ubi sistendi uentris gratia lentes sumuntur. Ceterum  
lens palustris humectat, & frigefacit ordine secundo.

Lens palustris  
Suber Phalaidis suc-  
cus, & folia, & semen pota, uelica doloribus opitulantur, nimirum ut quae  
tenuium partium quid habeat, insuperq; calidum. Phalangitis nomen  
habet ex eo quod morsus phalangio opitulatur. Est autem tenuium partiū.  
Vnde & his qui torminibus uexantur, auxiliari uidetur. Phellos, id est So-  
ber, & maxime id quod est ē uinarijs uasis, usum siccantissimum cinerem  
efficit, qui in dysentericas maxime compositiones miscetur.

Verbascum  
Thryallis Philyreae arboris folia, similiter ut syluestris oleae folia adstringunt. Co-  
modant ulceribus in ore, si manducantur, & si decoctum ipsorum colluatur.

Thryallis Hoc autem decoctum si bibatur, urinam & menses ciēt. Phlomos, id est  
uerbascum plura genera habet, inter quae est etiam thryallis. Omnium for-  
lia siccantem & moderate extersoriam uim habent, & maxime eius quod  
a uri colorem refert. Quia uero acerba sunt, fluidis affectionibus conueni-  
unt. Quidam etiam ipsa ad dentes colluunt.

Rhus  
Palma arbor Phoenix, quam alij rhinuo  
cant, herba est lolio similis. Vim habet adstringendi. Pota itaq; in uino au-  
stero omnes fluidas affectiones sistit. Phoenix, id est palma arbor, fructū  
quidem habet iam maturum, moderate calidum & corroborantem, & sior-  
macho gratum, siue intus sumatur, siue foris imponatur. Verum quod reli-  
quum est in ipsa abunde adstringit unde stomachicis & hepaticis compo-  
sitionibus ammiscetur. Omnis autem maxime adstringit id quod enascen-  
tis fructus uelut inuolucrum quoddam est. Phormion tenuium partiū  
um extersoriamq; ac attractoriam uim habet. Itaq; albugines attenuat ser-  
men eius cum melle, & aculeos educit. Phytardo similem radicem habet,  
sed ad plurima debiliorem. urinas tamen magis quam ipsa propellit. Simili-  
ter ut celtica nardus. Phycos, id est fucus frigefacit ac siccit secundo  
abscessu, habens etiam aliquid moderate adstringens. Phyllitis quam  
acerbam qualitatem habeat, non absq; ratione alui profluuiā pota sistit.

Initium literae. χ.

Galbanum Chalbane, id est galbanum calefacit propemodum tertio ordine, siccit  
prope secundum, ut quae molliem ac discussoriam uim habeat.

Atramentum  
sutorium Chalchitis adstringentis & acris, & urentis ac crustam inducentis facul-  
tatis est. Tenuitate uero partium medium inter misy & fori obtinet. usque ue-  
ro magis tenuium partium euadit. Chalcanthos, id est atramentum su-  
torium, aqua est congelata in metallis in Cypro, quae fortissimam adstric-  
tionem cum caliditate habet nō ingenerosa, & praeter omnibus humiditas carnes  
asseruare ac siccare potest. uerum longiori temporis progressu in chalciti-  
dem transit. Chalcos, id est Aes, usum quidem habet quid acre, & ad-  
strictionis particeps est. Optimum igitur est ad cicatrices ulceribus indu-  
cendas

acendas in siccoribus corporibus. Si uero lotum sit, teneris corporibus magis commodat. Chalci anthos, id est Aeris flos tenuium magis partium uim habet quam æs ustū, & squama ipsius. Si igitur collyrijs ammiscetur, asperitates & sycones palpebrarū deterit. Chamædrys calefacit ac liccat tertio ordine. Lienes itaq; consumit, & urinas ac menses mouet, & uiscerum obturationes expurgat. Chamæcilli, id est hederæ terrestris flos, quum abunde amarus sit, hepatis obstructiones aperit. Datur etiam ad coxendicum dolores. Chamæleuce calefacit tertio ordine, liccat primo.

Aeris flos

Hedera terrestris

Chamæleonis nigri radix calefacit ac liccat propè tertium ordinem. Extergit autem uitia cutis, & discutit ac mollit duros tumores, & phagedænica ulcera in cataplasmate imposita sanat. At intra corpus si accipiat, uenenosa est. Cæterum albi radix similis est nigri radici, sed amarior est. Hæc cum uino austero acetabuli mensura pota lumbricos latos necat: Facit itē ad hydropicos. Chamæmelum siue anthemis calefacit ac liccat primo ordine. Est & tenuium partium, & discutit, & laxat, & rarefaciendū uim habet.

Anthemis

Chamæpitys secundo ordine calefacit, tertio liccat. Quare uiscera & maxime hepar purgat ac extergit. Ducit etiam urinas & menses, & magna uulnera glutinat, & putredinosa sanat, & duricijs discutit. Decoctū ipsius etiam ad coxendicum morbum facit. Chamædrops ab alijs item chamædrys appellatur, ab alijs etiam Teucrion, similem autē chamædryi uim habet.

Teucrion

Chamælyce exierforiam & acrem uim habet. Quare & formicarias, & alias uerrucas auferunt, tum uirgulta ipsius, tū succus. Exerit item cum melle crassas in oculis cicatrices, & uisus hebetudinem & suffusionem incipientes sanant. Chamelæa exierforia est facultatis. Quare sordida ulcera & crustas purgat cum melle. Chelidonium magnum calefacit tertio ordine. Est & fortiter extersorium. Succus ipsius ad uisum acutendum utilis est. Radix morbo regio laborantes ab obturatione liberat, cum uino & aniso pota. Comiansa dentium dolores eadem sanat. At minus Chelidonium quum quarti ordinis calefacientium sit, acris est, ut curem exulceret in cataplasmate impositum: scabros item ungues eiecit, uerū succus ipsius per nares purgat.

Chelidones, id est hirundines si ustæ sint, cinis ipsarum cum melle illitus, anginosas inflammationes sanat. Facit etiam ad uisus claritatem. Chole, id est fel siue bilis; calidissimus est omnium aliorum animalis humorum. Differt autem colore quidem, eo quod flaua calidior est quam pallida, & æruginosa quam flaua. Verū pro differentia animalium quæ ipsam habent, eo quod suilla omnium debilissima est, ut etiam ulceribus in auribus citra mordacitatē opuletur. Hæc acrior est ouilla, & hæc caprina. Huic autē similis est ursina & bubula. Taurina uero fortior est, & hæc hyænarum. quæ tamen callionymi piscis, & scorpij bilis superat, quæ oculorū suffusionibus, & hebetudinibus ac albuginibus conuenit, itemq; marinæ testudinis. At fel capræ syluestris etiam nyctalopibus prodesse dicitur. Porro uolatilium fel omne acrius est, & magis liccat q̃ quadrupedum. Et ex illis ipsis gallorum & perdicum fel præstantius est. Sed accipitris & aquilæ fel acrius quodam modo est & corrodens, coloreq; æruginosum. Quandoq; etiā nigrū. Chondride feridis species est, & subamarum quid habet. Quare etiam magis quā illa liccat.

Hirundines

Fel animalium

Chondros tritico similis est: Sed magis illouscosus. Chryso colla quædam est quæ in metallis reperitur, quædā præparatur, ita ut in æris rubri pila, pistillo eiusdem æris, urina pueri impubis teratur, in ardoribus sub cane. Hæc itaq; extergit, discussoriam ac siccantem uim habens, magis quā ea quæ in metallis reperitur, adeo ut etiam carnem citra mordacitatem consumat. Vlceribus itaq; malignis conuenit. Sed & si illam uisuris minus mordacem efficies. Chrysocome quæ & Chrysis acrem simulq; adstringentem uim habet in radice. Quapropter neq; multi usus est. Datur tamen in peripneumonijs & hepaticis affectionibus cocta in aqua mulsæ. Mouet etiam menses.

Chrysis

## Initium literæ. †.

*Cerussa* Pseudobunion specie simile est bunion. Calefacit autem & discutit, ac ex-  
tergit. Tormina itaq; & urinæ stillicidia, & laterum dolores soluit. Discutit  
item strumas, cū sale & uino in cataplasmate imposita. Pseudodictamn-  
num debilis dictamni uim habet. Psymithium, id est cerussa frigefacit,  
& meatus obducit. Psyllij semen secundi ordinis frigefacientium est.  
Verum siccando & humectando medium obtinet. Ploricum sit, spumę  
argenti si duplum chalcitidis miscetur, & hæc aceto terantur, & in nouam  
ollam data, fumo ad quadraginta dies obruantur. Ita enim & magis siccatur, et  
magis tenuium partium, minusq; mordax chalcitide euadit.

## Initium literæ. u.

*Ouum* Oui candidum & tenue ex his est quæ omni penitus mordacitate ca-  
rent, moderate frigefaciens. Vtendum itaq; ipso in oculis, & in ulceribus in-  
pudendis, & omnibus malignis. Miscetur item sanguinem sistentibus mea-  
tus obducentibus medicamentis. Sed & luteum similem uim habens, medi-  
camentis inflammationem arcentibus miscetur. Si uero affletur, magis qui-  
dem siccatur, sed minus mitigatur. At uero aceto coctum totum ouum, si edatur,  
fluxiones uentris rescat. Si uero etiā addatur aliquid ex acerbis, uelut est  
galla, aut rhus, aut balaustium, atq; ita in sartagine frigatur, multo efficaci-  
us euadit. Sed et ambustis statim auxiliatur, totum ouum crudum imposi-  
tum. At si forbile exhibeatur, thoracis affectiones concoquit ac mitigat, &  
arteriæ asperitates leuigat. Praferendum porro est recens uetusto, & galli-  
narum ouum reliquorum animalium ouis. Ocimum ex secundo ordine  
est eorum quæ calefaciunt. Habet autem humiditatem superuacua. Vnde  
neque utile est ut intra corpus suscipiatur. Extrinsecus autem adhibi-  
*Philetæriou* tum, discutit & concoquit. Ocimoides quam aliqui Philetæriou nomi-  
nant, radicem quidem inuisilem habet. Verum semen tenuium partium est,  
& citra mordacitatem siccatur.

## De medicamentis simplicibus purgantibus. Cap. IIII.

## Quæ bilem flauam ducunt.

*Aloe mane  
danda*

**A**Loes drachma una cum aqua mulsā mane detur. Qui enim uesperidā,  
aut post cibum, lædunt. Corrupt enim alimentum, uacuat autem fla-  
uam bilem. Si uero minus detur, nimirum trium obolorum pondere, sterco-  
ra solum abunde euacuat. Quā uero omnia purgantia stomacho noxia sint,  
sola aloë stomacho grata est. Qui autem amaritudinem eius non sustinent,  
his in catapotia efformata exhibeantur. Siquidē quoddam purgantia medica-  
*Purgantia me-  
dicamentis non  
qualitate* ta non simplici alicuo temperamento euacuēt, ueluti caliditate: oportebat  
enim omnia calida euacuare, uelut est piper quoq; sed totius substantiæ pro-  
prietate, quomodo Magnetes ferrum trahit demonstratum est. Ceterū ex  
purgantibus ea quæ solum molliunt, primo libro relata sunt. At efficaciori-  
*Purgantium  
scopus* bus ex ipsis utimur, aut ut materiam transferamus: aut ut affectionem indu-  
ratam remoueamus, ac euacuemus: aut ut corpus transmutemus, & tempe-  
rumentum ipsius euertamus: aut ut infestantem humorem ex ipso educa-  
mus. Sunt etiam quidam mixti ex relatis modis, interq; se cōnexi. Vtendum  
est purgatorijs, in his qui uires robustas habent, & uoluntatem constantē,  
& qui primas ætates excefferunt, nondum autem ad extremas deuenērūt,  
& qui stomachum robustum habent, & multam inuisilem materiam in cor-  
pore collegerūt, nec ualde multum sanguinem habent. Tempus porro pur-  
gationum, si res non urgeat, maxime uernum, & autumnale est.

*Purgationum  
tempus*

Et bilem quidem educentibus urēdum est omni tempore, excepta hye-  
me. In ætate autem uigoris, & declinante. In habitibus siccis, & musculosis,  
& nigri coloris aut rubicundi. Et in uiris potius quā in fœminis. Et in his  
qui assidue cibos corrumpunt, & uentrem subadstrictum habent, & bile æ-  
mara abundant, iracundiq; sunt, & paucas urinas excernunt. In his item qui  
siccis alimentis utuntur ac calidis. Et in affectionibus morbi regij, hepatis  
cis,

cis, pleuriticis, phrenitide, angina, infania, cephalæa, lippitudine, igne sacro, lepra, febris, & in quibus humor biliosus abundat.

Datur porro Aloe, capite grauat, lippientibus, siticulosis, & quibus in somnis (maginationes obuerfantur citra febrem. His etiam qui horrores discursum percipiunt, & qui status acres excernunt, & intestina morderi sentiunt, & circa stomachum feruorem, aut fastidium euerforium percipiunt & quibus obcrementorum copiam infusum per clysterem exhiberi non potest. Nam abunde euacuat, totum quidem corpus non euacuans, nisi ualde multa detur, sed insidentem intestinis uentrig ac stomacho bilem educens. At ueratrum couenit in acutis morbis, & diuturnis, qui bilem ducente medicamento opus habent, uelut sunt infani, altera capitis parte uexati, oculos fluidos habentes, circa thoracem affecti. Maxime autem idoneum est uisceribus, utero ac uescicæ, si bilem ducente medicamento hæc indigent. Commodum est etiam in alpera arteria diuturne affecta, ad morbum regium, ad pustulas, impetigines, herpetas, ignes sacros, lepras. Nigrum ueratrum bilem ducit maxime flauam ex toto corpore, citra molestiam. Unde etiam non grauius febricitantibus datur, & magis febre carentibus drachma una radicum in aqua mulla tritarum aut aqua, ita ut prius ieiunant. Aut exhibetur cum melle in catapotia efformatum. Quidam amingiscunt ipsi pulegium, aut thymbra, aut aliquod ex cito transeuntibus stomacho gratis. Scammonia similiter ut ueratrum purgat, & magis flauam bilem. Verum magis quam omnia purgatoria, stomacho noxia est. Detur itaque non febricitantibus, & stomacho bene affectis pondere obolum quatuor, cum sale aut pipere, aut zingibere, aut quodam oxyporo cito transeunt, stomacho grato: aut cum melle. Fiunt & catapotia cum gummi.

Colocynthis medulla bilem potissimum uacuat, & mucosa, non de sanguine quemadmodum ueratrum & scammonia, sed de neruis & partibus nervosis, drachmæ pondere, in aquæ mullæ cyathis duobus, in qua ruta sit incocta. Teratur autem diu, nam aspretudines ipsius internis partibus adherentes, ulcerationes & neruorum per consensum affectiones inducunt. Danda est his qui caput affectum habent, aut quibus membrana cerebri, aut ea quæ caluariam ambit affecta est: uelut sunt uertiginosi, alteram capitis partem dolentes, à cephalæa uexati, comitiales, siderati, canino modo conuulsi, diutina oculorum fluxione laborantes, recta ceruice spirantes, anhelosi, diuturna tussi uexati, Insuperque arthritici, & qui circa renes aut uescicam affectionem habent. Elaterium similiter ut scammonia euacuat. Eligendum id quod prasini coloris est, & leue, & non uetustius anno. Datur trium obolorum pondere tritum cum lactis hemina una.

Tithymallus ducit bilem similiter ut elaterium & scammonia. Dantur succi guttæ quatuor aut quinque, cum polenta subactæ, ita ut cito deuorentur. Nam in ore detentæ diutius, linguam & circumstantes partes exulcerant. Lathyrides purgant bilem, sicut ueratrum & scammonia. Dantur septem aut octo, & ad quindecim usque, ita ut robusti, & ampliorem purgatione opus habentes, ipsas mandere iubeantur. Debiliores autem & stomacho male affecti, totas ipsas deuorent. Peplij uirgulta quæ semper sicca sunt, octo obolorum pondere dantur in aqua mulla. Ducunt bilem similiter ut ueratrum. Flatus item erumpere faciunt.

Agaricum similem colocynthis uim habet, tarde quidem operans, non autem ualde stomacho noxium. Datur tritum duarum drachmarum pondere, cum aqua mulla. Sit autem albißimum, & maxime friabile, & non ita lignosum, neque corrosum. Iris Illyrica similiter purgat, octo obolorum pondere data, in aqua mulla. Sit autem non uetusta, nec teredines habeat.

Centaurium paruum bilem & mucos purgans, priuatim coxendicum morbo laborantibus conuenit. Bibitur ipsius decoctum, sic ut centaurij sesquidrachma, in aquæ hemina coquatur, donec ad dimidiam deueniat.

*Tragorigani* Tragorigani flos cum semine datur duarum drachmarum pondere, in aqua mulsâ, his quibus etiam ueratrû nigrum. Est autem stomacho magis gratum quàm ueratrû, sed minus purgat. *Chamelææ* Chamelææ drachmæ quatuor, in aquæ mulsæ cyathis duobus coctæ, ut ad quartans partem deueniant, similiter ut ueratrû purgant. Aliqui chamelæam cum duplo ablinthij in catapotia efformant ac exhibent. *Aristolochiæ* Aristolochiæ clematidis feminis drachma una, in aqua mulsâ data, purgat ut colocynthis. *Polypodij* Polypodij radix sicca trita aquæ mulsæ inspersa, aut cum ipsa trita, idē q̃ colocynthis facit.

Quæ bilem atram euacuant.

*Atram bilem* Atram bilem educētibz utendum est præcipuē in melancholicis, his qui facile exacerbantur, iracundis, homines auerlantibus, aut in secessu degentibus, et in his qui ubi à morbo se recolligunt, purgatio opus habent. In autumno feruente. In habitibus siccis, ac parum musculosis.

*Epithymum* Epithymum optimum est ex his quæ atram bilem euacuant. Dantur ex ipso drachmæ quinque tritæ cum feri lactis hemina. Epithymbion quod super Thymbra nascitur, similiter ut epithimum euacuat, sed debilius est. *Pulegium* Pulegium atram bilem ducit, acetabuli mensura in aqua mulsâ potum. *Tragorigani* Tragorigani heracleotici eadem mensura similiter ut pulegium uacuat. Sed ambo sicca. *Alypi* Alypi semen atram bilē deorsum purgare dicitur, cum est, si pari copia uelut epithymum sumatur cum sale & aceto. Verum intestina uelut dioscorides ait, leniter exulcerat. Est autē ut arbitror, ea quæ nunc alypias appellatur. Datur in aqua mulsâ. *Parthenium* Parthenium similiter siccum potum eadem ducit. *Alysson* Alysson cum sale potum, similiter ut hæc purgat.

Quæ pituitam euacuant

*His quæ pituitam* His quæ pituitam educunt utendum est in frigidioribus habitibus, & his qui consenuerunt, et hyeme. Item in resolutis, & sideratis, & qui laxis moribus intumuerūt. In his quoq̃ qui multam pituitam in uentre, aut thorace, aut stomacho habent, & in muliebri fluxu. Conueniunt etiam multæ, mungentibus, & crassâ exscreantibus, cibumq̃ fastidientibus, & coxendi cum morbo laborantibus, ubi articulus subnucosus aut pituitosus fuerit. Maxime autē conueniunt hydropicis, ex ea specie quæ proprie intercus dicitur, laborantibus. *Syracis* Syracis albi drachma una, cum resina terebinthina æqualis ponderis pota, pituitam euacuat. *Olcæ* Olcæ radicis cortex drachmæ pondere cum uino aut aqua. Item pyrethri oboli nouem cum aqua. *Lychnidis* Lychnidis feminis drachmæ duæ. *Cyclamini* Cyclamini radicis drach. una, cum aqua mulsâ. *Scordij* Scordij drachmæ duæ cum melle. *Chamepitys* Chamepitys trita & in catapotijs data. *Squamæ* Squamæ cypriæ drachma dimidia cum pari resina in catapotijs. Hæc ualidius pituitam purgat. *Foliorum lauri* Foliorum lauri uiridinum selsquidrachma. *Cucumeris* Cucumeris syluestris radicis corticis oboli duo. *Ricini* Ricini grana quadraginta, qui crotones appellantur, decorticata eduntur, & similiter faciunt. *Apij* Apij dimidium id quod ad radicem est, & ab aliquibus chamæraphanus uocatur si edatur.

*Bdellij* Bdellij drachmæ duæ cum aqua mulsâ. Priuatim uero gummi oculis fluidis commodum est.

Quæ aquam euacuant.

*Aquam educētibz* Aquam educētibz utendum est in hydrocypis ex ascite hydropelaborantibus, & in mulieribus à fluxu albo infestatis, & his qui fluida ulcera habent. *Squamæ* Squamæ cypriæ drachma una cum aqua mulsâ pota, aquam ducit. Verum aceti parū insuper sorbere oportet, ut ne reuomatur. *Granum cnidi* Granum cnidii decorticatum tritum cum melle coctio deuoratum, ut ne gulam siue transglutitionem contingat, aquam ducit. Danda sunt grana uiginti, aut uiginti quinque, aut triginta, fortioribus quadraginta. *Euphorbij* Euphorbij drachma una cum melle coctio deuorata, pituitam ducit. Magis tamen aquam. *Lonchitidis* Lonchitidis feminis oboli octio, cum aqua mulsâ aquam ducunt. *Cnicorum* Cnicorum similiter aquam purgat, cum polenta uoratum. *Cnici* Cnici feminis drachmæ quinque contritæ cum pissana concoquuntur addito pauco sale, & forbenatur. *Ammoni* Ammoni

moniaci Thymiamatis drachmæ duæ in aqua mulsa potæ, aquam ducunt. Quidam splenicis ipsum cum posca exhibent.

De medicamentis compositis purgantibus.

Cap. V.

**C**atapotia ex aloë. Colocynthis medullæ partem unam, succi ablinthis partem unam, aloes partem unā, scammoniae partes duas. Cum aqua in catapotia efformato ciceris magnitudine. Dantur ex his grana undecim.

Purgantia  
composita

Acetum mulsum Iuliani. Rutæ quadrantem, origani quadrantem, comæ thymi tridentem, anethi sesquiunciam, iridis unciam unā, radices Mandragoræ sesquiunciam, agarici sextantem, tedarum pinguium uncia. xij. grani Cnidij tridentem, lathyridum quadrantem, alysiadis quadrantem, populodij sextantem, folij unciam unam, costi unciam unam, spicæ nardi unciam unam, Rhei pontici sesquiunciam, scillæ quadrantem, sambuci uirgultorum quadrantem, canopi, qui est sambuci cortex, quadrantem, asari unciam unam, pulegij quadrantem, epithymi sextantem, ueratri sextantem, acori sextantem, siquinciam unā, amomi unciam unā, hyperici unciam unā, cymini unciam unam, anisi sextantem, aceti sextarios decem, mellis sextarios quinq. Herbas ad triduum in aceto macerato. Deinde facta coctura, donec plus quàm dimidiū infumatur, mel adijcito: & facta colatura, lathyridas addito, costi item & granum Cnidium, & spicā nardi tritā. Aut si uoles, postquàm acetū mulsum perfectè fuerit coctum. Dosis perfecta est uncia una, aut pro uiribus. Facit ad podagricas affectiones, & ad comitiales, & in quibus euacua resimulq; ab obturatis amouere opus crassos humores.

Acetum mulsum  
Iuliani

Canopum

Purgatorium aquam ducens ex Caryophyllo. Aloes, epithymi, caryophylli, grani cnidij, petroselinij, rhei pontici, singulorum semunciam, euphorbij scrupulos quatuor. Mellis quod satis est. Datur cochlearij mēsurā.

Purgatoria  
aqua

Purgatorium ex Rhodomelite, Alexandrij. Rosarum succi sextar. duos, mellis sextar. unum, scammoniae tridentem. Dosis perfecta cochlearia quinq. Minor cochle. duo. Media cochle. tria. Aliter. Mellis librā unā, Rosarū succi lib. unā, piperis drach. duas, scammoniae drach. octo, mastiches drach. quatuor, zingiberis drach. duas. Aliter quo ego utor. Spicæ nardi, asari, epithymi, singulorū semunciam in aquæ hemina per triduum macerato, & moderata facta coctura, rosarum succi sextarium dimidiū ad aquam adijcito, & mellis sextar. dimidiū, & facta ad compagem usq; coctione, scammoniae sesquiunciam addito.

Purgatorium ex malis cydonijs. Malorum cydoniorum assatorum tridentem, piperis semunciam, scammoniae drach. j. Mellis quincuncem, ex tritis præbe cochlearium unum, aut pro uiribus.

Purgatorium ex malo citrifo, stomacho gratū. Mali citrij corticis et carnis libram unam, in aquæ sextario. j. s. ad tertias coquito, & mellis sextar. s. adiecto, ad mellis spissitudinem coquito, & piperis longi unc. j. scammonie infermento tostæ unc. j. trito ac inspergito.

Buccellatus purgatorius. Scammoniae tostæ unc. j. piperis & seminis apij, singulorum scrup. j. feniculi, anisi singulorum unc. i. mellis libr. j. De moderate tostis dato unc. j. in condito.

Buccellatus  
purgatorius

Oliæ purgatoriae. Scammonie unc. j. piperis unc. j. epithymi, cymini torrefacti, petroselinij, foliorum rutæ, mentæ uiridis, singulorū drach. iij. silphij drach. j. palmularū quincuncem, mellis quincuncem, aceti heminas. ij. o. liuarū colymbadum muræ innatantium fissarum uidelicet, sextarium. j. Quidam etiam gari modicum addunt. Dantur ex his. v. aut. vij. aut. viij.

Oliæ purgatorie

Pastillus purgatorius. Scammoniae drach. iij. euphorbij drach. iij. folij drach. ij. piperis drach. ij. Mellis libram. j. Datur uncia. j.

Posca purgatoria, & stomacho grata. Cumini, feniculi singulorum unc. j. pulegij, apij, anisi, singulorum semunciam, epithymi, scammoniae, singulorum unc. j. salis sextantem. Dosis perfecta scrupuli. ij. in posca. Quidam euphorbij scrup. iij. adijciunt.

Posca purgatoria

*Vinū purgato- rium* Vinum purgatorium in hydropicis. Scillæ quadrantem, apij seminis sexuncem, piperis drach. j. capparis radices drach. iij. grani cruidij decorti, cati drach. j. folij malabathri globulos. ij. Vini heminas. xij. mellis sextar. iij. Scillam contusam in vino macerato. Reliqua trita ammisceto.

*Sal purgatori- us* Sal purgatorius. Salis communis torrefacti drach. vj. apij seminis, zingiberis, panis sicci, singulorum scrup. vj. anisi, piperis, singulo semunciam. scammoniae, epithymi, singulo. unc. j. Datur cochleā. j.

Purgatoria ex Hermodactylo podagrica. Hermodactyli quadrantem, anisi, cumini Aethiopici, ameos, thymi corymborum, piperis albi, zingiberis, singulo. scrup. iij. epithymi semunciam. Dosis. scrup. iij. Aliqui. vj. dā. Datur mane cum condito, aut aqua multa, aut mero feruifacito.

*Diaphanus* Aliter eadem purgatoria. Hermodactyli unc. j. cumini Aethiopici, anisi, agarici, zingiberis, singul. scrup. vj. mastiches scrup. ij. spicæ nardi scrup. ij. moschi siliquam. j. cnici scrup. ij. Dantur scrup. iij. cum hydromelo. Scammoniam reprobamus, eo quod stomacho noxia sit. Si uero ampliore euacuatione, opus sit, misce ad dosim scammoniae siliquas. iij. datur loto.

Catapotia ex lapide Armenico, quæ in morbo articulari maxime dantur. Aloes trientem, scammoniae sexuncem, agarici unc. j. epithymi unc. j. lapidis armenici scrup. xij. cassiæ unc. j. spicæ nardi unc. j. scillæ assate sexuncem, croci scrup. xij. Excipe rhodomelite. Dantur. scrup. ij.

Purgatoria ex cornopodio, faciens ad quæ etiam ea quæ ex hermodactylis, stomacho commoda. Zingiberis scrup. ij. piperis scrup. j. agarici scrup. x. cnici internæ partis scrup. iij. cornopodij radices scrup. vj. Dantur scrup. iij. His uero qui aluum ægre solubilem habent siliquæ. xxij. quæ faciunt omnino. vij. aut propemodum. viij. obolos. Et post euacuatio- nem ubi lauisi, ex ouis & panenutrito.

Purgatorium ex cyrenaico succo, ad febres quartanas. Succicyre- naici, piperis, zingiberis, ruiæ foliorum, singul. drach. j. datur nucis ponticæ magnitudine.

*Pulicula pur- gatoria*

Pulicula purgatoria, faciens ad tumefactos, elephantiacos præcipue, et in quibus crassum ac uiscosum humorem quis exsurgere uelit. Colocyn- thidas. ij. resectas semine euacuato, & dimissa medulla, oleo dulci ipsas ex- plecto, impositisq; resectis ab ipsis operculis, per diem ac noctem finito. Por- terea die euacuatio oleo, colocynthidas in aqua donec flaccescant coquito. Deinde ipsas quidem reijcito, oleo uero ad aquam ammixto, ueratri nigri obolos. iij. adjicito, & scammoniae drach. j. Cum his autem puliculam ex similagine, aut panem siccum tritum coquito. Postea ex hac, ægro simplici antea uictu uso, dabis nucum ponticarum. viij. aut x. magnitudinem, aut ad summum. xiiij. & aquam calidam bibendam.

De custodia eorum qui purgantur, & quid sit faciendum his qui ex sumpta purga- tione non purgantur. Ex phlegrio. Cap. VI.

*Uinum exhiben- da purgatoria*

In omnibus efficacibus in summa purgatorijs, homini simplici antea ni- ctu uso, ieiuno & probe facta concoctione, medicamentum dato, et ut ad perfectam usq; purgationem ne dormiat prohibeto. Motum etiam modera- tum, si fieri potest, faciat, & ab omni cibo ac potu tunc abstineat, ad perfectam usq; purgationem. Si uero inedia non ferant, aut propterea quod os uen- triculi in ipsis facile bilem concipit, ob longam inedia prægressam, aut aliam quandam eiusmodi causam, dandus est ipsis panis ex uino aquoso: aut pilularum aut alice succus, non ubi iam euacuatio incæpit, ut ne corrumpatur, sed statim post medicamenti potum. Sic enim aliquando etiam gra- uitate sua, ad celerem medicamenti motum cooperatur. Si tamen quis po- tui quocunque tandem aluum subducente medicamento, non purgetur, nec euacuetur, si quidem nihil molesti adest, nihil sollicitum esse oportet. Si uero res urgeat, ob magnitudinem morbi, aut æger lancinetur, & disten- datur

*Non purgato- riū afflictione;*



datur, & uelut ferra fecetur, necessario statim infusum per clysterem adhi-  
 beatur. Si uero neque sic obediatur alius, si quidem corpus morbum sentiat, &  
 uelut euertatur, lauare & largo oleo illinire oportet: si uero repletum sit,  
 & grauetur, uenam secare: praesertim si multo sanguine homo abundet, &  
 oculos rubicundos ac prominentes, non naturaliter, sed aduentitio mo-  
 do, obpotum medicamentum habeat. At si nihil horum infestet, sed mor-  
 bus & lacinatio adsit, a balneo statim nutrire oportet, & uinum largum bi-  
 bendum exhibere, & interim clysterem adhibere, si non sedetur, & rursus  
 lauare. Sit autem oleum quod per clysterem infunditur tutaceum, aut ex al-  
 lio quopiam flatu discutiente paratum.

De his qui uinum purgantur.

Cap. VII.

Nimum pur-  
 gati

**E**orum qui nimium purgantur cutis confricetur, & calida lauetur, ante  
 balneum dato uino tenui fuluo ac flauo: Talc enim celerrime ad distri-  
 butionem procedit et pane madido, ac malis punicis. Quod si perseueret eua-  
 cuatio, artus deligentur, ita ut uincula ex supernis deorsum procedant, &  
 adstringant, & quid sanguinis ac spiritus intercipient. Detur etiam modic-  
 um de Theriaca ex carnis uiperæ bibendum. Transilit enim ad cu-  
 tem, & humorum in uentrem lationem breui reuellit, & quod ueneno-  
 sum ac medicatum est in purgatorijs medicamentis, id obtundit. Et si hæc  
 desit, de pastillis Theriacis, & amplius de pastillis ex seminibus, & de an-  
 tidoto philonio appellato dabis. Sed & cucurbitis ad stomachum utendū  
 est, & cataplasmati ex polenta & uino mulso. Post hæc epithematis ad-  
 stringentibus utendum. Maxime autem utilitatem sentiunt ex totius cor-  
 poris frictionibus, & medicamentorum potionibus. Abstineant præterea  
 ab aere frigido ac calido ualde. Ille enim materias ab externis intro com-  
 pellit, & fluxum auget. Hic uero discutit & exoluit uires. Si uero ob mor-  
 bum intestinis irritatis euacuatio augeatur, prædicta cataplasmata imponā-  
 tur, & hebetantia per clysterem infundantur, adeps nimirum anserinus, &  
 uinum dulce, oleum nardinum & similia.

De Hieris Antidotis.

Cap. VIII.

**H**iera Antiochi. Chamædryos, agarici, colocynthidis medullæ stœcha-  
 dis, singulorum drachmas. x. opopanax, sagapeni, petroselinī, a-  
 ristolochiæ clematidis, piperis albi, singulorum drachmas v. cinnamo-  
 mi, spicæ nardi, myrrhæ Troglodyticæ, croci, folij, singulorum drachmas  
 iij. Mellis quod satis est.

Hiera uaria

Alia Hiera. Colocynthidis medullæ drach. xx. scillæ assatæ, agarici,  
 ammoniaci Thymiamatis, ueratri nigri corticis, scammonia, hyperici, sin-  
 gulorum drach. iij. epithymi polypodij sicci, bdellij, aloes, chamædryos,  
 marrubij, cassiæ, singul. drach. viij. myrrhæ Troglodyticæ, opopanax, sa-  
 gapeni, piperis communis, & longi, & albi, petroselinī, cinnamomi, croci,  
 castoreij aristolochiæ longæ, singul. drach. iij. Mellis quod satis est.

Hiera lusi. Epithymi drach. xij. marrubij, stœchadis, chamæ-  
 dryos, ueratri nigri, scammonia, agarici, piperis longi, scillæ assatæ,  
 singul. drach. xvi. euphorbij, colocynthidis medullæ, aloes, croci, gen-  
 tianæ, petroselinī, ammoniaci Thymiamatis, sagapeni, singul. drachmas  
 viij. opopanax, polij, cinnamomi, myrrhæ, spicæ nardi, floris funci rotun-  
 di odorati, pulegij, singul. drach. iij. aristolochiæ longæ & rotundæ, sin-  
 gulorum drach. ij. Mellis quod satis est. Dosis scrup. ij. aut. iij. aut. iij.  
 cum aqua mulla, & sale.

Hiera Galeni. Chamædryos, piperis longi, piperis albi, stœchadis,  
 ueratri nigri, scammonia, spicæ nardi, scillæ assatæ: Quidam etiam epithy-  
 mi: singulorum drach. xvi. myrrhæ, croci, ammoniaci Thymiamatis, eu-  
 phorbij, singulorum drach. viij. Excipe melle.

Sycionia eade  
 que Colocyn-  
 this

Hiera Rufi. Sycionia siue colocynthidis medullæ drac. viij. cha-  
 mædryos drach. x. sagapeni drach. viij. petroselinī drach. v. aristolochiæ ro-  
 tundæ

tundæ drach. v. piperis albi drach. v. cinamomi drach. iij. aut cassie drach. viij. spicæ, croci, polij, myrrhæ, singul. drach. iij. Mellis quod satis est.

**Hiera Archigenis.** Marrubij, agarici, chamædryos, colocynthidis medullæ, stoechadis, singuli drach. x. opopanax, sagapenij, petroselinij, aristolochiæ rotundæ, piperis albi, singul. drach. v. cinamomi, spicæ nardi, myrrhæ, folij, croci, singul. drach. iij. Arida tundito simul ac cribrato. Opopanax & sagapenum, & myrrham confusa, in pila cum aqua mulsâ, non de una macerato, deinde terito, & arida adijcito, & melle optimo excepta, in uitreum aut plumbeum uas reponito. Hic modus communis est omnibus hieris. Dolis autem ipsatum perfecta drachmæ iij. Assumata autem & salis drach. j. & mellis cyath. ij. & aquæ quantum satis est. Quod si magis purgatorius efficere uolumus eas quæ scammoniam non habent, ad has quoque singulas obolus. j. de ipsa ammiscatur.

*Illitiones sedis & Umbilici purgatorie. Cap. IX.*

*Illitiones sedis*

**Illitio sedis** ad flatus prouocandos. Ruta cum melle conteritur, ut unus succus fiat, & penitissime intra sedem illinitur. Efficacissima sit, si parum cumini, & nitri, aut succi cyclamini assumpserit. Sed & lanæ tomento exspecta in sedem inditur. Aut melle addito glans efformatur. Flatu enim prouocant inde multi, qui allevationem faciunt.

*Chezananca*

*Cacacoga*

**Illitio sedis** uentrem mouens, appellatur Chezananca, id est Cacacoga. Alumen cum melle tritum concoquitur donec sulum fiat. Et cum hoc sedes illinitur. Facile enim multa quidem, sed non citra laborem educit.

*Umbiliceres illitiones*

**Umbilicaris illitio** aluum subducens. Cyclamini drach. iij. nitri drach. ij. ueratri nigri et albi, utriusq; drach. ij. colocynthidis drach. ij. scammonij drach. ij. elaterij succi drach. iij. grani Cnidij drach. iij. caricarum pinguium sextantem, felis taurini unciam. i.

*Alia optima.*

Elaterij, lathyridum, galbani, cyclamini, ueratri nigri, singulo. drach. iij. colocynthidis medullæ drach. viij. cucumeris syluestris recentis, scammonij, grani Cnidij, singul. drach. ij. Tithymalli drach. ij. terebinthine drach. iij. Excipe hæc felle taurino, & uelut unguento utere. Quidam tere septunce addito, & olei sicyonij quantum est satis, uelut emplastrum impoluerunt.

*Medicamenta uomitoria, & sumendi ueratri modi. Cap. X.*

*Vomitum usus*

**Vomitibus** utuntur etiam sani, ab alimenti aut humorum copia grauati. Sed & hi qui ex acuto morbo ægrotant, quum à pituita, aut tali quodam humore infestantur. Verum uomitorijs medicamentis ut utantur, neque sanis, neque ex acuto morbo ægrotantibus permittendum est: sed in affectionibus diuturnis, & maxime induratis, & quæ forti exactione opus habent, uelut est podagra, morbus comitialis à stomacho oriens, elephas, hydrops, melancholia, & consimiles. Contraria autem sunt uomitoria medicamenta sanguinis sputis, & stomacho male affectis, & qui suffocari solent.

*Vomitiorij medicamentorum usus*

Promptissimum itaque ex uomitorijs medicamentis est oleum cyprinum, si digiti aut pennæ in ipsum tingantur, & in gurgulionem immittantur. Sed & nardi celticæ radicum drach. viij. in aqua mulsâ potæ, fortiter suisum purgant. Similiter etiam cestri. v. aut. vi. drach. in aqua mulsâ potæ. Et daphnodis folia. iij. uiridia, trita ac comesta.

Elaterij quoque obolus. j. in aqua potus, pituitam & bilem sursum purgat. Et staphidis syluestris grana. xv. cum aqua mulsâ crassa. Ex bulbis item hi qui consuetudo more eduntur, si crudi edantur, & narcissi bulbi cocti, sursum purgant. Apij quoque radices pars ea quæ ad aërem uergit, si edatur sursum purgat. Quidam ipsam chamæraphanum uocant: Quæ uero ad radicem est, deorsum purgat. Tota uero si edatur, sursum ac deorsum. Raphanides uero minus quidem prædictis purgant, sed utilius. Oportet autem ipsas de acres ualde ac recentes sunt in tenuia frustra concidere, & duabus aut tribus horis antea in aceto mulsso maceratas quotquot possunt sumant, ita ut

*Apio*

*Chamæraphanum*

ter aut quater à coena uomant, & semel ieiunt. Sæpe autem insuper sorbeât acetum mulfum. Vbi uero duabus horis obambulauerint, aquam tepidam bibentes, immixtis digitis aut pinnis uomant.

Modi sumendi ueratri. Veratrum dandum est diutinè egrotantibus, & ex forti morbo, & qui ex alijs auxilijs salutem desperarunt, eo quod morbus omnibus ipsis sit fortior. Dandum autem siue assidue uexarit morbus, uelut hydrops, elephas, malus habitus, resolutio, & similes: siue per quosdã temporis circuitus repetat, uelut comitialis, & podagra. Quum autem mul- ti sint sumendi ueratri modi, simplicior & potior præparatio ad sumendum ueratrum, hic modus est. Postquam raphanidas prius arundine perpunxe- ris, ueratri albi optimi radicum surculos festuaceos in fissuras impingito, & ubi noctem permanserint, ipsos tollito, raphanidas autem concisas cum acetumulso dato iuxta relatum modum, assuetio nimirum antea ad uomitio- nes ægroto, & relatis horis interpolitis, ut insuper ad uomendum cogatur.

Præcipuus autem sumendi ueratri modus hic est. Veratri optimi sex tantem in aquæ hemina, quinque antea diebus maceratis, coquito donec ter- tia aquæ pars resiet. Expresse deinde ueratrum, ad aquam æqualem mellis mo- dum ammisceto, & facta ad crassitudinē coctura, dato ægroto antea iuxta re- latum modum ad uomitum exercitato, ita ut idem sit ieiunus, & bene co- coxerit, & aluum deorsum exonerauerit, aut sua sponte, aut etiam semel at- que iterum infuso per clysterem immisso pro uiribus.

Efficacissimus porro omnium modus talis est. Radices ueratri ad se- fami magnitudinem concidito. Nam in puluillum redactæ, actionis effica- cia strangulant: Et debilioribus quidem eum pisanæ, aut alicæ, aut cuiusmo- di euulsidam succo, ueratri summum drach. ij. minimum drach. j. equito, et bibendum dato. Robustioribus autem cum aqua calida, aut aqua malsa. In- cipit purgatio post tres aut quatuor horas. Quibus tardius incipit, hi meli- us purgantur. Si uero uomitiones tardè prodeant, aqua malsa bibenda da- ta, ad uomitum cogantur, immixtis item pinnis in oleum tinctis. Si neque sic uomant, in balneum abducantur. At ubi uomere inceperint, si quidem pro- ratione euacuatio fiat, nihil amplius molestiæ exhibere oportet. Si uero lan- cinentur aut etiam conuellantur, aquam & oleum bibenda dato. Nam hinc & deorsum per uentrem subductio ipsis cōtingit, id quod etiam alias in his qui ueratrum sumunt aliquando contingere solet, & medicamenti coacer- uationem facilius ferunt. Quod si animi deliquium ipsis accidat, odoramen- tis resoellentur. Sed & ad alia, uelut uerisimile, accedentia symptomata, si- militer congrua adhibere oportet. Cæterum multa contingente euacua- tione, nutriantur & dormire permittantur, aliæque uelut in his qui nimis pur- gantur dictum est fiant. Si uero perseveret adhuc, cucurbitæ stomacho affi- gantur, & artus deligetur. At si pro ratione euacuatio fiat, aqua malsa ipsis bibenda detur moderatè, quo superfluitates ex medicamento eluat. Et pau- lo post cibis concoctu facilis exhibeatur. Porro in his qui suspecta ha- bent per os medicamenta, & tamē omnino ueratri usu opus habent, Antyl- lus tali quodã infuso per clysterem utitur. Veratri albi drach. ij. in aquæ fœ- tar. j. maceramus, & per diem ac noctem manere sinimus. Sequēte uero die ueratrum in aqua ad dimidias coquimus. Deinde hanc per sedem infundimus ut uomitum concitet. Sursum purgat paulò debilius quàm ueratri po- tio. Post sufficientem purgationem, glandula acris subdita excretionem irritamus, quo infusum reddatur, & ipsi non amplius uomant. Et post ex- cretionem, aquam mulsam semel aut iterum infundimus, quo intestina clu- antur. Idem Antyllus ita dicit. Fit etiam glandula inquit, ex ueratro albo tuso ac cribrato, deinde melle cocto excepto, similiter purgans supremum uentrem, quemadmodum infusum ex ueratro purgat. At uero probatior est hic modus. Nam in nobis situm est ut moderemur purgationem. Sit itaq; que ueratri pondus drachmarum duarum ipsa uero glans lanæ tomenio so-

Veratri sicon-  
di Modi

Infusa per se-  
dem, sursum  
purgantia

Glandule sira-  
sum purgantes

lidiores obducatur aut obligetur. Et caput tomenti extrinsecus per sedem propendeat, quo post sufficientem purgationem, glandem extrahere nobis liceat. Hic modus perfectissime purgat, & neq[ue] suffocationem, neq[ue] aliud quoddam periculum inducit.

De diversis Antidotis.

Cap. XI.

Præfatio à Galeno libris de Antidotis præmissa.

Antidoti n[on] r[ati]o

Compositiones medicamentorum quæ affectiones curant, & non foris inponuntur, sed intra corpus sumuntur, veteres Medici Antidotos vocant. Tres autem sunt ipsarum differentia. Quædam enim letalium medicamentorum gratia exhibentur. Quædam ob bestias uenenum ei[us]culantes. Quædam affectionibus ex malo uictu obortis auxiliantur. Aliquæ triplicem usum promittunt, quemadmodum etiam ea quæ Theriaca appellantur.

Hedychroi preparatio

Hedychroi in Theriacam ingredientis preparatio.

Aspalathi radicis corticis, calami aromatici, costi, asari, xylobalsami, phu, amaraci, mastiches, singul. drach. vi. carpobalsami drach. ij. Mari drag. xvi. floris iunci rotundi odorati drach. ij. cinamomi drach. xxiii. amomi, cassia, Rhei, singul. viij. nardi indicæ, folij, singul. drach. xij. myrrhæ drach. xxiii. croci drach. xij. Vino bono excipe, & pastillos efforma digitis opobalsamo tinctis.

Pastillor[um] scillitricorum preparatio  
Pastillor[um] Theriacorum preparatio

Pastillorum scilliticorum preparatio. Scillam luto aut farina[m] massa oblitam moderatè assato, & acceptis interne part[is] ipsius partibus duabus, & farina erui parte una, terito & similiter pastillos efformato.

Pastillorum Theriacorum preparatio. Viperas quatuor aut quinque sulciore ac recens captas sumito, & de ipsis ad caput & ad caudam, quatuor digitorum magnitudinem amputato, & tota pelle interaneisq[ue] ipsarum ablaris, reliqua in noua olla cum anetho & sale coquito, donec spinæ de carnibus discedant. Deinde ablatis ac diligenter à spinis purgatis carnibus, puri panis æqualem portionem ipsis ammisceto, & trita similiter in pastillos efformato digitis opobalsamo tinctis, & in umbra siccato.

Theriace preparatio

Theriace Antidoti preparatio. Pastillorum scilliticorum drach. xlvij. Pastillorum Theriacorum drach. xxiiij. hedychroi drach. xxiiij. cinamomi drach. xxiiij. piperis communis drach. xxiiij. succi papaueris drach. xxiiij. rosarum siccarum drachmas. xij. scordij, buniadis seminis, iris illirica, agarici, glycyrrhizæ, opobalsami, singul. drach. xij. myrrhæ, croci, zingiberis, Rhei pontici, quinque folij radicis, calaminthæ, marrubij, petroselinij, stoechadis, costi, piperis albi & longi, dictamnij, iunci rotundi odorati floris, thuris masculi, terebinthinæ, mastiches, cassia nigra, spice nardi, singul. drach. vi. polij floris, styracis, apij seminis, fefelidis, Thlaspis, ammi, chamædryos, chamæpitios, hypocistidis succi, malabathri, nardi celticæ, mei, gentianæ, anisi, sceniculi seminis, lemnis sphragidis, chaletidis tostæ, amomi, acori, balsami, phu pontici, hyperici, acaciæ, gummi, cardamomi, singul. drach. ij. dauci seminis, galbani, sagapeni, bituminis, opopanacis, castorij, centaureæ, aristolochiæ clematidis, singul. drach. ij. Mellis Attici libras. x. uini falerni sextar. ij. Opium, hypocistidem, myrrham, sagapenem, styracem, acaciæ, opopanacem, in pilam mittito, & modico melle assuso, tundens dissoluito. Deinde uino adfecto ut superemineat, ad triduum macerato. Postea reliqua rufa unio. Mel ipsum desumpitur. Reponitur in argentea aut uitrea uasa non ualde plena. Et opercula singulis diebus demouuntur. Vfus ipsius est, si res urget, in morsu à bestiis uenentis, & his qui uenenum acceperunt, post septimum à præparatione annum, nucis ponticæ magnitudine, cum uini cyath. ij. ita ut bis in die bibatur. Similiter etiam his qui ab aliqua obscura periclitati sunt causa, ut corruptio in corpore letalis medicamentis qualiter sit imitata, quemadmodum in pestilentibus constitutionibus maxime fieri solet, semel in die datur. At in alijs affectionibus post decennium ipsius usus est, & usq[ue] ad uigessimum annum. In russi uero, &

Vfus Theriacus

ro, & thoracis aut lateris doloribus, non febrientibus cum uino mulso, febrientibus cum aqua mulsa, datur ad noctem fabæ Aegyptiæ magnitudinis. Sanguinem spuentibus, si recens est malum, in polca: diuturnum, in symphyti decocto datur fabæ Aegyptiæ magnitudine mane & uesper. In flatibus & torminosis, aut coeliacis datur mane ex aqua calida, fabæ ægyptiæ magnitudine. Appetentiam intensam excitat. A rigore, perfrigeratione, & bilis uomitu, ante accessiones pota liberat. Meneses mouet, & mortuos foetus ejicit, fabæ Aegyptiæ magnitudine pota cum aqua mulsa, aut passo, in quo rura aut dictandum coctum est. Facit etiam ad uocem abscissam, ei per se, & cum dupla tragacantha, ex uino mulso aut passo pota, & sub lingua detenta, & eliquata. Splenicis et hepaticis datur ex posca. Si scirrhi ducia adit, ex aceti mulsi, aut aceti scillitici sesquicyatho. Nephriticis cum aceto mulso fabæ Aegyptiæ magnitudine. Dysentericis tantundem cum rhois decocto, mane & uesper. Ad uisus quoque hebetudinem summe facit hoc modo. Antidoti & opobalsami sextantem, cum mellis cyatho misceto, & paulatim illinito. Detergit etiam dentes. Plerique etiam præseruationis gratia ipsam accipiunt, in nouissimo fabæ græcæ magnitudine, ubi probe concoxerunt, cum mellis cochleario uno, & aquæ cyathis. ij. Similiter etiam in professionibus ipsa utuntur, quum uisum aërem aliquem, aut aquas suspectas habent, in locis ubi iter faciunt.

## Sales Theriaci.

Sales Theriaci

Viperas sumito recens captas quatuor. Deinde salis ammoniaci aut communis modium Italicum. j. in pilam mittito, & cum ipso hæc in crassas partes contundito. Gentianæ sesquilibram, aristolochiæ rotundæ sesquilibram, cētaurij tenuis comæ lib. ij. cardamomi, marrubij, singulorum sexuncem, scordij, apij, chamædryos creticæ, singul. lib. j. rutæ fatiæ seminis sextar. ij. Mellis Attici mensura sufficiente hæc unito, & dimidiam ipsorum partem in ollam nouam dato, deinde quatuor uiperas uiuas adijcito, infusperque ad ipsas, etiam scillas teneras recentes minutim concisas addito, atque ita reliquam dimidiam partem superioris mixturæ superinjicito, & olla diligenter operta, tribus aut quatuor foraminibus operculum ipsius perforato, quo uapor per ipsa exhalans, assationis modum tibi significet. Primum enim apparebit fumus multus, exiens caliginosus ac ualde turbatus, significans quod ignis iam feras ipsas contingat. Atque tunc tu diligenter caue, ne quid de hoc fumo inspires, dum aer à uiperarum exhalatione inficitur. Deinde quum cessauerit uapor, & flammam quandam exilem cōspexeris per foramina egredientem, tunc sanè quàm optime assatas putato, atque sic ollā ab igne ablata, per totam diem ac noctem perfrigerato: postea aperito, & exemptos carbones diligenter tundito & cribrato cum his mixturis. Rutæ syluestris seminis, hyssopi cretici, singul. dodrantem, seminis foeniculi, nardi celticæ, stachyosicythicæ, singulorum sexuncem, petroselinum macedonicum, malabathri, foliorum, singul. trientem, amomi, racemi, hormini seminis tostis, singul. quadrantem, origani cacuminum, thymi cacuminum, singul. sextantem, baccarum iuniperi, pipæris albi, & longi, singul. libr. siliij radiis dextantem, seminis coriandri, zingiberis non perforati, satyrij seminis aut radicis, pulegij, fœselis massiliensis, mentas, singulorum sexuncem, cassigifistulæ sextantem, cinamomi unc. j. Cæterum ego præparati ut bestias non exusserim, sed pastillos ex ipsis paratos, uelut in Theriaca exposui, cum his quæ cum bestiis uruntur miscui, & hoc propterea, ut quam in se habent amaritudinem, eam in uestione deponant. Tantam autem mensuram pastillorum adieci, quantam confectura assequi potui quatuor uiperas habere. Et euaserunt reuera optimi.

Antidotus Mithridatica ex Scinco. Myrtæ Troglodyticæ, zingiberis, cinamomi, singul. drach. x. spicæ nardi, Thuris, thlaspeos, opobalsami, floris iunci odorati, costi, stœchadis, fœselis, galbani, terebinthinæ, piperis

Mithridatica  
ex Scinco

peris longi, castorij, succi hypocistidis, styracis, foliorum malabathri, singul. drach. iij. cassiae nigrae, polij, piperis albi, scordij, dauci seminis, carpo-  
balsami, cypheos, bdellij, nardi celticae, gummi, petroselinij, opij, cardamo-  
mi, foeniculi seminis, gentianae, foliorum rosarum, singul. drach. viij. dictam-  
ni, anisi, acori, phu, singulorum drachmas. iij. mei Athamantici, acacie, uen-  
tris scinci, hyperici seminis singul. j. s. Vini & mellis quantum satis est.  
Præparato similiter ut Theriacam. Galenus dicit hanc ad eadem facere, ad  
quæ etiam Theriaca, exceptis his qui à uipera morfi sunt. Nam ad hos The-  
riaca efficacior est.

*Sanguinij An-  
tidotus*

Antidotus ex sanguinibus, Faciens ad omnia uenenum eiuculantis,  
& ad letalia medicamenta. Piperis albi & longi, costi, acori, phu, anisi, di-  
ctamni cretici, singul. drach. ij. a momi, opobalsami, seminis rutæ syluestris  
seminis foeniculi, cumini Acthiopici, anethi, sanguinis anatis masculi sic-  
ci, sanguinis hœdi, sanguinis anseris, sanguinis anatis feminae, bundadis  
syluestris seminis, singulorum, drachmas. iij. gentianæ radicis, trifolij, an-  
ci odorati floris, Thuris, rosarum siccarum, sing. drac. iij. cinamomi drac. ij. scoe-  
dij drach. viij. petroselinij, polij, myrrhae, nardi, singul. drach. vj. cassiae drac.  
iij. succi cyrenatici drach. iij. hyssopidis drach. v. asari drach. ij. ammoniaci  
Thymiamatis drach. iij. mei Athamantici drac. ij. agarici drac. ij. carpo-  
balsami grana xx. Mellis cocti quantum satis est.

*Acetum mul-  
sum simplex*

Acetum mulsum simplex. Aceti acerrimi albi sextar. j. aquæ se-  
xtar. ij. Mellis sextarium. j. Coquito ad liquidioris mellis compagem, mel  
inter coquendum despumans.

*Acetum scilla-  
ticum*

Acetum scilliticum. Scillæ albæ concisæ, & in umbra siccatæ ad  
dies quadraginta, rursusque purgatæ, minam unam, aceti boni sextar. xij.  
Hæc simul in uas mittito, idque opertum ad dies sexaginta ad solem expo-  
nito, post quas scillam expressam abijcito. Acetum autem excolatum in  
aliud uas transfundito. Quidam scillæ minam. j. in aceti sextar. vj. mit-  
tunt. Alij uiridis scillæ idem pondus in acetum coniungunt, & ad menses  
sex simul in uase esse sinunt. Et est hoc magis incisorium. Facit autem ad  
fluxiones circa os, si colluatur, & ad multas internarum partium affe-  
ctiones, si bibatur, exceptis his quæ cum ulceratione consistunt. Facit  
item ad plura alia.

*Acetum mul-  
sum scilliticum*

Acetum mulsum scilliticum. Scillæ partium internarum tenerarum  
libr. ij. aceti acris albi sextar. xv. piperis, petroselinij macedonici, sin-  
gul. sextantem, dauci cretici, ammij, anisi, nardi celticae, ligustici, asari,  
cardamomi, spicæ nardi, a momi, rhei pontici, singul. semunciam, semi-  
nis foeniculi, cumini, silphij, zingiberis, pyrethri, hyssopi cretici, costi,  
pulegij, singul. unc. j. mentæ uiridis fasciculum. j. rutæ uiridis ramulos. v.  
Mellis Attici sextar. j. sapæ sextar. ij. apij uiridis fasciculum. j. Internas scil-  
læ partes albas contusas in acetum mittito, & ad dies septem sub caniculæ  
ardoribus macerari finito. Deinde exempta scilla, sicca quidem iam con-  
tusa, uiridia autem non contusa, in acetum dato, & rursus post septem dies  
omnibus excolatis, mel & sapam ad acetum addito, & ad cōpagē coquito,  
uitreoque uase excipito. Vtere hoc auxilio & seipsum uelut portioneque ante  
cibum sumi solet, & cum cibo ad intestinus. Est enim longè utilissimum.

Medicamentum Galeni ex scilla, faciens maxime ad comitialcs. Scil-  
lam in tenues partes manibus confractam, in uas quod mel habuit conijce  
& id probe opertum in loco ad meridiem conuerso, sub caniculæ ardori-  
bus exponere. Post quadraginta dies ab ortu caniculæ solue, & scillæ corpus  
effluxisse comperies. Exceptum itaque succum ipsius optimo melle condito  
& his singulis diebus cochlear. j. præbeto, pueris paruum, perfectis ma-  
gnum. Sed & ipsum scillæ corpus cum melle teritis, indeque cochlearium ex-  
hibeto. Est autem hoc facultate posterius succo.

*Philonis Anti-  
dotus*

Philonis Antidotus. Piperis albi drach. xx. hyosciami drac. xx. scor-  
cipar

cl papaueris drac. x. croci drac. v. pyrethri, euphorbi, spicæ nardi, singul. drach. j. Mellis Attici, aut alterius boni probe cocti quod satis est. Dato per seccis nucis ponticæ magnitudinem, minoribus fabæ, pueris ciceris. Medicamentum est quod dolorem maxime sedat, & somnum inducit.

Athanasia dolorem sedans pleuritica, Oribasij. Cassie drach. viij. spicæ nardi, amomi, croci, opij, styracis, myrrhæ, costi, singul. drac. iij. mellis depurati quod satis est. Dosis est eadem quæ philonis antidoti.

Antidotus ex duobus piperis generibus, similem uim habens. Cardamomi, castorij, opij, singul. drach. ij. myrrhæ, costi, piperis albi, & longi, galbani, singul. drach. ij. croci drach. ij. Excipe melle cocto, & præbe fabæ magnitudine.

Antidotus ex papaueris capitibus, & sapa. Capita papaueris uiridia non aquosa. viij. aut x. postridie ut decerpseris, cum glycyrrhizæ uncia una, in sapæ sextario uno, ad diem unum macerata, coquito donec flaccescant, & ubi moderatam habuerint hæc compagem, ab igne ablata uale excipito, ac utitor in febrientibus qui uigilijs infestantur, & si de capite thoracem tenuis fluxus fertur.

Antidotus ex papaueris capitibus, & melle. Capita papaueris uelut dictum est, & glycyrrhizæ unc. j. in aquæ pluuiæ aut fontanæ sextario. donec flaccescant coquito ac exprimito, & ad decoctum mellis sextarium dimidium adjicito, & ad spissitudinem coquito. Datur his qui eum doloris mitigatione, & somni inductione, insuper etiâ expurgatione & excretionis opus habet, eorū quæ in thorace, aut circa pulmonem et renes heret.

Antidotus ex papaueris capitibus cõposita. Aquæ in qua capita papaueris iuxta relatum modum cocta sunt, sextar. j. uini dulcis heminas. ij. mellis libr. j. croci, hypocistidis succi, singul. drach. iij. coquito ad compagem. Ceterum ea quæ ex melle, & capitibus papaueris, & malis cydoniis paratur, stomacho grator est. Verum efficacior est, si unâ cum papaueris capitibus, etiam melilotum & glycyrrhiza in aqua coquantur.

Elegma ex marrubio simplex, ad tabescentes maxime. Comæ marrubij lib. j. in aquæ heminis. vj. ad tertias coquito, & abiecta herba, partem mellis mensuram aquæ adjicito, & ad mellis spissitudinem coquito, indeq; cochlear. i. præbeto.

Elegma ex marrubio compositum.

Comæ marrubij, iridis Illyricæ, hyssopi, pulegij, glycyrrhizæ, apij, singulorum sextantem, caricarum pinguium quadrantem nucleorum nucis pineæ resin. ite quadrantem. Contundito in crassas partes sicca, & cum caricis in aquæ sextar. iij. macerata, ad tertias decoquito. Deinde ad excolatam aquam mellis lib. ij. adjicito, & ad mellis compagem usq; coquito.

Elegma ex eruo. Amygdalatum amararum sextantem, farinæ erui trientem, hyssopi trientem, iridis semunciam, nucleorum pineorum tortefactorum sextantem, Mellis sextar. j. aut quod satis est.

Elegma dodecateon. Iridis Illyricæ trientem, erui trientem, hyssopi sextantem, seminis urticæ sextantem, glycyrrhizæ sextantem, foeni græci sextantem, bulborum trientem, seminis lini torrefacti trientem, melanthij scrupul. xvij. pulegij scrup. vj. nucleorum pineorum tortefactorum sextantem, piperis scrup. vj. Mellis quod satis est.

Antidotus Sotira. Spicæ nardi scrup. xxxix. myrrhæ scrup. xxvij. croci scrup. xxxvij. castorij scrup. xxxix. pettoselini scrupul. xlv. anisi scrup. ix. apij scrup. vij. floris iunci odorati scrup. xxxvi. cassie scrup. xij. piperis longi scrup. xij. seminis sinonis scrup. vj. styracis scrup. xvij. amomi scrup. xij. seselis scrup. xij. hederoy scrupulos. xvij. costi scrup. xvij. Mellis quod satis est.

Medicamentum ad tussim ex styrace. Amomi, cassiæ, singul. sextantem, styracis, spicæ nardi, singulo sesquiunciam, croci, piperis albi, singul.

D. a. unc.

Athanasia

Antidotus uari  
us ex papau  
eris capitibus

Elegmata ma  
ria

Dodecateon  
Elegma

Sotira antido  
tus

unc. i. Mellis sextar. i. Exhibe cochlearium unum.

Medicamentum Philoxeni, ad suppuratos, & fluxiones diuturnas.

Terebinthinæ drach. xxviiij. nardi drach. xvi. myrrhæ stactæ drach. vj. cardamomi, bulborum, singul. drach. vi. croci drach. xij. galbani drach. xvi. galbani drach. xvi. amygdala amara. lxxx. Mellis heminam. Bibitur ex aqua fabæ Aegyptiæ magnitudine.

*Esse antidotus*

Antidotus Eisdæ multi usus. Est enim ex his quæ ualde siccant, Amomi scrup. vi. croci scrup. xviiij. seminis dauci scrup. j. s. feniculi seminis scrup. iij. cassiæ scrup. j. s. floris iunci odorati scrup. iij. s. cinamomi scrup. iij. hy pocystidis succi scrup. iij. s. sulphuris scrup. v. seminis papaueris scrup. v. pyrethri scrup. iij. petroselinæ scrup. j. s. iridis Illyricæ scrup. v. s. hyoscyami seminis scrup. xij. s. spicæ nardi scrup. v. s. seminis rutæ scrup. j. s. anethi scrup. iij. cardamomi scrup. iij. rosarum siccatarum scrup. iij. s. Floris nerij (Est autem uelut siliqua, ex qua rosa rododaphnes emergit) & rosæ ipsius, singul. scrup. iij. Rhei scrup. vj. gentianæ scrup. vj. hedychoi scrup. j. s. tragacanthæ scrup. xv. Lycij scrup. vj. foliorum citrij scrup. vj. seminis ocimi scrup. j. s. anisi scrup. iij. costi. myrrhæ, singul. scrup. vj. bdellij scrup. xvi. succi artemisiæ scrup. xij. rhois syriaci scrup. xxv. s. asari, uentris mergi. lapidis laspidis, singulorum scrup. iij. piperis scrup. xv. castorij scrup. j. s. cimolizæ scrup. vj. lisonis scrup. jx. styracis scrup. jx. opobalsami scrup. xij. scelis herbæ scrup. j. s. Mellis uncias. xxviiij. Vini quod satis est.

Medicamentum ex malorum cotoneorum carnibus. Malorum cotoneorum purorum lib. iij. concoquantur in uini ueteris sextar. iij. deinde teruntur, & adijciuntur ipsis trita hæc, piperis, anisi, ligustici, singulo. unc. j. Quidam etiam zingiberis unciz dimidium addunt. Qui pro uino acetum sumunt.

*Ex malis cotoneis medicamenta uaria*

Medicamentum ex malorum cotoneorum succo. Ad prostratam appetentiam & agrè concoquentes commodum. Malorum cotoneorum maturorum succi sextar. ij. mellis boni sextar. ij. aceti sextar. j. zingiberis quadrantem, piperis albi sextantem. Ad spissitudinem coquito. Hoc ad perfrigeratos preparat Galenus. In quibus autem, inquit, bilis abundat, citrapiperis & zingiberis ammissionem præparato.

*Meloplacuntion*

Meloplacuntij id est placentæ ex malis cotoneis præparatio.

Malorum cotoneorum purorum lib. vj. coquuntur in uino donec flaccescant. Deinde ad excolata ac trita quidam adijciunt Mellis lib. viij. & ad lentum ignem coquant, mouentes subinde ferula, donec totum manus non inquinet, & tunc contusa hæc adijciunt, piperis quadrantem, anisi quadrantem, petroselinæ unc. j. Quidam etiam zingiberis unc. j. & malliches unc. j. Deinde mixta in placentas semunciales efformant, & cum lauri folijs componunt.

*Cydonatum*

Cydonatum friabile frustra integra habens. Malorum cydoniorum purorum in frustra concisorum libræ. viij. coquuntur in uini sextarijs. viij. moderate, ut non dissoluantur. Deinde ammiscentur ipsis, mellis despumati lib. viij. piperis bellis, petroselinæ, anisi, singulorum quadrantis, zingiberis quincunx, spicæ nardi scilicet uncia, caryophylli uncia una. Omnia hæc confusa, & moderate cocta ad iusculi spissitudinem tollito, & ubi perfrigerata sunt, frustra simul cum iusculo componito.

Antidotus ex tribus piperis generibus. Piperis communis, albi, longi, singulo. drach. vij. zingiberis, anisi, cacuminum thymi, singulo. drach. ij. Mellis quod satis est.

Alia oribafij.

Piperis albi sextantem, piperis nigri, longi, spicæ nardi, cinamomi, amij. caroi, hyssopi, scelis, dauci, petroselinæ, singul. unc. j. zingiberis drach. iij. Mellis libr. iij.

Alia.

Piperis communis quadrantem, albi unc. j. longi unc. j. petroselinæ, Cinamomi



namomi, aut cassiæ duplum, zingiberis, singul. unc. j. Mellis unc. xxi. Aut quantum satis est. Ego etiam Thymi cacuminum unc. j. ammifcul.

Diospolites. Cumini aceto macerati ac totrefacti unc. j. piperis, zingiberis singulo, sextantem, rutæ viridis unc. j. s. hñtri drac. ij. s. Excipe melle.

Medicamentum ex calamintha, Petroselinii pulegij, fescelis, calaminthæ, singulorum quadrantem. apij seminis unc. j. cacuminum thymi unc. l. ligustici trientem. Piperis unc. xij. Mellis quod satis est.

Medicamentum ex citrio, ad agrè concoquentes.

Aceti heminas. iij. citrij siue medicij mali carnis lib. j. hyssopi, rutæ, ordiani, singul. fasciculum. Hæc per diem ac noctem macerata in aceto coquantur ad tertias, et expressa abijciuntur. Ad acetum autem mellis sextar, j. ammifcetur, et rursum ad mellis spissitudinem coquitur. Quod ubi factum est, asari, mei, piperis albi singul. sextans infarcitur. Datur inde cochlear. j. mane, & ad somnum.

Picra Galeni. Aloes drach. c. xylobalsami, mastiches, croci, spicæ nardi, asari, cinamomi, singul. drach. vi. Quidam etiam floris iunci odorati, & cassiæ, singul. drach. vi. addunt. Datur ex aqua mulsa drach. j.

Picra ex aceto mulso. Ad stomachicos, uterum, & hydropem Aloes trientem, folij sextantem, costi, cassiæ, amomi, iridis, singul. drach. j. corticis radicis fœniculi libr. j. mastiches, nardi celticæ, zingiberis, singulorum drach. j. piperis drach. j. mei. drac. j. acetij sextar. j. s. Mellis. sextar. j. s. Fœniculum in aceto ubi prius coctum est abijciuntur. Deinde mel adijciuntur, & facta ad mellis compagem coctura, reliqua trita inspergantur.

Medicamentum optimum ex hepate lupino. Gentianæ, chamartyos, petroselinii, marrubij, fellis ursini, sinapis, scolopendrij, radicis panacis minij, rubiæ, seminis brassicæ, aristolochiæ longæ, piperis albi, spicæ nardi, costi, cruce seminis, eryngij radicis, polij, echij, eupatorij, baccarum lupiperi, hepatis lupini, enulæ, singulorum æquales partes melle cocto excipe. Datur nucis ponticæ magnitudo, cum uino mulso cocto.

Theodoretus ex Anacardijs. Anacardiorum unc. j. s. croci, cassiæ, folij, spicæ nardi, caryophylli, mei, agarici, floris iunci odorati, rheij, epithymi, singul. drach. iij. acori, piperis singul. unc. j. s. aloes quadrantem, saxifragæ, mastiches, iridis Illyricæ, singul. unc. j. s. myrobalanorum unc. j. Mellis libr. j. aut quod satis est.

Theodoretus absque anacardijs. Aloes drach. lx. agatij drach. xxiij. croci, cassiæ, rheij pontici, acori, cinamomi, mastiches, singul. drach. x. costi, seminis rutæ, piperis albi, singul. drach. viij. spicæ nardi drach. iij. xylobalsami, asari, chamædryos, mei, singul. drach. iij. Mellis quod satis est. Quidam etiam his addunt anacardiā. ij. Dosis est drachmæ. ij. cum aqua mulsa.

Cyphoides. Ad Hepaticos, & thoracis affectiones. Vuæ passæ earum nis drachmas. xxv. croci drach. j. calami drachmas. ij. bdellij drachmas. ij. s. cinamomi obol. iij. nardi obol. iij. iunci odorati drachmas. ij. myrrhæ drach. iij. terebinthinæ drachmas. iij. aspalathi ramenti obol. xij. Mellis drachmas. xvi. Vini quod satis est.

Cyphoides aliter. Alexandri. Croci, cinamomi, bdellij, singul. drachmas. iij. myrrhæ, calami, singul. drachmas. ij. aspalathi, floris iunci odorati, singul. drachmas. iij. cassiæ, nardi, singul. drachmam. j. terebinthinæ drachmas. xvi. vuæ passæ carnis drachmas. clx. Mellis heminam. j. s. Vini Chij quod satis est.

Medicamentum ex Cacano hepaticum.

Cacani unc. j. costi unc. j. folij scrup. viij. piperis albi scrup. vi. spicæ nardi scrup. vi. Mellis quod satis est. Datur cochlear. j. cum conditi portione.

Zopyrius. Myrrhæ drach. v. croci, cassiæ singulorum drach. iij. cinamomi drach. iij. spicæ nardi drach. ij. floris iunci odorati drach. ij. piperis al

Diospolites

Picra Galeni

Lupini hepatis medicamentum

Theodor. t. iij

Anacardiā

Cyphoides

Ex cacano medicamentum

Zopyrius

*Pœonia  
Antidotus*

bi drach. j. s. thuris drach. j. costi drach. j. Mellis quod satis est.

Pœonia. Stryacis calamitæ drach. vi. thuris, amomi, croci, singul. unc. j. s. spicæ nardi drach. vi. folij drach. ij. piperis albi drach. vi. piperis communis drach. viij. myrrhæ unc. j. costi unc. j. Mellis quod satis est.

Catapoti hepatica, dosithei. Aloes unc. j. spicæ nardi, folij, costi, singul. scrup. ij. agarici scrup. viij. mastiches scrup. xij. epithymi scrup. iij. Rhei scrup. j.

Acetum mulsu ad splenem. Capparis radicis corticis, scolopendrij, spicæ nardi, asari, iridis, floris iunci odorati, floris iunci quadrati, anisi, cumini, fœniculi, acori, fructus ericæ, singulo. unc. j. foliorum myricæ, foliorum salicis, radicis apij, dendrolibani, scillæ, singulorum sextantem, acetum sextar. iij. Mellis sextar. iij. ammoniaci Thymiamatis, quadrantem. Parato uelut scilliticum. Dato cochlear. ij.

Acetum mulsu faciēs ad calculosos. Saxifragæ, betonicæ, graminis, adianti, spicæ nardi, carpesiæ, asari, eryngij, singulorum unc. j. petroselinii macedonici, rutæ seminis, singul. unc. s. fœniculi uiridis, scillæ assatæ, chamædaphnes, singul. sextantem. Capparis radicis corticis quadrantem, sij sextantem, aquæ, acetum, mellis, singul. sextantem.

*Posca calculos  
atterens*

Posca calculos atterens. Pulegij, mastiches, seminis apij, mentæ sicæ, singulorum unc. j. salis communis torrefacti, lib. j. seminis coriandæ, spicæ nardi, anisi, ammij, singul. scrup. vi. folij scrup. iij. piperis albi unc. s. aut communis unc. j. lithospermatis sexuncem, betonicæ sexuncem, acetum boni sextar. v. Omnia tusa, cribrata ac leuissime trita, per triduum aceto ammisceto, & per dies xl. insolato. Vltus autem tempore, ex cicere nigro, & asparagorum radice, aploq; & adianto decoctū parato, & ad ipsius temperaturam acetum heminas. ij. adijcito, ægroq; in calido balnei folio bibendum præbeto. Quidam uero relatarum specierum puluilli scrup. xij. cum posca ex prædictorum relatarum herbarum decoctio mixta exhibent, & nihilominus efficax est medicamentum.

*Conditum  
Vinum Ascalonites  
Hircini sanguinis medicamentum  
Cicadarum medicamentum*

Conditum calculos atterens. Piperis albi, saxifragæ, spicæ nardi, lithospermi, betonicæ, singul. unc. j. petroselinii, folij, singul. unc. j. s. seminis rutæ syluestris unc. s. Mellis sextar. j. Vini Ascalonitæ sextar. xvi.

Medicamentum ex hircino sanguine. Quum uia inceperit mature scere, hirci ætate uigentis sanguinem accipe, & in sole sicca, deq; ipso cochlear. ij. præbe calculosis cum passo cretico. Quidam etiam amomi & folij singulo, quadrantem ammiscunt. Alij etiam myrrhæ scrup. iij.

Antidotus Rhemalis ex cicadis. Lithospermi, acus piscis uisti, selælis, singul. unc. j. ammij, cucumeris fatiui seminis, saxifragæ, uuarum passerum exemptis uinaceis, seminis, altheæ, phaseoli albi, lyncurij, singulorum unc. s. spicæ nardi, phu, mei, lapidum ex spongijis, singul. drachmas. j. adianti, seminis palmuri internæ partis, sij sicci, radicis rubi, graminis, polypodij singul. drachmas. iij. hircini sanguinis siccati uelut dictum est, scrup. vi. cicadarum siccatorum, ademptis capite, alis ac pedibus, tritentem, piperis albi drach. vi. Mellis costi quod satis est. Datur nucis ponticæ magnitudine, in condito, aut decocto tribuli, aut saxifragæ aut sinonis, aut radicis asparagorum, aut graminis, aut quinquefolij, aut radicis herbæ lanariæ.

Antidotus ex lithospermo. Lithospermi, betonicæ, saxifragæ, petroselinii, piperis albi, æquales portiones. Excipe melle.

Antidotus ex semine porri. Piperis albi ac nigri, dauici cretici, cucumeris fatiui seminis, fœniculi seminis, porri seminis, petroselinii Macedonici, Pyrethri, zingiberis, folij singul. unc. j. Mellis quod satis est.

Antidotus ex Tocolitho. Spicæ nardi, hyssopi, tocolithi, singulorum scrup. viij. piperis scrup. xij. zingiberis, petroselinii, costi, saxifragæ, singul. scrup. vi. cassiæ, seminis apij sing. scrup. iij. cyperti scrup. vi. rameti eboris scrup. iij. cardamomi ligni scrup. vi. lithospermi scrup. iij. Mellis quantum satis est.

Antidotus

Antidotus ex semine maluæ sylvestris. Cucumeris sativi seminis drachmas. xij. hyoscyami seminis drachmas. vi. cicutæ seminis drachmas. iij. alij vi. habent. opij, sceniculi maluæ sylvestris seminis, croci, singulorum drachmas. iij. seminis apij, drachmas. vi. cassiæ drachmas. iij. amygdalas. x. nuces regias. x. nuces ponticas. x. asari drach. iij. Excipe passo Creti, co, & obolos. iij. præbe non febrientibus cum sapa. Quidā melle excipiūt.

Medicamentum Rhenale ex bellarijs. Ad uesciæ ac rhenum ulcerationem. Vuæ passæ albæ uinaceis exemptis, nucleorum pineorum recentium singul. sextantem, cucumeris seminis decorticati, baccharum myrti exempto osse, amygdalarum amararum, palmularum pinguis, seminis apij, seminis papaueris, croci, singulorum drachmam. j. myrrhæ sextantem. Ex passo drachmam. j. ieiuno bibendam præbe.

Bellariorum  
medicamentū

Antidotus Satyriaca. Zingiberis, satyrj superioris, singulorum drachmas. viij. scinci caudæ, mei, asari, petroselinj, cardamomi, fetidis. singulorum drachmas. iij. seminis erucæ, cinamomi, singulorum drachmas. ij. hormini, pipertis albi, seminis cnici, singulorum drachmas. ij. floris iun, ci odoratis, spicæ nardj, singulorū. drach. j. sanguinis hircini mystrum. Datur drach. j. cum uino, debilibus cum lacte.

Satyriaca

Cataportia ex xylomacere, ad dysentericos.

Xylomaceris, opij, rhei, singul. scrup. vi. gallæ, myrrhæ, singulorum unc. j. Excipe uino spathite.

Xylomaceris  
cataportia

Antidotus ex corallio, podagrica. Rhei barbarici, pœoniæ, myrrhæ Troglodyticæ, spicæ nardj, singulorum sextantem, folij unc. j. caryophylli grana. xv. anagallidis ruscum id est puniceum florem habentis, quam uocant corallium, unc. s. aristolochiæ longæ trientem, & rotundæ trientem. Datur scrupulus. j. quotidie concoctione probe facta. Incipere uero oportet ab equinoctio autumnali, quod est circa. xxiiij. diem mēsis septembris,

Podagrica anti-  
dota

Corallium ana-  
gallis

& sumere deinceps ad dies quinquaginta, & intermittere diebus. xix. Atque ita facito donec impleti fuerint dies quibus sumis. ccclxv. Sub cane porro in totum uacato, hoc est à xxiiij. lulij usque ad Augustum completum. Abstinentum est à uenore, carnibus maxime porcinis, salsamento, garo, beta, dauco, menta, lactucis coctis, & peponibus: A piscibus capitonibus, gobijs, mollibus & testa intestis: & ab omnibus leguminibus, & ab omnibus simpliciter crassum succum habentibus, & à uino nigro ac uberiore. Lauent autem quotidie, & exerceant se aut pedibus, aut equo, aut uehiculo. At uero qui siccitate habitu præditi sunt, hi etiam pleniore uictu usi fuerint, non læduntur.

Anni tempo-  
rum ratio

Antidotus podagrica, Agapeti.

Folij, rhei barbarici, croci, spicæ nardj, myrrhæ Troglodyticæ, costi, chamædryos singul. sextantē, aloes hepaticæ quincuncem, hyperici, pœoniæ, singulorum quadrantem, aristolochiæ longæ, phu, mei, damasonij, anagallidis, sing. trientē. Utendi modus idē est qui eius quæ ex corallio constat.

Rheon barbaricum

Antidotus Ataclos podagrica. Folij, mei, damasonij, anagallidis ceuleum florem habentis, rubiæ, mastiches, croci, cassiæ, aloes hepaticæ, gentianæ, chamædryos, singul. unc. j. caryophylli, asari, pipertis albi, & nigri, singul. unc. s. spicæ nardj, myrrhæ, Rhei barbarici, pœoniæ radices, aristolochiæ longæ, & rotundæ, singul. sextantem. Vtus idem est.

Ataclos anti-  
dota

Antidotus procli podagrica. Facit etiam ad coxendices. Chamædryos dodrantem, centaurij bessellem, aristolochiæ septuncem, gentianæ sexuncem, hyperici quincuncem, petroselinj Macedonici trientem, mei quadrantem, agarici sextantem, phu unc. j. Mellis Attici heminas. ij.

Procli antido-  
tus

Medicamentum ex. vij. rebus constans, ad eadem. Hyperici, aristolochiæ longæ, singul. unc. j. centaurij, chamæpityos, agarici, singul. quadrantem, chamædryos sexuncem, gentianæ quincuncem. Quidam etiam petroselinj unc. j. Mellis heminam. j. Datur drach. j.

Pastillorum 3.  
species

Pastilli ab orbiculari figura Trochisci nominantur. Species ipsorum iii. sunt. Quidam enim bibuntur, quidam per sedem infunduntur, quidam alinuntur. Ex his igitur qui bibuntur, quidam sistant aluum, aut sanguinem, aut alium quandam fluxum, perfrigerando, aut adstringendo, aut meatum obducendo, aut siccando cohibentes, uelut est is qui ex spina Aegyptia constat, & qui ex seminibus, & consimiles. Quidam dolorem eximunt, aut quoddam sensum torpesciunt, uelut est croccus: aut quoddam diffundunt, uelut hi qui ex aromatibus constant. Quidam splenem, aut rhenes, aut hepar ab obturatione liberant, uelut est is qui ex amygdalis amaris paratur. Ex his autem qui per sedem infunduntur, quidam acres humores obstruunt, ut in dysenteria, uelut sunt qui ex pompholyge, & amylo, & terra samia constant, & perpetua sanæ, aut huiusmodi alicuius sucum infunduntur. Quidam alui aut sanguinis fluxiones sistant, uelut qui ex alumine, acacia, & omphacio, parantur, qualis est pastillus Philippi, aut ex spina Aegyptia constans, qui cum succo rosarum aut plantaginis infunduntur. Quidam urunt, in dysenterijs depascendo proserpentibus conuenientes, ex sandaracha, arsenico, calce, charta usta compositi, qui cum lenisum aut oryzae succo infunduntur, intestino prius muria infusa eloto, ita ut ægroti prius cibum ac potum acceperint, ut ne quid de medicamentorum facultate ad stomachum rapiatur. Viles autem sunt maxime pastilli qui infunduntur, in affectionibus infra umbilicum. Altius enim uis ipsorum non progreditur. At uero qui illinuntur similem quidem uim habent cum his qui infunduntur. Verum qui adstringunt, ad herpetas faciunt, pustulas, intertrigines, sanguinis eruptiones, ulcera fluida, quemadmodum pastillus Andronis, & polydia. Qui uero obtundunt, carbunculis & malignis ulceribus conueniunt, uelut est albus, & qui ex lotijs constat. Qui uero urunt, uelut relati, & qui faustiani appellantur, in depascentibus in pudendis ac ano ulceribus, in pterygijs item, & carne ex crescente conducunt.

Aster pastillus

Pastillus aster. Croci, opij, castorij, spicee nardi, cassiae, myrrhae, sigilli lemnij, corticis mandragoræ, singul. trientem, dauci, apij, anisi, seselis, lemnis hyofciami, styraeis singul. drac. viij. Terito cum uino.

Trigonus pastillus

Pastillus trigonus. Seminibus apij, seminis hyofciami, singul. drach. ij. anisi drach. iij. opij. drach. ij. cum aqua terito.

Pastillus ex seminibus. Anisi, ammij, sceniculi seminis, singul. drach. iij. seminis apij, opij, seminis hyofciami, singulo. drac. ij. Excipe aqua trita.

Pastillus croccus. Anisi, dauci cretici seminis sing. drac. iij. myrrhae castorij, singul. drach. ij. croci, opij, singul. drach. iij. seminis apij, styraeis, singul. drach. iij. hyofciami seminis drach. vj. terito cum aqua.

Pastillus ex rosis. Acaciae, gummi, floris rosarum, balaustrorum, succi hypocyttidis, gallarum, singul. drach. iij. rosarum uiridium succi, seminis plantaginis, singul. drach. j. Lycij Indici drach. j.

Pastillus ex corallio. Seminibus hyofciami, thuris, singulorum drach. viij. terræ samiae, corallij, minij sinopici, opij, singul. drach. iij. amyli, balaustrorum, singul. drach. ij. Excipe succo polygoni.

Pastillus ex succino. Phyllij quincuncem, mastiches trientem, ramentum electri, iridis, croci, singul. trientem, opij sextantem.

Pastillus ex spina Aegyptia. Spinæ Aegyptiae, Rhoeis, thuris, acaciae, aluminis scissi, succi hypocyttidis, gallæ, lemnij sigilli, corallij, symphyti, terræ samiae asferis appellatae, aloes, ladani, æquales partes, uino excipe.

Aphrodisiasti  
con Clidion

Pastillus quem Galenus Aphrodisiasticum Clidion inscribit.

Cytinorum mali punici, spinæ Aegyptiae, balaustrorum, hypocyttidis succi, acaciae, singul. drach. vj. Lycij, thei pontici, opij, singul. drach. iij. myrrhæ drach. ij. Excipe uino myrtitæ, aut decocto rosarum aut myrti baccharum.

Clidion oris  
basij

Clidion Oribasij, Ad dysentericos, & coeliacos. Gallegomphactidis drach

drac.viij.opij drac.iiij. cū aqua efformato catapotia, & iij. aut iiij. præbetor  
 Pastillus ex cornu ceruino, Ad dysentericos, & sanguinem ipuentes.  
 Cochlearum drach.xij.cornu ceruini usti, gallæ tostæ, acaciæ tostæ, sin-  
 gul.drach.v.obol.xij. baccarum myrti nigrarum drach. xv. opij torrefacti,  
 succi hypocistidis, singul.drach.v. cenanthes drach.vj. mandragoræ radi-  
 cis succi, terræ samitiæ alteris, singul.drach.xij. Rhois oblongorum drac.xiiij.  
 malicorij tosti drach. viij. thuris drac. viij. piceæ corticis torrefacti drac. xiiij.  
 hyoscyami seminis tosti drach. x. Rhois coriarij sextar. vj. uini nigri quantū  
 satis est ad coquendum rhoem, quo uinum crassissimū fiat. Hoc autem per-  
 colato reliqua excipiantur, & pastilli formentur.

Pastillus Amazonum. Seminis apij, anisi, singul. drach. vj. absinthij *Amazonū pas-  
 tillus*  
 comæ drach. iiij. myrrhæ, piperis, opij, castorij, singul. drach. ij. cinamomi  
 drach. vj. Excipe aqua.

Pastillus ex amygdalis amaris. Anisi, apij seminis, asari, amygdala-  
 rum amararum, absinthij comæ, equales singulorum partes aqua excipe, &  
 pastillos drach. j. efforma. Dato non febrientibus cum uino mulso. Febrici-  
 tantibus cum aqua mulsā.

Pastillus ex erica splehicus. Erica fructus drach. iiij piperis albi, nar-  
 di Syriacæ, ammoniaci Thymiamatis, singul. drach. ij. Ammoniacum aceto  
 dissoluitur, & siccis adijcitur, & efformantur pastilli drach. j. Datur autem  
 pastillus unus, cum aceti cyath. j.

Pastillus ex uescarijs. Seminis cucumeris satui decorticati trientē,  
 hyoscyami seminis, cicutæ, singul. sextantem, fœniculi, rumicis seminis, cro-  
 ci, nucleorum pineorum, amygdalatum amararum, opij, singul. unc. j. Phy-  
 salidum hoc est uescariorum sextar. ij. uini quod satis est.

Pastillus Philippi, ad dysentericos. Balauitiorum, acaciæ, succi *Philippi pas-  
 tillus*  
 hypocistidis, opij, rhois, thuris, myrrhæ, croci, gallæ, aloes, rhei pontici, ma-  
 licorij, baccarum myrti, singul. drach. iiij. excipe uino austero, & efforma pa-  
 stillos. obol. ij. Dato non febrientib. cum uino, febricitibus, cū aqua mulsā.

Pastillus Musæ. Aluminis, aloes, myrrhæ, atramenti sutorij, singul.  
 unc. j. s. malicorij, crocomagmatis, singul. drach. vj. excipe uino.

Crocomagmatis præparatio. Croci sextantem, rosarum, amyli, myr-  
 rhæ, aloes, thuris, gummi, singul. unc. j. costi, spicæ nardi, singul. drach. j. ex-  
 cipe uino. In crocino oleo etiam alia crocomagmatis præparatio habetur.

Pastillus Nere, ex libris Heræ. Myrrhæ, aloes, croci, singul. drach.  
 viij. aluminis scissi drach. c. excipe aqua.

Polydæ sphragis. Aluminis scissi drach. iiij. thuris drach. iiij. myr-  
 rhæ drach. viij. atramenti sutorij drach. ij. cytinorum drach. xij. fellis taurini  
 drach. vj. alij drac. xv j. habent, aloes unc. j. uino austero excipe.

Pastillus passionis. Squamæ æris drach. xij. æris usti, salis ammoniaci,  
 aluminis rotundi, æruginis rasæ, thuris, singul. drach. viij. uini q̄ satis est.

Pastillus Andronius. Cytinorum drac. x. myrrhæ drach. iiij. gallarū  
 drac. viij. aristolochiæ rotundæ drach. iiij. atramenti sutorij, croci, aluminis  
 scissi, crocomagmatis, Misys, thuris, singul. drachm. ij. Cum uino acerbo,  
 aut aceto terito.

Pastillus faustini. Auripigmenti drac. xij. sandarachæ drach. vj. cal-  
 cis uiuæ drach. viij. chartæ ustæ drac. j. Cum baccarum myrti succo, aut de-  
 cocto excipe, & forma pastillos; & per clysterē in sedem infunde, cum bac-  
 carum myrti, & lentium, & radicū rubi decocto.

Pastillus ex charta. Charta ustæ lib. ij. calcis, auripigmenti, sandara-  
 chæ, singul. unc. j. excipe succo plantaginis.

Pastillus thronus Marcellius dictus. Chartæ ustæ drach. x. sandara-  
 chæ, auripigmenti, squamæ æris, aluminis scissi, singul. drach. iiij. balauitij  
 drac. ij. opij drac. ij. calcis uiuæ drac. xx. omphacij drach. j. succi hypocisti-  
 dis drac. ij. uino myrtitæ excipe, & efforma pastillos ponderis drac. iiij. Ut  
 ubi

ubi coxeris in uino malicorium, & myrti baccas, & rosas, ad tertiae partis consumptionē, præbe in vj. cyath uini pastillum. j. aut simpliciter drac. iij. A

Pastillus ex subere. Gallarum ustarum, chartæ ustæ, suberis usti, panis usti, singul. drac. x. In alio exemplari habentur etiam cornu ceruini usti drach. xv. auripigmenti drac. ij. sandara. hæ, calcis, singul. drac. xv. acaciæ, cerussæ, singul. drac. v. spumę argenti drac. iij. Vino terito.

*Bichynus pas-  
tillus*

Pastillus Bichynus. Malicorij drac. x. cadmię quadrantem, aristolochiæ, gallarum, radicis panacis, iridis, atramenti sutorij, aluminis scissi, chalcitidis, misyos, squamę æris, mannę thuris: Aliqui etiam costi, singulorum unc. j. s. Excipe aceto.

Pastillus ex castorio. Ad ulcera, & nomas depascentes, & fluxiones, Croci, aloes, thuris, singul. unc. j. cytinorum, aluminis scissi, castorij, mannę thuris, æruginis rase singul. unc. j. minij Sinopici lib. j. Excipe uino ueteri.

Pastillus ex castorio, ad colicos. Myrrhæ, castorij, sing. scrup. vj. croci, opij, singul. scrup. ix. anisi, seminis apij, seminis dauci, sing. unc. s. seminis hyoscyami drach. xvij.

Pastillus ex uino & oleo, Ad sedem & pudenda. Cerussę sextantem, spumę argenti quincuncem, thuris, cremamenti plumbi, aluminis scissi singul. sextantem, Vino maris experte terito. Vfus autem tempore uino & rosaceo, aut uino & myrteo oleo dissoluito.

Pastillus ex lapide phrygio, ad pudenda. Lapidis phrygij usti & extincti ter, primum butyro aut rosaceo, secundo uino, tertio melle, sextantem, florum rosarum trientem, malicorij unc. j.

Pastillus ex Lotarijs, Ad sedem & pudenda. Cerussę, amyli, glaucij, croci, aluminis, æquales portiones terito cum succo lotariorum, aut uino.

Pastillus albus. Terrę asteris trientem, pompholygis, cerussę, amyli, singul. sextantem, opij scrup. iij. Excipe a qua.

Pastillus ex Halicacabo. Spumę argenti drac. xxiij. cerussę drac. xij. an. xxi. halicacabi drac. viij. atramenti sutorij drac. iij. aluminis scissi drac. iij. Minij ad colorem quod satis est. Excipe a qua.

Pastillus ex duplici ueratro, qui idem etiam ex duplici Acaciã. Acaciã nigra & fulua, glutinis fabrilis, in alio glutinis piscium, singulorũ trientem, ammoniaci Thymiamatis, glaucij, aloes, singul. sextantem, thuris masculi, ucratri nigri & albi singul. unc. j. Excipe aceto scillitico, usus autem tempore eodem, aut communi dissoluito. Illinitoq; ante & post balneum.

*Criogenes pas-  
tillus*

Pastillus Criogenes. Myrrhę, æris usti, aristolochię rotundę, æruginis rase, squamę stomomatis ferri, uerbenacę rectę, aluminis rotundi, singul. unc. j. Aceti quod satis est. Verbenacam colligere oportet, quum Sol est in Ariete. Fit etiam Emplastrum hoc modo. Pastilli, cerę, colophonis, olei, æquales portiones, aceti quod satis est ad terendum pastillum.

*Melanchlorus*

Pastillus Melanchlorus. Myrrhę, aloes, squamę æris ustę, auripigmenti, aluminis scissi & rotundi, iridis, chalcitidis, misyos, salis fossilis, atramenti sutorij, cerussę, nitri, spumę argenti, panacis radicis, cadmię, malicorij, gallarum, aristolochię rotundę, squamę stomomatis ferri, æruginis rase, singul. unc. j. Aceti quod satis est. Fit etiam Emplastrum hoc modo. Pastilli sextantem, colophonis, cerę, olci, singulorum sexuncem, aceti quod satis est ad terendum pastillum.

*Pantolmius*

Pastillus Pantolmius. Ad chironia & maligna uleera, Itemq; ad fluxiones. Cassię, æris usti, cerussę, spumę argenti, æruginis rase, aluminis scissi, rotundi, liquidis, & laterij, panacis radicis, aristolochię longę & rotundę, malicorij, atramenti sutorij, portulacę, iridis astragalitidis, chalcitidis, misyos, ammoniaci Thymiamatis, salis ammoniaci, rubiginis ferri, squamę æris, aloes, diphyrgis, thuris, gallarũ, sarcocollę, plũbi usti, foliorũ oleę foreos, myrrhę, melantisę liquidę, balauistoris, spinę Aegyptię, sulphuris uiuũ, nitri, rhois rubri, rhois Syriaci, chrysocollę, rhois coriam, acacię, salis spumę,

*A* spume, omphacis, auripigmenti, æquales singulorum portiones. Cum aceto terito sub canis ardoribus, ad dies xxx.

Pastillus Nymphodoti. Aphronitri unc. j. nitri Alexandrini, saporis gallici, sing. unc. j. salis Cappadocici, mastiches, gallarum, singul. drac. iij. inferiorum rosarum, amomi, amyli, singul. unc. j. folij drac. j. aluminis scissi, costij, singul. drac. ij. uini myrtitæ quod satis est.

Pastillus ex Thapsia, Ad Hemieraniam. Succij Thapsiæ drach. xvj. myrtiæ drac. viij. opopanax, euphorbij, singul. drach. vj. nitri, succij parthici, singul. drac. iij. piperis, sagapeni, singul. drac. ij. Aceti quod satis est. Vsu expetente, a ceto illinito, & post horas. vj. lauto. Si uero remissiore uti uelis, æquali cerato excipe, illine, & per diem ac noctem sine.

Pastillus subditarius, Ad dysenteriam, & ani dolores. Terræ Asteris, amyli, singul. quadrantem, croci sextantem, a caciæ, tragacanthæ, sing. unc. j. castorei, thuris, lycij, singul. unc. s. In calidioribus etiam opij. unc. s. Excipe succo psyllij, & pastillos oblongos efforma.

De puluilli qui inspergantur, & de smegmatis. Cap. xlii.

*A*rida medicamenta quæ & puluilli, & catapasmata ab insperatione uocantur, partim ulceribus conueniunt, partim cuti adhibentur. Et ex his quæ ulceribus conueniunt, quædam caua ulcera incarnant: quædam carnem super excrecentem deprimunt: quædam cicatricem inducunt: quædam uerunt ac erodunt: quædam sanguinem sistunt. Quæ igitur incarnant, aut scindida purgando id faciunt, uelut sunt quæ constant ex eruo, aristolochia, itride, panace, myrrha, thure, aloes aut superfluam humiditatem resiccando, uelut sunt quæ ex ære, diphryge, squama æris, charta usta, piceæ cortice, & spina constant. Hæc autem etiam cicatricem inducunt, aut acrimonias & mordacitatem obtundendo, uelut quæ parantur ex pompholyge, amylo, cerus, fa, fece uini usta, lapide speculari, ostreis ustis, terra Samia, & similibus, & quæ ex his compolitorum uires habent. At ex his quæ super excrecentem carnem deprimunt, mitia quidem sunt, quæ ex squama æris, misy, chalciti, de ustis, & galla fiunt. Fortiora autem quæ ex atramento sutorio, ærugine, misy, chalcitide non ustis. Vrentia uero & erodentia, ex calce, & auripigmento, & sandaracha, & fecula, quæ est fexuini usta, componuntur. Omnia uero hæc si in tenuissimum puluillum redacta ulceribus inspergantur, minus mordacia fiunt. Quod uero magis crassas partes habent, tanto magis mordent. Quæ uero sanguinem sistunt, aut adstringendo, aut perfrigendo, aut siccando, aut meatus obducendo, aut urendo, aut crustum inducendo sistunt, quorum materiam in capite de puluillis tradidimus. Porro ex his quæ cuti adhibentur, quædam extergunt & exterunt uelut quæ ex cimo li, apumice, fabæ lomento, ordeaceo fermento, peponum carne, salis flore constant: quædam attenuant ac discutiunt, uelut ex ueratro, alcyonio, sulphure, staphide syluestri, sinapi, pyrethro, rorismarini semine, limnitide siue adarce, & sepiæ testa parata. Sed & hæc ubi calcem & auripigmentum assumunt cum aliquo humore, psilos abolent, & smegmata fiunt: quædam uero capiti adhibentur, ut fluxionem quæ ex ipso defertur resiccant, uelut sunt quæ ex nitro, sale, galla, malicorio & similibus fiunt. Omnia autem smegmata cuti non illitæ adhibere oportet.

Puluillus Capitalis. Erui quincuncem, itridis unc. j. s. mannæ unc. j. & aristolochiæ, squamæ æris, singul. unc. j. s.

Alius. Piceæ corticis drac. vj. thuris drach. iij. pumicis drach. iij. itridis drach. ij. resine siccæ drach. vj. aristolochiæ drach. ij.

Puluillus ex aloë. Aloes drac. vj. erui drach. viij. mannæ drac. iij. gallæ drac. ij. aluminis scissi drach. xij.

Puluillus ex fece uini usta, Manethonis. Cadmiæ usta & lotæ unc. j. terræ Asteris unc. j. fecis uini ustæ trientem, lapidis specularis trientem, thuris trientem. Quidam etiam amyli trientem addunt.

Meditera

*Melitera* Melitera. Oribasij. Chalcitidis, squamæ aris, gallæ, balaustiorum, erui, singul. quadrantem, aristolochiæ longæ unc. j. malicorij, aluminis scissi, singul. unc. s.

Puluillus ex ostreis. Cadmiæ, thuris, singulorum unciam unam, ostreorum ustorum quadrantem.

*Rhoidarium* Puluillus ex thure. Spumæ argenti, thuris, squamæ aris, Rhoidarij, amyli, cerusæ, singul. æquales, porriones.

*Aphroditarius* Aphroditarius puluillus. Thuris, squamæ aris, Rhoidarij, amylicæ, rursæ, singulorum æquales partes.

*Rodia siccum* Rhodia sanguinem siccum, & ad nomas, & carnem superexcresecem; Gallæ crudæ drach. vj. gallæ ustæ & extinctæ uino sicce drach. xij. squamæ aris nigri, sin minus, rubri drach. viij. atramenti futuri drach. xxij. aluminis scissi drach. xxvij. terito ad dies sufficientes.

Puluillus flauus. Chalcitidis ustæ drach. xl. atramenti futuri drach. viij. Misys usti drach. x. aris usti drach. v.

*Pferus puluillus* Puluillus pferus. Misys quincuncem, gallarum trientem, chalcitidis sextantem, squamæ aris sextantem, atramenti futuri unciam unam, graminis rase sextantem.

*Heliocates* Puluillus heliocates, id est sole ustus, adurens. Auripigmenti libræ j. calcis uiuæ lib. ij. terito cum aqua in diebus sub cane, deinde siccatis utitur.

*Floridum* Puluillus floridus. Cyperi drach. viij. myrrhæ drach. xij. sandarachæ drach. iij. florum rosarum drach. ij. croci drach. j. crocomagnatis, aluminis scissi, iridis Illyricæ, singul. drach. ij.

Puluillus ex charta. Ad nomas oris maxime, & ulcera in pudendis. Squamæ aris, chartæ ustæ, singul. drach. viij. auripigmenti, sulphuris uiui, singul. drach. xij. plumbiusti drach. vj. Ad humectiores putredines utere sicco. Verum ad siccas rosaceo subactio. Quandoque etiam melle cum rosaceo.

Puluillus ex oxymyrine. Ad eadem. Rhois coriarij sextantem, foliorum oxymyrines, sandarachæ, singul. drach. viij. foliorum salicis siccorum, malicorij, singul. drach. vj. aluminis scissi, chrysocolle, aloes, chalcitidis crudæ, squamæ aris, auripigmenti, salis communis, sing. drach. iij.

Puluillus Massaliotæ. Nitri tosti, chrysocolle, lapidis Asij, sandarachæ, misys, chalcitidis, aluminis scissi, diphrygis, singulorum æquales partes. Vtere sicco.

*Aesculapius puluillus* Smegma aridum puluillus Aesculapius. Baccarum lauri, nitri Alexandrini, salis fricti, salis cappadocici, ammoniaci Thymiamatis, aphronitri, pumicis, sing. lib. j. ueratri nigri, herbæ lanariæ, pyrethri, feculæ, quæ est fex uiniusti, staphidis syluestris, sinapis, cyperi, aluminis scissi, floris tunc odorati, iridis, gallarum, singul. sexuncem, sampuchilib. j. seminis uiticis, pulegij, farinæ fabaceæ, & lupinorum, singul. sexuncem, chamaeleonis tigris, sulphuris, gummi, thuris, piperis, cucumeris syluestris radicis, manubij, cismolæ, pæoniæ, testæ sepiæ, sceni græci, folij, costi, cumini, euphorbij, spicæ nardi, singulorum quadrantem. At Alexander etiam hæc addit. Salis ex nitri fontibus, salis tragasij, sing. lib. j. adarces unc. j. aluminis liquidi, celticæ, cnicij, grani Cnidij, graminis sicci, bryoniæ sicce, sing. quadrantem.

*Peponaton smegma* Smegma peponaton. Thuris, mastiches, ammoniaci thymiamatis, singulorum unc. j. tragacanthæ unc. j. s. succi uuæ acerbæ, dodrantem, peponis seminis recentis, quadrantem, semidialis sextar. v. ouorum albumina. xxij. iridis trientem. Quidam etiam ueratri nigri sextantem.

Aliter, Critonis.

Lomenti modium. j. simlaginis sextar. iij. trifolij, myrobalsani, iridis Illyricæ, singul. lib. iij. ammoniaci Thymiamatis lib. j. costi lib. j. ouorum albumina. vij. peponum carnis sextar. ij. succi uuæ acerbæ sextar. ij. Misce & efformatos pastillos sicca. Deinde tuls cribratis utere.

Aliter. Tragacanthæ, thuris, mastiches, ammoniaci Thymiamatis, singul.



lingulorum, drach. x. succi uuae acerbæ drach. v. semilaginis sextar. v. albu-  
minis ouorum unc. j. peponum carnis dextantem. Præpara ut dictum est.

Smegma caput fluidum resiccans. Nitri Alexandrini fului quincun-  
cem, salis communis tostii unc. j. s. salis cappadocici unc. j. Hæc aceto acerrî-  
mo subacta in sacculum lineum mitto, & urito in camino, donec ad carbo-  
nes redigantur, deinde refrigeratis ac tritis affricando utere, uinum adstil-  
lans in balneo.

Sapo Constantini. Rosarum siccarum, aloes, gallarum, malicorij, mā-  
labathri, sarcocollæ, singulorum, quadrantem, balaustiorum, myrrhæ, fan-  
darachæ, spicæ nardî, singul. sextantem, costi unc. j. saponis Gallici lib. unā  
Excipe decocto lupinorum.

Pulvis depilatorius, podagricus. Mastiches, thuris masculi, staphi-  
dis syluestris, ueratri albi, spumæ argenti, singul. quadrantem, solij, amyli,  
ueratri nigri, floris lapidis Asij, singul. unc. j. halcyonij, puniceis tostis, cimo-  
liæ, sampluchi, singulorum quadrantem, spicæ nardî unciam unam, Quidā  
etiam aloes unciam unam. His cōtutis, pulvillum in uase adseruato. Viu au-  
tem expetente, oryzæ & ptisanæ succum in ollam mitte, & postquam effe-  
ruerint iniice puluilli unc. j. s. saponis Gallici unc. j. s. auripigmenti, alumi-  
nis scissi, singul. unciam unā, s. sandarachæ unciam unam, s. calcis uiuæ re-  
centis libram unam, Vtatur illitione ter in mense, die lunæ nono, decimo  
nono, & uigesimo nono, per annum unum. Post hunc semel in mense,  
xxix. lunæ die.

#### Illitiones oris. Cap. XIII.

Quanto rarior ac mollior cute, est superficies tunicæ in ore, in tantum  
etiam stomaticorum quæ ori illinuntur medicamentorum usus euari-  
at. Ab initio igitur inflammationis, medicamentis id quod influit repel-  
lentibus opus est, qualia sunt arida quidem, omphacium, galla omphacitis,  
rhœis succus & hypocistidis, alumen, picæ & thuris cortex, balaustia, &  
in summa omnia adstringentia, excepta iniucunda & uenenosa facultate.  
Liquida uero, succus mororum tum rubi, tum eorum quæ sycamina appel-  
lantur. Nucum item uiridum corticis succus, & malorum puniceorum ma-  
ximæ acidorum, & malorum cydoniorum, & mustum aminæum. Mel autē  
in principio, ut permaneant ac durent solum medicamenta miscetur. Quū  
uero constitit humor, concoquentia & moderatè discutientia ammiscen-  
da sunt, qualia sunt crocus, & myrrha, & radicis dulcis succus. At per totū  
hoc tempus quod inter uigorem ac declinationem intercedit, mixto quodā  
ex ambobus opus est, quod & repellat, & discutiat, ac primum quidem præ-  
ualeant repellentia, deinde discutientia. Verum in declinatione solis discu-  
tientibus citra adstrictionem utendum est, qualia sunt nitrum, & aphroni-  
trum, origanum, hyssopum, Thymus, calamintha, iris, bescasa, & similia. Li-  
quor autem tunc sireon, id est sapa sit, tum quæ ex musto cocto, tum quæ ex  
corticis & palmulis sit, & ipsum mustum dulce cum melle. Quum uero ue-  
lut reliquæ super fuerint inflammationis, etiam sulphur uiuum ammiscen-  
dum est. Coquere aut primum oportet liquorem cum melle, ad mellis liqui-  
dioris spissitudinē. deinde sic arida euissime trita inspergere, & postea mo-  
deratè coquere, donec oīa exaëne unita fuerint, & tūc uitreis uasis excipere.  
Illitio stomatica ex moris, simplex. Mororum succi sextar. iij. præco-  
quito ut tertia pars consumatur, & mellis sextari. j. adijcito, ac coquito ad  
crassitudinem mellis.

Stomatica ex moris, composita. Mororum succi heminas vj. coqui-  
to ad strigmentitiam spissitudinem, deinde trita ammisco, croci drach. j.  
myrrhæ drach. iij. succi uuae acerbæ drach. j. aluminis scissi obol. iij. mellis he-  
minam. j. Et ad spissitudinem coquito.

Stomatica ex moris rubi. Sed & ex rubi moris illitio stomatica simi-  
liter præparatur, & magis adstringit.

Stomatica ex nucibus simplex. Nucum uiridium corticis cōtusi fac-  
ci hemi.v. Mellis hemi.j. Coquitur uelut ea quæ ex moris fit.

Stomatica ex nucibus composita. In principio quidem & uigore in-  
flammationum in ore, ad prædictas mensuras succi ac mellis, ammicere o-  
portet croci & aluminis, singul. drach. j. myrrhæ drach. ij. Verum in declina-  
tione ad discutiendum nitri drach. j. sulphuris drach. j.

Stomatica ex succo mali punici. Malorum punicorum nucleos non  
habentium dulcium succi sextar. iij. malorum punicorum acidorum succi  
sextar. ij. mellis sextar. j. myrrhæ Minnæg drach. viij. crocomagnatis, gallæ,  
singul. drach. viij. aluminis scissi drach. iij. iridis Ilyticæ drach. viij. ompha-  
cii drach. vi. præpara uelut eam quæ ex moris fit.

Eademaliter. Malorum punicorum unâ cum putamine contusorū  
succi sextar. vi. Mellis boni sextar. j. aluminis scissi unc. unam, myrræ unc. s.

Stomatica ex musto. Musti sextar. vj. gallæ, aluminis scissi, sing. drac.  
ij. croci, myrrhæ, singul. drach. j. Siquidē mitigare uoles, dulce sit mustum.  
Si uero repellere, auliterum. Quod uero medium est, mediam quodammodo  
do inter hæc usm habet.

Stomatica Aegyptia. Mellis lib. j. olei beßsem, terebinthinæ sextan-  
tem, croci drach. iij. in duplici liquantur uase.

Besafa quid sit  
Harmala

Stomatica ex besafa. Seminis anisi, seminis apii, floris tunci odorati,  
seminis ammij aluminis scissi, iridis Ilyricæ, besafa quod aliqui harmala uo-  
cant, Est autem ruta syluestris, cinamomi, myrrhæ Troglodyticæ, croci, gal-  
læ, sing. unciam unam, aristolochiæ longæ, cassiæ, crocomagnatis, rosæ  
siccarum, sing. uncia unâ, costi, cineris hirundinū recentis, sing. quadranti,  
nardi Indicæ, amomi, sing. unc. s. Mellis quantum satis est.

Iucundæ & utiles potiones.

Cap. XV.

Potiones utiles  
& iucundæ

Iucundæ simulq; uti es potiones, partim ex uino componuntur, inieci-  
in ipsum speciebus quibusdam, uelut pipere, at sinthio, cassamo, & pluri-  
bus alijs ex quibus etiam aliquādo appellationes accipiunt, quādoq; mel-  
le ammixto, quādoq; non: partim ex aqua, in qua decoquuntur mala aut  
rosæ, cum quibusdam succis, uelut uix acerbæ, malorum punicorum, myrti  
baccarum. Ammiscetur his mel optimum despumatum, & conseruationis,  
& iucunditatis gratia, quādoq; etiam utilitatis. Excepto austero & uinoso  
hydromelo, quod in paruis uasis à Cebyra affertur. Hoc enim noui etiam di-  
tra mel parari, quemadmodum rursus Apomeli ex melle solo & aqua, citra  
aliañ aliquam substantiam. Sed & quæ ex uino componuntur, quæ sane  
propomata appellantur, mellis despumati sextar. j. ad quatuor uini sextari-  
os accipiunt, & componuntur ita ut non coquantur. Quæ uero ex aqua &  
succo parantur, si quidem coquantur, unum mellis ad tres liquoris accipiunt  
cuius duæ ferè partes in coctura consumuntur. Si uero non coquantur, unum  
mellis ad duos liquoris accipiunt. Quæ uero non coquantur, eas omnino in-  
solare satis diu oportet, & maxime omphacomeli. Coquere porro eas quæ  
ex aquis sunt conuenit, eo quod propter debilitatem facile mutantur. Om-  
nes autē testaceis uasis paruis picatis excipere oportet, easq; probe cooperta  
reponere in locis supra terrā, usq; ad concoctionē. Utendū autē est attenuan-  
tibus, et aqua probe permixtis. Omphacomeli uero post q̃ effertur uelut  
mustū, & rursus quieuerit, tunc operire oportet. His igitur quæ ex uino cō-  
ponuntur, in non febricitantibus utimur maxime, aut solius uoluptatis gratia  
exceptis his quæ ex scammonia, aut grano enido, aut huiusmodi purgato-  
rijs parantur: aut etiā gratia affectionū eiusmodi, in quibus etiam medica-  
menta ipsis iniecia per os sumere quis possit. Quæ uero ex aquis aut succis  
quibusdam, in febricitantibus: quādoq; uelut iucundis condimentis, quū  
morbus non permittat ipsis ut uino utantur: quādoq; etiā proæt affectioni-  
bus conuenit, quemadmodū Apomelite, ad educendum spiritū, aut mouen-  
dum urinā, aut molliendam aluum, aut attenuandū humorem: hydromelo &  
hydro-

Hydromelum  
ex cebyra

Apomeli  
Propomata

Apomelite uti-  
litas

hydrorofato, in sticulis & febre ardēte, & exolutis ac stomacho male habentibus: omphacomelite & myrtite, & rhodostactio, & rhoite, in coeliacis & dysentericis, uomentibus item ac alijs fluidis affectionibus. His autē etiam pro collutionibus sepe utimur in oris affectionibus.

**Hydromelon ex succo malorum.** Malorum cydoniorum purorum contusorum succi sextar. ij. Mellis sextar. iij. aquæ sextar. vj. Coquito despumans ad tertiæ partis consumptionem. Hydromelon

**Aliud.** Malorum cydoniorum concisorum purorum lib. v. in aquæ fontanæ sextar. x. coquito donec flaccida fiant, & ablata ab igne Vbi frigefacta fuerint colato, & expressa mala abijcero. Aquam autē mensurato, & ad ipsam mellis dimidium mensuræ amisceto, rursusq; coquito despumans, donec octaua pars fuerit consumpta. Quidam etiam ex dulcibus malis similiter componunt hydromelum.

**Hydrorofati compositio.** Rosarum ablatis unguibus lib. iij. aquæ sextarios. v. Mellis sextar. ij. Hydrorofaton

**Rhodomeli præparatio.** Succi malorum cydoniorum sextar. j. rosarum lib. iij. Mellis sextar. iij. aquæ sextar. v. Quandoquidem uero mala eodem quo rosæ tempore non inueniuntur, oportet ipsas rosas suo tempore cum melle componere, & ubi mala apparuerint, totā compositionē facere. Rhodomeli

**Omphacomelitis præparatio.** Succu uugacerbæ sextar. iij. mellis sextar. j. permixta in solato ad dies quadraginta, aut coquito. Omphacomeli

**Myrtite præparatio.** Succu baccarum myrti sextar. iij. mellis sextar. j. Coquito donec tertia pars fuerit consumpta.

**Apomeli ex philagrío.** Fauorum melle plenorum alborum lib. j. aquæ fontanæ lib. iij. s. Confracto fauo a quam cum melle unitam coquito, donec spuma ipsius, & quod uelut cerosum super natat, particulatim ablatum fuerit, & tunc refrigerata diligenter nasalis excipito. Apomeli

**Rhodostactii compositio.** Rosarum a demptis unguibus succi sextar. ij. Mellis sex. j. Coquito despumans ad quartæ partis consumptionem. Rhodostacton

**Rhoite præparatio.** Malorum puniceorum succi sextar. iij. Mellis sextar. j. Coquito ad tertiæ partis consumptionem.

Collyria ex adglutinateria. Cap. XLV.

**V**aria est medicamentorum ocularium materia. Nam & spissi & liquidi succi, & semina & fructus, & plantarum partes, & metallica his iniiciuntur. Ex quibus quædam acria mitigant, & uelut meatus obducunt, ut est pompholyx, spodium, amyllum, plumbum, samius aster, cadmia, omnia lora, & oui candidum, quibus præuacuato capite utendum est. Si enim repletum fuerit, periculum est ne præ distensione rumpantur tunice oculorum. Quæ uero his contraria, & acris naturæ sunt, ea ab obstructione liberant, & diu adstricta euacuant, quemadmodum succi, Cyrenæicus & Medicus, & sagapenum & Euphorbium, & similia. Quædam uero fordida ulcera extergunt, uelut squama æris, æs, chalcitis, misy, fori, flos æris, & stibium, uita omnia. Quædam his uicina extensoria appellantur, uelut est auripigmētum, sandaracha, lapidis Aij flos. Quædam adstringunt. Et quæ quidem moderate hoc faciunt, multiplici usu lippitudinibus, & ulceribus, & fluxionibus conueniunt, uelut rosarum folia, & flores, & semen, spica nardi, foliū, crocus, glaucium, & hypocistis his. Quæ uero adstrictionem fortorem habent, in compositionibus uisum acuentes maxime miscentur, uelut omphacium, cacia, balastia, cytini, gallæ. Quædam concoquunt & discutiunt, uelut myrrha, crocus, castorium, thus, sceni græci succus. Ex compositis porro ocularibus medicamentis, quædam effinguntur, et plasta simpliciter appellantur: quædam arida collyria, quædam liquida existunt. Quæ igitur in massas coacta effinguntur, omnes prædictas materias suscipiunt, & omnibus affectionibus conueniunt. Præparanda igitur sunt maxime uere, Aestate enim uis ipsorum transpirat, hyeme uero dum horridæ ac rigidæ sunt species, non permiscen-

Collyria varia  
ocularum

Plasta ocularia  
Collyria arida  
Collyria liquida

*Aqua pluuias-  
lis*

tur. Conterere autem oportet affuso humore non acervanti, ut ne metallica subsidant, aromata autem supernantent, sed paulatim ut ad strigementorum modum conterantur. Sit autem aqua pluuiialis, tum ob partium tenuitatem tum ob moderatam ipsius adstrictionem: illi non uino aut succo quodam teruntur. Et rursus conterere oportet metallica quidem multo tempore. Quæ uero ex succis constant, modico. Postremum uero post sufficientem leuigationem, adijciendum est gummi, & efformatæ massæ reponendæ in æneis aut uitreis uasis. Utendum autem his quæ ex succis constant itaq. Metallica uero temporis tractu meliora fiunt. At uero arida collyria quædam consumunt ac extersit callos, scius, pterygia, & scabrias, quæ ex chalcitide & æruginæ, & misy cõponuntur. Quædam lachrymas ducit, obturationibus & hebetudinibus uisus conueniëntia, quæ & ex his, & expipere ac spica nardi constant. Quædam præseruant, eo quod influxiones ab oculis arcebutæ, uelut sunt quæ ex phrygio lapide, & sarcocolla, glaucio, aloe, cadmiæ, sibiis & croco parantur. Atq. hæc omnia in tenuissimum puluillum trita ac leuigata oculis adponantur. Cæterum liquida collyria parantur quidem ex melle Attico, opobalsamo, oleo quod tenuium partium est ob uetustatem, sœni, culi succo, felle diuerforum animalium, succo cyrenæico, & pluribus alijs. Commodant autem ad uisus hebetudinem, & suffusiones incipientes, attenuantia, calefaciëntia, & purgâtia. Utendum aut & his, & omnibus acris, capite nō repleto, in sereno, puro, boreali, non ualde frigido, neq. minus calido aere nos ambiente. Porò quæ agglutinatoria appellantur, parantur quidem ex meatu obducentibus, & glutinantibus, & cõstringentibus, aut frigefacientibus, aut adstringentibus, aut siccantibus, uelut est pollen, manna, terra samia, mirra, cochleæ, acacia, opium, cum oui candido. Agglutinantur aut fronti, in quibus nō sub caluaria humor, sed extrinsecus colliit.

*Agglutinatio-  
nis*

Collyrium Monohemcron, Ad incipientes & ueteres lippitudines.

Acaciæ drach. xxxvi. gummi drach. xxxij. cadmiæ drach. xxiij. æris uili & loti drach. viij. opij drach. j. Vino austero terito, discuit & siccatur.

Collyrium Chiacum. Minij sinopici, gallæ omphacitidis, croci, rosarum nouarum exunguis floris, quem thylacæ uocamus, gummi, singul. quadrantem, opij, unc. i. Vino Amineo aut phalerno, aut chio austero terito. Sit autem uinum maris exors.

*Thylacæ in ro-  
sis*

Collyrium Cygnarium. Cadmiæ ustæ & lotæ sex uncem, cerussæ lotæ trientem, pompholygis trientem, amyli sextantem, tragacanthæ, opij torrefacti, gummi singul. sextantem. Aqua pluuiâ terito.

Cygnus Fuluus. Cadmiæ ustæ & lotæ sextantem, terræ asteris sextantem, cerussæ trientem, pompholygis bessem, amyli sextantem, opij sextantem, acaciæ, tragacanthæ, singul. unc. j. gummi trientem. Aqua pluuiâ.

Cignus albus. Cadmiæ unc. xv. cerussæ unc. xvij. opij drach. viij. thuris drach. vij. amyli septuicem, gummi drach. xij. Aqua pluuiâ.

*Pelation*

Pelation ad ulcera. Cadmiæ, cerussæ, singul. drach. xxiij. acaciæ, opij singul. drach. xviij. gummi, tragacanthæ, amyli, singul. drach. ix. amythæ, drach. iij. æris, croci, singul. drach. j. s. Aqua terito.

Collyrium Fuscū Ad suppuratos oculos, & magnas affectiones. Cadmiæ teneræ drach. xxiij. cerussæ drach. xvi. eruginis rasæ drac. xij. sibiis drach. viij. aluminis scissi drach. iij. chalcitidis ustæ drach. iij. nardi Indici drach. iij. omphacij drach. iij. æris drach. j. squamæ æris drach. viij. fructus ericæ drach. xiiij. succi papaueris drach. xxiij. croci drach. iij. castorij drach. iij. mirræ drach. vi. lycij Indici, acaciæ, gummi singul. drach. iij. rosarum recentium drach. ij. s. Vino Falerno aut Surrentino, aut Amineo, aut Chio austero terito. Minitur ter in die, aquosum cum fœni græci succo dilutum, deinde cum ouo aut lacte. Postremo cum aqua, crassius.

Collyrium ex decoctis. Cadmiæ unc. xvi. cerussæ bessem, amyli, opij, tragacanthæ, acaciæ, singul. sextantem, gumi sexuncem, Terito cum decocto rosarum

rosarū siccatū, meliloti, caputū papaueris, glycyrrhizæ, pari ling. mēsurā.  
 Collyrium ex hydrīa, id est uase aquario, Repulforium. Tosi qui in  
 uasis calcfactorijs anēis reperitur lib. iij. cadmiæ ustæ & lotæ lib. j. cerussæ  
 lotæ, pompholygis lotæ, terre asteris lotæ, singul. sexunc. Thuris unc. j. myr-  
 rhæ unc. j. succi seminis lini, psyllij, psilanzæ, sceni græci, singul. lib. j. traga-  
 canthæ, sexuncem, gummi lib. j.

Collyrium Nilamoni. Cadmiæ unc. j. pompholygis trientem, cera  
 sæ lib. j. tragacanthæ, gummi, opij, singul. trientem. Aqua pluuiā.

Collyrium Spodiæcum. Ad inflammationes, fluxiones, & Chemoses,  
 Thuris, stibij, singul. drach. c. cadmiæ, cerussæ, singul. drach. xxiij. terræ Sa-  
 miæ, succi papaueris, singul. drach. iij. gummi drach. xv. Terito cum oleæ ra-  
 mulorū succo. Hunc autem succum sic facito. Teneriora oleæ solia lota, in  
 mortatio moderata aqua effusa tundito, & per linteolum exprimito.

Collyrium ex oleæ ramulis tenerum. Thuris drach. iij. stibij drach. xv.  
 cadmiæ drach. xxvij. cerussæ drach. xlix. terræ Samiæ drach. xvij. opij drach.  
 vi. gūmi drach. j. plumbi usti & loti drach. viij. Excipe succo ramulorū oleæ.

Collyrium ex oleæ ramulis fuluum. Aeris usti drach. xij. sandycis  
 unc. xxiiij. Foliorum oleæ sextantem, opij sextantem, gummi dextantem.  
 Vino spathite aut Amingo excipe.

Collyrium ex myrrha Claudiacum. Glaucij, sarcocollæ, singul. drach:  
 xlvij. croci drach. xxiij. opij, myrrhæ, lapidis hæmatitæ, singulorum drach/  
 mas. vi. tragacanthæ drachmas xlvij. gummi drachmas xvi. Vino Italico  
 excipe. Vfus est cum ouo.

Claudiacum  
collyrium.

Aliud ex myrrha. Ad Rhyadas & Aegylopas. Cadmiæ lotæ, lapidis  
 hæmatitæ loti, singul. drach. xxvij. myrrhæ, spodiij cyprij, singul. drachmas.  
 xxiiij. opij drach. viij. croci drach. iij. Alij drach. viij. habent. Piperis albi  
 grana. xxx. gummi drach. xvi. Vino Italico excipe. Vfus est cum ouo. In re,  
 centibus aquosum adhibetur.

Collyrium Stafrican, profechij. Cadmiæ, gummi singul. drach. xx. sti-  
 bij, atramenti sutorij, singul. drach. viij. opij drach. xiiij. æruginis rase drach.  
 x. piperis albi drach. vi. croci drach. viij. mysios crudi drach. viij. opobalsa-  
 mi drach. iij. Aqua.

Stafrican colo-  
lyrium

Collyrium Hygidiū, Ammonij. Cadmiæ, æris singulorū drach. xvi.  
 cerussæ, castorij, aloes, croci, singul. drach. iij. squamæ drac. v. rosarum flo-  
 ris, plumbi usti, singul. drach. viij. lycij drach. iij. lapidis scissi drach. iij. opij  
 drach. x. acaciæ drach. xl. gummi drach. xlvij. Aqua.

Hygidium

Collyrium Olympicum, aut Olympus. Acaciæ, spicæ nardi, thuris,  
 singul. drach. viij. æris usti ac loti, stibij usti ac loti, cerussæ ustæ ac lotæ, cad-  
 miæ, singul. drach. xij. myrrhæ, opij torrefacti, singul. drach. iij. croci drach.  
 v. æruginis rase drach. iij. lapidis schisti, squamæ rubræ, licij Indici, ompha-  
 cij, singul. drach. j. castorij, floris rosarum, singul. drach. iij. palmularum drac.  
 iij. ossa palmularum usta numero. v. gummi quinquncem, Aqua pluuiā. Ve-  
 rum in aqua macerentur per tres dies ac noctes, calami aromatici, seminis  
 hyoscyami, rosarum siccarum, singul. drach. iij. solij drach. j.

Olympicum  
collyrium

Collyrium Nardinum. Cadmiæ, croci, gummi, singul. drach. xxxvi.  
 æris usti drach. xvij. stibij, acaciæ, singul. drach. xxx. nardi Syriacæ drach.  
 xij. opij, myrrhæ, singulorum drach. xvi. Aqua.

Theodonium

Collyrium Theodonium paruum. Stibij, acaciæ, singul. drach. xx. æ-  
 ris usti drach. viij. cerussæ drach. iij. myrrhæ drach. iij. æruginis drach. ij. alo-  
 es, succi papaueris, lycij singul. drach. j. Aqua pluuiā.

Collyrium Rhinarion. Lapis hæmatitæ, lapidis schisti, singul. drac.  
 xvi. æris usti, cadmiæ, æruginis, singul. drach. viij. opij drach. v. chalcitidis  
 drach. ij. gummi drach. viij. Vino.

Rhinarian

Xyfter. Pumicis usti, misyos usti, ostreorum ustorum, singul. sexun-  
 cem, cadmiæ, opij, chalcitidis usti, croci, aloes hepaticæ, castorij, solij, lin-  
 gul.

Xyfter colly-  
rium

gul.drach.ij.ſtibij,acaciæ ſingul.unc.j.æris uſti trientem, myrrhæ Troglodyticæ drach.iiij.ſpicæ nardī drach.j.ceruſſæ drach.viij.gummi drach.iiij. Aqua pluuiā. Quidam etiam uinum miſcent.

Hecatombe

Hecatombe. Ad cicatrices craſſas. Cadmiæ uſtæ & lotæ, æris uſti ac loti, ſingul.drach.viij.ſtibij uſti,acaciæ fuluæ,gummi,ſingul.drach.xv.aloes,gallæ,aruginis uermiculatæ, caſtorij, lycij,ſpicæ nardī, croci, opij, myrrhæ,ceruſſæ,ramenti obeni,chalcitidis,ſingul.drachmam.j.roſarum drach. lx. Aqua pluuiā.

Collyrium ex cornu. Ex Galeno. Plumbi uſti,cornu ceruini uſti, ſingul.sexantem,ceruſſæ,ſquamæ æris,amylī,thuris,teſtæ ſepiæ uſtæ,traguginis,myrrhæ,gummi,ſingul.unc.j. Aqua pluuiā.

Collyrium ex thure. Thuris ſexuncem,cadmiæ,pompholygis,terræ aſteris,amylī, gummi,ſingul. quadrantem,ceruſſæ ſexuncem,ſquamæ æris trientem,tragacanthæ trientem,opij ſexuncem, Aqua pluuiā.

Libyanum

Collyrium Libyanum. Cadmiæ lotæ,amylī,ſingul.drach.xij.ceruſſæ drach.xij.spodij,pompholygis,terræ aſteris,plumbi uſti ac loti,tragacanthæ,ſingul.drach.viij.opij drach.xij.gummi drach.iiij. Aqua pluuiā & ouorum.xx.albumina. Quidam etiam myrrhæ drach.iiij.addunt.

Aſter Collyrium

Aſter, Magni. Pompholygis,cadmiæ,ceruſſæ,ſingul.drach.xvi.plumbi drach.viij.amylī drach.xviij.thuris drach.x.terræ aſteris drach.xij.myrrhæ drach.ij.tragacanthæ,gummi,ſingul.drach.viij. Aqua.

Vranium

Collyrium Vranium. Terræ Aſteris lotæ quadrantem, ſpodij loti,unc.j.gummi trientem,ſtibij uſti ac loti ſextantem,ſquamæ lotæ unc.j.opij drach.vi.cadmiæ uſtæ & lotæ drach.ij. Aqua pluuiā. Incarnat & repellit.

Collyriū ex ſœni græci ſucco. Cadmiæ, Tragacanthæ,ſingul. beſſem,ceruſſæ unc.xxx.amylī unc xxx. opij unc.j. cum ſucco ſœni græci terito.

Collyrium Cleonis. Pompholygis, plumbi ſingul. quincuncem, croci unc.j.s.ſquamæ ſtomomatis ferri unc.j.gummi ſextantem. Aqua pluuiā. Illinitur aquoſum.

Collyrium ex roſis unciarum.lxxij.

Roſarum uiridium unc.lxxij. cadmiæ uſtæ & lotæ drach. xxiiij. aruginis rafe drach.ij.ſpicæ nardī drach.j.ſquamæ æris lotæ drach.ij.ſtibij uſti ac loti,opij,myrrhæ,ſingul.drach.iiij. croci drach. viij. amylī drach. ij. gummi drach. xxiiij. Aqua pluuiā.

Collyrium album ex roſis. Cadmiæ uſtæ & lotæ,ceruſſæ lotæ,ſingul. lib.j.amylī,opij tragacanthæ,ſingul. quadrantem,aloes unc.j.s.gummi quadrantem,croci unc.j.s. roſarum exunguium ſexuncem, Aqua.

Collyrium ex aloë. Cadmiæ,ceruſſæ,aloes ſingul. dextantem,roſarum uiridium ſexuncem,amylī quadrantem,opij unc.j. tragacanthæ ſextantem, gummi quadrantem, Aqua pluuiā.

Crocium collyrium

Collyrium Crocinum ex roſis. Spicæ nardī,roſarum miſſicarum,aloes. ſingul.drach.ij. hyoſcyami albi drach.j.s. croci drach.iiij.s. glaucij ſexuncem, ſarcocollæ ſexuncem, opij drachmas ij. tragacanthæ unciā. j. Aqua pluuiā.

Collyrium Nili ex Roſis. Roſarum tenerum drach.iiij. croci drach. ij. papaueris obol.j.gummi drach.iiij. Aqua pluuiā.

Lyncus

Lyncus uſum acuens. Cadmiæ,æris uſti, ammoniaci Thymiamatis, ſingulorum drachmas. xij. myrrhæ, lapidis hematitæ, opij Thebaici, ſingulorū ſexuncem, aloes hepatitidis, fellis taurini, galbani, ſagapeni, ſingul. drach.iiij. aruginis rafe, opopanax falis ammoniaci, ſingulorum drach. j. gummi drach. vi. Aqua pluuiā.

Proteus

Proteus ad eadem, & cicatrices attenuat. Cadmiæ,ceruſſæ, chalcitidis crudæ, ſingul. drach. xl. piperis drach. j. s. ſucci Cyrenaci drach. viij. croci drach. xij. opij Thebaici drach. x. ſagapeni drach. xij. oleæ Aethiopice drach. xij. auripigmenti, aluminis ſciſſi, ſingul. drach. viij. myrrhæ drach. xij. ammo

ammoniāci Thymiamatis drach. xx. opopanacis drach. xvi. opobalsami drach. x. gummi drach. xx. Aqua pluuiā.

Collyrium ex succo fœniculi. Cadmię drac. xvij. atramēti Indici drac. xvi. piperis longi drach. xij. & albi drac. xij. succi cyrenaici drach. viij. opobalsami drach. vi. spicę nardi drach. vi. sagapeni, opopanacis, singul. drach. v. opij drach. iij. euphorbię drach. j. gummi drac. j. Terito cū succo fœniculi.

Collyrium ex opobalsamo. Cadmię, cerussę, singul. drach. viij. omphacię drach. iij. piperis albi drach. xvi. opij drach. iij. opobalsami, gummi singul. drach. xvi. Aqua pluuiā.

Thalasserus. Cadmię bessē, æruginis sextantē, atramenti Indici bessē, piperis albi tridentē, succi Medici unc. j. opobalsami sextantē, gummi sexuncē. Aqua.

Collyriū Harmatiō. Ammoniāci Thymiamatis, æris usti, corticis thuris, singul. drach. iij. æruginis drach. j. gummi drachmas. iij. Aqua pluuiā.

Collyrium Malabathrinum, quod & Isotheon. Cadmię drach. xvi. æris usti & loti drach. xij. opij, lici Indici, malabathri, nardi Indicę, croci, aloes, singul. drach. ij. castorij drach. viij. mirrhę drach. iij. acacię stibij, singul. drach. xl. Aqua. Vñs cum ouo est.

Collyrium crassius ex uino. Cadmię, lapidis hæmatitę & schisti, singul. drach. iij. æris usti drach. xxx. chalcitidis drach. xxxij. seminis papaueris drach. xij. papauer aqua feruefacito, & expressum succū adijcito, & uino spathitę aut Ammīneo terito.

Aliud ex uino. Aeris usti, cadmię placitidis, singul. drodrantē, lapidis hæmatitę loti sexuncē. croci, mirrhę, aloes, ammoniaci Thymiamatis singulorum quadrantē. lycij Indici, spicę nardi, singul. unc. s. piperis albi grana. cl. acacię fuluę drodrantē, gummi quadrantē, Vno salerno aut Amīneo terito.

Collyrium ex duobus lapidibus, ad aspritudines. Lapidis hæmatitę, & schisti, cassię, sing. drach. xvij. æris, cadmię, opij, æruginis rasę, singul. drach. ix. gummi drach. ix. chalcitidis usti drach. vj. Aqua.

Collyrium aridum præseruatū, Galeni. Lapidis phrygi in tenues partes concili, & usti in ollula donec partes ignescant, & butyro non ueteri extincti, deinde rursus similiter usti & uino salerno extincti: & tertio usti & melle extincti ac siccati lib. j. æris usti, piperis albi, folij, singulo. unc. j. stibij unc. s. Et ubi omnia leuigata fuerint, & reponere pharmacum uoles, succi balsami nō crassi: prohibet enim hic aridū fieri medicamētū: sed lucidissimi unc. j. adijcito. Utendum autem est ipso, solis palpebris inducū specillo, ita ut tunicę non attingantur, sed solas palpebras apertas medicamentum contingat. Sublinendumq; est non semel, sed sepe, ante & post cibum, & magis ubi iam sensu percipitur lippitudo. Mirū enim est quomodo præseruet præ omnibus alijs medicamentis.

Collyrium aridum ex croco.

Sarcocollę drach. viij. croci drach. iij. glaucij drach. iij. Soepe in die illinito. Quidam etiam aloē addunt.

Aliud aridum. Ad lippitudinem siccam, sycosin, putredines & super excresecētem carnē. Cadmię drachmas. x. chalcitidis drachmas. xx. piperis grana xv. nardi celticę drachmam. j. Cadmiām & chalcitidem terito cum uino, & ubi resiccata fuerint, reliqua adijcito, & in tenuissimum puluillum redigito.

Collyrium liquidum ex Caucalide. Succu caucalidis, chamædryos, coronopodis, quandoq; etiam othonnę, æquales singulorum portiones. Est autem othonna chelidonium magnum.

Aliud Ad Sycoses, & ulcera in angulo oculi magno, & carnē excresecētem. Misys tosti drach. vi. atramenti iutorij drach. iij. mellis Attici sextar. j.

Collyrium liquidum panchrestos Erasistrati, admirandam uim habēs

Thalasserus

Harmation

Isotheon Collyrium

Collyrium ex lapide phrygi Galeni

Othonna quid sit

Panchrestos Erasistrati

ad oculorum affectiones, tonsillas, pudenda, & aures pure manantes. Aeris drach. vi. misyos tosti, myrrhae, singul. drach. iij. croci drac. j. s. piperis drac. j. Vini chij & passi cretici, singul. heminam. j. s. Omnia cum uino terito donec arida euaserint, & infuso passo coquito ad mellis spissitudinem.

Adglutinatoria oculorum fluxione infestatorum. Terrae Samiae, mannae, thuris, myrrhae, & aequales partes oui candido exceptas, & linteolo inducias, fronti imposito.

Aliud. Hyoscyami seminis drachmam. j. opij drachmam. j. myrrhae drach. ij. croci drach. j. pollinis drach. iij. ouorum alliatorum uitellos duos. Oui albumine excipito.

De Emplastris, & his que in cocturas ipsorum mittuntur, Ex Antylo: & de cere ad oleum addende modo. Cap. XVII.

Emplastra uaria.

EX medicamentis quae in emplastra mittuntur, quaedam sunt Terrae, ueluti sunt metallica, & lapidei ac terrae species, feces, cinis, cōchylia. Quaedam oleosa: quaedam lachrymae, quaedam liquabiles: quaedam succi, partim spissi, partim liquidi. Semina uero, & herbas, & radices paucas recipiunt. Ipsa autem Emplastra partim sunt uulneraria, quae inde quod cruentis uulneribus competunt, cruenta appellamus, itemque glutinatoria, & fracturaria. Haec exsiccantibus non summe, sed secundi ordinis completi, & tertii incipientis componere oportet. Qualia sunt salix, quercus, cupressus, piceae ac pini cortex, myrrha, thus, bitumen, aloë, aristolochia, cinis armentorum uitis, cerussa, spuma argenti, & plura ex metallicis. Coquuntur autem ad cōpagē manus non inquinantem, partim uero cicatricem inducunt, quae etiam ipsa ex siccantibus componuntur, efficacioribus quam glutinatoria habent, ueluti sunt res ustum, & squama ipsius, & ferri aerugo, chalcitis, flos aeris ustus, alumen, galla, plumbago, cadmia, pumex, & ostreae. Partim discussoria, ex calefacientibus ac siccantibus moderate, uelut est Aristolochia, thapsia, oleum uetus & raphaninum, mel, opobalsamum, pix, terebinthina, galbanum, sal ustus, salis flos. Partim mollitoria, ex spuma argenti, & adipibus, medullis, oleo ueteri, propoli, ammoniaco, styrace, galbano, bdellio, mastiche, terebinthina, altheae & cucumeris syluestris radice. Partim siccantia, ex sulphure, nitro, sale, cinere, et bitumine. Partim attractoria, ex sale, nitro, propoli, arugine, fermento stercoribus, sulphure, terebinthina. Partim concoctoria, ex cera laudano, uua passa, amomo, croco, thure, pice, mastiche Aegyptia, styrace, myrrha, galbano, butyro, oesypo, adipe, arugine. Partim suppuratoria, ex aqua & oleo, polline, pane triticeo, alica, butyro, adipe suillo ac uitulino, thure, pice, resina. Partim mitigatoria, ex spuma argenti, cerussa, oleo, anetho, chamamelo, amylo, cera alba. Porro cruenta emplastra recentibus adhuc uulneribus ac fracturis imponere oportet, ita ut auxilium insuper ipsis feramus, spongijis posca madidis supra ipsa splenia deligatis: & tertio quoque die soluamus, rursusque eadem splenia, & non alia imponamus. At mollitoria, attractoria, discussoria, insuperque concoctoria & suppuratoria, post cataplasmatum & ceratorum usum adhibentur. Mitigatoria uero etiam ab initio statim in summis doloribus commodant. Ceterum de coctura ipsorum consequenter dicemus.

Cruentorum Emplastrorum usus

Tetrapharmacum

Emplastrum Regium Tetrapharmacum. Cerae colophoniae, piscis, adipis taurini, singulorum pares portiones.

Emplastrum ex semine lini. Discutit & rumpit.

Olei ueteris lib. ij. cerae unc. xx. colophoniae, adipis porcini, singul. lib. j. s. spumae argenti lib. j. cerussae sexuncem, succi seminis lini sexuncem, polinis unc. j. Thuris trientem.

Emplastrum ex melle. Spumae argenti, cere, olei, singul. lib. iij. terebinthinae, lib. ij. mellis, adipis taurini, singul. lib. i.

Aliud. Spumae argenti lib. vi. olei lib. v. s. colophoniae lib. vij. s. cerae lib. iij. s. mellis lib. iij.

Empl.



Emplastrum ex succo. Spumæ argenti lib. vi. Olei æstatis lib. vii. hyē  
 me lib. ix. fœni græci sextar. s. seminis lini sextar. s. althææ lib. iij. Althæam  
 & semina coquito in aqua sextar. xx. donec parum resistit, & ex ipsa lib.  
 iij. ad oleum misceto ac coquito donec bullæ quieverint. Deinde argenti  
 spuma leuissime trita inspersa, lēto igne coquito donec manus nō inquinēt.

Empl. ex polline. Pollinis ammoniaci Thymiamatis, sing. lib. j. resinæ  
 piceæ, ceræ, adipis porcini, singul. lib. ij. succi seminis lini quantum satis est.

Emplastrum ex herbis. Rūmicis, olei strigmentitij, anchusæ quæ cho  
 ros pelethrum uocatur, id est fugerum porcinum: Est autem Onoclea se  
 prem nervos habentis plantaginis, singul. quadrantem, olei lib. vi. adipis  
 porcini lib. vi. Herbe in oleo coctæ abijciuntur, Reliqua cū oleo eliquantur.

Emplastrū ex asphodelis. Radicis asphodeli succi li. j. rosacei, chamæ  
 melini, adipis anserini, sing. sextantē, adipis porcini quadrantē, ceræ triētē.

Emplastrum ex fermento, rumpens abscessus. Fermenti, axungie, sin  
 gul. sexuncē, salis triētē, resing piceæ quadrantē, ceræ triētē, aphronitri unc.  
 j. ammoniaci Thymiamatis sextantem, mellis sexuncem, saponis sextantē.

Dothiene Emplastrum. Ammoniaci Thymiamatis lib. j. nitri Ale  
 xandri sexuncem, aphronitri sexuncem, adipis taurini lib. ij. ceræ lib. ij. te  
 rebinthinæ lib. j. olei ueteris unc. j. aceti quod satis est.

Emplastrum ex Struthio, discutiens strumas. Spumæ argenti, struthij,  
 aristolochiæ, singul. trientem, galbani, squamæ griseæ, aloes, singul. unc. j. man  
 næ sextantem, ammoniaci Thymiamatis sexuncem, resinæ piceæ unc. xvi.  
 aceti scillitici sexta. iij. ad sica terenda.

Emplastrum Smilium, ad Abscessus. Olei ueteris lib. j. s. spumæ ar  
 genti, nitri rubri, salis ammoniaci, lxxiij. siculnei protosiaci, resinæ singul.  
 lib. j. galbani, ammoniaci Thymiamatis, singul. quadrantem, atramenti su  
 torij trientem, ceræ sexuncem, æruginis, opopanax, singul. unc. j. Aceti  
 quod satis est. Spumam argenti & æruginem in oleo coquito donec non in  
 quinet. Deinde ita reliqua adijcito.

Emplastrum ex alijs ruptorium. Ceræ sexuncem, colophonie trien  
 tem, resinæ piceæ quadrantem, adipis taurini trientem, nitri fului unc. j. s. al  
 lii capita pura. xx. Olei sextar. s. Aliū in oleo coctū abijce, & reliqua misce.

Emplastrum ex Apyrano discussorium. Adipis anserini & phasianorū,  
 sing. quadrantē, olei ueteris unc. xxvi. psylli quadrantē, seminis urticæ, radi  
 cis apyrani uiridis, sing. lib. j. ceræ albæ dextantē, emplastri ex succo sextan  
 tē, terebinthine unc. j. Radicē in tenuia frusta cōcisam, cū psyllio in oleo ma  
 cerato, itemq; urticæ semen per diem ac noctem, & tunc ubi coxeris, ipsa  
 quidem abijcito, liquabilia uero resoluta ad oleum ammisceto.

Emplastrum Pyrinon id est Triticeum, Ad duricias & scirrhomata.

Althææ, palmularū siue Nicolaorum, singul. lib. ij. fœni græci, seminis  
 lini, sing. sextar. s. chamæmeli, meliloti, elates, sing. sexuncem, uini Aminei  
 sextar. vi. spumæ argenti lib. j. cerusæ, colophonie, singul. lib. ij. ceræ terebin  
 thinæ, singul. lib. j. olei ueteris lib. v. aque lib. ij. panis siccī tusti & cribrati li.  
 v. Herbe in uino coctæ exprimuntur, & in expresso succo panis macerantur.  
 Sequenti die spuma argenti & cerussa in aqua teritur, deinde adiecto oleo  
 donec non inquinēt coquitur. Postea adijciuntur reliqua. Ablatis ab igne  
 adijcitur panis, & fortiter spāthula agitur. Additur insuper & æruginis  
 raseæ, & floris salis, singulorum sexunx, iridis, aristolochiæ singul. sexunx,  
 terebinthina lib. j.

Pelarium ex recremento argenti. Ad desquamata & alia similia. Cer  
 ra, adipis taurini, singul. quinuncem, recrementi argenti sexuncem, colo  
 phonie trientem, picis, olei, singul. sextantem, Argenti recrementum siccū  
 teritur cum uino aut fœni græci succo. Quod si recrementum argenti non  
 addit, plumbagine utimur.

Emplastrum ex althæa. In podagricis & alijs duricijs. Succī fœni græ  
 ci

Anchusa Cho  
 ros pelethrum

Dothiene

Dothiene cis  
 plastrum

Smilium Ema  
 plastrum

Apyrani re  
 dix

Nicola palmu  
 le

Pelarium

ci, & seminis lini, & althææ, singul. lib. iij. olei lib. ij. Coquito donec succus fuerit consumptus, & adijce colophoniam lib. j. terebinthinæ lib. j. lachrymæ hederæ quadrantem, Post hæc uero hæc soluta fuerit, ablatiis ab igne, inijce ceræ lib. j. galbani trientem, ambo simul confusa, & dissoluta spatula agitata.

Emplastrum cissinum id est hedraceum. Ad fauciatos nervos, & puncturas maxime diuturnas. Squamæ rubræ trientem & unc. s. thuris unciam. j. mysios unc. j. s. chalcitidis drach. iij. acetii heminas. vi. Terito in Sole astituo, donec acetum fuerit consumptum. Deinde soluta ammisce, ceræ bessem olei unc. xvij. lachrymæ hederæ, galbani singulorum quadrantem. Si uero diffusus & nudus sit nervus, pro galbano terebinthinæ sextantem adijce.

Melanchlorum

Emplastrum Melanchlorum, Ad eadem, & ad cruenta uulnera.

Malicorii, æris uisti, gallæ, aristolochiæ rotundæ, salis ammoniaci, squamæ griseæ, aluminis scissi & liquidæ. Alij pro liquido rotundum habent, iris, malyos, atramentum futorij, chalcitidis, eruginis, tæsæ, cadmiæ, aloes, myrrhæ, thuris, radicis panacis, spumæ argenti, cerusæ, omnia æquis portionibus teruntur ætate in Sole cum aceto ad dies sufficientes, & in paltillos effinguntur. Emplastrum autem fit hoc modo. Medicamenti huius sumitur sextans, ceræ sexunx, olei bessem. Si faucitati sunt nervi, oleum sit uetus. In alijs autem commune.

Emplastrum ex Senecione. Succus senecionis lib. ij. olei ueteris lib. j. s. olei cyprini trientem, axungia ueteris lib. j. terebinthinæ unc. j. galbani unc. s. resinæ piceæ unc. s. æruginis, thuris, cæsypii medicamenti, singul. unc. j. squamæ æris scrup. viij. ceræ sextantem, picis naualis unc. xij. Oleum cum succo adstrigmentitiam compagem coquito, addito etiam adipe porcino. Arida uero cum cyprino terito. Galbanum cum cera tundito, & in ollam adijcito. Picem naualem si arida fuerit, tritam ac cribratam ponderato acin spergito. Si uero conteri non possit, cum parte olei dissoluta soletur, & tunc omnia misceantur.

Emplastrum Mnaeæ discussorium. Ceræ, axungia porcina singul. lib. j. colophoniam sexuncem, spumæ argenti lib. ij. Vini boni lib. iij.

Ariobarzanum

Emplastrum Ariobarzanum, ad easdem affectiones. Spumæ argenti unc. j. s. cerusæ lib. j. & quincuncem, aquæ marinæ unc. xxv. olei ueteris lib. j. s. buccinorum ustorum septuncem, & unc. s. ceræ fuluæ dodrantem, terebinthinæ sexuncem, thuris quadrantem, & scrup. iij. s.

Emplastrum ex dracunculo. Ceræ colophoniam, picis sicce, axungia resinæ, singul. lib. iij. ammoniaci Thymiamatis lib. ij. radicis dracunculi lib. v. Radix arida trita, reliquis dissolutis inspergitur.

Pistacium em  
plastrum

Emplastrum pistacium. Ceræ, colophoniam, adipis porcini, hyoscyami foliorum tenerorum, aut succi eorundem, singulorum æquas portiones. Verum in Alexandria sumuntur ceræ lib. ij. s. hyoscyami lib. ij. axungia lib. ij. s. colophoniam lib. j. & magis discunt.

Empl. Myrsinatū. Argenti spumæ, cerusæ, sandycis, plumbi uisti & loti, singul. unc. j. ceræ sexuncem, olei myrti lib. j. uini quod satis est.

Emplastrum ex cerussa aut ex ouis. Ceræ albæ sexuncem, rosæ lib. j. s. spumæ argenti sextantem, cerusæ sextantem, amyli quadrantem, albu mina ouorum. v.

Parhygron

Emplastrum parhygron, Orisassi. Spumæ argenti unc. j. s. cerusæ unc. j. s. ceræ trientem, pinguedinis suillæ septuncem, colophoniam dodrantem, succi seminis lini, olei, singul. dextantem, Mitissime facit ad calcaneorum rimas. In ulceribus autem inquit, uitant, Nam graueolens euadit.

Emplastrum ex cadmia, Cicatricem inducens. Chalcitidis uisæ sextantem, cadmiæ manna, singul. unc. j. ceræ, colophoniam, olei myrti, singul. lib. j. Vini quantum satis est.

Emplastrum phoenicinum id est palmulatum. Axungia ueteris lib. ij. olei lib. iij. spumæ argenti lib. iij. chalcitidis crudæ sexuncem, Chalcitis lib. iij.

nam cum oleo præleugetur in pila commoda, aut etiā in Sole. Postquā  
autem strigenti spissitudinem acceperit, etiam spumæ argenti prius trita  
adiciatur. Postea etiam adeps, & ubi probe contriueris, ad lentum ignem  
coquito, donec non inquinet, palmarum ramis uelut sphatula agitans.

Emplastrum ex Anchusca, ad ambusta. Cerae albæ dodrantem, rosa  
cei, unc. xvij. His liquatis anchusca purpureæ radicis sicca leuissime trita  
uersi inspergatur.

Aliud.

Anchusca radicis uiridis, marrubij comæ, singul. quadrantem, Coquito  
in olei dodrante, & abijcito, Ad oleum autem cerae albæ quincuncem ad  
ijcito, ac dissoluito.

#### Emplastrum pompholygerum.

Pompholygis sextantem, spumæ argenti quadrantem, cum succo semi  
nis lini terito, & ad hæc liquata ac frige facta, ceræ sexuncem, adipis anseri  
ni aut gallinari sextantem, olei chamæmelini sexuncem adijcito.

Emplastrum phycoryche, dolorem eximēs, ad sedem destinatum. Thu  
ris unc. xvij. myrrhæ septuncem, opij drac. iij. aluminis scissi drac. ij. butyri  
drac. iij. ouorum assatorum uitelli. iij. cadmiæ ustæ & lotæ drac. iij. pom  
pholygis drach. vi. ceræ Tyrrhenicæ drac. viij. adipis anserini drac. xvi. me  
dullæ ceruinæ drac. xi. plumbi usti & loti drac. viij. lapidis hæmatitæ drac.  
j. cæsyli liquidi drac. iij. Arida terito cum uino Italico, & liquata misceto.

Emplastrum Amythaonis, Ad distortos ac conuulsos articulos. Est eti  
am attractorium. Ammoniæ, ceræ bdellij, singul. drach. viij. terebinthinæ  
iris lityricæ, galbani, singul. drach. xx.

Emplastrum Aristophanium, Mollitorium. Picis lib. iij. picis naua  
lis lib. ij. ceræ lib. j. opopanacis unc. j. Aceti heminam. j.

Emplastrum ex plumbagine, ad calidas affectiones. Plumbaginis tri  
entem, spumæ argenti sextantem, cerusæ sextantem, ceræ bessem, olei myr  
tei lib. ij. Arida cum uino teruntur.

Empla. Coracum ex aceto mulso ad pudenda destinatū, & ad nomas  
Gallæ sextantem, squamæ unc. j. s. chalcitidis, thuris, singul. unc. j. Terito  
cum aceto ad dies sufficētes, deinde mellis quincuncem misceto. Scorsum  
autem ceratum parato, ex myrte aut rosacei sextante, & adipis taurini bes  
se cere triente, terebinthinæ unc. j. Misceto ac simul conterito & utitor, ue  
lut eo quod ex charta constat, tum per instrumentum ad pus trahendum ap  
tatum, tum per linamentum.

Emplastrum ex aceto & oleo. Spumæ argenti partem. j. olei, aceti,  
singul. partes. ij. Quidam uero. iij. accipiunt.

Emplastrum ex Achate discutiens ac molliens. Lapidis Achate se  
miusti. unc. j. s. ceræ quincuncem, resinæ frictæ quadrantem, olei unc. j.

Emplastrum lsis, ad cruenta uulnera, glutinans, incarnans, & purgans.  
Squamæ gris, gris usti, aristolochiæ rotundæ, singul. drach. viij. aluminis  
scissi drach. vi. salis ammoniaci drach. viij. thuris drach. viij. ammoniaci Thy  
miamatis drac. viij. myrrhæ drach. xij. aloes drach. xij. galbani drachmas. xij.  
succo radicis dracunculi drach. viij. ceræ lib. j. colophonæ lib. ij. olei ueteris  
quadrantem, aceti quod satis est.

Emplastrum Arhena, ad ulcera fordida, impacta & neruos sauciato.  
Malicorij, aris usti, gallarum, aristolochiæ rotundæ & longe, salis ammo  
niaci, ammoniaci Thymiamatis, squamæ gris, aluminis scissi & rotundi, iri  
dis, misyos, atramenti tutorij, chalcitidis, eruginis rasæ, cadmiæ, aloes, myr  
rhæ, propolis, galbani, singul. unc. j. ceræ drach. cc. picis drach. cc. colopho  
niæ drach. c. olei sexuncem. Aceti quod satis est.

Emplastrum ex dictamno, glutinans, ad canum morsus, & ulcera omni  
gena. Spumæ argenti lib. ij. squamæ gris unc. j. s. olei ueteris sextar. ij. diphrye  
quadrantem, gentianæ unc. j. s. aristolochiæ, æruginis rasæ, sing. unc. ij. s. di  
ctamni, gris usti, singulorū. unc. ij. s. colophonæ lib. j. mannæ galbani, aloes,  
singulorum

Pompholyge  
rum

Phycoryche

Aristophanium

Coracum Em  
plastrum

Isis empla  
strum

Arhena empla  
strum

singulorum quadrantem, ammoniaci Thymiamatis sexuncem, propolis sextantem, ceræ sexuncem & unc. s. Oleum cū spuma argenti primū coque re oportet, donec non inquinet, deinde ab igne ablatis iniicere eruginem & squamam æris, & rursus coquere donec non inquinet, & rursus ablatis resinam & ammoniacum cribratum adhicere, & mouere donec seruere delināt, ad ignemq; apponere, & ubi parum efferbuerint, æs & diphryges immittere, & rursus coquere donec spissentur. Deinde ceram indere, eaq; donec non inquinet cocta, propolim adhicere, & paulo post aloem, mannam, dictamnū, aristolochiam, gentianam, singula trita inspergere, ubi parum sunt perfrigerata.

Barbarum  
Emplastrum

Emplastrum Barbarum, ad cruenta uulnera, & fracturis callos obducit. Bituminis iudaici, picis sicca, ceræ, resinæ, singul. lib. j. terebinthinæ sextantem, spumæ argenti unc. j. cerussæ unc. j. s. mame sextantem, opopanaeis sextantem, myrrhæ sextantem, olei quadrantem. Aceti quod satis est.

Emplastrum ex salicibus, glutinatorium, & quod sanguinem spuentibus, & pectore suppuratis in thoracem imponitur. Misys, chalcitidis, cerussæ æruginis, gallæ, aluminis scissi & rotundi, melanteriæ, singul. sexuncem, ceræ lib. ij. resinæ piceæ lib. ij. picis lib. ij. malicorij sexuncem, bituminis lib. ij. foliorum salicis lib. ij. olei rosacei trientem, atramenti sutorij sexuncem, Aceti quod satis est. Quidam etiam terebinthinæ dodrantem.

Emplastrum Nicolai, ad cruenta uulnera, sinus glutinans. Squamæ æris trientem, æruginis rasæ unc. j. spumæ argenti unc. j. s. aristolochiæ longæ & rotundæ, singul. unc. j. aluminis scissi & rotundi, singul. unc. j. atramenti sutorij unc. j. sulphuris uiui unc. j. gallæ omphacitidis trientem, salis ammoniaci unc. j. misys unc. j. origani unc. j. chamaeleonis unc. j. cadmeæ race mosæ unc. j. ueratri albi unc. j. peucedani quadrantem, seminis apij sextantem, radices symphyti unc. j. s. cerussæ unc. j. s. succi Mandragoræ unc. s. chalcitidis unc. j. s. famij asteris unc. i. Thuris masculi unc. j. aloes unc. j. bdellij sextantem, opij. Thebaici sextantem, myrrhæ Troglodytiæ unc. s. ammoniaci Thymiamatis unc. j. foeni græci sexuncem. succi perdicidis sexuncem, ceræ flauæ lib. iij. colophonis lib. ij. resinæ piceæ lib. j. bituminis lib. j. mastiches sexuncem, picis nigrae lib. ij. olei ueteris lib. j. styracis unc. j. opopanaeis unc. j. s. Aceti quod satis est.

Icesium emplastrum

Emplastrum Icesium, ad strumas, & abscessus, & splenem, & articulos, & ad coxendicum morbum Spumæ argenti drach. cxx. olei ueteris sextar. ij. aceti sextar. j. eruginis drach. j. s. corticis piceæ drach. viij. chamaeleonis cum radice drachmas. xvi. euphorbij drach. xvi. succi hypocistidis drach. xvi. propolis drach. xvi. myrrhæ drachmas. xvi. helenij drach. xvi. pyrethri drachmas xvi. ceræ lib. iij.

Neronis emplastrum

Emplastrum. Neronis. Ad plagas, & omnem carnosarum partium dolorem. Olei ueteris lib. j. s. spumæ argenti lib. j. ceræ, resinæ piceæ, singul. septuncem & unc. s. ammoniaci Thymiamatis trientem, cerussæ trientem, galbani, mannæ thuris, myrrhæ, thuris, sing. unc. j.

Emplastrum oxerum multiplicis usus. Picis sicca lib. ij. ceræ lib. j. ammoniaci Thymiamatis unc. j. terebinthinæ lib. s. galbani sextantem, mannæ sextantem, Aceti sextar. j. s.

Aceratum

Emplastrum aceratum id est sine cera, Galeni. Glutinat & concoquit, suppurans ulcera, cum ricinino aut ueteri oleo dissolutum, uelut medicamentum quod linamentis illinitur. Spumæ argenti lib. iij. olei ricinini aut ueteris lib. iij. aceti a cerrii lib. ij. squamæ æris nigrae, chalcitidis, æruginis, singul. sextantem. Spumam argenti cum oleo coquito ad strigementi spissitudinem. Deinde metalla pluribus diebus cum aceto trita adjecto.

Emplastrum ex Metallicis. Chalcitidis unc. j. misys sextantem, squamæ griseæ quadrantem, thuris quadrantem, colophonis sextantem, galbani unc. j. s. ceræ lib. j. olei unc. xv. Aceti quod satis est.

Empla

Emplastrum Harmonia, ad fracturas Chalcitidis trientem, squamæ *Harmonia*  
 æris sextantem, & uncia. s. æris usti unciam. j. Thuris sextantem, olei *Emplastrum*  
 lib. j. Aceti lib. j. Coquito metallica in aceto & oleo donec non inquinent.  
 Deinde thus adijce.

Empla Melinū, Serapionis. Spumæ argenti lib. j. ceræ septuncē, am  
 moniaci Thymiamatis quadrantē, & unc. s. galbani, eruginis, singul. drach.  
 ix. colophonix septuncē. myrrhæ drach. j. olei heminā. j. s. Spumam argen  
 ti coquito cum oleo, donec non inquinet. Deinde reliqua adijcitur.

Emplastrum Anicetum, glutinans discutiens, squamas separans, & ad *Anicetum*  
 distortionē. Baccarum lauri, iridis siccæ, thuris, singul. drach. lx. æris usti  
 drach. xx. nitri, salis, ammoniaci Thymiamatis, singul. drach. xx. pyrethri,  
 staphidis sylvestris, seminis Rosmarini, grani Cnidij, sinapis, stercoris co  
 lombini, aristolochiæ, cumini, æruginis, cyperi, seminis erucæ, singul. drac.  
 viij. Aceti heminas. xij. Terito sub canis ardoribus donec acetum fuerit  
 consumptum. Deinde decocti caricarū crassissimi dodrantem adijce, & ex  
 permixtis pastillos finge & ex sicca. Vsu uero expetente ex ipsis pastillis se  
 xtantem cum aceto tere, & resinæ quadrantem, ceræ Tyrrhenicæ sextan  
 tem, olei sextantem ammiscē.

Emplastrum ex lolio. Picis lib. ij. resinæ picæ dodrantem, ceræ Tyr  
 rhenicæ quincuncem, olei quadrantem, bituminis cribrati sextantem, fari  
 næ lolij sextar. j. Aceti quod satis est.

Emplastrum ex succo Sycamini. Spumæ argenti, picis aridæ, adipis,  
 singul. bellem, terebinthinæ quadrantem, ceræ quincuncem, æruginis ra  
 tæ, opoponacis, galbani, singul. unc. j. olei ricinini, aut fusini, aut ueteris ual  
 de, heminam. j. picis liquidæ hemin. j. succi sycamini cuius fructus sycomo  
 ra uocantur hemi. j. *Sycomoræ fru  
 ctus Sycamini*

Emplastrum duplicis coloris. Aeris usti, aluminis scissi, ammoniaci  
 Thymiamatis, singul. unc. j. ceræ lib. j. colophonix lib. j. adipis porcini lib.  
 j. Aceti quod satis est.

Emplastrum Indicum. Ad nomas & sanguinem spuentes. Ceræ, resi  
 næ frictæ, picis siccæ, bituminis, liquidæ zacynthij, singul. lib. j. cerussæ, chal  
 citidis, misyos, melaniteriæ, aluminis scissi & rotundi, gallæ omphacitidis,  
 malicorij, singul. sexuncem, Aceti quod satis est.

Emplastrum ex cinere Aspidum. Discutit strumas & podagras. Tere  
 binthinæ, lapidis Asij, bituminis iudaici, singul. drac. ccc. lx. ceræ, baccarū  
 lauri, ammoniaci Thymiamatis, aphronitri, adipis utulini, singulorum  
 drach. ccc. lx. lapidis pyritæ, calcis uiuæ, singul. drach. c. lx. cineris Aspidum  
 drach. c. lx. olei ueteris heminas. ij. Medicamento perfrigerato cinerem in  
 spergito. Paratur etiam sine cinere, eo quod aliqui ipsum auersentur, & nihi  
 lominus efficax est propter Asium lapidem.

Emplastrum Leæna siccans & discutiens. Ammoniaci Thymiamatis,  
 plumbaginis, singul. drach. c. sinapis drac. viij. radicis chamæleonis drac.  
 xvi. colophonix drach. c. squamæ æris, radicis herbæ lanariæ, euphorbij, æ  
 ruginis, singul. drach. viij. aristolochiæ drach. xvi. pyrethri drach. viij. Olei  
 ueteris hemi. j. & raphanini quod satis est. *Leæna Empla  
 strum*

Aliud, Leæna ex alto euacans, & humores euacuans. Atramenti futo  
 rij sextantē, aut pigmēti unc. j. ueratri nigri, Thoracū cantharidū, sing. drac.  
 j. s. sandarachæ quadrantem, ceræ lib. j. s. resinæ frictæ lib. j. olei hemi. ij.

Emplastrum Macedonicum. Ceræ, colophonix, picis, adipis taurini,  
 thuris, sing. æquales partes liquefacito, & ab igne ablatis thus inspergito.

Emplastrum Sphæron. Ad Feruida. Cerussæ, spumæ argenti, calcis  
 uiuæ, singul. quadrantem, ceræ unc. j. s. nitri Berenicarij, rosæ ceti, singul. unc.  
 j. Liquefacta aridis affundito & pilulas formato. Vsu uero expetente, olei  
 sexuncem cum ceræ sextante liquefacito, & medicamenti unc. j. addito, &  
 spathula agitato. Frigefacium autem cum aquæ dodrantē collidito. Ego ue  
 ro

ro etiam rosacei quadrantem addo.

Emplastrum ex ochra, Inflammationes arcet, tum his qui sua sponte, tum qui in iudicio torti sunt. Ochra Atticæ lib. ij. ceræ lib. j. spumæ argenti, bessem, uino terito, ceræ, colophonix, picis, resinæ piceæ, singul. lib. j. terebinthinæ bessem, olei lib. ij. Hæc simul in massas formato. Resolvuntur autem hoc modo. Ceræ lib. j. olei ueteris lib. iij. medicamenti lib. j. cum uino conquassato.

Emplastrum ex cedria, glutinans, discutiens, extergens. Ceræ, picis sicæ, singul. lib. j. colophonix bessem, cedriæ sexuncem, liquefacta simul coquito donec non inquinent.

Aliud mollitorium. Ceræ, picis, singul. bessem, colophonix drach. xxv. propolis drach. xvij. cedriæ drach. xx.

Emplastrum è pumice cicatricem inducens. Olei myrthei lib. ij. ceræ lib. j. pumicis usti & uino extincti drach. vi. squamæ stomomatis drach. vi. æris usti, cimolix, singul. drach. v. Supra linamenta adhibetur, & spongia ex aqua superimponitur.

*Paula Empla.* Emplastrum paula id est Quies, ad strumas & inguinum tumores. Ceræ, colophonix, nitri singulorum lib. j.

Emplastrum ex nitro, ad carbunculos. Nitro torrefacti quadrantem, ceræ, olei, colophonix, sing. unci. j. s. succi cyrenæici aut Medici drach. x. imponitur linamentis exceptum dilutum.

Emplastrum ex Anemona. Anemonæ exunguis sextantem, ceræ quincuncem, olei trientem, resinæ quincuncem & unc. s. colophonix lib. ij. s.

*Macherionis  
emplastrum*

Emplastrum Machæionis, Viride. Ad coxendicum morbum, articulos compachos, abscessus. Opopanacis, galbani, æruginis, myrrhæ, iridis, ammoniaci Thymiamatis, aristolochix, singul. unc. j. terebinthinæ, ceræ, olei omphacini, singulorum sextuncem.

Aliud uiride simplex. Resinæ lib. iij. ceræ lib. j. æruginis rasæ lib. s. thuris drach. xxv. Aceti quod satis est.

Aliud Viride. Faciens ad ulcera humecta, et carnem superexcrecentem. Colophonix sexuncem, æruginis rasæ unc. j. s. ceræ sextantem, salis Cappadocici unc. j. rosacei sextantem. Aceti quantum satis est.

Empl. Rutaceum, ad pleuriticos. Rutæ uiridis lib. j. butyri li. j. s. terebinthinæ unc. xv. opopanacis quadrantem, galbani quadrantem olei anethini lib. j.

Emplastrum ex Lixiuo. Ad coxendicum & articulorum morbum, & ad tumorem laxum. Ceræ, olei ueteris, lixiui per calcem excolati, singul. lib. j. resinæ frictæ, nitri Alexandrini, nitri albi, terebinthinæ, singul. sexuncem, Nitra cum lixiuo terito.

Empla. ex nitro. Ad abscessus, & tumores induratos. Olei ueteris, ceræ, aphronitri, saponis, lixiui, singul. li. j. terebinthinæ sexuncem, galbani, propolis, ammoniaci Thymiamatis, singul. unc. j. præpara uelut præcedens.

Emplastrum ex sale. Ceræ trientem, olei lib. j. salis communis trientem, aphronitri trientem, cerussæ bessem, aceti sextantem ad arida contrita.

Aliter Salis communis, nitri singulorum trientem, ceræ, olei ueteris, singul. sexuncem, aquæ marinæ quod satis est.

Empla. ex perna. Soluit tophos. Pinguedinis pernae, suillæ ueteris, ammoniaci Thymiamatis, casei ueteris bubuli aut caprini, adipis taurini, picis naualis quæ de nauibus deraditur, & apochyma appellatur, singul. lib. j. medullæ ceruinæ bessem, cæsypii cerati quadrantem, olei cyprini sexuncem. Vini Aegyptij quantum satis est.

*Apochyma*

Empla. ex Cinnabari. Ad rophos & alios omnis generis induratos tumores. Appellatur pampathes. Spumæ argenti lib. j. olei ueteris sextantem, squamæ æris unc. j. æris usti unciam. j. cinnabaris scrup. xvij. magnetis uiuentis unciam. j. lapidis phrygij drach. vi. lapidis pyritæ, cadmiæ, æruginis rasæ, thuris, singul. unc. j. diphrygis sextantem, aloes. unc. j. s. galbani

*Cinnabaris  
Emplastrum  
Pampathes*

ni unc. j. s. lapidis onitę Schythici scrup. xvij. lapidis hematitę unc. j. ptopo-  
lis lib. j. scrup. xxvij. cerę unc. xvij. lapidis perdicitę unc. j. Aliud exemplar  
perdicitę habet: betonitę unc. j. scrup. vij. gentianę unc. j. aristolochię lō  
gę & rotundę, sing. drach. iij. chameleonis nigri unc. j. dictamni scrup. xliij  
resinę sicce lib. j. adipis struthocameli lib. j. lapides cum spuma argenti teri-  
to, adijciens floris salis lib. ij. particulatim, donec totum fuerit leuigatum.

Emplast. ex nucibus auellanis. Ad tophos articulorum approbatum.

Lixiuij per calcem excolati sexuncę, nuclei nucū auellanarū sextantē,  
aphronitri sexuncę, olei ueteris lib. j. saponis gallici trientē, mellis bessmē,  
candida ouorū. vi. cerę sextantē, terebinthinę sextantē. Terito cū lixiufo.

Ceratum ex Torpedine. Ad podagram, dolorem eximens, admittendū.  
Quinto mensis Martij die, in domo subterranea, in ollam olei communis se-  
tar. ij. mittito, & cum lignis uitis coquito, ubiq; ebullierit, torpedinis piscis  
marini lib. j. inijcito, & sanguinis talpę animalis, quod à quibusdam aspha-  
lax, ab alijs Madaniudan dicitur, trientem. Et simul coquito donec carnes  
piscis dissolutę fuerint aut frictę. Deinde ad excolatum oleum, adijce cerę  
moderatum modum, quo spissitudo quā tenerrima cerati fiat, quod in lin-  
teolum infractum imposito.

Torpedinis  
Ceratum  
Asphalax  
Madaniudan

Emplastrum ex urina muli podagricum. Urinę muli masculi sextar.  
iij. spumę argenti lib. ij. olei ueteris minam. j. Diu omnia terito ut strigmen-  
tina euadant, & coquito donec non inquinent.

Emplastrum ex lapidis Asij flore, philagrij. Ad tumores duos. Peute-  
dani radicis, floris lapidis Asij, qui non si non adfit, salis, ammoniaci Thy-  
misamatis, lanarum succidatum uistarum, singul. unc. j. aristolochię rotundę,  
pumicis, stercoris canini, æruginis rasę, squamę æris, misyos, singul. scrup.  
xvij. castoreij scrup. xvij. myrrhę quadrantem, aceti acerrimi quadrantem,  
cerę unc. xij. s. resinę picę, picis bruti, singul. unc. xvij. s. scrup. vi. Olei  
ueteris quantum satis est.

Aliud ex eadem Galeni. Cerę, terebinthinę, singulorum libram. j.  
lapidis Asij, mannę, singulorum quadrantem, olei cyprini sextantem, aquę  
pileatoris quantum sufficit.

Aquę pileato-  
ris

Emplastrum ex flore salis. Ad arthriticos in declinationibus. Terebin-  
thinę, resinę frictę, resinę picę, cerę, singul. lib. j. picis sicce, aluminis scissi,  
floris salis, singul. lib. s. Coquito in duplici uase.

Emplastrum nutrit, carnem in ulceribus generans. Rosacei, terebin-  
thinę, mellis singulorum sextantem, cerussę, butyri, singulorum unciam. j.  
Alij etiam thuris unc. j.

Nutrix empla-  
strum

Emplastrum Italicum, purgans sordida ulcera, & incarnans. Fici sylue  
stris tenerum corticem in oleo coquito & abijcito, & in oleo cerę fuluę  
quantum sufficit liquato. Vtete, linamentis illito.

Italicū empla.

Emplastrum arrigendū uim habens. Satirij pudendi ceruinę, caudę  
scinici, singul. drach. ij. seminis cruce, pyrethri, seminis roris marini, cerę sin-  
gul. drach. ij. terebinthinę drach. j. oua passerum trogloditarum tria, stellio,  
nestres, olei laurini aut trini quod satis est. Stelliones uiui in aceto maceran-  
tur ad dies. xl. uase infimo desosso.

Emplastrum aureum, ad cruenta uulnera. Thuris, aluminis scissi, sin-  
gul. sextantem, colophonię, resinę, singul. lib. j. olei quadrantem, auripig-  
menti sextantem, Auripigmentum cum aceto teritur.

Emplastrum ad Fracturas, Orisassj. Picis bruti lib. j. & trientē, Spu-  
mę argenti libram. j. & trientem, thuris bessmē, terebinthinę quincuncem,  
adipis taurini lib. j. & trientem, galbani, opopanacis, sing. unc. j. cerę trien-  
tem, olei ueteris lib. j. Aceti quincuncem.

Empla. ad Fracturas, & cum uulnere, & sine uulnere. Ex heracliida. Pi-  
cis aridę minam. j. spumę argenti minam. j. mannę minam. s. adipis uituli  
ni minam. j. cerę Tyrrhenicę unc. xxvi. opopanacis drach. viij. æruginis ra-

F a se,

fiæ, æris cyprij, singul. quintam & decimam minæ partem, Terebinthinæ minam. j. s. olei ricinini aut ueteris heminam. j. Aceti hemi. s.

Oesypiliquid  
preparatio

Oesypiliquidum Medicamenti præparatio. Meliloti trientem, cardamomi sextantem, lanarum ualde sordidarum sexuncem, In uini sextar. ij. ad triduum macerata coquito donec parum super sit, & facta collatura, ad unum olei quadrantem misceto, et coquito donec parū de uino restet, & tunc inijce colophonix dextantem, terebinthinæ dextantem, Quidam etiam ceræ dextantem miscent, & hyssopti herbæ unc. j. cum alijs coquant. Alij, lasnas uino lauant, & uinum cum sorde, quæ etiam pinon uocant, siccant. Vñ uero exigente, ex ipso quadrantem consiciunt, & reliqua uelut dictum est.

Rinos

De Ceræ ad oleum addendæ modo.

Ceræ & olei  
in compositio  
nibus modus

Si uelis unguenta præparare uelut ea quæ acopa uocantur, quadruplum oleum ad ceram immittes. Si uero quemadmodum in fracturis, molle ceratum efficiamus, duplum. At si medicamentum emplastri forma facere uoluerimus, tunc æqualem olei modum ad ceram misc ebimus, si aer ambiens moderatus fuerit. Sin cera uetus sit aut squallida, & aer ambiens frigidus, paulo plus olei sit quam ceræ: quemadmodum ubi cera pinguis fuerit, & aer ambiens calidus, paulo copiosior cera quam oleum sit. Hoc autem paulo plus, duodecima pars sit, in utramq; à medio & æquali modo partem. Nam tunc. xi. aut. xij. olei uncias, ad ceræ lib. j. miscebis.

Ex antylo, de coctura medicamentorum, quæ in Emplastra mittuntur. Spuma argenti in medicamentorum cocturis cum oleo coquitur. Operet autē ipsam tritam, rursus cū oleo leuigare, ut strigementitia euadat. Et postea sic coquere ad lentum ignem indefinenter mouendo. Principio igitur intumescit, & in bullas exurgit. Vbi uero prope accessit ad sufficientem cocturam, colore feculentior sit. Modū autē cocturæ accipit, quæ ex tumore confidet, et non amplius manus inquinat. Plumbago similiter ut spuma argenti coquitur. Modus cocturæ ipsius est nō solum ut non inquinet, sed etiam ut ex igneo colore, in fuluum & ualdè floridum transeat.

Aesustum coquitur nō à principio immissum, sed ubi semicoctum iam est emplastrum. Modus cocturæ est, si non ualde modicum immittatur, ut colore præualeat, & emplastrum fuluum efficiat.

Squama æris coquitur ut æs, & eodem tempore immittitur, & eandem cocturæ rationē habet. Nisi n. color eius præualuerit, & emplastrū fuluū effecerit, nondum iustam cocturam habet. Sed & ferri Squama eodem tempore inijcitur, & fuluum colorem inducit. Sori & diphryges immittuntur etiā ipsa in medio cocturæ. Modus autē diphrygis idē est qui squamæ æris, ut colore præualeat. Sori uero nullum proprium habet modum. Omnibus autem communis modus est, ut non inquinans fiat emplastrum.

Chalcitis similiter ut æs coquitur, & cocturæ ipsius modus est ut fuluus quodammodo & magis punicum faciat emplastrum. Flos æris similiter ut æs coquitur. Modus autem cocturæ communis est. Atramentum sutorium in media coctura immittitur. Et dum coquitur, liuidiorem emplastri colorem facit. Si uero non sint alia quæ ipsi reluctantur, nigrū emplastrū facit.

Misy in fine inijcitur. Proprium autem modum nullum habet.

Auripigmentum & Sandaracha in fine cocturæ immittuntur.

Plumbumustum in media coctura inijcitur. Cerussa in alba emplastro in fine inditur. Sic enim colorem conseruat, & magis albefacit. Verum in nigra à principio. Dum enim amplius coquitur, nigrum euadit.

Aerugo in uiridia emplastra post cocturam inijcitur. In quibusdam uero omnino non in ollā immittitur, sed ad ipsam in pila leuigatam & manentem reliqua euacuatur. At in melini coloris emplastris, ubi semicocta est preparatio inijcitur. Moderatam enim cocturam adeptam, melinum colorem inducit. Verum in his quæ duplicem faciē, ac geminum colorem præferunt, statim ab initio æruginem in coquimus. Perleuerans enim in coctura primum



primum melinum colorem inducit. Deinde duplicem faciem representans, postremo fulvum colorem efficit.

Alumē plerūq; post cocturā iniicitur. Propriū cocturæ modū nullū habet. Minium immittitur in fine. Cadmia & Pompholyx iniiciuntur in principio. Sal & Nitrū in medio cocturæ. Sulphur in fine. Coctura uero lupulus emplastra nigrefacit. Terra omnis & lapides immittuntur plerūq; in fine. Pumex itē in fine. Conchylia quoq; uita in fine iniiciuntur. Oleū si in principiis injectū fuerit ad resinā aut picē liquidā, emplastrū nō spissat, Oportet igitur ubi spissata fuerint quæ coquuntur, ita oleū injicere. Pinguedines reliquas nō falsas circa mediā cocturā immittere oportet. Ex unguētis lirinū cocturā fert, Cyprinū & Rosaceū minus. Reliqua penitus nō. Quare in fine cocturæ immittēda sunt. Cera nō coquitur per se sola. Cōbūritur. n. Neq; cū resinā liquidā, aut picē liquidā. In spissata. n. manet. Sed aut oleo puro, aut oleoso alicui, cū quodā metallico cocto super iniicitur, aut resine, aut picis præcoctæ, & prius spissatæ cū alijs quæ injici debēt. Resina sicca cū cera iniicitur. Liquida uero præ omnibus alijs ipsa per se ipsam coquitur, sinō ualde modica assumatur. Pix præ alijs omnib. immittitur. Modus autē liquidae est, ut dū coquitur spissetur. Sicca uero maxime cū aceto, ut nō amplius bullas emittat, neq; intumescat. Pix naualis trita, & superfluitatib. quæ in ipsa sunt per cribrū separatis, cocto emplastro inspergitur. Si uero mollis fuerit, cū oleo dissoluitur. Verū prior ratio exactior est, eo q; in posteriore potius nō seruetur. Bitumē coquitur à principio immixtum. Nō autē oportet ipsum leuigare, quoniā aspretudines ficus granis similes habet. Quare in acillas partes frāgitur, & in aceto coquat, ita ut nemoueatur, donec nō amplius bullas emittat. Ego uero inquit Timocrates, in oleo coxi, & successit.

Propolim mollire oportet & coquere. Nā ex coctura penitus nō confunditur. Si uero etiā cerā Emplastrū suscipiat, cū cera propolim, quæ admodū etiā Galbanū cōtulum injicere oportet. Ammoniacū circa mediā cocturā iniicitur. Oportet autē, si teri ac cribrari potest, tenue hoc inspergere. Sin minus, cū humore aliq; leuigare, & sic injicere. Si quidē ad cruetā uulnera dicatū natū sit emplastrū, cū aceto aut uino: Si uero fistulare sit, aut strumis dicatū omnino cū aceto. Si uero molle, qualia sunt ea quæ ad annum parātur, cū aqua. Deinde ita leuigatū alijs perfrigeratis affūdere, ut ne effervescat. Opō, panax iniicitur lōgē posteriore ammoniaco. Omnino uero modica coctura opus habet. Galbanū cocturā omnino nō fert. Sed ubi nō in quinās factū fuerit emplastrū, tolle ab igne oportet, & ipsum mollitū injicere. Sagapenū in mortario tūditur, & ubi tenerū sit cū emplastro emollitur, postq; ab igne fuerit ablatū. Aloe inspergitur post cocturā. Papaueris succus pridē in modica aqua maceratur, Deinde in pila teritur, atq; sic ad ipsum infunditur etiā emplastrū. Thapsia postrema inspergitur. Aut cū humore aliquo teritur. Bdelliū leuigatū inspergitur. Postq; ab igne ablatū est emplastrum. Si uero pinguescit, & leuigari nō possit, similiter ut sagapenō cōtulum ipsum, & ad emplastri formā redactū, cū emplastro molliemus post cocturā. Thus & Manna in fine cocturæ inspergitur, trita cū modico melle, aut aceto, aut aqua, aut uino, si humorem suscipiat emplastrum. Myrrha perfecta iam coctura iniicitur. Semina, Radices & herbæ nullam cocturam sustinent. Ad trita igitur, & in pila permanentia, liquata affunduntur.

De Malagmatis & Epithematis. Cap. XVIII.

Malagmata

**M**ALAGMATA appellata partim medijs corporis partibus imponuntur diu in inflammationis, aut induratis, aut feruentibus, aut perfrigeratis, aut fluxione laborantibus: partim articulis compactis, aut nervis perfrigeratis, aut etiā alijs in scirrhus induratis partibus cōueniunt. De his igitur & in capite de emplastris dictū est, & in capite de Acopis dicitur. Ex his autē quæ medijs partibus conueniūt, quæ sanē etiā propriē Epithemata appellantur, ea quidē quæ stomacho et hepati adhibētur, qualiacūq; tandē fuerint, etiā corroborari

Epithemata

te facultate per adstringentia opus habent. Nam sine his periculum uitæ sequitur, quum illa communia ad uitā conseruandā opera habeant. Vnde ex aromatibus maximè componuntur. Stomacho igitur aut non concoquēti, aut debili, aut inflato, epithemata ex seminibus, & meliloto, & aloë, & absinthio, & sampsocho, & nardo, & mastiche imponuntur. Hepati uero, ex myrobalano, ammoniaco, adipibus, & chamæmelino. Spleni autē, quæ ex calce, auripigmento, cappari, salicibus, cardamomo, erugine, ammoniaco, & aceto parantur. Quod si fluxione laborent partes circa uentrem, quæ ex cenanthe, alumine, melino, et alijs adstringētibz componuntur. Nam et hæc per abusum in cōmuni Malagmata appellant, etiam si contrariam his quæ molli re possunt facultatē habcant. At ubi feruēt uiscera, uelut in febribz ardentibus malagmata ex croco, rosaceo, succo seminis lini, aut foridis ut polygoni, adipe lussillo, & spuma argenti cōueniunt. Perfrigeratis uero quæ ex opobalsamo, folio, cassamo, pipere, parantur. Thoraci aut in sanguinis refectionibus, adstringētia & siccantia, ex alumine, & salice, & bitumine cōposita cōueniūt. In tabe uero, ea quæ ex baccis lauri, marrubio, cardamomo, & calce sunt. Malagma ex Meliloto. Croci, nardi celticæ, cypri, cardamomi, iridis, myrrhæ, singul. sextantē, meliloti lib. iij. ammoniaci Thymiamatis lib. j. ceræ lib. iij. terebinthinæ lib. j. cyprini lib. iij. gleucini lib. ij. bdellij sexuncem. Quidam etiam cypheos sextantem, Vini quod satis est.

Polyarchium

Malagma polyarchion, ex libris de compositione medicamentorum secundū locos Galeni. Ceræ, terebinthinæ, bdellij, ammoniaci Thymiamatis, cardamomi, cypri, singul. minā. j. meliloti, amomi, nardi Indicæ, croci, myrrhæ, thuris xylocinnamomi, sing. drach. xxv. olei cyprini hemi. j. Vini Italici quantum satis est. Præpara & utere quāq; meraco. quāq; resolutō cū ce rato cyprino Polyarchion aliter. Xylobalsami, costi, iridis, cypri, myrrhæ, floris iunci odorati, cardamomi, thuris, spicæ nardi, mastiches, styracis, bdellij, amomi, folij, croci, cassiæ, pyrethri, aristolochiæ longæ, singul. unc. j. ammoniaci Thymiamatis unc. j. s. resinæ frictæ quadrantē, terebinthinæ lib. j. medullæ cervinæ sextantē, ceræ lib. ij. opobalsami sexuncem, Vini bellem.

Phylagrianū

Malagma Philagrianū. Croci unc. j. s. aloes, ammoniaci Thymiamatis, bdellij styracis singulorum. unc. j. adipis anseris sextantem, ægypti medicamenti trientem, palmularum sextantem, libram. j. nardini sexuncē, melini sexuncem. Vini quantum satis est ad arida terenda. Malagma odoratū. Croci, aloes, mastiches, absinthij, styracis, cenātes, cassami, caryophylli, sing. quadrantē, nardini lib. j. ceræ lib. j. melini sexuncē, palmulas xij. Vini q. satis est. Malagma Baion. Cardamomi, cassiæ, cenātes, celticæ, balaustrorū, propolis, singul. scrup. viij. herbæ sabinæ, cassami, amomi, sing. scrup. vi. floris iunci odorati scrup. xvij. iridis scrup. iij. caryophylli scrup. j. s. suffimēti liliacei sextantē, thuris, myrrhæ, sing. unc. j. ladani sexuncē, bdellij, mastiches, aloes, nardini, lētiscini, sing. unc. s. resinæ aceris, resinæ piceæ, terebinthinæ, sing. quadrantē, opobalsami unc. j. ammoniaci Thymiamatis scrup. vi. ceræ sextantē. Succulēta & arida cōtusa oleo cenāthino terito. In ælio exēplari etiā piperis scrup. xv iij. habetur. Quidā etiā moschi scrup. j. habēt.

Baion malagma

Malagma Galenium. Croci unc. s. aloes unc. j. mastiches quadrantem, seminis absinthij scrup. viij. cenanthes scrup. viij. palmulas magnas iij. ceræ quadrantem, olei melini sexuncem.

Masfuch  
Masuaphij

Malagma Brythron. Styracis quincuncem, malorum cydoniorum unc. xx. masfuchæ aut masuaphij, croci, singul. drach. x. micarum panis, cypheos, singul. drach. v. cenanthes sextantem & unc. s. cassami, absinthij, singulorum drach. x. caryophylli scrup. xv. ammoniaci Thymiamatis scrup. x. opobalsami scrup. vi. s. nardini quincuncem, colophonis, gleucini, melini, singul. sextantem, rosacei drach. x. propolis quincuncem, terebinthinæ sextantem, mellis cochleæ. x. folij drach. x. spicæ nardi drach. x. ceræ septemcem & unc. s. Vīno salerno aut Amīnæo terito.

Malagma

Malagma Nili Splenicum. Et ad omnem duriciam. Cere lib. j. ammoniaci thymiamatis lib. j. olei cyprini lib. j. croci unc. s. Alij unc. j. habent. Aceti quod satis est.

Malagma Citrinū. Cere, colophonias, sing. li. j. ammoniaci thymiamatis, auripigmēti, calcis, aluminis, aceti, sing. cyath. viij. Arida terito cū aceto.

Malagma Tonsoris. Picis sicce libram. j. cere, resinæ picæ, ammoniaci Thymiamatis, nitri, baccarum lauri siccarum, adipis taurini, singulorum libras. ij. farinæ foeni græci sextar. j. pollinis sextar. j. radicis chamaeleonis nigri aridæ libram. j.

Malagma ex stercore caprino, Orisabij. Ad splenicos, hydropicos, hepaticum induratum. Cyprini aut uetustissimi olei lib. ij. cere lib. ij. Pilularum stercoris caprini, baccarum lauri decorticatarum, iridis Illyricæ, sing. sextar. x. terebinthinæ lib. j. sinapis, nitri, cyperi, seminis raphani, corticis radicis capparis, singul. quadrantem, colocynthidis medullæ sextantem, foeni græci unc. j. Quandoq; arida excipiuntur liquatis. Quandoq; aceto subacta. Si uero fluat uenter, colocynthis non addatur.

Malagma ex stercore caprino, Spongiola. Ad hydropicos. Picis brutæ lib. ij. s. nitri lib. j. colocynthidis medullæ, pyrethri, opopanax, grani, Cnidij, singul. quadratæ, corticis radicis capparis, thuris, iridis, adipis taurini, elaterij, squamæ æris, seminis apij, lathyridum, singul. sexuncem. baccarum lauri, sextar. s. farinæ foeni græci, unc. s. fellis taurini sextantem, olei cyprini sextar. s. cere lib. j. resinæ frictæ lib. ij. caprini stercoris montani, seminis rotis, cypri, cardamomi, singul. sexuncem. Malagma ex baccis lauri. Cere, resinæ, picis, baccarum lauri, adipis taurini, singul. lib. j. nitri, ammoniaci Thymiamatis, singul. sexuncem, Aceti quod satis est.

Malagma ex seminibus. Cardamomi, cyperi, herbæ sabina, nitri, baccarum lauri, cassiæ, meliloti, foeni græci, nardi celticæ, seminis apij, sampsuchi, anisi, radicis panacis, thuris, ammoniaci Thymiamatis, terebinthinæ, singul. quadrantem, mellis, cere, nardini, singul. lib. j. adipis taurini lib. j.

Malagma foetidum, pleuriticum. Resinæ picæ lib. j. cere, rutæ, uiridis, cyprini, singul. sexuncem, sulphuris uiui opopanax, sagapenij, singul. drac. iij. Quidam etiam galbani drac. iij. Malagma ex sampsucho. Cere lib. j. terebinthinæ lib. ij. sampsuchi, baccarum lauri, foenigræci, singul. sextar. j. Nardini quod satis est. Malagma Apollophean. Ad hepaticos.

Cere drach. lxxx. terebinthinæ, mannæ, singul. drach. xi. Irini fece conquassato, & pilam illinito. Malagma Copton, id est quod contunditur. Ad stomachi & hepatis duriciam. Propolis sexuncem, styracis sextantem, mastiches unc. j. terebinthinæ unc. s. fecis nardini quantum sufficit.

Malagma ex oenanthe. Oenantes, aloes, croci, acaciæ, aluminis scissi, rosarum siccarum, succi absinthij, gallæ, omphacij, rhois Syriaci manna, singul. drac. j. olei myrti, cere, singul. lib. j. palmulas magnas. u. uini amincei quod satis est. Malagma Antylium. Aluminis scissi unc. s. aloes unc. j. mastiches scrup. j. oenantes scrup. vi. omphacij, scrup. viij. rosarum siccarum scrup. viij. rhois Syriaci scrup. x. ping. Aegyptiæ scrup. x. balaustiorum scrup. xx. gallarum scrup. xv. cere quincuncem, olei melini quod satis est.

Malagma ex uinaceis. Croci, sandicis, oenantes, singul. unc. j. aluminis scissi trientem, balaustiorum, omphacij, rosarum floris, baccarum myrti aridarum, singul. sextantem, cere albæ lib. j. olei melini lib. ij. malorum cydoniorum trientem, palmulas Nicolaos. x. uini Amincei quod satis est. Vinaceorum aridorum bessum. In usu medicamenti quadrantem, cum cere unc. j. permisceto. Malagma Anethinum. Anethi uiridis sexuncem, meliloti sextantem, chamæmeli sextantem, papaueris capita uiridia. x. Coquito, & decocti lib. iij. & totidem olei misceto ac coquito. Et ubi consumptum fuerit decoctum, adipis porcini recetis li. ij. adiecto. et seorsum scillæ affatæ internæ partis sextantem, & medullæ ceruinæ sextantem terito, ac omnia

**Inta misecto.** Malagma Ambrosia, sinicens febrem. Spuma argenti  
ib. j. adipis porcini recentis sexuncem, succi seminis lini sexuncem, cerat  
bæ dodrantem, rosacci lib. j. mellis quadrantem, croci unc. j. Quidam etiam  
utellos ouorum crudos. x.

*De Acopis, illitionibus, dropacibus ac Sinapismis.* Cap. XIX.

**A** Copa dicuntur ex eo quod primario ad lassitudinis sensum inueta sunt,  
uelut est Tensiuus, ulcerosus, & is sensus qui ossa lassare uidetur. Ve-  
rum etiam alijs pluribus conueniunt. Quaedam enim ex ipsis calfactoria  
sunt: quaedam mollitoria: quaedam lancinantia. Calfactoria igitur ex pipe-  
re, pirethro, rorismarini semine, & similibus parantur, neruorumque affectio-  
nibus conducunt, & perfrigerationibus uehementibus, & quæ difficulter  
recallescunt. Mollitoria uero ad duricias & scirrhos, & compactos articu-  
los, quorum materiam in capite de emplastris indicauimus. At lancinanti-  
bus, quæ ex adarce, & rorismarini semine, & euphorbio, & grano Cnidio  
similibusque componuntur, in diuturnis affectionibus, & quæ ægè exigi  
possunt, & in quibus Sinapismus etiam conuenit, utitur. Cæterum om-  
nia Acopa spissitudinem inter cerata & emplastra mediam habere conue-  
nit. Sed & Illitiones acopis consimiles, liquidiores quodam modo compa-  
gem habent. At Dropax duplici modo præparatur, altero uelut empla-  
strum, altero uelut malagma. Quidam etiam calidum ipsum illiunt. Verum  
materiam acopis & emplastris similem recipit. Vsum autem exhibet cata-  
plasmatis, diuturnis conueniens affectionibus, iisdem quibus & Sinapis-  
mus. Sed & ante Sinapismum adhibetur, ut corpus ad sinapim præparet:  
& post Sinapismum, ut affectionis reliquias excindat. Sinapismus porro ma-  
teriâ non habet uariâ, sed efficacissimus est in diuturnis maxime affectionib.  
post deuictam aliorum auxiliorum facultatem competens. Commodata uo-  
tem maxime Cephalææ, alterius capitis partis affectioni, comitiali morbo,  
uertiginibus, insanix, capiti adhibitus. Verum in anhelatione, rectæ cerui-  
cis spiratione, & tussi ueteri, thoraci. At in diuturna destillatione, etiam ca-  
put cum thorace sinapismo integendum est. Sed & stomachum & uentrem,  
in diuturnis ipsorum affectionibus, sinapismo integimus. Est & conueniens  
auxilium coxendicibus & podagris, & omni parti resolute, aut alias perfri-  
geratæ, ut ægè recalcari possit. Modus autem operationis medicamentif  
sit, ut æger quidem uehementer doleat, caro uero liuidior ac altior fiat, &  
ut post balneum leniter pustulæ erumpant. Si uero etiam sensus perierit a-  
nimaduertere oportet, & frequentius retegendo considerare. Nam non  
percipientes, immodice se uri ignorant. Quin & in acutis morbis lethargi-  
cos, & alias in profundiores somnum delatos, & sopore detentos, sinapis-  
mis integimus, in principio in cruribus. Vbi uero materia statum accepe-  
rit, in capite. At in perfrigeratis ut recalcari non possint, crura & cubitos  
sinapismo integimus. Porro uitandus est Sinapismus in his qui febre conti-  
nua laborant, & his qui ulcus habent. Itemque in cartilaginosis & ex carni-  
bus partibus. Combuntur enim & denigrantur aliquando partes ex car-  
nes, dum sinapismo integuntur.

**Acopon Bromium.** Cere, colophonis, resine, sing. lib. j. adipis porcini  
trientem, butyri sexuncem, althææ sceni græci, seminis lini, singul. lib. ij. olei  
lib. j. galbani sextantem, & unc. s. Succum cum oleo coquito, donec multa  
succu pars fuerit consumpta, & reliqua cum cera & galbano adijcito.

**Acopon Varium.** Succu althææ, sceni græci, & seminis lini, rutæ, cu-  
mini, singul. lib. ij. medullæ ceruinæ libram. j. olei ueteris lib. j. adipis anseri-  
ni, opobalsami, nardini, singulorum libram. j. ceræ, colophonis, resinæ, sin-  
gul. lib. j. s. euphorbii, terebinthinæ, opopanax, singul. sexuncem, castorei  
quadrantem. At herbarum, ex quibus succus fit, singularum libra una suma-  
tur, & coquatur uelut præcedens.

**Acopon Azanica.** Adipis porcini lib. ij. adipis taurini, resinæ, colo-  
phonis

Acopa unde  
dicta

Illitionum ra-  
tio  
Dropacis præ-  
paratio & u-  
sus

Sinapismi ma-  
teria

Bromium aco-  
pon

Azanica aco-  
pon

Aphonia, cœsypī medicamenti, ceræ singul. lib. j. galbani quadrantem.

Acopon Basilij. Althææ, chamæmeli, melilori seminis lini, singul. unc. j. s. aminomi quadrantem, Hæc macerantur in uini Ascalonij aut cilicij sextar. viij. ad triduum, & ad mellis spissitudinem coquantur. Deinde succi lib. v. cum olei ueteris lib. iij. & coquantur, donec modicum succi superfue rit, & adjicitur butyri sexunc. terebinthinæ triens, adipis anserini unc. xv. medullæ ceruinæ cum modico oleo tritæ quincunx, ceræ albæ lib. iij.

Lysiponion

Acopon Lysiponion. Piperis, styracis, castorij, mastiches, aloes, elei, irisidis, singul. trientē, euphorbij, coliti, ammoniaci Thymiamatis, myrthæ, sampuchit, thuris, cyperei, cassiæ fistulæ, seminis rorismarini, singul. quadrantem, adarces, amomi, bdellij, xylobalsami, singul. sextantem, malabathri, picis nardi, pyrethri, croci, singul. unc. j. opobalsami lib. j. nardini, cyprini, gleucini, singul. lib. ij. ceræ lib. j.

Foetidum Acopon

Acopon foetidum, Ex opere Galeni de compositione medicamentorum secundū genera. Ceræ, terebinthinæ, singul. drach. xxiij. galbani, ammoniaci Thymiamatis, singul. drach. vi. olei hemi. ij. medullæ ceruinæ drach. viij. Vtere meraco & resolutio. Aliud foetidū Terebinthinæ drach. lvi. ceræ drach. xxvii. cœsypī, mellis, singul. drach. vi. medullæ ceruinæ drach. vi. ammoniaci Thymiamatis, galbani, aphronitri, baccarum lauri, sing. drach. vi. olei ueteris sextar. j. Vini cyathi. ij. Quidam etiam castorij drach. iij.

Acopon Barbaricum ex Euphorbio, Ad coxendicum morbum, et multalia. Opopanacis unc. j. ceræ Tyrhenicæ lib. j. terebinthinæ lib. ij. s. galbani unc. j. ammoniaci Thymiamatis sextantē, euphorbij, castorij, piperis albi, sing. sextantē, medullæ ceruinæ trientē, cœsypī trientē, limnithidis (est aut adarce) unc. s. olei styracini, laurini, iridii, amaracini, sing. sexuncē, olei ueteris lib. ij. hedychroi sexuncē. Acopon pyxis appellatū. Colophonizæ lib. j. s. terebinthinæ besslem, ammoniaci Thymiamatis quadrantē, thuris dodrantē, olei ueteris lib. ij. succi seminis lini lib. j. lactis bubuli lib. j. adipis anserini sexuncem, butyri bessē, albumina ouorū, xxiij. preparata reponi to in uase buxco. Acopon ex Abiete, Galeni. Seminis abietis maturi modū Italicū. j. hoc est sextar. xvi. olei lib. xv. ceræ lib. iij. resinæ strobilinae aut terebinthinæ trientē, Semē abietis cōtusum in oleū iniice, & ubi permiseris in ipso. xl. diebus, expressum reice, & reliquis ammixtis utere, & ad spontaneas lassitudines, & resolutiones, et articuloſi perfrigerationes. Si uero usus necessitas urgeat, semē abietis cū oleo coquere oportet, admixtis ut ne cōburatur, etiā aquæ sextar. iij. In podagricis & articularibus affectionibus. Aliter Idem. Olei hemi. xxv. hoc est sextar. xij. s. seminis abietis modū. j. hoc est sextarios. xvi. resinæ abiegnæ quadrantē, resinæ strobilinae aut terebinthinæ quadrantē, ceræ lib. j. Acopon ex populo nigra. Ad easdem affectiones. Pro Abietis semine, parē mensuram seminis populi nigre coniecto, & reliqua similiter ut illud præparato.

Limnitis est adarce

Pyxis acopon

Zosimi illitio

Illitio zosimi, ad tremores celebris. Resinæ picis sexuncem, ceræ trientem, olei ueteris lib. j. opopanacis sextantē, adarces unc. j. euphorbij unc. j. nitri trientem, aphronitri teneri trientē. Nitro, euphorbij, adarcen cū uino terito, deinde opopanacē adjecito ac simul leuigato. Scorsum uero liqua bilis cū anchusâ liquato, quo inde colorē sumant, & perfrigerata excipito.

Dropax Galeni

Dropax Gallus. Orisali. Colophonizæ thus redolentis, resinæ picis & lignosæ appellatæ, quæ in sola Italia prouenit, picis naualis, picis sicæ, singul. lib. iij. ceræ lib. iij. resinæ frictæ unc. xv. picis brutæ lib. ij. nitri lib. j. bituminis, galbani, adarces, pyretri, singul. sexuncem, opopanacis, euphorbij, ueratri albi, piperis, singul. trientem, sulphuris uiui quadrantem, castorij, ammoniaci, staphidis syluestris, singul. sextantem, olei Sicyonij lib. j. opobalsami sexuncem.

Resina lignosa Italica

Aliter Simplex. Ceræ lib. j. picis sicæ lib. j. s. picis brutæ lib. j. resinæ picis lib. j. s. resinæ frictæ lib. j. & trientē. Loco ex nitro præparato imposito.

Sinaptis

*Sinapismi præparatio.*

Sinapismi præparatio. Caricas pridie in aqua tepida macerare oportet, & postera die probe expressas fortiter tenere. Deinde acre Sinapi, quale est Siliacum & Aegyptium, per se terere, cremore sicuum affuso, & permixta in massas cogere: Ita ut siuehementem sinapismum facere uelimus, duas partes sinapis, ad unam caricarum miscamus. Si debilem, uice uersa. Si uero moderatum, æquales partes. At si anteaquam teratur sinapi aceto maceretur, uelut quidam faciunt, debilius euadit. Cæterum post ablauum sinapi, & post balnei usum, si dolor uehemens aut rubor succedat, & bullæ ac pustulæ erumpant, malug aut sceni greci succum cum rosaceo, linteolo in his imbuto, imponemus. Deinde cerato rosaceo cum cerussa utemur. At in resolutione, in quibus sensus oblaesus est, frequentius animaduertere oportet, de tege regi ac inspicere. Nam non percipientes sæpe immodice combussit sunt. Sed & caprini stercoreis pilulæ cum aceto impositæ, efficaciores sunt quam Sinapi, & maxime in coxendicum morbo laborantibus.

*Atramenti scriptorij illitio.*

Illitio ex atramento scriptorio. Rubificans proprie, & maxime hos quibus dimidia capitis pars dolet. Ex Alexandro.

Euphorbij, atramenti scriptorij, singul. drach. iij. myrrhæ troglodyticæ, crocomagnatis, piperis albi, singul. quadrantem, croci drach. ij. Aceti quantum satis est, ut hæc probeterantur, & crassitudo similis strigmento fiat: Et tunc illinito, initio sumpto ab intermedia superciliarum parte usque ad totum tempus, maxime si locus pilis nudus sit. Et ubi siccata fuerint rursus illinito, & quò bene opus suum peregerit auxiliū hoc, in balnei hominē deducto.

*Oleorum & Unguentorum præparationes Variæ. Cap. XX.*

*Oleorum & Unguentorum præparatio.*

EXVnguentis & oleis unguentolis quædā sunt simplicia, in quibus una species oleo iniicitur: quædam præparantur, & ex pluribus composita sunt. Et ex simplicibus, quædam ex floribus in oleum positis fiunt, uelut est rosaceum, chamæmelinum, susinum: quædam ex fructibus & seminibus: quædam etiam ex germinibus quibusdam, uelut rutæ, quæ etiam cum oleo coquantur, quum nullus flos cocturæ admittat. Quapropter magis insolantur. Verum si quidem fortem & durantem odoris iucunditatem habeant, si pluribus diebus insolentur, magis renuium partium & magis utilia, fiunt, uelut rosaceum & chamæmelinum. Qui uero flores debiliores sunt, & facile discutuntur, hi minus ferunt insolutionem, ut qui prompte transpirent, uelut lilium & uiola. Ex his autem quæ ex fructibus & seminibus fiunt, quædam ipsis totis in oleum coniectis fiunt, uelut melinum: quædam conuulsis aut molitis, & oleoso quod in ipsis est separato, aut expressis ipsis in cochlearis, aut per aquam calidam, sic ut separatio fiat, uelut quod ex nucibus fit, sesaminum, amygdalinum, lentissimum, laurinum, ricinum, raphaninum, & huiusmodi. Quæ uero ex plantis aromaticis fiunt, potissimum ita præparantur, ut illæ in oleo coquantur, cum uino, aut musto, aut aqua, & excolantur, ad oleum uero amisceantur succi quidam, quandoque etiam adipēs, aut medullæ. Ex talibus autem quæ exacte oleosam compagem habent, simpliciter unguenta aut unguina dicuntur, uelut gleucinum, nardinum, sicyonium, cyprinum. Quæ uero a corporum compagem habent, ceram aut elinam, aut tale quid assumentia, Myracopa appellantur, quemadmodum est decamyron & Amaracinum, & his similia. Et quædam sanè una uice coquuntur, quæ materiam non ita uariam habent, quemadmodum metopium, mastichinum, sicyonium. Quædam per duas, aut tres, aut quatuor inflectiones, ita ut primi contumaciore coquantur, uelut est aspalathus, spathæ, arbor thuris, laurus. Deinde aromata, folium, spica nardi, amomum, herba sabina. Postremum succi, adipēs & medullæ: & si ita contingat, cera & resina iniiciantur. At Opobalsami succus omnino non coquitur, sed post perfectam cocturam, refrigerato mediocriter unguento immittitur. Sed & ex ipsis unguentis quædam omnino non admittunt cocturam, sed solum permiscuntur, uelut Mendesivum. Quidam porro uiride unguentum facere uolentes, tingunt ipsum postquam

*Viridia ut fiat unguenta.*

quālibet igne ablatū est, in v. olei sextarios, æruginis rasæ tritæ probe, unc. j. immittentes, uelut in cyprino & amaracino. Ceterum simplicia ungenta uim habent specierum quæ in ipsa iniiciuntur, aut ex quibus contulsis facta sunt, quum oleum uelut materiam rationem in ipsis obtineat. At eorum quæ uaria sunt, tota natura ad caliditatem uergit. Verum quædam uelementer calida & mollitoria sunt, ut etiam articulis distortis ac compactis conueniant, uelut est Metopisum, Mendesium, Marciaton. Moderatius autem est pen camyron, quemadmodum rursus decamylon fortius, ut etiam superficiem radat. Quædam uero moderate quidem calida sunt, sed tenuium partium, ideoq; & mitigant & coneoquunt, uelut est Susinum, amaracinum, irinum, crocinum, foliatum. Quædam ad hoc quod calcificant, satis abunde siccant, & secandi uim habent, uelut cyprinum & Sicyonium. Quædam uero calida quidem satis sunt, uerum magis corroborant. Vnde stomacho maxime, & uisceribus exolutis conueniunt. Talia sunt mastichinum, nardinum, gleus cinum. Magis tamē corroborat q̄ sit ex uisæ acerbæ succo, omphacio appellato. At quibuscūq; ungentis propter odoris iucunditatem solū, mulieres utuntur, ut est foliatum, spicatum, comagenum, & ex moscho facta, moscholea dicta.

Moscholea.

Rosaceum. Rosarum rubrarum exunguium & per diem ac noctem siccatorum quadrantem, olei omphacini sextar. Italicum j. Vase diligenter constructio ut ne transpirent, in solato sub dio ad dies xl. Et tunc reposito non in pauiamento, sed in tabula. Quidam pro insolatione, uas in puteum demittunt, addies xl. eo quod ex frigiditate conseruetur odoris iucunditas. Alij ipsum uas in terra defodiunt.

Chamæmelinum. Floris chamæmeli, citra alba folia, per diem ac noctem siccata sextantem, olei sextar. Italicū j. Vas linteo simplici contegito ut transpiret & hoc quoq; ad dies xl. in solato post quas secure opertū reponito.

Anethinum. Comæ anethi uiridis siccatae unc. j. olei dulcis sextar. Italicū j. Similiter in solato. Fieri etiam poterit pro temporis occasione Anethinum, si in solatum non adfit. Sicci enim anethi comam cum oleo in duplici uase coquimus, & utimur. Fit etiam Chamæmelinum similiter. Verum de his hanc sunt illis quæ ex uiridibus fiunt, & insolantur.

Liliaceum, quod alijs Susinum. Fortassis ideo quod in Susis repertum sit, foliorum liliorum alborum similiter siccatorū sextans, in sextar. olei Italicū j. mittitur, & exacte constringitur ut ne transpiret, & per triduum in solatur. Post quod tempus primis excolatis ac abiectis, alius sextans iniicitur ad aliud usq; triduum, atq; sic reponitur.

Susinum à Susi.

Susinum compositum. Olei sextar. iij. calami aromatici quincuncem, myrtæ quincuncem, cardamomi quadrantem, foliorum liliū exunguiū & siccatorum lib. j. cinamomi quadrantem, croci Cilicij quincuncem, Tota præparatio in tres injectiones diuidatur. Et primum quidem myrrham & calamum uino ad dies quinq; maceramus, ac ter in die mouemus, & tunc cum oleo ad breuissimum tempus coquimus. Deinde Cardamomum ad triduum aqua maceramus, similiterq; mouemus, & rursus coquimus cum oleo ad unam horam. Postea colantes, ad oleum purum tertiam liliorum partē iniicimus: & post triduum excolantes, alteram tertiam liliorum partem iniicimus, & rursus post triduum excolantes, & priora abiicientes, postremam tertiam liliorum partem cum croco trito immittimus. Post aliud autem triduum, excolato oleo cinamomum contusum iniicimus, aut pro ipso, Arnam, aut cassiæ duplum, aut carpesium, atq; sic reponimus.

Violaceum. Violaceum præparant alijs purpurearum, alijs crocinarum, alijs albarum uiolarū foliorum exunguium quadrantem iniicientes, in olei omphacini sextar. Italicū j. Et adstrictio uase exacte ut ne transpirent, insolant ad dies x. ter ipsas uiolas post triduum semper, uelut lilia permutantes. Sed & ad repositionem paucas uiolas exacte siccas iniiciunt.

Viola triplis.

Melinum. Hoc paratur ex malis cydonijs, forinsecus panniculo de-

tertis,

tertis, & unā cum corticibus in frusta concisis, deinde libris .iij. ex ipsīs, in sextar. x. Italicos olei omphacini iniecto, & insolato ad dies .xl.

Sesaminū. Oleū fit, cōtulis aut molitis sesamis, aut p. fiseellas in cochlea expressis, aut in aqua calida oleo ipso separato, & in uitreis uasis reposito.

Raphaninum. Et hoc eodem modo in Aegypto fit, ex semine raphanorum tenues radices habentium tuso, & oleo separato.

Ricinū. Et hoc eodem modo in Aegypto fit, ex semine ricini quod croton uocatur, similiter tuso, aut molito.

Aegirinū ex populo nigra. Circa ueris tempus hoc fit, quum multa circa semen est resina. Nam grana populi nigrae contundunt, & horum trientem in sextarium j. olei dulcis inijciunt, & ad dies .xl. insolant, aut in duplici uase ad horas .iij. coquunt, & sic excolatum reponunt.

Amygdalinum. Fit & hoc uelut praedictum, tulis amygdalis amaris puris, & modica aqua instillata, & oleo so separato uelut dictum est. Quidam tusorum amygdalorum sextantem, in olei dulcis sextar. Italicum j. immittunt, & in duplici uase coquunt.

Amygdalinum quod & Metopium. Aegyptij qui hoc oleum inueniunt, Metopium ipsum appellauerunt, eo quod galbanum recipit. Planta autem ex qua fit galbanum, Metopium uocatur. Recipit haec. Olei omphacini sextar. xx. amygdalorum amarorum lib. ij. cardamomi lib. j. floris iunci odorati, calami aromatici, carpobalsami, singul. lib. j. myrrhae, galbani, singul. sexuncem, terebinthinae lib. ij. Vini odorati ad maceranda in ipso arida sextar. iij. Mellis Attici lib. ij. Resinam & galbanum cum parte olei trita ac dissoluta, reliquis coctis inijcimus, & tunc mel addimus. Quum uero omnia exacte permixta fuerint, dum leuiter calidum adhuc est medicamentum ab igne tollimus & excolamus. Frigescens enim crassum fit.

Balaninum. Sed & Balaninum similiter ut simplex amygdalinum fit, non ab his quae in quercubus nascuntur glandibus, sed ex his quae ungenteriae glandes & myrobalani appellantur.

Quod ex nucibus fit oleum, itidem uelut relatū, ex ueterib. nucibus fit.

Laurinum. Purum quidem laurinū simili modo ut relata, ex lauri fructu fit. Verum quod mixtum est, hoc modo paratur. Ad oliuarum maturarū sextar. v. baccarum lauri sextar. j. inijcitur, terunturq; omnia ac exprimuntur. Quidam aequalem ex ambobus mensuram sumunt ac miscent.

Lentiscinum. Et hoc similiter ut laurinum paratur ex lentisci fructu, duplici modo, & per se, & cum oliuis non maturis, sed acerbis.

Mastichinum. Simplicissimum quidem fit, mastiches chiae unc. j. in olei omphacini sextar. j. iniecta, & in duplici uase cocta. Quidam etiam absinthij & styracis singul. unc. j. inijciunt.

Mastichinum uariiegatius. Olei sextar. l. lenij lib. v. xylobalsami lib. x. floris iunci odorati lib. v. cardamomi lib. vij. mastiches lib. v. xylomastiches lib. vij. terebinthinae lib. ij. comae absinthij lib. j. Vini odorati sextar. v. aquae sextar. x. Arida uino triduo antea macerata, ad oleum & aquam miscentur, & coquuntur horis vi. & tunc mastiche & terebinthina inijcitur, & exacte permixta excolantur, & refrigerata uasis excipiuntur.

Sicyonium simplex. Hoc fit radice cucumeris syluestris sextante, in olei sextar. Italicum j. coniecto, & in duplici uase coctura facta.

Sicyonium compositum. Olei sextar. x. radice cucumeris syluestris derae lib. j. serpylli, meliloti, singul. sexuncem, tedarum pinearum pinguis, althaeae, singul. quincuncem, scolopendrij sexuncem, foeni graeci sextar. ij. foenum graecū die una in aqua praemaceratur, deinde excolatur, & praedicta inijcitur unā cum oleo, & uini sextar. ij. Et ad omnia cocta, medullae ceruinae cum modico oleo tritae triens immittitur, & adapis gallinae triens. Et excolatū oleum uasis excipitur. Quidā post cocturā insolant ipsum ad dies .xl.

Sicyonium aliud efficacius. Succu elaterij sextar. ij. aristolochiae rotundae

Croton, ricini  
semen.

Metopium.

Vngenteriae  
glandes Myro  
balani.

Sicyonium ut  
re paratum.



unda & longæ styracis, elenij, hyssopi, iridis, colocynthidis, pulegij, origani, cypri, dendrolibani, centaurij, foliorum lauri, singul. sextantē, olei sextant. v. Mixta coquito donec parum succi super sit.

Cyprinum ex Posidonio. Olei sextar. xxv. cypri, elenij, iridis, singul. j. sa. p. fuchi, hyssopi, seminis uiuicis, saluæ, sing. quadrantem, floris cyprini ligustri lib. j. Reliqua omnia in uino die una macerata coquitur cū oleo ad horas vj. Ad excolatum autem oleum ligustrum inijcitur, si quidē addit, uride cum teneris ramulis non contusis, sin minus, siccis cum modica aqua contusis, & coquitur ad sesquihoram. Si uero uelis ipsum tingere, ubi ab igne ademptum est, æruginis puræ unc. j. s. inijce. At Posidonius acrimoniam æruginis fugiens, post cocturam inquit, dimittit oleum in cacabo non obliro stanno per triduum, & tingetur facultate ipsius non læsa.

Actugo in unguentis

Cyprini alia descriptio. Foliorum ligustri, foliorum lauri, iridis, cypri, saluæ, singul. quadrantem, dendrolibani, aristolochiæ longæ, seminis uiuicis singul. trientem, elenij, aspalathi, singul. sexuncem, rutæ sextantem, cupressi sextantem, olei sextar. x. Hæc in uino præmacerata cum oleo coquitur, & excolato oleo rursus xylobalsami, xylocassii, sing. trientem inijcito, sampfuchi, cumini, myrti, styracis, mastiches, singul. quadrantem, opopanaxcis sextantem, floris ligustri sexuncem, æruginis unciam unam.

Amaracinum. Elenij lib. x. xylobalsami lib. xx. cypri lib. viij. floris iunci odorati, aspalathi, herbæ sabine, singul. lib. viij. opopanaxcis, seminis amaraei, singul. lib. ij. Olei primarij sextar. lxxx. Vini odorati sextar. v. Reliqua omnia uino præmacerata primam habeant iniectionem, secundam herbæ sabine. Et illa quidem horis vj. coquantur, hæc tribus. Quidam etiam hoc tingentes æruginis quadrantem inijciunt.

Oleum prima rium

Irinum. Iridis, aspalathi, cypri, singul. lib. v. opopanaxcis quadrantem, anchusæ sextantem, olei sextar. xxx. Aquæ sextar. xv. Quidam etiam floris iunci odorati sexuncem adijciunt, & cassiæ quadrantem, xylobalsami sexuncem, celticæ sexuncem. Omnia confusa, aqua & oleo præmacerantur ad dies v. & in duplici uase coquantur ad horas vj. & Reponantur.

Crocinum. in quo etiam alterum Crocomagma. Olei omphacini odorati libram unam, calami aromatici quincuncē, myrrhæ troglodyticæ quincuncem, cardamomi septuncem, croci cilicij sexuncem. Primæ iniectionis sit calamus & myrrha, quæ trita uino macerantur per triduum, & ter in die palmacea spathula agitantur. Deinde cum oleo coquantur. Secundæ cardamomum pridie aqua maceratum. Tertiæ crocus uino maceratus. Quidam cum croco etiam alium myrrhæ quincuncem adijciunt. Et excolatum olei purum reponunt. Specierum autem fecem subsidentem totam in pastillos efformat ac siccant, habentq; medicamentum illud quod Crocomagma uocant. Mendesium. Indeditum est, quod in Aegypto inuentum sit, ubi & Mædes colitur. Recipit olei balanini lib. x. In alio sunt sextar. x. myrrhæ, cassiæ fistulæ, singul. quadrantem, terebinthinæ lib. x. In alio sunt sexta. x. Cinamomi quadrantē. Hoc non coquitur, sed arida insecta per dies lx. mouentur. Deinde liquata in olei parte terebinthina immittitur, & postea rursus per alios lx. dies mouetur. Atq; sic reponitur.

Crocomagma Mendesium

Marciaton. Mastiches, ceræ, styracis, singul. quadrantē, celsipime, dicamenti unc. s. opobalsami unc. j. s. nardini, gleucini, olei omphacini, singulorum quadrantem, medullæ ceruinæ unc. j. s. terebinthinæ unc. j.

Marciaton

Vnguentum ex uua acerba. Iniectio. j. Aspalathi, spathæ palmularum, meliloti, iridis, floris iunci odorati, xylobalsami, rosarum siccarum, calami aromatici, singulorum quadrantem, olei omphacini libras. x. succi uuæ acerbæ sextar. x.

Iniectio. ij. Folij amomi, spicæ nardi, costi, caryophylli, cassiæ, cassami, singul. quadrantem. In alio etiam arnabo quadrantem. Vini quod satis est.

Iniectio. iij. Thuris, ammoniaci thymiamatis, styracis, bdellij, myrrhæ, masti-

G

maſticheſ, ſingul. quadrantem, uini quod ſatis eſt, ceræ albæ quincuncem, opoballami ſexuncem. Quidam beſſem. Primæ iniectionis medicamenta in ſucco uuæ acerbæ & oleo, die una præmacerantur. Secundæ uero iniectionis in alia pelui, in uino Aminæo, aut alio ueteri & odorato. Moueto quotidie ſpatha palmacea ter, in dies tres. Poſt quos in cacabo ſtanno obliſito coquito. Primum primæ iniectionis medicamēta donec parum de uuæ acerbæ ſucco ſuperſit. Deinde ſtatim quæ ſecundæ iniectionis ſunt cum uino immittitur. Melius autem eſt faciã prius colatura, ſic ipſa ad purum oleum inſicere, & poſtquam cocta fuerint, donec pauciſſimum uini reſter, ut ne comburatur oleum, ablatur ab igne excolator & rurfus ad oleum purũ, tertię iniectionis medicamenta ſucculenta prius cum uino, quale dixi, in mortario trita inſcito, ſtyrace excepto: Hic enim cum alijs iniectus facile ſoluitur: & ad prunas coquito, donec bene habere uiſa fuerint, & ablata ab igne refrigerari ſinito. Poſtridie ad oleũ diligenter excolatũ, & ſufficienter calefactum ſuper ignem, ceram inſice, & ablata ſpathula commoue, & ubi refrigerata fuerint, opoballamum adijce, & in ualis uitreis reponere.

*Gleucinum*

Gleucinum. Iniection. j. Olei ſextar. x. multi Aminæi ſextar. vi. aſpalathi trientem, ſpathæ palmaceę ſexuncem, ſloris iunci odorati ſexuncem, meliloti trientem, roſarum unc. j. myrrhæ quadrantem, ſoliorum lauri ſextantem, dendrolibani ſexuncem, xylobalſami ſexuncem, elenij ſexuncem, ariſtolochiæ longæ quadrantem, iridis quadrantem, Hæc in muſto macerato.

Iniection. ij. Celticæ trientē, caſſami ſextantē, cyperti, caſſiæ, ſpicæ nardi, aſari, amomi, coſti, ſampſuchi, ſing. quadrantē. calami aromatici, caryophyllorum, ſolij ſingu. unc. j. cardamomi trientem, uino odorato macerato.

Iniection. iij. Maſticheſ trientem, myrrhæ troglodyticæ, bdellij, ſingul. ſextantem, ladani quadrantem, ſtyracis liquidi, thuris maſculi, ſingul. trientem, opoballami ſexuncem. Quidam etiam croci ſextantem. Præparato uelut id quod ex uua acerbâ fit, excepta cera. Verum hic per. vii. dies, duarum iniectionum ſpecies macerare oportet.

*Nardinum Cizicenum*

Nardinũ Cizicenum. Iniection. j. Olei primarij ſextar. x. aſpalathi, cyperti, elenij, iridis, xylobalſami, ariſtolochiæ, cardamomi, ſloris iunci odorati, ſing. ſexuncē, ſampſuchi trientē, herbæ ſabinæ ſextantem. Quidam etiam calami aromatici ſextantem. Hæc in uini odorati ſextar. iij. macerato.

Iniection. ij. Caſſiæ, Caſſami, arnabo, ſing. ſextantē, ſpicæ nardi quadrantē, caryophylli unc. j. coſti, amomi, ſing. ſextantē. Quidā etiã celticæ ſextantē. Hæc in uino macerantur. Iniection. iij. Myrrhæ troglodyticæ, aloes, thuris, ſing. ſextantē, ſtyracis quadrantē, maſticheſ trientē, opoballami ſexuncē. Quidā etiã croci uino triti unc. j. Præparato & hoc uelut dictum eſt.

*Decamyron*

Decamyron. Spicę nardi, ſolij, euphorbij, piperis, coſti, adarces, ſing. unc. j. maſticheſ unc. j. s. opoballami ſexuncē, nardini lib. j. ceræ ſexuncem.

*Pentamyron*

Pentamyron. ſtyracis unc. j. maſticheſ ſextantem, ceræ albę quadrantem, opoballami trientem, nardini quincuncem.

*Foliaſum*

Foliaſum. Folij quadrantē, amomi unc. j. caſſiæ ſexuncē, ladani unc. j. piperis albi grana. xl. myrrhæ troglodyticæ drach. j. Contuſa & cribrata rurfus in pila leuigato, olei nardini lib. j. adiecta. Quo uero nigrius pharmacũ reddatur, nucum iuglandium cortices uſtos ac tritos in mortario, adiecto. Deinde opoballami cochlearia tria ammiſceto, ac utitor.

De ænantharijs.

Cap. XXI.

*Ænantharia unde appellata*

Non quod ænanthen recipiant hæc, ænantharia appellata ſunt: Quædã enim ænanthen omnino non recipiunt: ſed propter uinum, & ſorem liſiorum, hanc appellationem adepta ſunt. Uſus ænanthariorum apud quosdam ſecundi odoris tantum, & delictarum gratia aſſumitur, qui ipſis utentes poſt balnea eis profunduntur, & ſpongijs his imbutis menſas detergunt. Verum apud recte utentes etiam auxilia ſunt, in his qui exoluntur, & ſyncopem incidunt, ſi ad cataplaſmata ſtomachum corroborantia amiſceantur.

ur, & in his qui ex morbo febrili maxime se recolligunt, qui post egressus a balneis perfunduntur ipsis, & naribus adhuc ualde inspirantibus ipsi admovent. Trahuntur enim in profundum, & animalem ac uitalem spiritum corroborant. Commoda sunt etiam his qui se præsruant, ne in pestilentes morbos incidunt, quam aeris mutatio huiusmodi apparet. Est autem Posidonij tale quod Mesopotamenum uocat.

Oenantharj Mesopotameni præparatio. Cassiæ, myrrhæ, thuris, folij, amomi, mastiches, costi, carpobalsami, opobalsami, singul. quadrans, styracis pinguis trientem, uini odorati Aminæ Italici sextar. x. Omnia contusa & cribrata, styracem uero in tenues partes diuisum, in uas amplioris composito, cum lilij folijs pridie siccatis & exunguis alternatim locatis. Sint aut lilia numero. ccc. Deinde adijce uinum & opobalsamū ante infectionem mixta ac commota, & obturato osculo uasis insolato ad di. es. xl. Et utere a balneis, post refocillationem ex morbis, & respergitio ex iplo domum & uasa. Tincto item in ipso spongiæ, & ad faciem apponito.

Aliud. Sicut nos parare solemus. Costi quadrantem, spicæ nardi, arnabo, caryophylli, singul. unc. j. amomi quadrantem, cassiæ, oenanthes, calam. singulorum dodrantem, styracis opobalsami, singul. trientem, lilia. ccc. Vini falerni sextar. x. præparato simili modo.

De Suffimentis et Cyphi. Cap. XXII.

Cypheos materia media est inter pastillos qui bibuntur, & antidota. Vt mur ipsis quandoq; ad suffitus, iucundi odoris gratia, quemadmodū etiā Thymiamatis ac suffimentis. Quandoq; uero olfacimus ipsa ad cōcoquendas destillationes, et grauedines remouendas, & ad cerebrum perpurgandum, & ad præseruationē a pestilentibus affectionibus. Sed & per os sumuntur, tum ob eadē, tum ut quæ circa thoracē herent cōcoquant, & ad frigidiores in hepate affectiones. Vnde etiā Cyphiformes antidotos dictas uereres inuenerūt. Miscetur etiā in cōposita medicamenta, maxime epithemata & antidota. Thymfama id est suffimentū rosatū. Costi, amomi, myrrhæ, cassiæ, sing. unc. j. styracis, mastiches, chitæ, bdellij, onychum, musci, ladani, sing. drach. ij. rosarum purarum unc. xxxix. opobalsami, Vini quod satis est.

Suffimentum Liliaceum. Liliorum exunguium lib. j. styracis primarij dodrantem, spicæ nardi quadrantem, costi, caryophylli, amomi, mastiches, onychum uistorum, mellis sing. unc. j. s. opobalsami quincuncem, Vini quod satis est. Terito ac efformato in pastillos.

Cyphi magnum quod Solare uocant, ex rebus. xxxvi. Styrcis, myrrhæ, bdellij, ladani, aspalathi, elenij, singul. sexuncem, nardi celticæ, folij cupressi seminis, ammoniaci Thymiamatis, nucis pineæ, splanchni, aut pro ipso onychum magnorum. ij. carpobalsami singul. quadrantem, cassiæ, iridis, seselis, sphagni, cyperi, cardamomi, calam aromatici, singul. quincuncem, rosarum siccarum, croci, spicæ nardi, herbæ Sabinae, radices asphodeli, alij succum habent, singul. trientem, lacaphthi (est autem pini, aut alterius, cuiusdam arboris cortex) dodrantem, costi, floris iunci odorati singul. sextantem, baccas iuniperi magnas. xl. & paruas. l. amomi, terebinthinæ, palmularum purarum, singul. lib. j. caricarum exemptis granis, uuarum passerarum exemptis uinaceis, singul. lib. ij. Mellis despumati lib. v. Posidonius etiam uini odorati sextar. iij.

Aliud. cyphi Lunare appellatum, ex rebus. xxvij. Bdellij, elenij, singul. septuncem, iunci rotundi sextantem, sphagni quincuncem, baccas iuniperi paruas. l. cardamomi quincuncem, aspalathi septuncem, cassiæ fistulæ quincuncem, spicæ nardi sextantem, cyperi quincuncem, asphodeli radicis, sabinae, singul. trientem, seminis cupressi, nardi celticæ, malabathri cū folijs, rosarum siccarum, singul. quadrantem, costi, croci, singul. sextantem, ladani, myrrhæ, singul. septuncem, caricarū pinguium, uuarum passerarum exemptis uinaceis, singul. lib. ij. nucum pinearū bellem, terebinthinæ lib. j. styrcis septuncem

Suffimenta uaria

Cyphi Solare

Lacaphthum quid sit

Cyphi Lunare

ptuncem, palmularū pinguis lib. j. Mellis lib. v. Vini odorati quod satis est.

*Preparatio Masfuche quam aliqui Masuaphium vocant.*

*Caput. XXIII*

*Masfucha*

*Masuaphium*

**M**elliloti dextantem, xylobalsami, aspalathi, herbae sabinae, myrrhae, amomi, floris iunci odorati, foliorum lauri, stactes, styrtacis, calami aromatici, sampfuchi, singulorum sextantem, iridis quincuncem, folijs croci, singulorum unc. j. opobalsami unc. s. gummi lib. j. rosarum siccarum sexuncem, Vini quod satis est.

*De pessis, ex Antylo. Cap. XXIII*

*Pessi siue tali triplices*

**P**essi siue Tali, utero adhibentur. Differentiae ipsorum secundum genus tres sunt. Quidam enim molliunt. Quidam adstringunt. Quidam oscula uenarum aperiunt. Mollientibus igitur in uteri inflammationibus, ulcerationibus, perfrigerationibus, recurribus sursum uersus, auersionibus & inflationibus utimur. Parantur autem ex cera Tyrrhenica, cyprino, fusino, adipis anserino aut gallinaceo, butyro infuso, resina uita, medulla ceruina, foenograeco, & quae eiusdem generis sunt. Aperientibus autem oscula uenarum, quum purgationem suppressam reuocare uouerimus, aut uteri contractionem aut contractionem corrigere. Parantur hi ex melle, artemisia, dictamno, brassicae succo, radice dulci, porri succo, ruta, scammonia, & similibus. At uero adstringentes contrarium his qui aperiunt, usum exhibent. Nam fluxum muliebrem cohibent, & expansum uterum contrahunt, & prolapsum repellunt. Verum materia adstringentium antea indicata est in tractatione de collyrijs & pastillis. Oportet autem strigmentum & paulo crassius facere pessi spissitudinem. Deinde lanam linamento angusto similem duplicatam in medicamentum tingere, & ad uteri osculum apponere, ita ut filum oblongum habeat annexum, quo pessus facile extrahi possit, ubi id uisum fuerit.

*Pessi forma*

Pessus Croceus, ad inflammationes, & auersiones, duriciasque ac inflationes. Cerae albae, medullae uitulinae, singulorum drachmas, xvi. medullae ceruinae drachmas, xi. adipis anserini drachmas. viij. adipis gallinacei drachmas. viij. mastiches drachmas. iij. cespypii medicamenti drachmas. iij. mellis drachmas. ij. croci drach. viij. Rosacei quod satis est. Crocum cum lacte muliebri terito.

Pessus Aureus molliens optimus. Croci drach. j. cespypii drach. j. medullae ceruinae drach. ij. terebinthinae, cereae, adipis anserini, singul. drach. iij. uorum assatorum uitellos. xvi. trini & rosacei ex aquo quod satis est.

Pessus Libanius, menses ducit, & ad uterinas affectiones egregie conducit. Unguenti nardini sexuncem, cerae Tyrrhenicae quincuncem, unguenti fusini trientem, adipis porcini recentis quadrantem, adipis anserini, gallinacei, medullae ceruinae, unguenti amaracini, singul. sextantem, adipis taurini, terebinthinae, cespypii, singul. unc. j. Liquatur in duplici uase, quemadmodum etiam omnes alij pessi.

*Enneapharmacus*  
*cus*

Pessus Enneapharmacus. Unguenti rosacei, ricinini, terebinthinae, cereae, mellis, adipis anserini & bubuli, medullae ceruinae, butyri, sing. e quales partes. Pessus Titianus emolliens. Cerae sexuncem, colophonae trientem & unc. s. adipis taurini trientem, ammoniaci Thymiamatis trientem, Ammoniacum cum aqua terito.

Pessus Aegyptius. Mellis, terebinthinae, butyri, rosacei, aut fusini, croci, singulorum partem. j. Verum in non inflammatis & sordidis, etiam aeruginis dimidia pars additur.

Pessus Genitura appellatus. Ad concipiendum. Butyri sexuncem, cespypii medicamenti, medullae ceruinae, adipis anserini & gallinacei, terebinthinae, aloes, singulorum quadrantem, cerae Tyrrhenicae sexuncem, rosacei libras. ij. myrrhae, cassiae, singulorum sextantem, spicae natdi unciam. j. Mellis quantum satis est.

De medicamentis inter se adiffim succedaneis. Ex Galeno.

Caput XXV.

Succedanea

IN Alexandria, inquit, quum muliercula quadam periclitante quadiuise  
sem lychnidem, nec reperissem: si nō statim pro lychnide, acanthij semine  
comperito usus essem, perisset mulier. Quare rogatus a sodalibus, ad hanc  
succedaneorum inter se uticissim medicamentorum descriptionem iuxta for  
dinem literarum deueni ab hoc ipso initium facturus.

## A

A Canthij semine, lychnis.  
Abrotono, origanum.  
Agallocho, calamus aromaticus.  
Agarico, epythymū, aut euphorbiū.  
Agriostaphide, palmulæ Syriacæ.  
Anchusa, hyacinthus.  
Acacia, lentisci succus.  
Acantha, acanthi siliquæ.  
Acanthi siliquis, Acantha.  
Aconito, iridis syluestris radix.  
Acoro, asari radix.  
Alumine, sal fossilis.  
Alumine scisso, malicorium.  
Aſia, glaucium aut simus ouillus.  
Aſie, sambuco, acantha.  
Alicacabo, Solani fructus.  
Aloe, ibidis fructus.  
Aloe Indica, aloes uiridis folia, glau  
cium, Lycium, aut centaureon.  
Ammio, anisum.  
Amianto, aphroselenon.  
Amylo, pollen siccus.  
Amygdalis amaris, absinthium.  
Ammoniaco Thymiamate, propo  
Adipe uulpino, ursinus (lis.  
Adipe ceruino, anserinus. (tus.  
Adipe uitulino, adeps porcinus ue  
Adipe hyenæ, adeps anserinus, aut  
uulpinus.  
Adipe crocodili, adeps canismarini  
Amomo, acorus.  
Aniso, Daucus.  
Araco, sesamum.  
Argemona, seriphium.  
Aristolochia, clematidis sicca.  
Aristolochia rotunda, aristolochia lō  
Armata, nasturtiū Babylonici. (ga.  
Armenio, Atramentum Indicum.  
Asaro, zingiber.  
Asio lapide, lapis gagates, aut sal am  
moniacus, aut sandaracha.  
Aspalatho, ericæ fructus, aut uiticis  
semen.  
Aspiodeli radice, betæ succus.  
Absinthio, abrotonum.  
Auripigmento, sandaracha.

## B

B Itumine, pix liquida aut terra am  
pelitis.  
Balauſtio, hypocistis aut Cytini.  
Balsamo, myntha ſtaſie.  
Bdellio, sphagius aromaticus.  
Besafa, semen rutæ syluestris, aut hor  
Buprestis, blatte cap. detracto. (tēſis.  
Butyro, lactis bubuli concrementū.  
Buccinis, ostrea.

## C

C Admia, leucographis Aegyptia  
Calamo aromatico, sphagnus.  
Calamintha, syluestris menta.  
Cantharidibus, phalangia. (dix.  
Capparis radice, ericæ aut myricæ ra  
Cardamomo, cyper xylocarpalum.  
Casia, cinamomi dimidium aut her  
ba ſabina.  
Castorio, ſilphium.  
Canchry, lauri baccæ aut pyrethri.  
Cedria, baecæ cedri.  
Cedri baccis, ladanum.  
Calce uiua, adarce.  
Ceraunio, leucographis.  
Cera, faba fresa cum propoli cocta  
ac trita.  
Cerussa, plumbi recrementum, ad  
plumbum uſtum.  
Chamaedri, rumicis syluestris radix.  
Cicuta, pſyllij semen.  
Chamaemelo, anthemis.  
Chamaelionis succo, ſalicis succus.  
Chalcantho, squamæ æris.  
Cinnabari, Rhodoides.  
Cinamomo, cassiæ duplum, aut her  
ba ſabinæ duplum.  
Clinopodio, heliotropium.  
Cnici semine, uiticis semen.  
Colocynthide, Ricini semen.  
Colophonía, pix naualis.  
Corallio, Moly, aut ſymphitum.  
Costo, ammoniacū, cedri baccæ, ele  
Coryledone, Onocardiū. (nū.  
Chrinanthemo, aphrodisias.  
Croco, crocomagma.  
Crocomagmate, Aloe Indica.

## G

Cumī,

Cumino Aethiopico, Melanthium.  
Cynosbaro, Solani fructus.  
Cypero, Iuniperus magna aut car-  
damomum.  
Cyphi, carica usta.  
Cornu cerui, cornu caprae.

**D** Amafonio, Carpesium aut ca-  
lamantha.

Dauci semine, laueris semen.  
Didaamo, pulegium, aut salua.  
Diphryge, misy torrefactum, aut la-  
pis phrygius, aut aes ustum, aut la-  
pis pyrites.

Dorycnio, hyoscyami semen.  
Dracunculo, aron.

**E** Beno, loti arboris lignum.  
Ebisici radice, radix papyri.  
Elatery succo, porri succus, aut eius-  
dem herbae succus.

Elleboro nigro, struthii radix.  
Enneaphyllo, potamogiton.  
Epithymo, colocynthidis semen.  
Ericae fructu, galla omphacitis.  
Erysimi semine, struthium.  
Erinei folijs, folia mori.

Erucae semine, erisimi semen.  
Eupatorio, chamaepitys. (stris.)  
Euphorbio, stercus columbae sylue.  
Eruca pini, Vespae cum cedria.

**F** Ecce uini usta, sandaracha.  
Fellae uiperae, fel Ichneumonis.  
Felle cameli, fel stellionis.  
Felle mustellae, fel simiae.  
Felle hyenae, fel perdicis.  
Filice, Vrticæ semen.  
Folio, spica nardi, aut Iris Illyrica.

**G** Albano, Sagapenum.  
Galla, myricae fructus.  
Gentiana, Elenium.  
Gentianae radice, apij aromatici ra-  
dix, Est autem petroselinum.  
Glycyrrhizae succo, succus mori.

**H** Ederae succo, succus persicus.  
Hyacintho, Flos Isatidis. (Aus.)  
Hyoscyami semine, cynosbati fru-  
Hypocistidis succo, acaciae succus.  
Hyperico, anethi semen.  
Hippuride, chamaepitis.  
Heliotropij semine, rapii semen.  
Hormini semine, semen lini.

**I** Ride Illyrica, Elenium aromaticum.  
Iunco aromatico, cardamomi aut  
Iunco, polygoni radix. (cinamomum.)  
Iuniperi baccis, Oysterus.

**L** Adano, sampsuchus.  
Lathyride, granum Cnidium.  
Lapathi radice, radix pyrethri.  
Lauri baccis, serpyllum aridum.  
Lapide Asio, gagates lapis.  
Lapide phrygio, lapis argyrites aut  
pyrites.

Lapide pyrite, lapis pirobolus.  
Lapide Magnete, lapis phrygius.  
Lentisco, terebinthus.  
Lepidio, erythrodanum.  
Lepidij radice, folia capparis.  
Lepore marino, concha marina.  
Lennio sigillo, sandaracha.  
Leucoij flore, struthion.  
Lini semine, fabarum succus.  
Loti semine, betae semen.  
Lygustici semine, radix eiusdem, aut  
pastinacae, aut laueris semen.  
Lychnide, acanthij semen.

**M** Alabathro, cassia, aut cupres-  
sus pilulos ferens, aut spica nar-  
Malua, fenum graecum. (di.)  
Mandagrora, dorycnium.  
Malis cydonijs, melilotum.  
Manna, thuris cortex.  
Mastiche, lentisci succus.  
Medulla cerui, adeps ceruinus, aut  
medulla uituli.  
Medulla uituli, oesypus, aut medul-  
la Meliloto, lotus syluestris. (la cerui.)  
Melle, sapa. (num.)  
Melle Attico crudo, Mel despumae.

Meo, myrobalanus  
Mendesio uino, uinum Italicum  
Misy torrefacto, diphryges.  
Misy cyprio, ochra cypria.  
Menta, calamintha.  
Molybdana, spuma argenti.  
Mori succo, rubi folia.  
Myrobalano, peucedanum.  
Myrteo uino, Mori succus.  
Myrteo oleo, lentiscinum aut me-  
linum.  
Myrrha troglodytica, calamus aro-  
maticus.  
Muriu stercore, muscae parimeni,  
sura.

N

**N**Api semine, rapi semen. (cus.)  
 Nardo Syriaca, iuncus aromati  
 Nardo Indica, Nardus celtica.  
 Nucleis pincis, cucumeris semen.

O

**O**cira, Misy cyprinum.  
 Ocimo, silymbrium.  
 Ocimoide, menta sylvestris.  
 Oenanthe, omphacium siccum.  
 Omphacio, Rhois succus.  
 Oleę lachryma, hypocistidis succus.  
 Oleę Aethiopica lachryma, acaciae  
 partes duae.  
 Oleo ricinino, laurinum aut uetus.  
 Oleo ueteri, Sicyonis, aut duplū o-  
 lei coquito cū adipe fusillo ueteri.  
 Onocardio, psyche herba.  
 Opopanace, castoriū, lac fycamini  
 id est mori, pix liquida.  
 Ornithogalo, Anthyllis.  
 Oryza, farina hordeacea.  
 Oſtreis, buccina. (ui.)  
 Oorum uirellis assatis, medulla cer  
 Oesypo medicamēto, medulla uiri  
 lina. P

**P**Anacis radicis uncia una, opopa  
 naxis drach. j.  
 Piperis, zingiber.  
 Piperis albo, nigrum duplicatum.  
 persae folijs siccis, rosas siccas.  
 Peucedano, glycyrrhizes succus.  
 Picelico, pix liquida.  
 Picebrutia liquida, bitumen, pix uer  
 nacula abunde, aut cōmunis pix  
 cocta cum aceto.  
 Pice liquida, oppanax.  
 Polij semine, cruce semen.  
 Polygoni succo, succus Plantaginis  
 Polypodio, chamaelaea.  
 Polytricho, absinthium.  
 Pompholyge, cadmia usta.  
 Potamogitone, serpillum.  
 Popule nigrae ramulis, sampsuchus.  
 Propoli, ladanium ammoniacum.  
 Psyllio, lens palustris. (dix)  
 Pyrethro, zingiber aut lapathi ra-  
 Piu, sphagnos.  
 Phycio id est fuso, anchusa.  
 Pulcgio, hyssopus.  
 Pumice, terra cretica.  
 Plumbo usto, cerussa.

R

**R**Apo, heliotropium,  
 Raphanino oleo, ricininum

Rheo, centaurinum. (argenti)  
 Recrementum plumbi, recrementū  
 Recremēto cyprio, melanteria Ae-  
 gyptia.  
 Resina colophonis, pix naualis  
 Resina pini, terebinthina.  
 Resina picea sicca, sagapenum.  
 Resina terebinthina, resina pini.  
 Radice lapathi, radix cinnaræ.  
 Radice cinaræ, radix asphodeli.  
 Rosi siccis, folia persae sicca.  
 Rodoide, sinopsis rubrica.  
 Rhoe syriaco, lapathi radix.  
 Rhoe culinario sicco, sampsuchus.  
 Rubigine ferri, recrementum ferri,  
 aut squama ferri, aut spuma argēti.  
 Ricino, sordes e palestra.

S

**S**Agapeno, galbanum, aut resina  
 picea sicca.  
 Sabino oleo, ricininum oleum  
 Salamandra, lacerta uiridis  
 Saluis, calamintha.  
 Sampsucho, thus culinaris.  
 Santonico, abrotonum.  
 Satyrio, cruce aut saluie semen.  
 Scapiade, prœniæ radix.  
 Serpyllo, potamogito, aut pyrethro  
 Sēperuio, folia aut succus lactucae.  
 Sepiae testa, pumex.  
 Sesamo, semen lini.  
 Sesamoide, quod ab amarantho ex  
 presso restat.  
 Scammonia, colocynthis, ricini se-  
 minis pars interna, lathyrus.  
 Scinco, satyrium.  
 Scilla, bulbos.  
 Sinapi, nasturcium.  
 Sio, id est lauere, asparagi aut ligu-  
 stici radix.  
 Sifone, anisum.  
 Sissimbrio, ocimum.  
 Spodio, pompholyx.  
 Spodio cyprio, cinis foliorum oleæ  
 Stribio, squama æris.  
 Stacade, chamedrys.  
 Sori, diaphryges, aut melanteria.  
 Struthij radice, elleborus niger aut  
 euphorbium.  
 Sale ammoniaco, sal cappadocius  
 Salis flore sandaracha.  
 Styrace, castorium.  
 Symphyto, centaurium. (nicē.)  
 Sinone syriaco, petroselinū macedo  
 Syrico, spuma argenti.

G 4

Sphagno

Sphagno, luncus odoratus, herba  
 Sabina.  
 Sphon filio, spodium cyprium, aut  
 cinis foliorum olea.  
 Sulino oleo, oleum foeni graeci.  
 Succo balsami, myrrha stacte, suc-  
 cus carpsi, fructus balsami.  
 Succo Thebaico, succus papaueris  
 Succo salicis, succus hederæ nigræ.  
 Succo carpsi, succus myrrhæ.  
 Succo cyrenaico, succus Syriacus,  
 laser, aut silphij succus. (cus.  
 Succo papaueris, Mandragoræ suc-  
 Succo mori arboris, hederæ succus.  
 Succo peucedai, glycyrrhizæ succus.  
 Succo Rhododaphnes, uiscu quer-  
 Succo fici, succus mori. (cinum.  
 Succo syriaco, succus mori.  
 Sulphure uiuo, sandaracha.  
 Stercore felis, stercore Ichneumonis.  
 Stercore gulturis, columbæ stercore.  
 Stercore lupi, stercore caninum.  
 Stercore turturis, stercore columbæ.

**T**erebinthina, mastiche, aut res-  
 na strobilina.

Terra tenera, plumbago.  
 Terra altera, terra Cimolia.  
 Terra cretiade, calx Thebaica.  
 Terra cretica, terra Erediria.  
 Terra Samia, leucographis Aegy.  
 Terra Megara, spuma salis. (ptia.  
 Thapsia, nasturtij aut erucæ semen.  
 Thapsia succo, chamaeleonis nigri  
 Thermuntiae, lycopsis. (succus,  
 Troxinus id est intubis, maiulium  
 appellatum, siue lactuca.  
 Thure, terra ampelitis.  
 Thuris cortice, manna thuris.

V

**V**erbenaca, chamaeleuce.  
 Vino Italico, uinum Medesig.  
 Vino Rhodio, uinum austerum.  
 Vino Syriaco, uinum Rhodium.  
 Vua acetba, malicorium, aut galla  
 omphacitis. (caro.  
 Vua passa satua, palmula Syriacæ  
 Viscæ quercino, chamaeleo albus.

X

**X**ylobalamo, Radix leucosj.  
 Xylocarpo, cinamomum.

Z

Zingiber e, pyrethrum.

## De ponderibus et Mensuris. Cap. XXVI.

Pondera  
 Mensurae

**P**ondus grauitatis mensu indicatur: Mensura autem uasculi capacita-  
 te. Vasculum uero tum arida, tum liquida quantitatibus mensura existit.  
 Quare tres omnino dimensae quantitatibus sunt differentiae: Vna quidem  
 ponderis: altera uero rerum aridarum, utpote quae uelut in aggerem  
 accumulatur: Tertia autem liquidorum. Ceterum quum penitus infinita  
 pondera ac mensurae, tum pro locorum, tum pro eorum qui eis unum  
 consuetudine, existant: de his saltem quae omnibus maxime familiaria  
 sunt, nobis sermo erit.

## De ponderum ac Mensurarum notis:

Note pondera  
 tum ac mensurae  
 variae

Verum quum quidam non integris literis, sed per notas hae ipsae pon-  
 dera ac mensuras significant, praestiterit fortassis & nos in hac parte ueter-  
 res imitari, atque primum characteres ipsos declarare. Primum igitur litera  
 x, ubi a. literam habuerit incumbentem, chalcum id est acreum significat,  
 hoc modo. x. Si uero. a. ipsi. x. incubuerit, choa id est congiuum demon-  
 strat, sic. x. Si. a. choenicem, x. Si. x. cheman, x. K. uero litera si incum-  
 bens. a. habeat, & linea recta inferiorem ipsius apicem per obliquum se-  
 cet, ceratio, id est siliqua significat, hoc modo. K. Quod si. v. ipsi. K. incum-  
 bat, cyathum significat, sic K. Si uero. a. corylam id est heminam, K.  
 Porro linea circumflexa, quam nihil aliud circumstat, & quae omnino per  
 obliquum ponitur, obolum denotat. ~. Si uero duae sunt lineae, quas nihil  
 circumstat, duos obolos signant. ~. Qui grammata, hoc est scrupulum faci-  
 unt, quod per litteram. r. quae. p. adiectum habet, denotatur, recta amplius  
 linea ipsum. p. secante, hoc modo. r. p. Duae autem lineae iuxta alteram extre-  
 mitatem confertae, angulumque constituentes, ad similitudinem duorum api-  
 cum, qui in ipsius. K. literae pictura, ad rectam lineam adscribuntur, drach-  
 significant, quae & Holec cognominatur, hoc modo. L. Proprie autem hol-



capitulum litteram notatur, a. littera medium eius occupante, hoc modo Δ. Quod si i. littera ad λ. apponatur, libra significatur, λi. Aliqui tamen alteram ipsius λ. lineam per obliquum alia linea secantes, libram denotant sic, λx. At uero littera i. intra angulum suum a. litteram habens, unciam significat, i. μ. autem iuxta medium ipsius v. habens, minam denotat, M. Si uero u. habeat, mystrum, M. Si i. medimnum, μ. Si a. modium, μ. Porro τ. litteram ρ. complectens, & u. incumbens habens, Tryblum significat, τρ. f. autem supra se i. habens, xesten, id est Sextarium designat, f. Si uero a. habeat supra scriptum, oxybaphum, id est acetabulum, f. Aliqui tamen Xesten per f. denotant recta linea dissectum, hoc modo f. x. autem incumbens μ. habens, heminum indicat, ρ. κ. uero cum g. connexum, incumbente ipsis littera μ. cetarium signat, ρκ.

## De ponderibus.

Mna, id est Mina Attica &amp; Aegyptia habet uncias

xvi.

Mina Romana habet uncias

xx.

Libra Vncias

xij.

Vncia drachmas

viij.

Drachma scrupulos

iij.

Scrupulus obolos

ij.

Obolus siliquas

iij.

Siliqua areos siue areolos

ij. drachmæ tertij partes.

Ita ut obolus areolos viij. complectatur.

## De Mensuris liquidorum.

Italicum Ceramium habet, Chous viij.

Chous siue Congius, Sextarios vi.

Sextarius cotulas ij. quæ &amp; Tryblia appellantur.

Cotula siue Tryblum, magna mystra. iij. Acetabula uero. iij.

Magnum enim mystrum continet Acetabulū. j. &amp; tertiam ipsius partem.

Acetabulum uero sesquicyathum habet.

Cyathus chemas paruas, aut mystra parua ij. habet.

Quod si uelis liquidorum iuxta pondus scire dimensionem: Multe enim rerum liquidarum differentie iuxta lancis momentum existunt: id ipsum ex olei, uini, & mellis exemplo docebimus. Mel igitur uino grauius est quarta ampliusque decima parte, quod ferè totum tertiam eius partem facit. Habet enim eadem mellis ad unum mensura, totum uini pondus, accedente insuper tertia eius ponderis parte. Ad oleum autem mel dimensum, dimidia eius parte ponderosius existit. Habet enim totum olei pondus, atque insuper dimidiam eius ponderis partem. Vinum uero nona parte olei excedit. Habet enim pondus ipsius totum, ampliusque nona eius ponderis partem. Quæ res ut magis euidens et manifesta fiat, omnium mensurarum pondus sigillatim subiectimus, uelut in tabella depictum: ita ut manifeste constet, quod per pondera quæ singul. mensuris subiecta sunt, oleum, Vinum, & Mel, ex ordine demonstratur.

## Ceramium Italicum habet

Olei	Vini	Mellis
Libras lxxij.	libras lxxx.	libras cvij.
Libras ix.	Chous siue Congius habet libras x	libras xij. & dimidiam.
Vncias xviij.	Sextarius habet. uncias xx.	uncias xxviij.
Vncias ix.	Cotula siue hemina habet uncias x.	uncias xij. & dimidiam.
Vncias iij.	Magnum Mystrum habet uncias iij. scrup. viij.	uncias iij. & dimidiam.
Drach. xviij.	Acetabulum habet uncias ij. scrup. xij.	uncias iij. scrup. ix. Drach. xij.

Mensura liqui-  
dorum

Cyathus habet  
drach. xij.      seſquiunciam, ſcrup. iij.      uncias. ij. drach. ij.  
Paruum Myſtrum habet  
drach. vj.      ſcrup. xx.      drach. ix.

Oribalius autem iuxta Adamantium, Sextarium Italicum, vini quidē iuxta menſuram, uncias. xxiij. habete autē iuxta pondus uero, lib. j. unc. vij. ſextarium autem mellis, libratum duarum & dimidiæ pōdus habete tradit.

## De Menſuris Aridorum.

Aegyptia Artaba continet Modios. iij.  
Modius Aegyptius & Italicus habet chœnices. vij.  
Chœnix Sextarios. ij.  
Sextarius ſemiſextarios ij. qui & Heminae appellantur.  
Hemina autem habet cyathos. vij.  
Atticus Medimnus continet Hemiecta. xij.  
Hemiectum autem ſeu Semodius, chœnices. iij.  
Quo fit ut Medimnus habeat Modios vj. chœnices. xlvij. ſextarios. xcvj.  
Cæterum pondus harum menſurarum non facile eſt proſeſſe, quod immenſa diuerſitas rerum atidarum, iuxta lancis inclinationem exiſtat.

Finis librorum 7. Pauli Aeginetæ, Iano Cornario  
Medico Interprete.

## . Pondera Latina ab interprete uſurpata.

Libra	Vncias xij.
Deunx	Vncias xi.
Dextans	Vncias x.
Dodrans	Vncias ix.
Bes uel Beſſis	Vncias viij.
Septunx	Vncias vij.
Sexunx uel Semiſſis.    habet	Vncias vj.
Quincunx	Vncias v.
Triens	Vncias iij.
Quadrans	Vncias ij.
Sextans	Vncias ij.
Vncia	Drach. viij.
Semuncia	Drach. iij.

S. hæc nota dimidium pondus cuiuſq; ponderis ſignificat, hoc eſt Semis. Reliqua pondera ac Menſuræ iuxta Pauli traditionem uſurpata ſunt.



